






6 vols.
750 fca

Bibliothèque
Du Roi

15428/c



Pancz



Dessiné & Gravé par F. N. Martinet, Dessinateur de M^{tes} les Ducs de la Roche-foucauld, & d'E. d'Orléans.

ORNITHOLOGIA

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS AVIUM DIVISIONEM IN ORDINES,
Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates.

*CUM ACCURATA CUJUSQUE SPECIEI
descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium,
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nomi-
nibusque vulgaribus.*

A. D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academiæ Socio.

Opus Figuris æneis adornatum.

VOLUMEN I.



PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM,

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam,
ad Insigne S^æ. Genovesæ, & Sⁱ. Joannis in Deserto.

M. DCC. LX.

CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO REGIS.

ORNITHOLOGIE

O U

M É T H O D E

CONTENANT LA DIVISION DES OISEAUX
en Ordres, Sections, Genres, Espèces & leurs Variétés.

*A LAQUELLE ON A JOINT UNE DESCRIPTION
exacte de chaque Espece, avec les Citations des Auteurs
qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux
que leur ont donnés les différentes Nations, & les Noms
vulgaires.*

Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences.

Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

T O M E I.




A P A R I S,


QUAY DES AUGUSTINS,

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte
Geneviève & S. Jean dans le Désert.

M. DCC. LX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.





A MONSEIGNEUR
LE DUC
DE BOURGOGNE.



ONSEIGNEUR,

*Les grandes & heureuses dispositions que vous avez
reçues de la nature, jointes au choix des personnes*

commises à votre éducation , promettent aux Sciences & aux Savants que vous daignerez leur accorder votre protection auguste. Les Gens de lettres vous offrent des hommages , qu'ils ne croient pas moins dus aux belles qualités que vous annoncez , qu'à votre naissance Royale. Que je serai heureux , MONSEIGNEUR , si je puis moi-même vous rendre un hommage qui vous plaise , en vous présentant cet Ouvrage , & s'il est digne de vous occuper quelques instants.

Je suis avec le plus profond respect ,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & très-obéissant
serviteur

BRISSON.



P R É F A C E.

LORSQUE je publiai en 1756 ma division générale des Animaux en neuf Classes, ainsi que la division particulière des deux premières, je m'engageai à donner les autres successivement au Public. Depuis ce temps-là je n'ai pas cessé de travailler à remplir mes engagements. J'avoue que j'aurois pu il y a déjà quelque temps acquitter une partie de la dette que j'ai contractée, & publier cette troisième Classe; mais le desir que j'ai eu de la rendre la plus complète qu'il étoit possible, ne m'a pas permis de la donner telle qu'elle étoit alors. Le grand nombre de correspondants qu'avoit feu *M. de Reaumur* dans toutes les parties du monde, & le zèle avec lequel ils ont travaillé à compléter son Cabinet, m'ont fourni continuellement de nouveaux matériaux propres à enrichir cette partie de l'Histoire Naturelle. En dernier lieu, étant même sur le point de faire mettre cet ouvrage sous presse, *M. Poivre*, à qui l'Histoire Naturelle a tant d'obligations, apporta des Indes Orientales à *M. de Reaumur* une collection d'Oiseaux d'autant plus précieuse, que la plupart des espèces qui la composoient, avoient été jusqu'alors inconnues. Cette nouvelle acquisition, jointe aux autres envois qui lui furent faits à peu près dans le même temps,

m'obligea de faire à mon ouvrage des additions considérables, & même en quelque façon de le refondre en entier, afin de donner à chaque objet la place qui me parut lui être la plus convenable, voulant éviter les supplémens, que je pense ne devoir être mis en usage que lorsqu'on ne peut faire autrement. En effet il est plus agréable pour le lecteur de trouver les choses à leurs places, que d'être obligé de les y rapporter, même quoiqu'elles soient indiquées.

Tant de nouvelles espèces, si différentes de celles qui étoient déjà connues, qui ne pouvoient par conséquent être rangées sous aucuns des genres désignés par les méthodes précédentes, prouvent combien il étoit nécessaire de travailler de nouveau l'Ornithologie, les Auteurs qui en ont traité jusqu'à présent, n'ayant pu en donner une assez complete, faute de s'être trouvés à portée de voir les objets qui font le sien.

Belon est le premier qui ait donné quelque ordre à cette partie de l'Histoire Naturelle, en rapprochant les uns des autres les Oiseaux qui lui ont paru avoir entr'eux le plus d'analogie, soit par leur façon de vivre, soit par leur forme extérieure. Son ouvrage en étoit un excellent pour le temps auquel il a été publié : temps que l'on pourroit regarder en quelque façon comme celui de l'enfance de l'Histoire Naturelle ; mais aujourd'hui que nos connoissances se sont multipliées, cet ouvrage est trop incomplet. A la vérité les descriptions que donne l'Auteur sont assez exactes ; mais le plus souvent il se contente d'indiquer l'espèce sans la décrire en aucune façon, même lorsqu'il

qu'il s'agit des Oiseaux qu'il nous dit avoir été à portée de voir par milliers. Les figures qu'il nous en a données sont la plupart fort mauvaises. Malgré cela nous lui avons beaucoup d'obligation : l'on en doit toujours à ceux qui ont osé frayer la route & applanir les premières difficultés. Il est bien plus aisé d'avancer dans un chemin déjà pratiqué, quelque raboteux qu'il soit, que dans un champ encore en friche, & tout couvert de ronces & d'épines.

Gesner, qui l'a suivi de près, s'est un peu plus étendu ; mais il a donné fort peu de choses de son propre fond ; presque tout a été tiré des différens ouvrages qui avoient paru jusqu'alors. On ne peut pas dire pour cela que ce soit un plagiaire, puisqu'il n'a point déguisé la source dans laquelle il a puisé. Au bas de chaque article est le nom de l'Auteur qui lui a fourni ce qu'il avance. Il n'a donné à son Ornithologie d'autre ordre que l'alphabétique, qui, à proprement parler, n'en mérite pas le nom. Les figures qu'il a fait graver, sont presque toutes fort imparfaites.

Aldrovande, qui a paru peu de temps après, ne s'est pas contenté de ce qui avoit été dit sur les Oiseaux ; il en a décrit une grande quantité d'espèces nouvelles ; & ses descriptions sont assez exactes ; mais il ne s'en est pas tenu à ce qu'il sçavoit, quoiqu'il sçût beaucoup ; il y a ajouté tout ce qu'il a entendu dire, qui avoit quelque rapport à son objet, sans s'embarrasser si la chose étoit avérée ou non. Tout lui a paru bon : les rêveries même du peuple ont trouvé place dans son ouvrage. Les figures qu'il a données des Oiseaux, ne sont pas meilleures que celles de *Gesner*.

Tome I.

* *

Dans le même temps *Schwenckfeld* donna par ordre alphabétique & sans gravures, l'Histoire des Animaux de Silésie, qu'il divisa en Livres, & dont les Oiseaux forment le quatrième. Ses descriptions sont assez exactes à l'égard de ce qu'elles contiennent, mais la plupart trop succintes & embrassant trop peu de parties de l'animal pour le faire bien connoître.

Jonston, qui a publié dans la suite son Histoire des Animaux, a sçu lire & copier : il nous a donné, soit entier, soit en partie, une nouvelle édition des ouvrages des différens Auteurs qui ont travaillé avant lui. Il a pareillement copié leurs figures, mais en les réduisant de façon à les rendre le plus souvent méconnoissables.

Enfin parut celui que je regarde comme le vrai Méthodiste, *Ray*, qui fut l'Editeur de l'ouvrage de *Willughbey*. Ce Savant a rangé les Oiseaux dans un nouvel ordre, & établi des caractères propres à les faire connoître. Les descriptions de ceux que l'Auteur a été à portée de voir, sont bien détaillées & fort exactes; mais les figures qu'il en a données ne répondent pas à cette première exactitude : elles ont presque toutes été tirées des Auteurs qui l'ont précédé.

Il sembloit qu'à l'aide d'un si bon guide, on ne devoit qu'avancer dans une route déjà si applanie; mais *M. Barrere*, qui publia son Ornithologie en 1745, nous a appris qu'il étoit possible de reculer. Je ne crois pas qu'on puisse rien faire d'aussi mauvais dans ce genre. Ses observations sont le plus souvent fausses, & ses dispositions ridicules. L'on trouve dans sa Méthode l'*Outarde* placée entre l'*Hirondelle* & le *Bruant*; ce

dernier entre l'*Outarde* & le *Pélican*; l'*Oiseau-de-Paradis* entre le *Casoar* & l'*Autruche*, & tant d'autres que je pourrois citer. Il semble qu'il range ses Oiseaux dans une armoire, & que, voulant ménager le terrain, il fait remplir par les petits le vuide que laissent nécessairement les gros. J'ai cependant trop bonne opinion de lui pour imaginer qu'il eut fait paroître son ouvrage dans cet état d'imperfection, s'il n'y eût été encouragé par l'approbation que lui a donnée la Société Royale de Montpellier, & qu'il n'a pas oublié de faire imprimer à la tête de son Ornithologie.

Quelques années auparavant *M. Linnæus* avoit publié son *Système de la Nature*, dont il donna l'année dernière la dixième édition. Ses caractères sont insuffisans, non-seulement pour comprendre les espèces qui n'étoient pas encore connues, mais même celles qu'il a rangées sous chacun de ses genres : puisque plusieurs n'en ont pas le caractère.

Il a cependant beaucoup augmenté cette dernière édition, & y a fait des changemens considérables. Entr'autres il a, à mon exemple, rapproché les *Cetacées* des *Quadrupèdes*, par la raison qu'ils allaitent leurs Petits; mais pour ne pas paroître me copier, il les a mis dans la même Classe; ce que je ne crois pas soutenable. Il a fait un autre changement, qui m'a paru bien singulier: il est vrai qu'il s'y est déterminé difficilement, puisqu'il a attendu la dixième édition. Il n'avoit ci-devant donné à l'*Homme* que deux associés, sçavoir le *Singe* & le *Paresseux*. Il en ajoute un troisième, qui est la *Chauve-souris*; & les appelle

tous trois , conjointement avec l'*Homme* , *Primates*. Tout le monde sçait quelle est la part qu'a la *Chauve-souris* dans l'empire de l'*Homme* sur les Animaux.

La Méthode d'Ornithologie la plus récente que nous ayons , est celle que *M. Moehring* donna au Public en 1752 , dans laquelle ce qu'il a observé lui-même sur l'animal se trouve assez exact ; mais les caracteres qu'il a établis d'après les descriptions des Auteurs qu'il a consultés , ne méritent pas la même confiance. Ces descriptions trop imparfaites l'ont induit en erreur , & l'ont conduit à former plusieurs genres de différentes especes qui appartiennent au même , & à ranger sous le même des especes appartenantes à des genres différens.

Ces trois derniers ouvrages sont sans descriptions. Cependant *M. Linnæus* a décrit les animaux de Suède dans son *Fauna Suecica*.

Deux ans auparavant que l'ouvrage de *M. Moehring* parût , c'est-à-dire en 1750 , *M. Klein* avoit publié son Histoire des Oiseaux , qu'il a divisés en Familles. La simplicité des caracteres qu'il établit , cause dans son ouvrage une confusion horrible. Tout s'y trouve pêle-mêle. L'*Aigle* , le *Colibry* , le *Coq* & la *Grue* appartiennent , selon lui , à la même Famille : nous ne nous en serions assurément pas doutés. La raison qu'il en apporte , est que tous ces Oiseaux ont quatre doigts à chaque pied , sçavoir trois placés en-devant & un en-arriere. Selon ce systême , il auroit dû y faire entrer aussi le *Martin-pêcheur* , & non pas , comme il a fait , dans la Famille des *Perroquets*. On ne le trouvera pas

plus exact dans le détail : il lui est arrivé quelquefois de placer la même espece dans deux genres tout-à-fait différens , & cela parce qu'il l'a trouvée décrite sous différens noms , tandis que d'autres fois de deux especes , qui ne se ressembloit point du tout , il n'en a fait qu'une seule.

Outre ces grands Historiens & ces Méthodistes , plusieurs Auteurs ont traité en particulier des Oiseaux ; sçavoir *Nieremberg* & *Hernandez* de ceux de Mexique : les ayant donnés sous le nom du Pays seulement & décrits trop imparfaitement , il est très-difficile de déterminer leur genre. *Marcgrave* de ceux du Brésil : ses descriptions sont passables ; mais les figures qu'il en donne , ne ressembloit point aux Oiseaux qu'il décrit. *Rzaczynski* de ceux de Pologne , du grand Duché de Lithuanie & des Provinces adjacentes : il les a rangés par ordre alphabétique , & a copié une partie des descriptions données par les Auteurs qui l'ont précédé. *Sloane* de ceux de la Jamaïque : ses descriptions sont exactes , & ses gravures on ne peut pas plus mauvaises. *M. le Comte de Marsili* de ceux du Danube : ses descriptions sont très-succintes , & ses figures le plus souvent fort imparfaites. *Catesby* de ceux de la Caroline , de la Virginie , de la Floride & des Isles Bahama : ses descriptions , quoique souvent trop abrégées , sont exactes , & ses figures assez bien enluminées. Enfin *M. Frisch* de ceux d'Europe : ses figures sont très-bien enluminées ; les couleurs ne sont point trop vives & imitent parfaitement le naturel : j'y trouve cependant un défaut , c'est qu'assez souvent l'Oiseau est représenté plus gros que nature. Ce dernier ouvrage

n'est pas encore fini : l'Auteur travaille à sa continuation. *Olina* a donné une quarantaine d'Oiseaux, dont la figure représente assez bien l'animal. L'on trouve aussi dans la description du magnifique Cabinet d'*Albert Seba* plusieurs Oiseaux de différens pays, assez mal décrits & figurés.

Outre tous ces Auteurs il y en a encore deux qui nous ont donné des figures enluminées ; sçavoir *Eleazar Albin*, de qui les descriptions ne sont autre chose que celles de *Willughbey*, souvent assez mal appliquées ; & les figures sont si mal coloriées que l'Oiseau n'est pas reconnoissable. En second lieu *George Edwards*, dont les descriptions sont très-bien détaillées, & les figures exactement enluminées : il faut cependant avouer que dans quelques-unes les couleurs sont trop vives & plus belles que le naturel.

Je ne finirois point si je voulois parler de tous les Auteurs particuliers, voyageurs ou autres, qui ont décrit quelques Oiseaux. Je les cite chacun à l'endroit que j'ai cru leur convenir : l'on pourra juger de la valeur de leurs descriptions, en les comparant aux miennes, sur-tout si ce sont des especes qui me soient parvenues.

Après cette légère esquisse de l'Histoire & du progrès de l'Ornithologie, je passe au plan que j'ai suivi dans cet ouvrage. Je le divise en vingt-six ordres, qui contiennent cent quinze genres, sous lesquels sont rangées environ quinze cens especes ou variétés. Les pattes & les becs sont les parties que j'ai choisies pour établir les caracteres. Le nombre des doigts, leur position, leur séparation ou leur réunion entr'eux, les

membranes qui les joignent ensemble ou le défaut de ces mêmes membranes sont autant de caracteres qui m'ont servi à faire les grandes & premieres divisions : les sous-divisions sont désignées par les différentes formes du bec : les autres particularités déterminent le genre : enfin la différence des couleurs distingue les especes. L'on trouvera à la tête de cet ouvrage la méthode, que j'ai établie avec le plus de clarté & de précision qu'il m'a été possible. Je la fais suivre par différentes Tables, dont la premiere présente sous un seul aspect les caracteres des vingt-six ordres ; pour chacun desquels est ensuite une Table particuliere, dans laquelle il se trouve divisé en sections, & les sections en genres, avec tous les caracteres qui les désignent. Pour ce qui est de la différence spécifique, elle est exprimée dans une phrase latine, qui précède la description de chaque espece. Le plan que j'ai suivi pour chacune de ces descriptions, est le même pour toutes ; c'est-à-dire que je les commence toutes & les finis de la même façon : je décris d'abord les grandeurs & les proportions de l'Oiseau, ensuite ses couleurs, commençant par la tête & finissant par la queue. J'avoue que cela produit une monotonie, qui deviendrait insoutenable dans un ouvrage fait pour être lû de suite ; mais dans celui-ci cet inconvénient cesse d'en être un, parce que chaque description est en quelque façon un ouvrage à part & indépendant de tout le reste. Au contraire même cette uniformité procure un avantage réel, qui est celui de pouvoir aisément comparer une espece avec une autre, & voir du premier coup d'œil en quoi elles diffèrent l'une de l'autre.

Cet ouvrage forme six volumes. Le premier renferme les trois premiers ordres, ſçavoir celui des *Pigeons*, celui des *Poules*, dans lequel ſont comprises auffi les *Gelinotes*, les *Perdrix*, &c. & celui des Oifeaux de proie diurnes & nocturnes.

Dans le ſecond l'on trouve les cinq ordres ſuivants, ſçavoir celui des *Corbeaux*, qui comprend auffi les *Pies*, les *Geays*, &c. celui des *Grives*, celui des *Etourneaux*, celui de la *Hupe* & celui des *Hirondelles*.

Le troiſième eſt formé des quatre ordres ſuivants, ſçavoir de celui des *Moineaux*, de celui des *Becſignes*, de celui du *Torchepot*, & de celui des *Grimpereaux*, *Colibrys* & *Oiſeaux-mouches*.

Dans le quatrième ſont compris les treizième & quatorzième ordres, ſçavoir celui des Oifeaux qui ont deux doigts devant & deux derriere, comme les *Pics*, les *Perroquets*, les *Toucans*, &c. & celui des Oifeaux dont les doigts ſont réunis dans la plus grande partie de leur longueur, comme le *Martin-pêcheur*, le *Guêpier* & pluſieurs genres nouveaux.

Le cinquième eſt compoſé des quinzième, ſeizième & dix-ſeptième ordres. Les Oifeaux de ces trois ordres ont tous la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes. Ceux qui forment le quinzième ont les aîles trop courtes, eu égard à leur groſſeur, pour pouvoir voler, comme l'*Autruche*, le *Caſoar*, &c. ceux du ſeizième n'ont que trois doigts, comme l'*Outarde*, le *Pluvier*, &c. & ceux du dix-ſeptième ont quatre doigts, comme le *Vanneau*, les *Beccaffes*, les *Courlys*, les *Hérons*, &c.

L'on

L'on a enfin dans le fixième les neuf derniers ordres, dans lesquels sont compris tous les Oiseaux *Palmipedes*, c'est-à-dire, ceux dont les doigts sont garnis de membranes dans toute leur longueur. Les différentes formes de ces membranes, la différente position des jambes & le nombre des doigts fournissent les caractères par lesquels on distingue ces neuf ordres.

Tous les Oiseaux que j'ai été à portée de voir, sont décrits avec l'exactitude la plus scrupuleuse. A l'égard des autres, qui sont le plus petit nombre, j'ai été obligé de m'en tenir à ce qu'en ont dit les Auteurs qui en ont traité. J'ai seulement rendu leurs descriptions plus analogues aux miennes, en suivant dans les unes le même plan que dans les autres; & cela afin qu'on puisse, comme je l'ai dit ci-dessus, plus aisément comparer une espèce avec une autre, & voir en quoi précisément elles diffèrent. L'on peut donc compter sûrement sur les descriptions que j'ai faites ayant l'Animal sous les yeux. Pour ce qui est de l'exactitude des descriptions des autres espèces, j'en donne pour garants les Auteurs qui me les ont fournies; & afin qu'on puisse les distinguer les unes des autres, j'ai marqué de ** les espèces que j'ai décrites sur l'Animal même, & de * seulement celles que je n'ai vues qu'en partie. Le reste de leur description & les descriptions entières des espèces qui n'ont aucune marque, je les ai faites d'après les différens Auteurs cités dans cet ouvrage: & j'ai toujours préféré de suivre ceux qui ont dit avoir vu l'Animal.

Au bas de chaque description j'indique le Pays où
Tome I.

l'on trouve l'Oiseau décrit : & pour prouver que je n'avance rien sans en être sur , j'avertis , au moins à l'égard des especes qui composoient le cabinet de feu *M. de Reaumur* , quel est le correspondant qui a bien voulu se donner la peine de les faire rassembler & de les lui envoyer.

Pour donner les moyens de s'instruire en fort peu de temps de tout ce qui a été écrit sur tel ou tel Oiseau , j'ai joint aux descriptions les indications de tous les Auteurs qui en ont parlé , & de toutes les figures qui en ont été données , en avertissant de l'exactitude ou du défaut de ces mêmes figures. J'y ai aussi ajouté tous les Noms que donnent à chaque espece les différentes Nations , ainsi que les Noms vulgaires.

Cet ouvrage est enrichi de plus de deux cens vingt planches gravées en taille-douce , très-bien exécutées , dont les sept premières sont destinées à représenter les différentes formes des pattes & des becs des Oiseaux , qui sont les parties dont j'ai tiré les caractères : les autres contiennent plus de cinq cens Oiseaux dessinés & gravés d'après nature , dont au moins trois cens cinquante ne l'avoient jamais été ; & de ces derniers plus de trois cens vingt n'avoient pas même été décrits. Les cent cinquante autres ont été à la vérité déjà gravés ; mais la plupart si imparfaitement , que le plus souvent l'Animal n'est pas reconnoissable. J'ai eu l'attention , autant qu'il a été en mon pouvoir , de faire graver au moins une espece de chaque genre.

Je dis que tous mes dessins ont été faits d'après nature : je donne cependant la figure de quelques especes d'Oiseaux que je n'ai jamais vûes ; mais celles-là ont été

dessinées sur l'Animal même par un excellent observateur, par *M. Poivre*, de qui le gout pour l'Histoire Naturelle est assez connu. J'ai cru qu'on pourroit compter sur ses dessins comme sur ceux qui ont été exécutés sous mes yeux; que je ferois un tort réel au public, si je manquois de lui faire connoître des especes si singulieres, que nous ne serons peut-être jamais dans le cas de voir en France. Si *M. Poivre* n'a pas pu les joindre à sa collection, peu de gens pourront nous les faire parvenir; parce qu'il en est peu qui aient plus de zele & plus d'intelligence que lui. Cependant, comme je me suis fait une loi de ne rien assurer que ce que mes observations m'ont fourni, j'ai marqué d'un A toutes les especes gravées d'après les dessins de *M. Poivre*.

Je n'ai rien négligé pour faire donner à mes planches toute l'exactitude dont elles sont susceptibles, & pour leur faire exprimer, soit la variété des couleurs, autant que la gravure en est capable, soit les différentes formes des parties qui caractérisent les Oiseaux. Ceux qui se sont trouvés assez petits pour permettre de les conserver dans leur grandeur naturelle, n'ont point été réduits : les autres l'ont été dans des proportions exactes de toutes leurs parties; & chacun a son échelle, au moyen de laquelle on peut voir aisément quelle est la grandeur réelle de l'Animal.

L'on trouvera quelques Oiseaux gravés hors de leur place : ces transpositions ont été inévitables; parce que ce sont des especes qui ne me sont parvenues qu'après l'arrangement des planches achevé & la gravure commencée ou même finie.

Les soins que je me suis donnés , pour rendre cet ouvrage le plus complet & le plus parfait qu'il m'a été possible , joints au grand nombre de nouveaux objets qui y sont décrits & figurés , me font espérer qu'il sera reçu favorablement.



CATALOGUS AUCTORUM.

- A**CTA Upsal Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsalienfis. Stockholmiæ. in-quarto.
- Alb.** Histoire Naturelle des Oiseaux ornée de 306 Estampes, qui les représentent parfaitement au naturel, dessinées & gravées par Eléazar Albin, & augmentée de notes & de remarques curieuses, par W. Derham, &c. traduite de l'Anglois. A la Haye. 1750, in-quarto. 3 vol.
- Aldrov. Avi. Tom. I.** Ulyssis Aldrovandi, Philosophi ac Medici Bononienfis, Historiam naturalem in Gymnasio Bononienfi profitentis, Ornithologiæ, hoc est, de Avibus historiæ Libri XII. Bononiæ. 1646, in-folio.
- Aldrov. Avi. Tom. II.** Ulyssis Aldrovandi, Philosophi & Medici Bononienfis, Ornithologiæ Tomus alter. Bononiæ. 1645, in-folio.
- Aldrov. Avi. Tom. III.** Ulyssis Aldrovandi, Philosophi & Medici Bononienfis, Ornithologiæ Tomus tertius ac postremus. Bononiæ. 1637, in-folio.
- Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro.** . . . Histoire naturelle de l'Islande, du Groenland, du détroit de Davis & d'autres Pays situés sur le Nord; traduite de l'Allemand, par M. Anderson, &c. A Paris. 1750, in-12. 2 vol.
- Barr. Hist. Fr. Eq.** Essai sur l'Histoire naturelle de la France Equinoxiale, ou dénombrement des Plantes, des Animaux, &c. Par Pierre Barrere, Correspondant de l'Académie des Sciences de Paris, &c. A Paris. 1741, in-12.
- Barr. Ornith.** Ornithologiæ Specimen novum, sive Series Avium in Ruscinone, Pyrenæis montibus, atque in Gallia æquinoctiali observatarum, in Classes, Genera & Species novâ methodo digesta. Auctore Petro Barrere, Societatis Regiæ Scientiarum Monspelienfis Socio, &c. Perpiniæ. 1745, in-quarto parvo.
- Bel. Hist. Nat. des Ois.** . . . L'Histoire de la nature des Oiseaux, avec leurs descriptions, & naïfs portraits retirez du naturel; écrite en sept livres, par Pierre Belon du Mans. A Paris. 1555, in-folio.
- Bel. Portr. d'Ois.** . . . Portraits d'Oiseaux, Animaux, Serpens, Herbes, Arbres, Hommes, & Femmes d'Arabie & Egypte, observez par Pierre Belon du Mans, &c. A Paris. 1557, in-quarto.
- Bell. Obs.** Petri Bellonii Cenomani plurimarum singularium & memorabilium rerum in Græcia, &c. Observationes tribus libris expressæ, &c. Raphelengii. 1605, in-folio.
- Bont. Ind. Ori.** Jacobi Bontii, Medici Civitatis Bataviæ Novæ in Java ordinarii, Historiæ naturalis & Medicæ Indiæ Orientalis libri sex, &c. à Gulielmo Pifone in ordinem redacti & illustrati, &c. Amstelædami. 1658, in-folio.
- Borl. Nat. Hist. of Cronwall.** . . . The Natural History of Cronwall. The Air, Climate, Waters, Rivers, Lakes, Sea and Tides; &c. By William Borlase, A. M. F. R. S. Oxford. 1758, in-folio.
- Browne. Nat. Hist. of Jamaic.** . . . The Civil and Natural History of Jamaica in Three Parts, &c. By Patrick Browne, M. D. London. 1756, in-folio.
- Brückm. Centur. Secunda Epist.** . . . Francisci Ernesti Brückmanni Phil. & Med. Doct. Acad. Cæsar. Leopoldino Carolinæ Nat. cur. &c. Centuria secunda epistolarum, &c. Wolfenbüttelæ. 1749, in-quarto.
- Catesb.** Histoire Naturelle de la Caroline, la Floride & les Isles Bahama: contenant les dessins des Oiseaux, Animaux, Poissons, Serpens, Insectes & Plantes, &c. par Marc Catesby, de la Société Royale. London. 1731, in folio. 2 vol.
- Charlet. Exer.** Gualteri Charletoni exercitationes, de differentiis & nominibus Animalium, &c. Oxoniæ. 1677, in-folio.

- Charlet. Onomazt.* ... Gualteri Charletoni M. D. Caroli II, Magnæ Britannæ Regis, Medici ordinarii, & Collegii Medicorum Londinensium Socii, Onomazticon ZONIKON, &c. Londini. 1671, in-quarto.
- Clus. Exot.* ... Caroli Clusii Atrebatensis, Aulae Cæsareæ quondam familiaris, exoticorum libri decem, &c. Raphelengii. 1605, in-folio.
- Comdam. Voy. des Amazo.* ... Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique Méridionale, depuis la côte de la Mer du Sud jusqu'aux côtes du Brésil & de la Guiane en descendant la Rivière des Amazones, &c. par M. de la Comdamine, &c. A Paris. 1745, in-octavo.
- Dan. Titius.* ... Parus minimus, Polonorum Remiz, Bononiensium Pendulinus descriptus, &c. à Jo. Daniele Titio. Lipsiæ 1755, in-quarto.
- Des March.* ... Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée, Isles voisines & à Cayenne, fait en 1725, 1726 & 1727, &c. par le R. Pere Labat, &c. A Paris. 1730, in-12. 4 vol.
- Du Tertre. Hist. des Antil.* ... Histoire générale des Antilles, habitée par les François, divisée en deux tomes, & enrichie de cartes & de figures, &c. par le R. P. du Tertre de l'ordre des Freres Prescheurs, &c. A Paris. 1667, in-quarto. 2 vol.
- Edwards.* ... Histoire naturelle de divers Oiseaux, qui n'avoient point encore été figurés ni décrits, &c. Par George Edwards. Traduit de l'Anglois par M. D. de la S. R. A Londres. 1745, in quarto. 2 vol.
- Edwards. Glanur.* ... Glanures d'Histoire Naturelle, consistant en figures de Quadrupèdes, d'Oiseaux, d'Insectes, de Plantes, &c. Par George Edwards, membre de la Société Royale, & de celle des Antiquaires de Londres, & traduit de l'Anglois par J. Du Pleffis, Ministre de S. E. A Londres. 1758, in-quarto.
- Euf. Nieremb.* ... Joannis Eusebii Nierembergii Madritensis, ex Societate Jesu, in Academia Regia Madritensi Physiologiæ Professoris, Historia naturæ maximè peregrinæ Libris XVI distincta. Antuerpiæ. 1635, in-folio.
- Faun. Suec. Linn.* ... Caroli Linnæi Medic. & Botan. Prof. Upsal. Horti Academici Præfect. Acad. Imperial. Monspeliens. Stockholm. Upsal. Soc. hujusque Secretar. Fauna Suecica, sistens Animalia Sueciæ Regni, &c. Stockholmia. 1746, in-octavo.
- Fern. Hist. Nov. Hisp.* ... Historia Animalium & Mineralium Novæ Hispaniæ Liber unicus, in sex tractatus divisus, Francisco Fernandez Philippi secundi primario medico Authore. in-folio.
- Feuillée. Journ. des Obs. phys.* ... Journal des Observations Physiques, Mathématiques & Botaniques faites par ordre du Roi sur les côtes Orientales de l'Amérique Méridionale, & aux Indes Occidentales, &c. par le R. P. Louis Feuillée, Religieux Minime, &c. A Paris. 1714 & 1725, in-quarto.
- Frezier. Voy. de la Mer de Sud.* ... Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes du Chili & du Pérou, &c. par M. Frezier, Ingenieur ordinaire du Roi, &c. A Paris. 1716, in-quarto.
- Frisch.* ... Johann Leonhard Frisch, Vorstellung der Voegel in Seutschland, und benlaeuffig auch einiger fremden mit ihren nateurlichen farben, Aus seinem deswegen von vielen Jahren her gesammelten Vogel cabinet, Zur ber besserung der bisfher davon herausgekommenen Abbildungen; &c. Berlin. 1734, in-folio.
- Gaz. Rup. Best.* ... Gazophilacium rerum naturalium è regno vegetabili, animali & minerali depromptarum, &c. Opera Michaëlis Ruperti Bessleri. Lipsiæ & Francofurti. 1716, in-folio.
- Gesn. Avi.* ... Conradi Gesneri Tigurini, Medicinæ & Philosophiæ professoris in schola Tigurina, Historia Animalium liber III, qui est de Avium natura. Francofurti. 1585, in-folio.
- Gesn. icon. Avi.* ... Icones Avium omnium, quæ in Historia Conradi Gesneri describuntur, &c. Editio secunda. Tiguri. 1560, in-folio.
- Hernand. Hist. Mex.* ... Nova Plantarum, Animalium, & Mineralium Mexicanorum Historia, à Francisco Hernandez, Medico in Indiis præstantissimo, primum

- compilata, dein à Nardo Antonio Reccho in volumen digesta, &c. Romæ. 1651, in-folio.
- Hist. de l'Acad.* . . . Histoire de l'Académie Royale des Sciences. A Paris. in-quarto.
- Joan. de Laët. Nov. Orb.* . . . Novus Orbis, seu descriptionis Indiæ Occidentalis Libri 18. Authore Joanne de Laët Antwerp. &c. Lugduni Batavorum. 1633, in-folio.
- Jonst. Avi.* . . . Historiæ naturalis de Avibus Libri VI. cum æneis figuris Johannes Jonstonus Medicinæ doctor, concinnavit. Amstelodami. 1657, in-folio.
- Klein. Avi.* . . . Jacobi Theodori Klein Secr. Civ. Ged. Soc. Reg. Lond. & Acad. Scient. Bonon. Sodalitatis Historiæ Avium Prodrômus cum præfatione de ordine Animalium in genere, &c. Lubecæ. 1750, in-quarto.
- Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp.* . . . Description du Cap de Bonne Espérance, où l'on trouve tout ce qui concerne l'Histoire Naturelle du Pays, &c. tirée des Mémoires de M. Pierre Kolbe, Maître ès-Arts, &c. A Amsterdam. 1741, in-12. 3 vol.
- Kramer. Elench. Veget. & Anim.* . . . Guilielmi Henrici Kramer Saxonis Dresdensis Philosophiæ & Medicinæ Doctoris Elenchus Vegetabilium & Animalium, per Austriam inferiorem observatorum, &c. Viennæ, Pragæ & Tergesti. 1756, in-octavo.
- Linn. Amœnit. Acad.* . . . Caroli Linnæi Sac. Reg. Maj. Suec. Archiat. Med. & Bot. Prof. Upsaliens. Acad. Imper. Monsp. Berol. Ups. Stockh. Soc. Amœnitates Academicæ, seu dissertationes variæ Physicæ, Medicæ, Botanicæ, antehac seorsim editæ, nunc collectæ & auctæ, cum Tabulis æneis; Accedit, &c. Lugduni Batavorum. 1749, in octavo. 2 vol.
- Lin. Systh. Nat. ed. 6.* . . . Caroli Linnæi Archiatr. Reg. Med. & Bot. Profess. Upsal. Systema Naturæ sistens Regna tria naturæ, in Classes & Ordines, genera & species redacta, Tabulisque æneis illustrata. Editio sexta. Stockholmæ. 1748, in-octavo.
- Marcgr. Hist. Br.* . . . Georgi Marcgraviï de Liebstad, Misnici Germani, Historiæ rerum naturalium Libri octo. in-folio.
- Marfil. Danub. Tom. V.* . . . Danubius Pannonico-myssicus, Observationibus Geographicis, Astronomicis, Hydrographicis, Historicis, Physicis perlustratus, & in sex Tomos digestus ab Aloysio Ferd. Com. Marfilii Socio Regiarum societatum Parisiensis, Londinensis, Monspeliensis. Tomus quintus, de Avibus circa aquas Danubii vagantibus, & de ipsarum nidis. Hagæ Comitum; Amstelodami. 1726, in-folio.
- Moehr. Avi. Gen.* . . . Avium Genera Auctore Paulo Henrico Gerardo Moehringio, Med. D. Sereniss. Princip. Anhaltino-Servestanti Consil. & Archiatro, dynastiæ ac Civit. Jeveranæ Physico provinc. Acad. Imper. Nat. Curios. Sodale. Bremæ. 1752, in-octavo.
- Mus. Bess.* . . . Rariora Musei Bessleriani, quæ olim Basilius & Michaël Rupertus Besslerus collegerunt, &c. illustrata à Joanne Henrico Lochuero, &c. 1716, in-folio.
- Mus. Worm.* . . . Museum Wormianum, seu Historia rerum rariorum, tam naturalium, &c. Adornata ab Olao Worm, Med. Doct. &c. Amstelodami. 1655, in-folio.
- Nouv. Voy. de l'Amér.* . . . Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique contenant l'histoire naturelle de ces Pays, l'Origine, les Mœurs, la Religion & le Gouvernement des Habitans anciens & modernes, &c. A Paris. 1722, in-12. 6 vol.
- Olina.* . . . Uccelliera o vero discorso della natura, e proprietà di diversi Uccelli, e in particolare di que'che cantano. Con il modo di prendergli, &c. Opera di Gio Pietro Olina, &c. in Roma. 1684, in-folio.
- Petiv. Gaz. Nat.* Gazophilacii naturæ, & artis Decades à Jacobo Petiver Pharmacop. Londin. & Regiæ Societatis socio. in-folio.
- Philos. Transf. Vol. L.* . . . Philosophical Transactions, giving some account of The present Undertakings, Studies and Labours. of the Ingenious, &c. Vol. L. London. 1758, in-quarto.
- Pison. Hist. Nat.* . . . Gulielmi Pisonis, Medici Amstelodamensis, Historiæ Naturalis & Medicæ Indiæ Occidentalis Libri quinque. Amstelædami. 1658, in-folio.
- Prosp. Alp. Egypt.* . . . Prosperi Alpini Marosticensis, Philosophi, Medici, &c. Historia Egypti naturalis, &c. Lugduni Batavorum. 1735, in-quarto. 2 vol.
- Raj. Syn. Avi.* . . . Joannis Raji Synopsis methodica Avium. Londini. 1713, in-octavo.

Rzac. Aust. Hist. Nat. Pol. . . . Aucuarium Historiæ naturalis curiosæ Regni Poloniæ, magni Ducatus Lithuanicæ, annexarumque Provinciarum, per P. Gabrielem Rzaczyński Soc. Jesu concinnatum, &c. Gedani. 1745, in-quarto.

Rzac. Hist. Nat. Pol. . . . Historia Naturalis curiosæ Regni Poloniæ, magni Ducatus Lithuanicæ, annexarumque Provinciarum, in tractatus XX divisa, &c. Opera P. Gabrielis Rzaczyński Soc. Jesu. Sandomiriæ. 1721, in-quarto.

Schwenck. Avi. Sil. . . . Therio-tropheum Silesiæ, in quo Animalium, hoc est, Quadrupedum, Reptilium, Avium, Piscium, Insectorum natura, vis & usus sex libris prestringuntur: concinnatum & elaboratum à Casp. Schwenckfeld Medico Hirschberg, omnibus Philosophiæ, Medicinæ & sanitatis studiosis profuturum. Lignicii. 1603, in-quarto.

Seb. . . . Locupletissimi rerum Naturalium Thesauri accurata descriptio, & iconibus artificiosissimis expressio, &c. ex toto terrarum orbe collegit, digessit, descripsit, & depingendum curavit Albertus Seba, &c. Amstelædami. 1734, in-folio. 2 vol.

Sibbald. Scot. illustr. . . . Scotia illustrata, sive Prodromus Historiæ naturalis, &c. auctore Roberto Sibbald M. D. Equite aurato, &c. Edinburgi. 1684, in-folio.


Sloane. Voy. of Jamaic. . . . A voyage to the Islands, Madera, Barbadoes, Nieves, S. Christophers, and Jamaica: with the Natural History, &c. by sir Hans Sloane Bart. &c. London. 1725, in-folio. 2 vol.

Tournef. Voy. du Lev. . . . Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roi, &c. Par M. Pitton de Tournefort, &c. A Paris. 1717, in-quarto. 2 vol. & in-octavo. 3 vol.

Voy. de la B. de Hud. . . . Voyage de la Baye de Hudson, fait en 1746 & 1747, pour la découverte du passage du Nord-ouest, &c. traduit de l'Anglois de M. Henri Ellis, &c. A Paris. 1749, in-12. 2 vol.

Willugh. Ornith. . . . Francisci Willughbeii de Middleton in agro Warwicensi Armigeri, è Regia societate, Ornithologiæ libri tres: in quibus omnes Aves hæctenus cognitæ in methodum naturis suis convenientem redactæ, accuratè describuntur, descriptiones iconibus elegantissimis & vivarum Avium simillimis æri incisis, illustrantur. Totum opus recognovit, digessit, supplevit Joannes Raius, &c. Londini. 1676, in-folio.





REGNUM
ANIMALE.

CLASSIS III.

AVES.

HARUM caractèr est
Corpus plumis tec-
tum:

Rostrum corneum;

Alæ duæ:

Pedes duo.

Aves omnes sunt *sanguineæ*: *pulmonibus* spirant: *duos* habent in corde *ventriculos*: earumque *fœminæ* sunt *oviparæ*. Pleræque nida construunt, & ova incubant, ut pullos excludant.

Aliæ digitis membranis destitutis (1) præditæ sunt (vide

(1) Per has intelligimus eas omnes quæ non habent digitos membranis auc-
tos per totam longitudinem, id est; ab

LE REGNE
ANIMAL.

CLASSE III.

LES OISEAUX.

LEUR caractere est
D'avoir le corps cou-
vert de plumes:

Un bec d'une matiere analogue
à la corne:

Deux ailes:

Et deux pieds.

Tous les oiseaux ont du sang: respirent par des *poumons*: ont deux *ventricules* au cœur: & leurs femelles sont *Ovipares*. La plupart font des nids, & couvent leurs œufs, pour faire éclore leurs petits.

Les uns ont les doigts dénués de membranes (1) (voyez Pl. I.

(1) Je comprends par là tous ceux qui n'ont pas les doigts garnis de membranes dans toute leur longueur; c'est-à-dire, de-

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 16; & Pl. II. Fig. 1, 2, 3, 4, 5 & 6), & on leur a donné le nom de *Fissipèdes*; les autres ont les doigts garnis de membranes dans toute leur longueur (*voyez Pl. III. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7; & Pl. IV. Fig. 1, 2, 3 & 4*), & on les a nommés *Palmipèdes*.

Parmi les *Fissipèdes*, les uns ont les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 16*): les autres ont la partie inférieure des jambes dénuée de plumes (*voyez Pl. II. Fig. 1, 2, 3, 4, 5 & 6*).

Ceux des *Fissipèdes* qui ont les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon, ont tous quatre doigts; mais les uns les ont tous séparés jusqu'à leur origine ou environ (*voyez Pl. I. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12*); & les autres ont le milieu des trois doigts antérieurs étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & au doigt intérieur jusqu'à la première

puis leur origine jusqu'à leur bout; & je compte pour rien ces commencemens de membranes, qui se trouvent dans différens genres d'oiseaux, comme les *Cogs*, les *Faisans* (*voyez Pl. I. Fig. 2*), les *Gourlys* (*voyez Pl. II. Fig. 6.*), &c.

Tab. I. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 16; & Tab. II. Fig. 1, 2, 3, 4, 5 & 6), & *Fissipedes* vocantur; alia digitos habent membranis per totam longitudinem auctos (*vide Tab. III. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7; & Tab. IV. Fig. 1, 2, 3 & 4*), & *Palmipedes* nominantur.

Inter *Fissipedes*, aliae cruribus gaudent ad calcaneum usque plumosis (*vide Tab. I. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 16*): aliae cruribus in parte inferiore plumis destitutis donantur (*vide Tab. II. Fig. 1, 2, 3, 4, 5 & 6*).

Aves omnes *Fissipedes* cruribus ad calcaneum usque plumosis praeditae digitos habent quatuor; in aliis vero digiti omnes usque ad exortum aut circiter discreti sunt (*vide Tab. I. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12*); in alteris autem medius trium digitorum anteriorum cum extimo digito trium articulorum spatio, & cum intimo primi tantum articuli inter-

exortu ad apicem usque; pro nihilo autem habemus rudimenta illa membranæ, quibus varia avium genera praedita sunt, ut *Galli*, *Phasiani* (*vide Tab. I. fig. 2*), *Numenii* (*vide Tab. II. fig. 6.*), &c.

LES OISEAUX, *Classe III.*

3

vallo arctè cohæret (*vide Tab. I. Fig. 13, 14, 15 & 16*), ut in *Ispidâ*, *Hydrocorace*, &c. (*voyez Pl. I. Fig. 13, 14, 15 & 16*), comme le *Martin-pêcheur*, le *Calao*, &c.

Inter eas quæ digitos habent omnes usque ad exortum aut circiter discretos, aliæ digitis tribus anticis & uno postico donantur (*vide Tab. I. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9*); aliæ verò digitis duobus anticis, totidem posticis præditæ sunt (*vide Tab. I. Fig. 10, 11 & 12*), ut *Picus*, *Psittacus*, &c.

Harum quæ digitis tribus anticis & uno postico gaudent, aliæ rostrum habent rectum, mandibulæ superioris apicem crassiorē parumper & incurvum, nares membranâ crassâ & molli semirectas (*vide Tab. V. Fig. 1*), ut *Columba* : aliæ rostrum conico-incurvum (*vide Tab. V. Fig. 2*), ut *Gallopavo*, *Gallus*, *Phasianus*, &c : aliæ rostrum breve aduncum (*vide Tab. V. Fig. 7 & 8*), ut *Accipiter*, *Aquila*, *Strix*, &c : aliæ rostrum conico-elongatum (*vide Tab. V. Fig. 3, 4, 5 & 6*), ut *Corvus*, *Garrulus*, *Galgulus*, *Manucodiata*, &c : aliæ rostrum rectum, mandibulâ superiore apice utrinque emarginatâ (*vide Tab. VI.*

Parmi ceux qui ont tous les doigts séparés jusqu'à leur origine ou environ, les uns ont trois doigts devant & un derrière (*voyez Pl. I. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9*); & les autres en ont deux devant & deux derrière (*voyez Pl. I. Fig. 10, 11 & 12*), comme le *Pic*, le *Perroquet*, &c.

De ceux qui ont trois doigts devant & un derrière, les uns ont le bec droit, le bout de la mandibule supérieure un peu renflé & courbé, les narines à demi couvertes d'une membrane épaisse & molle (*voyez Pl. V. Fig. 1*), comme le *Pigeon* : d'autres ont le bec en cône courbé (*voyez Pl. V. Fig. 2*), comme le *Dindon*, le *Coq*, le *Faisan*, &c : d'autres ont le bec court & crochu (*voyez Pl. V. Fig. 7 & 8*), comme l'*Epervier*, l'*Aigle*, le *Chat-huant*, &c : d'autres ont le bec en cône allongé (*voyez Pl. V. Fig. 3, 4, 5 & 6*), comme le *Corbeau*, le *Geay*, le *Rollier*, l'*Oiseau-de-Paradis*, &c : d'autres ont le bec droit, & les bords de la mandibule supérieure échancrés vers le bout (*voyez Pl. VI. Fig. 1, 2 & 3*), comme

la *Pie-grièche*, la *Grive*, le *Gobe-mouche*, &c : d'autres ont le bec droit, & les deux mandibules entières (voyez *Pl. VI. Fig. 4 & 5*), comme le *Pique-bœuf*, l'*Etourneau* : d'autres ont le bec menu, & un peu courbé en arc (voyez *Pl. VI. Fig. 6 & 7*), comme la *Huie*, &c : d'autres ont le bec très-petit, comprimé horizontalement à sa base, & crochu à son bout ; & l'ouverture du bec plus large que la tête (voyez *Pl. VI. F. 8*), comme le *Tette-chevre*, l'*Hiron-delle* : d'autres ont le bec en cône raccourci (voyez *Pl. VI. Fig. 9, 10, 11, 12 & 13*), comme le *Moineau*, le *Bruant*, le *Bouvreuil*, le *Bec-croisé*, &c : d'autres ont le bec en alefne (voyez *Pl. VI. Fig. 14, 15 & 16*), comme l'*Alouette*, le *Bec-figue*, la *Mésange*, &c : d'autres ont le bec en forme de coin (voyez *Pl. VII. Fig. 1*), comme le *Torchepot* : d'autres enfin ont le bec effilé (voyez *Pl. VII. Fig. 2, 3 & 4*), comme le *Grimpereau*, le *Colibry*, l'*Oiseau-mouche*.

Parmi ceux qui ont la partie inférieure des jambes dénuée de plumes, les uns ont les ailes petites à proportion de la grosseur du corps ; & ces ailes leur sont tout-à-fait inutiles pour le vol, comme l'*Autru-*

Fig. 1, 2 & 3), ut *Lanius*, *Turdus*, *Muscicapa*, &c : aliæ rostrum rectum, utraq. mandibulâ integrâ (vide *Tab. VI. Fig. 4 & 5*), ut *Buphagus*, *Sturnus* : aliæ rostrum gracile, parum arcuatum (vide *Tab. VI. Fig. 6 & 7*), ut *Upupa*, &c : aliæ rostrum minimum, ad basim horizontaliter compressum, apice aduncum ; & oris rictum capite ampliorem (vide *Tab. VI. Fig. 8*), ut *Caprimulgus*, *Hirundo* : aliæ rostrum conico-attenuatum (vide *Tab. VI. Fig. 9, 10, 11, 12 & 13*), ut *Passer*, *Emberiza*, *Pyrrhula*, *Loxia*, &c : aliæ rostrum subulatum (vide *Tab. VI. Fig. 14, 15 & 16*), ut *Alauda*, *Ficedula*, *Parus*, &c : aliæ rostrum cuneiforme (vide *Tab. VII. Fig. 1*), ut *Sitta* : aliæ tandem rostrum filiforme (vide *Tab. VII. Fig. 2, 3, & 4*), ut *Certhia*, *Polytmus*, *Melospiza*.

Inter eas quæ crura habent in parte inferiore plumis destituta, aliæ alis, pro mole corporis, parvis, & volatui inutilibus donantur, ut *Struthio*, *Casuaris*, &c : aliæ alis sat magnis &

volatui idoneis præditæ sunt.

Posteriorum alia digitos habent tres anteriores, postico nullo (*vide T. II. F. 2*), ut *Otis*, *Ostralega*, *Pluvialis*, &c : alia digitos habent quatuor, tres scilicet anteriores, & posticum unum (*vide Tab. II. Fig. 3, 4, 5 & 6*), ut *Vanellus*, *Jacana*, *Scolopax*, *Numenius*, *Ardea*, &c.

Inter *Palmipedes*, alia digitos habent membranis fissis auctos (*vide Tab. III. Fig. 1 & 2*), ut *Gallinula*, *Fulica*, &c : alia digitos habent membranis semifissis auctos (*vide Tab. III. Fig. 3*), ut *Colymbus* : alia tandem digitis membranis integris auctis præditæ sunt (*vide T. III. Fig. 4, 5, 6 & 7; & T. IV. Fig. 1, 2, 3 & 4*).

Posteriorum alia crura habent ad podicem posita, & intrà abdomen condita : alia cruribus donantur circa corpus medium, & extra abdomen positis.

Inter eas quibus crura ad podicem posita & intrà abdomen condita sunt, alia digitis tribus anticis, membra-

che, le *Casuar*, &c : les autres ont les ailes assez grandes ; & ces ailes sont propres pour le vol.

De ces derniers les uns ont trois doigts devant, & n'en ont point derrière (*voyez Pl. II. Fig. 2*) ; comme l'*Outarde*, l'*Huitrier*, le *Pluvier*, &c : les autres ont quatre doigts, savoir, trois devant & un derrière (*voyez Pl. II. Fig. 3, 4, 5 & 6*), comme le *Vanneau*, le *Jacana*, la *Beccasse*, le *Courly*, le *Heron*, &c.

Parmi les *Palmipèdes*, les uns ont les doigts garnis de membranes fendues (*voyez Pl. III. Fig. 1 & 2*), comme la *Poule-d'eau*, la *Foulque*, &c : d'autres ont les doigts garnis de membranes demi-fendues (*voyez Pl. III. Fig. 3*), comme la *Grebe* : d'autres enfin ont les doigts garnis de membranes entières (*voyez Pl. III. Fig. 4, 5, 6 & 7; & Pl. IV. Fig. 1, 2, 3 & 4*).

De ces derniers les uns ont les jambes placées tout-à-fait derrière & cachée dans l'abdomen : les autres ont les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen.

Parmi ceux qui ont les jambes placées tout-à-fait derrière & cachées dans l'abdomen, les uns ont trois doigts devant,

tous joints ensemble par les membranes, & n'ont point de doigt derriere (*voyez Pl. III. Fig. 4*), comme le *Guillemot*, le *Pingoin*, &c: les autres ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par les membranes, & le postérieur séparé (*voyez Pl. III. Fig. 5*), comme le *Plongeon*, &c.

De ceux qui ont les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, les uns les ont plus courtes que le corps (*voyez Pl. III. Fig. 6 & 7*; & *Pl. IV. Fig. 1 & 2*): les autres les ont plus longues que le corps (*voyez Pl. IV. Fig. 3 & 4*).

Parmi ceux qui ont les jambes plus courtes que le corps, les uns ont trois doigts devant, tous joints ensemble par les membranes, & n'ont point de doigt derriere, comme l'*Albatros*: les autres ont quatre doigts (*voyez Pl. III. Fig. 6 & 7*; & *Pl. IV. Fig. 1 & 2*).

De ces derniers les uns ont trois doigts devant, joints ensemble par les membranes, & le postérieur séparé (*voyez Pl. III. Fig. 6 & 7*; & *Pl. IV. Fig. 1*): les autres ont les quatre doigts tous joints ensemble par les membranes (*voyez Pl.*

nis inter se connexis, digito postico nullo, donantur (vide Tab. III. Fig. 4), ut Uria, Alca, &c: alia digitis quatuor, tribus anterioribus membranis inter se connexis, postico soluto, præditæ sunt (vide Tab. III. Fig. 5), ut Mergus, &c.

Inter aves *Palmipedes* quibus crura circa corpus medium & extra abdomen posita sunt, alia cruribus donantur corpore brevioribus (*vide Tab. III. Fig. 6 & 7*; & *Tab. IV. Fig. 1 & 2*): alia cruribus corpore longioribus (*vide T. IV. Fig. 3 & 4*).

Inter eas quæ crura habent corpore breviora, alia digitis tribus anticis, membranis inter se connexis, digito postico nullo, donantur, ut *Albatrus*: alia verò digitis quatuor præditæ sunt (*vide Tab. III. Fig. 6 & 7*; & *Tab. IV. Fig. 1 & 2*).

Posteriorum alia digitos habent tres anteriores, membranis inter se connexos, postico soluto (*vide Tab. III. Fig. 6 & 7*; & *Tab. IV. Fig. 1*): alia digitis omnibus membranis inter se connexis præditæ sunt (*vide Tab. IV.*

Fig. 2), ut *Lepturus*, *Phalacrocorax*, *Onocrotalus*, &c.

Inter eas quæ digitos habent tres anticos, membranæ inter se connexos, posticum verò solutum, aliæ rostro edentulo donantur (vide Tab. VII. Fig. 5 & 6), ut *Larus*, *Sterna*, *Rygchopsalia*, &c: aliæ rostro denticulato (vide Tab. VII. Fig. 7 & 8), ut *Merganser*, *Anas*, &c.

Aves illæ *Palmipedes*, quæ crura habent corpore longiora, digitis quatuor donantur, quorum tres anteriores membranæ inter se connectuntur, & posticus est solutus (vide Tab. IV. Fig. 3 & 4), ut *Phœnicopterus*, *Avocetta*, &c.

Aves igitur in viginti sex ordines dividimus.

In primo ordine continentur ea quæ habent quatuor digitos membranæ destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes usque ad exortum aut circiter discretos: crura ad calcaneum usque plumosa (vide Tab. I. Fig. 1): rostrum rectum; mandibulæ superioris apice crassiori parumper & incurvo: & nares membranâ crassâ & molli se-

IV. Fig. 2), comme le *Paille-en-cul*, le *Cormoran*, le *Pelican*, &c.

Parmi ceux qui ont trois doigts devant, joints ensemble par les membranes, & le postérieur séparé, les uns ont le bec sans dentelures (voyez Pl. VII. F. 5 & 6), comme le *Goiland*, l'*Hirondelle-de-mer*, le *Bec-en-ciseaux*, &c: les autres ont le bec dentelé (voyez Pl. VII. Fig. 7 & 8), comme l'*Harle*, le *Canard*, &c.

Ceux qui ont les jambes plus longues que le corps, ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par les membranes, & le postérieur est séparé (voyez Pl. IV. Fig. 3 & 4), comme le *Flamant*, l'*Avocette*, &c.

Je divise donc les Oiseaux en vingt-six ordres.

Dans le premier sont compris ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (voyez Pl. I. Fig. 1): le bec droit; le bout de la mandibule supérieure un peu renflé & courbé: & les narines à demi couvertes d'une membrane épaisse & molle (voyez Planche V.

Figure 1), comme les *Pligeons*.

Dans le second ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine : les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 2*) : & le bec en cone courbé (*voyez Pl. V. Fig. 2*). Je divise les Oiseaux de cet ordre en deux sections : dans la première seront ceux qui ont la tête ornée de membranes charnues, comme le *Dindon*, le *Cog*, &c. & dans la seconde ceux qui ont la tête dénuée de ces membranes (*voyez Pl. V. Fig. 2*), comme la *Perdrix*, le *Faisan*, &c.

Dans le troisième ordre ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine : les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 4*) : & le bec court & crochu (*voyez Pl. V. Fig. 7 & 8*). Je divise encore les Oiseaux de cet ordre en deux sections : je fais entrer dans la première ceux dont la base du bec est couverte d'une peau nue (*voyez Pl. V. Fig. 7*), comme l'*Epervier*, l'*Aigle*, &c. & dans la seconde ceux dont la base du bec est couverte de plumes tournées en devant (*voyez*

mitectas (*vide Tab. V. F. 1*), ut *Columba*.

In secundo ordine ea quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos: crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 2*) : & rostrum conico-incurvum (*vide T. V. Fig. 2*). Hujus ordinis aves in duas sectiones dividimus: prima continet eas quæ capite paleis prædito donantur, ut *Gallo-pavo*, *Gallus*, &c. & secunda eas quarum caput paleis destituitur (*vide T. V. Fig. 2*), ut *Perdix*, *Phasianus*, &c.

In tertio ordine continentur ea quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes usque ad exortum aut circiter discretos: crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 4*) : & rostrum breve, aduncum (*vide T. V. Fig. 7 & 8*). Hujus ordinis aves in duas sectiones adhuc dividimus: prima continet eas quæ basim habent rostricute nudâ tectam (*vide T. V. Fig. 7*), ut *Accipiter*, *Aquila*, &c. secunda eas quarum basis rostri plumis antorsum incumbantibus

incumbentibus tegitur (*vide Pl. V. Fig. 8*), ut *Asio*, *Strix*. *Pl. V. Fig. 8*), comme le *Hibou*, le *Chat-huant*.

In quarto ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos : crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 3*) : & rostrum conico-elongatum (*vide Tab. V. Fig. 3, 4, 5 & 6*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividuntur : in prima continentur illæ quarum plumæ basis rostri antrorsum incumbunt, naresque tegunt (*vide Tab. V. Fig. 3*), ut *Corvus*, *Pica*, *Garrulus*, &c : in secunda verò illæ quarum plumæ basis rostri retrorsum vertuntur, naresque detectas relinquunt (*vide Tab. V. Fig. 4, 5 & 6*), ut *Galgulus*, *Icterus*, *Manucodiata*.

In quinto ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos : crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 3*) : & rostrum rectum ; mandibulâ superiore apice utrinque emarginatâ (*vide Tab. VI. Fig. 1, 2 & 3*).

Tome I.

Dans le quatrième ordre sont compris ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine : les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 3*) : & le bec en cone allongé (*voyez Pl. V. Fig. 3, 4, 5 & 6*). Les Oiseaux de cet ordre se divisent aussi en deux sections : dans la première je comprends ceux dont les plumes de la base du bec sont tournées en devant, & couvrent les narines (*voyez Pl. V. Fig. 3*), comme le *Corbeau*, la *Pie*, le *Geay*, &c : & dans la seconde ceux dont les plumes de la base du bec sont tournées en arrière, & laissent les narines à découvert (*voyez Pl. V. Fig. 4, 5 & 6*), comme le *Rollier*, le *Troupiale*, l'*Oiseau-de-Paradis*.

Dans le cinquième ordre sont compris ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine : les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 3*) : & le bec droit ; & les bords de la mandibule supérieure échancrés vers le bout (*voyez Pl. VI. Fig. 1, 2 & 3*). Les Oiseaux de cet ordre

B

se divisent aussi en deux sections : dans la première sont ceux qui ont le bec convexe en dessus (voyez *Pl. VI. Fig. 1 & 2*), comme la *Pie-grièche*, la *Grive* &c : & dans la seconde ceux qui ont le bec comprimé horizontalement à sa base, & presque triangulaire (voyez *Pl. VI. Fig. 3*), comme le *Gobe-mouche*.

Dans le sixième ordre sont ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine : les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (voyez *Pl. I. Fig. 3*) : & le bec droit ; & les deux mandibules entières (voyez *Pl. VI. F. 4 & 5*). Les Oiseaux de cet ordre sont divisés en deux sections : dans la première sont compris ceux qui ont le bec presque quadrangulaire, un peu convexe en-dessus, & anguleux en-dessous (voyez *Pl. VI. Fig. 4*), comme le *Pique-bœuf* : & dans la seconde ceux qui ont le bec convexe ; son bout un peu plus large qu'épais & obtus (voyez *Pl. VI. Fig. 5*), comme l'*Etourneau*.

Dans le septième ordre sont ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois de-

Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividuntur : in prima continentur illæ quæ rostrum habent superne convexum (vide *Tab. VI. Fig. 1 & 2*), ut *Lanius*, *Turdus*, &c : & in secunda illæ quæ rostro donantur horizontaliter basi compresso, & ferè triangulari (vide *Tab. VI. Fig. 3*), ut *Muscicapa*.

In sexto ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos : crura ad calcaneum usque plumosa (vide *Tab. I. Fig. 3*) : & rostrum rectum ; mandibulâ utràque integrâ (vide *Tab. VI. Fig. 4 & 5*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividimus : in prima continentur eæ quæ rostrum habent subquadrangulare, paululùm superne convexum, inferne angulosum (vide *Tab. VI. Fig. 4*), ut *Buphagus* : in secunda verò illæ quæ rostro donantur convexo, apice obtuso ; apicis latitudine crassitiem superante (vide *Tab. VI. Fig. 5*), ut *Sturnus*.

In septimo ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis de-

stitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos: crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 3*): & rostrum gracile, parum arcuatum (*vide Tab. VI. Fig. 6 & 7*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividuntur: prima continet eas quæ caput habent corollâ longitudinali plumosâ, in duplici serie parallelâ divisâ, & plicatili ornatum (*vide Tab. VI. Fig. 6*), ut *Upupa*: secunda eas quæ capite simplici donantur (*vide Tab. VI. Fig. 7*), ut *Promerops*.

In octavo ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos: crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 5*): rostrum minimum, basi horizontaliter compressum, apice aduncum; & oris rictum capite ampliorem (*vide Tab. VI. Fig. 8*), ut *Caprimulgus*, *Hirundo*.

In nono ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes cir-

vant, un derriere, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 3*): & le bec menu, & un peu courbé en arc (*voyez Pl. VI. Fig. 6 & 7*). Je divise aussi les Oiseaux de cet ordre en deux sections: dans la première sont ceux qui ont la tête ornée d'une hupe longitudinale, composée d'un double rang de plumes, & que l'Oiseau peut plier à volonté (*voyez Pl. VI. Fig. 6*), comme la *Hupe*: & dans la seconde ceux qui ont la tête simple (*voyez Pl. VI. Fig. 7*), comme le *Promerops*.

Dans le huitième ordre sont compris ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derriere, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 5*): le bec très-petit, comprimé horizontalement à sa base & crochu à son bout; & l'ouverture du bec plus large que la tête (*voyez Pl. VI. Fig. 8*), comme le *Tette-chèvre*, l'*Hirondelle*.

Dans le neuvième ordre sont ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derriere, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les

jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 6*): & le bec en cone raccourci (*voyez Pl. VI. Fig. 9, 10, 11, 12 & 13*). Les Oiseaux de cet ordre se divisent en trois sections : dans la premiere sont ceux dont les deux mandibules sont droites (*voyez Pl. VI. Fig. 9, 10 & 11*), comme le *Tangara*, le *Moineau*, le *Bruant*, &c : dans la seconde ceux dont la mandibule supérieure est crochue (*voyez Pl. VI. Fig. 12*), comme le *Bouvreuil*, &c : & dans la troisième ceux dont les deux mandibules sont crochues & se croisent (*voyez Pl. VI. Fig. 13*), comme le *Bec-croisé*.

Dans le dixième ordre sont ceux qui ont quatre doigts dénudés de membranes, trois devant, un derriere, tous séparés environ jusqu'à leur origine : les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 7*) : & le bec en alefne (*voyez Pl. VI. Fig. 14, 15 & 16*). Les Oiseaux de cet ordre se divisent en deux sections : dans la premiere sont ceux qui ont les narines découvertes (*voyez Pl. VI. Fig. 14 & 15*), comme l'*Alouette*, le *Becfigue* : & dans la seconde ceux qui ont les narines couvertes par les

citer usque ad exortum discretos : crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 6*) : & rostrum conico-attenuatum (*vide Tab. VI. Fig. 9, 10, 11, 12 & 13*). Hujus ordinis Aves in tres sectiones dividimus : in prima continentur illæ quæ mandibulâ gaudent utrâque rectâ (*vide Tab. VI. Fig. 9, 10 & 11*), ut *Tangara*, *Passer*, *Emberiza*, &c : in secunda illæ quæ mandibulam habent superiorem aduncam (*vide Tab. VI. Fig. 12*), ut *Pyr-rhula*, &c : in tertia verò ex quæ mandibulâ donantur utrâque aduncâ, apicibus se decussantibus (*vide Tab. VI. Fig. 13*), ut *Loxia*.

In decimo ordine continentur ex quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticosticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos : crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 7*) : & rostrum subulatum (*vide Tab. VI. Fig. 14, 15 & 16*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividuntur : in prima continentur ex quæ nares habent detectas (*vide Tab. VI. Fig. 14 & 15*), ut *Alauda*, *Ficedula* : & in secunda illæ quæ

rum nares plumis basis rostri cooperiuntur (*vide Tab. VI. Fig. 16*), ut *Parus*.

In undecimo ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos: crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 8*): & rostrum cuneiforme (*vide Tab. VII. F. 1*), ut *Sitta*.

In duodecimo ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum, omnes circiter usque ad exortum discretos: crura ad calcaneum usque plumosa (*vide Tab. I. Fig. 9*): & rostrum filiforme (*vide Tab. VII. Fig. 2, 3 & 4*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividimus: prima continet eas quæ rostrum habent arcuatam (*vide Tab. VII. Fig. 2 & 3*), ut *Certhia*, *Polytmus*: & secunda illas quæ rostrum habent rectum (*vide Tab. VII. Fig. 4*), ut *Melospiza*.

In decimo-tercio ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, duos scilicet an-

plumes de la bête du bec (*voyez Pl. VI. Fig. 16*), comme la *Mésange*.

Dans le onzième ordre sont ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 8*): & le bec en forme de coin (*voyez Pl. VII. Fig. 1*), comme le *Torchepot*.

Dans le douzième ordre sont compris ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (*voyez Pl. I. Fig. 9*): & le bec effilé (*voyez Pl. VII. Fig. 2, 3, & 4*). Je divise les Oiseaux de cet ordre en deux sections: dans la première sont ceux qui ont le bec courbé en arc (*voyez Pl. VII. Fig. 2 & 3*), comme le *Grimpereau*, le *Colibry*: & dans la seconde ceux qui ont le bec droit (*voyez Pl. VII. Fig. 4*), comme l'*Oiseau-mouche*.

Dans le treizième ordre sont ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, deux devant, deux derrière: & les jam-

bes couvertes de plumes jusqu'au talon (voyez *Pl. I. Fig. 10, 11 & 12*). Les Oiseaux de cet ordre se divisent en cinq sections : dans la première sont ceux qui ont le bec droit, & la langue très-longue & ressemblante à un ver de terre, comme le *Torcol*, le *Pic* : dans la seconde ceux qui ont le bec droit, & la langue pas plus longue que le bec, comme le *Jacamar* : dans la troisième ceux qui ont le bec un peu courbé en arc, convexe en-dessus & comprimé par les côtés, comme le *Barbu*, le *Coucou* : dans la quatrième ceux qui ont le bec court & crochu, comme le *Bout-de-Petun*, le *Perroquet*, &c. & enfin dans la cinquième ceux qui ont le bec long, de la grosseur de la tête, dentelé comme une scie ; le bout des deux mandibules courbé en enbas ; & la langue ressemblante à une plume, comme le *Toucan*.

Dans le quatorzième ordre sont ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière ; le milieu des trois antérieurs étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & au doigt intérieur jusqu'à la première : & les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon (voyez *Pl. I. Fig. 13, 14, 15 & 16*).

ticos, totidem posticos : & crura ad calcaneum usque plumosa (vide *Tab. I. Fig. 10, 11 & 12*). Hujus ordinis Aves in quinque sectiones dividimus : prima continet eas quæ rostro donantur recto, & linguâ longissimâ & lumbriciformi, ut *Torquilla*, *Picus* : secunda eas quæ rostrum habent rectum, & linguam rostrum longitudine non superantem, ut *Galbula* : tertia illas quæ rostrum habent modicè arcuatum, superne convexum, & lateraliter compressum, ut *Bucco*, *Cuculus* : quarta eas quæ rostro donantur brevi & adunco, ut *Crotophagus*, *Psittacus*, &c. Quinta denique illas quæ rostrum habent longum, crassitie caput æquans, ferræ instar denticulatum ; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo ; & linguâ pennæ æmulâ, ut *Tucana*.

In decimo-quarto ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos, tres scilicet anticos, posticum unum ; quorum medius trium digitorum anteriorum cum extimo digito trium articulorum spatium, cum intimo primi tantum articuli intervallo arcuè cohaeret : & crura ad calca-

neum usque plumosa (vide Tab. I. Fig. 13, 14, 15 & 16). Hujus ordinis Aves in quinque sectiones quoque dividuntur : in prima continentur illæ quæ rostrum habent breve , & versùs apicem lateraliter compressum , ut *Rupicola* , *Manacus* : in secunda illæ quæ rostro dominantur conico , ferræ instar denticulato ; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo , ut *Momotus* : in tertia eæ quæ rostrum habent rectum , longiusculum , ut *Isida* , &c : in quarta illæ quæ rostro arcuato & acuto præditæ sunt , ut *Apiaster* : in quinta tandem eæ quæ rostrum habent crassum & falciforme , ut *Hydrocorax*.

In décimo-quineto ordine continentur eæ quæ digitos habent membranis destitutos : crura in parte inferiore plumis destituta (vide T. II. Fig. 1) : & alas , pro mole corporis , parvas , & volatui inutiles. Hujus ordinis Aves in tres sectiones dividuntur : prima continet eas quæ digitos habent duos anticos , posticum nullum (vide T. II. Fig. 1) , ut *Struthio* : secunda eas quæ digitos habent tres anticos , posticum nullum , ut *Rhea* , *Casuarius* : tertia

Je divise aussi les Oiseaux de cet ordre en cinq sections : dans la première sont ceux qui ont le bec court & comprimé par les côtés vers le bout , comme le *Coq-de-roche* , le *Manakin* : dans la seconde ceux qui ont le bec conique , dentelé comme une scie ; & le bout des deux mandibules courbé en en-bas , comme le *Momot* : dans la troisième ceux qui ont le bec droit , & assez long , comme le *Martin-pêcheur* , &c : dans la quatrième ceux qui ont le bec courbé en arc & pointu , comme le *Gulépier* : & dans la cinquième ceux qui ont le bec gros & en forme de faux , comme le *Calao*.

Dans le quinzième ordre sont ceux qui ont les doigts dénués de membranes : la partie inférieure des jambes dénuée de plumes (voyez Pl. II. Fig. 1) : & les aîles petites à proportion de la grosseur du corps , & point propres pour le vol. Je divise les Oiseaux de cet ordre en trois sections : dans la première sont ceux qui ont deux doigts devant , & point derrière (voyez Pl. II. Fig. 1) , comme l'*Autruche* : dans la seconde ceux qui ont trois doigts devant & point derrière , comme le *Thouyou* ,

le *Casoar* : & dans la troisième ceux qui ont quatre doigts , trois devant & un derriere , comme le *Dronte*.

Dans le seizième ordre sont ceux qui ont trois doigts devant , dénués de membranes , & point de doigt derriere : la partie inférieure des jambes dénuée de plumes (*voyez Pl. II. Fig. 2*) : & les ailes assez grandes & propres pour le vol. Les Oiseaux de cet ordre se divisent aussi en trois sections : dans la première sont ceux qui ont le bec en cône courbé , comme l'*Outarde* : dans la seconde ceux qui ont le bec droit , très-long , & renflé vers le bout , comme l'*Huitrier* , &c : & dans la troisième ceux qui ont le bec droit , court & renflé vers le bout , comme le *Pluvier*.

Dans le dix-septième ordre sont compris ceux qui ont quatre doigts dénués de membranes , trois devant , un derriere : la partie inférieure des jambes dénuée de plumes (*voyez Pl. II. Fig. 3 , 4 , 5 & 6*) : & les ailes assez grandes , & propres pour le vol. Je divise les Oiseaux de cet ordre en douze sections : dans la première sont ceux qui ont le bec droit & renflé vers le bout , comme le *Vanneau* ,

verò illas quæ digitos habent quatuor , tres scilicet anticos , & posticum unum , ut *Raphus*.

In decimo-sexto ordine continentur eæ quæ digitos habent tres anticos , membranis destitutos , posticum digitum nullum : crura in parte inferiore plumis destituta (*vide Tab. II. Fig. 2*) : & alas sat magnas , & volatui idoneas. Hujus ordinis Aves in tres sectiones quoque dividimus : in prima continentur illæ quæ rostrum habent conico-incurvum , ut *Otis* : in secunda eæ quæ rostro donantur recto & longissimo , apice crassiori , ut *Ostralega* , &c : in tertia tandem illæ quæ rostrum habent rectum & breve , apice crassiori , ut *Pluvialis*.

In decimo-septimo ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos membranis destitutos , tres scilicet anticos , posticum unum : crura in parte inferiore plumis destituta (*vide Tab. II. Fig. 3 , 4 , 5 & 6*) : & alas sat magnas & volatui idoneas. Hujus ordinis Aves in tredecim sectiones dividuntur : prima continet eas quæ rostro donantur recto , apice crassiori ,

ut

ut *Vanellus*, *Jacana*: secunda eas quæ rostrum habent subrectum, fursùm modicè tendens, & horizontaliter paululum compressum, ut *Arenaria*: tertia illas quæ rostrum habent superne convexum, apice lateraliter compresso, ut *Glareola*: quarta eas quæ rostrum habent rectum, lateraliter compressum, & corpus etiam lateraliter compressum, ut *Rallus*: quinta illas quæ rostrum habent gracile, ut *Tringa*, *Scolopax*, &c: sexta illas quæ rostrum habent deorsum arcuatum, ut *Numenius*: septima eas quæ rostrum habent rectum, horizontaliter planum; apice ampliato, subrotundo, spathæ-formi, ut *Platea*: octava illas quæ rostro donantur crasso & longo, ut *Ciconia*, *Ardea*, &c: nona eas quæ rostrum habent crassum & breve; mandibulâ superiore cochleari-formi, apice unguiculato, ut *Cochlearius*: decima illas quæ rostrum habent breve & rectum; apice conico, ut *Balearica*: undecima eas quæ rostrum habent conico-incurvum, ut *Cariama*, *Anhima*: duodecima denique illas quæ rostro donantur conico, lateraliter compresso,

Tome I.

le *Jacana*: dans la seconde ceux qui ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement, comme le *Coulon-chaud*: dans la troisième ceux qui ont le bec convexe en-dessus & comprimé par les côtés vers le bout, comme la *Perdrix-de-mer*: dans la quatrième ceux qui ont le bec droit & comprimé par les côtés; & le corps applati par les côtés, comme le *Râle*: dans la cinquième ceux qui ont le bec menu, comme le *Beccasseau*, la *Beccasse*, &c: dans la sixième ceux qui ont le bec courbé en arc en en-bas, comme le *Courly*: dans la septième ceux qui ont le bec droit, plat horizontalement, & son bout plus large & arrondi en forme de spatule, comme la *Spatule*: dans la huitième ceux qui ont le bec gros & long, comme la *Cigogne*, le *Héron*, &c: dans la neuvième ceux qui ont le bec gros & court; la mandibule supérieure en forme de cuillière, & onguiculée à son bout, comme la *Cuillière*: dans la dixième ceux qui ont le bec court, droit & conique vers le bout, comme l'*Oiseau-royal*: dans la onzième ceux qui ont le bec en cône courbé, comme le *Cariama*, le *Kamichy*: & enfin dans la douzième ceux qui ont le

C

bec en cône applati par les côtés, & le front chauve, comme la *Poule-sultane*.

Dans le dix-huitième ordre sont ceux qui ont quatre doigts, trois devant, un derriere, garnis dans toute leur longueur de membranes fendues (*voyez Pl. III. Fig. 1 & 2*). Je divise les Oiseaux de cet ordre en deux sections : dans la premiere sont ceux qui ont les doigts garnis de membranes simples (*voyez Pl. III. Fig. 1*), comme la *Poule-d'eau* : & dans la seconde ceux qui ont les doigts garnis de membranes festonnées (*voyez Pl. III. Fig. 2*), comme la *Foulque*, &c.

Dans le dix-neuvième ordre sont ceux qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes demi-fendues, & le postérieur séparé (*voyez Pl. III. Fig. 3*) : & les jambes placées tout-à-fait derriere, & cachées dans l'abdomen, comme la *Grebe*.

Dans le vingtième ceux qui ont trois doigts devant, joints ensemble par des membranes entieres, & point de doigt derriere (*voyez Pl. III. Fig. 4*) : & les jambes placées tout-à-fait derriere, & cachées dans l'abdomen. Les Oiseaux de cet

calvirio in fronte, ut *Porphyrus*.

In decimo-octavo ordine continentur ea quæ quatuor habent digitos, tres scilicet anticos, posticum unum, membranis fissis per totam longitudinem auctos (*vide Tab. III. Fig. 1 & 2*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividuntur : prima continet eas quæ digitos habent membranis simplicibus auctos (*vide Tab. III. Fig. 1*), ut *Gallinula* : secunda vero illas quæ digitos habent membranis emarginatis auctos (*vide Tab. III. Fig. 2*), ut *Fulica*, &c.

In decimo-nono ordine continentur ea quæ quatuor habent digitos, quorum tres anteriores membranis semifissis inter se connectuntur, posticus autem solutus (*vide Tab. III. Fig. 3*) : & crura ad podicem posita, & intra abdomen condita, ut *Colymbus*.

In vigesimo ordine continentur ea quæ digitos habent tres anticos, membranis integris inter se connectos, posticum digitum nullum (*vide Tab. III. Fig. 4*) : & crura ad podicem posita & intra abdomen condita.

Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividimus : in prima continentur illæ quæ rostro donantur recto & acuto, ut *Uria* : in secunda verò ex quæ rostrum habent lateraliter planum, transversim striatum, ut *Fratercula*, *Alca*.

In vigesimo-primo ordine continentur ex quæ quatuor habent digitos, quorum tres anteriores membranis integris inter se connectuntur, posticus verò solutus (vide *Tab. III. Fig. 5*) : & crura ad podicem posita, & intra abdomen condita. Hujus ordinis Aves in duas sectiones quoque dividuntur : prima continet eas quæ rostro donantur recto, apice mandibulæ superioris adunco, ut *Spheniscus*, *Catarractes* : & secunda illas quæ rostrum habent rectum & acutum, ut *Mergus*.

In vigesimo-secundo ordine continentur ex quæ digitos habent tres anticos, membranis integris inter se connexos, posticum digitum nullum (vide *Tab. III. Fig. 4*) : & crura circa corpus medium & extra abdomen posita, & corpore breviora, ut *Albatrus*.

In vigesimo-tertio ordine

ordre se divisent en deux sections : dans la premiere sont ceux qui ont le bec droit & pointu, comme le *Guillemot* : & dans la seconde ceux qui ont le bec applati par les côtés, & cannelé transversalement, comme le *Macareux*, le *Pingoin*.

Dans le vingt-unième ordre sont ceux qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entieres, & le postérieur séparé (voyez *Pl. III. Fig. 5*) : & les jambes placées tout-à-fait derriere, & cachées dans l'abdomen. Je divise aussi les Oiseaux de cet ordre en deux sections : dans la premiere sont ceux qui ont le bec droit, & le bout de la mandibule supérieure crochu, comme le *Manchot*, le *Gorfou* : & dans la seconde ceux qui ont le bec droit & pointu, comme le *Plongeon*.

Dans le vingt-deuxième ordre sont ceux qui ont trois doigts devant, joints ensemble par des membranes entieres, & point de doigt derriere (voyez *Pl. III. Fig. 4*) : & les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps, comme l'*Albatros*.

Dans le vingt-troisième ceux

qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur séparé (*voyez Pl. III. Fig. 6 & 7*): les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps: & le bec sans dentelures (*voyez Pl. VII. F. 5 & 6*). Les Oiseaux de cet ordre se divisent en deux sections: dans la première sont ceux dont le bec est crochu vers le bout (*voyez Pl. VII. Fig. 5*), comme le *Pétrel*, le *Goiland*, &c: & dans la seconde ceux qui ont le bec droit & applati par les côtés (*voyez Pl. VII. Fig. 6*), comme l'*Hirondelle-de-mer*, le *Bec-en-ciseaux*.

Dans le vingt-quatrième ordre sont ceux qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur séparé (*voyez Pl. IV. Fig. 1*): les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps: & le bec dentelé (*voyez Pl. VII. Fig. 7 & 8*). Je divise les Oiseaux de cet ordre en deux sections: dans la première sont ceux qui ont le bec presque cylindrique; & la mandibule supérieure crochue vers le bout (*voyez Pl. VII.*

continentur ea quæ quatuor habent digitos, quorum tres anteriores membranis integris inter se connectuntur, posticus verò solutus (*vide Tab. III. Fig. 6 & 7*): crura circa corpus medium & extra abdomen posita, & corpore breviora: & rostrum edentulum (*vide Tab. VII. Fig. 5 & 6*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividimus: in prima continentur illæ quæ rostrum habent versus apicem aduncum (*vide Tab. VII. Fig. 5*), ut *Procellaria*, *Larus*, &c: in secunda verò illæ quæ rostrum habent rectum & lateraliter planum (*vide Tab. VII. F. 6*), ut *Sterna*, *Rygchopsalia*.

In vigesimo-quarto ordine continentur ea quæ quatuor habent digitos, quorum tres anteriores membranis integris inter se connectuntur, posticus autem solutus (*vide Tab. IV. Fig. 1*): crura circa corpus medium & extra abdomen posita, & corpore breviora: & rostrum denticulatum (*vide Tab. VII. Fig. 7 & 8*). Hujus ordinis Aves in duas sectiones dividuntur: in prima continentur illæ quæ rostro donantur subcylindræo; mandibulæ superioris apice adunco (*vide*

Tab. VII. Fig. 7), ut *Merganser* : & in secunda illæ quæ rostrum habent superne convexum, infernè planiusculum (*vide Tab. VII. F. 8*), ut *Anser*, *Anas*.

In vigesimo-quinto ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos, omnes membranæ integris inter se connexos (*vide Tab. IV. Fig. 2*) : & crura circa corpus medium & extra abdomen posita, & corpore breviora. Hujus ordinis Aves in duas sectiones quoque dividuntur : prima continet eas quæ rostrum habent acutum, ut *Lepturus*, &c : & secunda illas quæ rostrum habent apice aduncum, ut *Phalacrocorax*, *Onocrotalus*, &c.

In vigesimo-sexto ordine continentur eæ quæ quatuor habent digitos, quorum tres anteriores membranæ integris inter se connectuntur, posticus verò solutus (*vide Tab. IV. Fig. 3 & 4*) : & crura circa corpus medium & extra abdomen posita, & corpore longiora. Hujus ordinis Aves in duas sectiones adhuc dividimus : in prima continentur eæ quæ rostrum habent denticulatum, ut

Fig. 7), comme l'*Harle* : & dans la seconde ceux dont le bec est convexe en-dessus & applati en-dessous (*voyez Pl. VII. Fig. 8*), comme l'*Oye*, le *Canard*.

Dans le vingt-cinquième ordre sont ceux qui ont quatre doigts, tous joints ensemble par des membranes entières (*voyez Pl. IV. Fig. 2*) : & les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus courtes que le corps. Les Oiseaux de cet ordre se divisent aussi en deux sections : dans la première sont ceux dont le bec est pointu, comme le *Paille-en-cul*, &c : & dans la seconde ceux dont le bec est crochu vers le bout, comme le *Cormoran*, le *Pélican*, &c.

Dans le vingt-sixième ordre sont ceux qui ont quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par des membranes entières, & le postérieur séparé (*voyez Pl. IV. Fig. 3 & 4*) : & les jambes avancées vers le milieu du corps & hors de l'abdomen, & plus longues que le corps. Je divise encore les Oiseaux de cet ordre en deux sections : dans la première sont ceux qui ont le bec dentelé, comme le *Fla-*

mant : & dans la seconde ceux qui ont le bec sans dentelures, comme l'*Avocette*, &c.

Phanicopterus : in secunda autem illæ quæ rostrum habent edentulum, ut *Avocetta*, &c.



T A B U L A
Synoptica Avium secundum Ordines.

Aves sunt, vel

Digitis membranis destitutis:

Cruribus ad calcaneum usque plumosis: Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis, Tribus anticè, uno posticè:

Rostro recto; mandibula superioris apice crassiori parumper & incurvo: naribus membranâ crassâ & molli semitectis. ORDO I.

Rostro conico-incurvo. ORDO II.

Rostro brevi, adunco. ORDO III.

Rostro conico-elongato. ORDO IV.

Rostro recto;

Mandibulâ superiore apice utrinque emarginatâ. ORDO V.

Mandibulâ utraq̃ue integrâ.

. ORDO VI.

Rostro gracili, parum arcuato.

. ORDO VII.

Rostro minimo, basi horizontaliter compresso, apice adunco: oris rictu capite ampliori. ORDO VIII.

Rostro conico-attenuato. ORDO IX.

Rostro subulato. ORDO X.

Rostro cuneiformi. ORDO XI.

Rostro filiformi. ORDO XII.

Duobus anticè, totidem posticè.

. ORDO XIII.

Medio trium anteriorum cum extimo trium articulo-
rum spatio, cum intimo primi tantum articuli
intervallo arcuè coherente.

. ORDO XIV.

Cruribus in parte inferiore plumis destitutis:

Alis pro mole corporis parvis & volatui inutili-
bus. ORDO XV.

Alis fat magnis & volatui idoneis:

Digitis tribus anticis, postico nullo.

. ORDO XVI.

Digitis quatuor, tribus anticis, uno postico.

. ORDO XVII.

Digitis per totam longitudinem auctis membranis,

Fissis: Digitis quatuor, tribus anticis, uno postico.

. ORDO XVIII.

Semifissis: Digitis quatuor, tribus anterioribus membra-
nis inter se connexis, postico soluto: cruribus ad
podicem positis & intra abdomen conditis.

. ORDO XIX.

Integris:

Cruribus ad podicem positis & intra abdomen
conditis:

Digitis tribus anticis, membranis inter se
connexis, digito postico nullo.

. ORDO XX.

Digitis quatuor, tribus anterioribus mem-
branis inter se connexis, postico soluto.

. ORDO XXI.

Cruribus circa corpus medium & extra abdomen
positis,

Corpore brevioribus:

Digitis tribus anticis, membranis inter se
connexis, digito postico nullo.

. ORDO XXII.

Digitis quatuor,

Tribus anterioribus membranis inter
se connexis, postico soluto:

Rostro edentulo.

. ORDO XXIII.

Rostro denticulato. ORDO XXIV.

Omnibus membranis inter se con-
nexis. ORDO XXV.

Corpore longioribus: Digitis quatuor,
tribus anterioribus membranis inter se con-
nexis, postico soluto.

. ORDO XXVI.

T A B L E

Méthodique des Oiseaux divisés en Ordres.

Les Oiseaux ont, ou

Les doigts dénués de membranes:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Quatre doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ,

Trois devant, un derrière:

Le bec droit; le bout de la mandibule supérieure un peu renflé & courbé: les narines à demi couvertes d'une membrane épaisse & molle.

. ORDRE I.

Le bec en cône courbé.

. ORDRE II.

Le bec court & crochu.

. ORDRE III.

Le bec en cône allongé.

. ORDRE IV.

Le bec droit;

Les bords de la mandibule supérieure échan-
crés vers le bout.

. ORDRE V.

Les deux mandibules entières.

. ORDRE VI.

Le bec menu & un peu courbé en
arc.

. ORDRE VII.

Le bec très-petit, comprimé horizontale-
ment à sa base, & crochu à son bout: l'ou-
verture du bec plus large que la tête.

. ORDRE VIII.

Le bec en cône raccourci.

. ORDRE IX.

Le bec en alène.

. ORDRE X.

Le bec en forme de coin.

. ORDRE XI.

Le bec effilé.

. ORDRE XII.

Deux devant & deux derrière.

. ORDRE XIII.

Celui du milieu des trois antérieurs étroitement
uni à l'extérieur jusqu'à la troisième articula-
tion, & à l'intérieur jusqu'à la première.

. ORDRE XIV.

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Les ailes petites à proportion de la grosseur du
corps, & point propres pour le vol.

. ORDRE XV.

Les ailes assez grandes & propres pour le vol:

Trois doigts devant & point derrière.

. ORDRE XVI.

Quatre doigts, trois devant, un derrière.

. ORDRE XVII.

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,

Fendues: Quatre doigts, trois devant, un derrière.

. ORDRE XVIII.

Demi-fendues: Quatre doigts, dont les trois antérieurs
sont joints ensemble par les membranes, & le pos-
térieur séparé: les jambes placées tout-à-fait derrière
& cachées dans l'abdomen.

. ORDRE XIX.

Entières:

Les jambes placées tout-à-fait derrière & cachées
dans l'abdomen:

Trois doigts devant, tous joints ensemble par
les membranes, & point de doigt derrière.

. ORDRE XX.

Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont
joints ensemble par les membranes, & le
postérieur séparé.

. ORDRE XXI.

Les jambes avancées vers le milieu du corps &
hors de l'abdomen,

Plus courtes que le corps:

Trois doigts devant, tous joints ensemble
par les membranes, & point de
doigt derrière.

. ORDRE XXII.

Quatre doigts,

Les trois antérieurs joints ensemble
par les membranes, & le postérieur
séparé:

Le bec sans dentelures.

. ORDRE XXIII.

Le bec dentelé.

. ORDRE XXIV.

Tous joints ensemble par les mem-
branes.

. ORDRE XXV.

Plus longues que le corps: Quatre doigts,
dont les trois antérieurs sont joints ensemble
par les membranes, & le postérieur
séparé.

. ORDRE XXVI.

O R D O I.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor ,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ;

Tribus anticè , uno posticè :

Rostro recto ; mandibulæ superioris apice crassiori parumper & incurvo ; naribus membranâ crassâ & molli semitectis. *Columba. Genus 1.*

O R D O II.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor ,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè , uno posticè :

Rostro conico-incurvo :

Capite paleis prædito. **SECTIO I.**

{ Paleâ unâ longitudinali , sub gutture pendulâ. . . . *Gallo-pavo. Genus 2.*

{ Paleis binis longitudinalibus , sub gutture pendulis ; & cristâ membranaceâ in fronte. . . . *Gallus. Genus 3.*

{ Paleis binis longitudinalibus , propè rictum oris , utrinque unâ , pendulis ; & cornu conico in fronte.
. *Meleagris. Genus 4.*

Capite paleis destituto. **SECTIO II.**

{ Pedibus plumosis. . . *Lagopus. Genus 5.*

{ Pedibus nudis :

{ Caudâ brevi. . . . *Perdix. Genus 6.*

{ Caudâ longâ. . . *Phasianus. Genus 7.*

O R D R E I.

Les Oiseaux qui ont O R D R E I.

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Quatre doigts ,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Trois devant , un derriere :

Le bec droit ; le bout de la mandibule supérieure un peu renflé & courbé : les narines à demi couvertes d'une membrane épaisse & molle.... *Le Pigeon. Genre 1.*

Les Oiseaux qui ont O R D R E II.

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Quatre doigts ,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Trois devant , un derriere :

Le bec en cone courbé :

{ La tête ornée de membranes charnues..

. SECTION I.

{ Une membrane charnue, longitudinale, pendante sous la gorge...

. *Le Dindon. Genre 2.*

{ Deux membranes charnues, longitudinales, pendantes sous la gorge ; & une crête membraneuse sur le front. *Le Coq. Genre 3.*

{ Deux membranes charnues, longitudinales, pendantes à côté de l'ouverture du bec ; & une corne conique sur le front.

. *La Peintade. Genre 4.*

{ La tête dénuée de membranes charnues. SECTION II.

{ Les pieds couverts de plumes....

. *La Gelinote. Genre 5.*

{ Les pied nuds :

{ La queue courte.

. *La Perdrix. Genre 6.*

{ La queue longue.

. *Le Faisan. Genre 7.*

O R D O III.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè, uno posticè :

Rostro brevi, adunco :

Basi rostri cute nudâ tectâ. SECTION I.

{ Rostro ab exortu adunco

. *Accipiter. Genus 8.*

{ Rostro primùm recto, dein adunco :

{ Capite plumoso.

. *Aquila. Genus 9.*

{ Capite vel nudo, vel lanugine tantum prædito. . . *Vultur. Genus 10.*

Basi rostri plumis antrorsum incumbentibus. . .

. SECTION II.

{ Capite fasciculis pennarum, auricularum æmulis, prædito. . . *Asio. Genus 11.*

{ Capite fasciculis illis pennarum destituto. *Strix. Genus 12.*

O R D R E III.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Quatre
doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ,

Trois devant , un derrière :

Le bec court & crochu :

La bête du bec couverte d'une peau nue...

SECTION I.

{ La courbure du bec commençant dès
son origine. . . *L'Epervier. Genre 8.*

{ La courbure du bec commençant à quel-
que distance de son origine :

{ La tête couverte de plumes. . . .

. *L'Aigle. Genre 9.*

{ La tête ou nue, ou seulement couverte
de duvet..... *Le Vautour. Genre 10.*

La bête du bec couverte de plumes tour-
nées en avant. SECTION II.

{ La tête ornée de paquets de plumes en
forme d'oreilles... *Le Hibou. Genre 11.*

{ La tête dénuée de ces paquets de plu-
mes. *Le Chathuant. Genre 12.*

ORDO IV.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis:

Cruribus ad calcaneum usque plumosis: Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis,

Tribus anticè, uno posticè:

Rostrum conico-elongato:

Plumis basis rostri antrorsum incumbentibus, naresque tegentibus. SECTIO I.

Rostrum parumper arcuato.

. *Coracia. Genus 13.*

Rostrum recto; apice deorsum inclinante:

{ Rectricibus æqualis ferè longitudinis. *Corvus. Genus 14.*{ Rectricibus intermediis multò longioribus. *Pica. Genus 15.*

Rostrum recto;

{ Mandibulis æqualibus.

. *Garrulus. Genus 16.*{ Mandibulâ superiore longiore & obtusâ. *Nucifraga. Genus 17.*

Plumis basis rostri retrorsum versis; naribusque detectis. SECTIO II.

Rostrum recto; apice deorsum inclinante. . .

. *Galgulus. Genus 18.*

Rostrum recto & acutissimo.

. *Icterus. Genus 19.*

{ Rostrum recto, acutissimo, paululùm lateraliter compresso: pennæ binis supra caudam totâ Ave longioribus, & pinnulis per totam longitudinem, exceptis exortu & apice, destitutis. . .

. *Manucodiata. Genus 20.*

ORDRE IV.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Quatre doigts ,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Trois devant , un derriere :

Le bec en cone allongé :

Les plumes de la bâte du bec tournées en-devant , & couvrant les narines

SECTION I.

Le bec un peu courbé en arc.

. *Le Coracias. Genre 13.*

Le bec droit ; son bout un peu tourné vers le bas :

{ Les plumes de la queue à peu près d'égale longueur.

. *Le Corbeau. Genre 14.*

{ Les plumes du milieu de la queue beaucoup plus longues que les latérales. . . *La Pie. Genre 15.*

Le bec tout-à-fait droit ;

{ Les deux mandibules égales.

. *Le Geay. Genre 16.*

{ La mandibule supérieure plus longue que l'inférieure & obtuse.

. *Le Casse-noix. Genre 17.*

Les plumes de la bâte du bec tournées en arriere , & laissant les narines à découvert SECTION II.

{ Le bec droit ; son bout un peu tourné vers le bas... *Le Rollier. Genre 18.*

Le bec droit & très-pointu.

. *Le Troupiale. Genre 19.*

{ Le bec droit, très-pointu, un peu comprimé par les côtés : deux plumes au-dessus de la queue plus longues que tout l'Oiseau , & qui n'ont des barbes qu'à leur origine & à leur bout.

. *L'Oiseau-de-Paradis. Genre 20.*

O R D O V.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè , uno posticè :

Rostro recto ;

Mandibulâ superiore apice utrinque emarginatâ ,

Rostro superne convexo , ... SECTION I.

{ Basis crassitie latitudinem æquante ;

{ Mandibulæ superioris apice adunco *Lanius. Genus 21.*

{ Mandibulæ superioris apice subrecto *Turdus. Genus 22.*

{ Basis latitudine crassitiem superante. . .

. *Cotinga. Genus 23.*

{ Rostro horizontaliter basi compresso , & ferè triangulari.

. *Muscicapa. Genus 24.*

. SECTION II.

O R D O VI.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor ,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè , uno posticè :

Rostro recto ;

Mandibulâ utrâque integrâ :

{ Rostro subquadrangulâri , paululùm superne convexo , infernè anguloso.

. *Buphagus. Genus 25.*

. SECTION I.

{ Rostro convexo , apice obtuso ; apicis latitudine crassitiem superante.

. *Sturnus. Genus 26.*

. SECTION II.

ORDRE V.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: Quatre doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ,

Trois devant, un derrière:

Le bec droit;

Les bords de la mandibule supérieure échan-
crés vers le bout:

Le bec convexe en-dessus, .. SECTION I.

Aussi épais que large à sa base;

Le bout de la mandibule supé-
rieure crochu.

... *La Pie-grièche. Genre 21.*

Le bout de la mandibule supé-
rieure presque droit.

... *La Grive. Genre 22.*

Plus large qu'épais à sa base.

... *Le Cotinga. Genre 23.*

Le bec comprimé horizontalement à sa
base, & presque triangulaire.

... *Le Gobe-mouche. Genre 24.*

... SECTION II.

ORDRE VI.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: Qua-
tre doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ,

Trois devant, un derrière:

Le bec droit;

Les deux mandibules entières:

Le bec presque quadrangulaire un peu
convexe en-dessus, & anguleux en-
dessous ... *Le Pique-bœuf. Genre 25.*

... SECTION I.

Le bec convexe; son bout un peu plus
large qu'épais & obtus.

... *L'Etourneau. Genre 26.*

... SECTION II.

ORDO VII.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè , uno posticè :

Rostro gracili , parùm arcuato :

{ Capite ornato corollâ longitudinali, plumosâ,
in duplici serie parallelâ divisâ , & plicatili..... *Upupa. Genus 27.*
..... SECTION I.

{ Capite simplici..... *Promerops. Genus 28.*
..... SECTION II.

ORDO VIII.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè , uno posticè :

Rostro minimo , basi horizontaliter compresso , apice adunco : oris recti capite ampliori :

{ Caudâ simplici.
..... *Caprimulgus. Genus 29.*
{ Caudâ bifurcâ.....
..... *Hirundo. Genus 30.*

ORDRE VII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Qua-
tre doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Trois devant , un derrière :

Le bec menu , & un peu courbé en arc :

{ La tête ornée d'une hupe longitudinale ,
composée d'un double rang de plumes ,
& que l'Oiseau peut plier à volonté. ...

..... *La Hupe. Genre 27.*

..... SECTION I.

{ La tête simple. *Le Promérops. Genre 28.*

..... SECTION II.

ORDRE VIII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Qua-
tre doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Trois devant , un derrière :

Le bec très-petit , comprimé horizontale-
ment à sa base , & crochu à son
bout : l'ouverture du bec plus large
que la tête :

{ La queue simple.
..... *Le Tette-Chèvre. Genre 29.*

{ La queue fourchue.
..... *L'Hirondelle. Genre 30.*

ORDO IX.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè, uno posticè :

Rostrò conico-attenuato :

Mandibulâ utrâque rectâ. SECTION I.

{ Mandibulâ superiore apice utrinque emarginatâ. *Tangara. Genus 31.*

{ Mandibulâ utrâque integrâ ;

{ Rostrò in apicem gracilem & longum exeunte. *Carduelis. Genus 32.*

{ Rostrò in apicem crassum & brevem exeunte ;

{ Rostrî basi capiti latitudine multò cedente.

{ *Passer. Genus 33.*

{ Rostrî basi caput latitudine ferè aquante.

{ *Coccothraustes. Genus 34.*

{ Mandibulæ utriusque marginibus introrsum depressis.

{ *Emberiza. Genus 35.*

{ Mandibulâ superiore aduncâ.

{ SECTION II.

{ Rostrò superne convexo, subtus planiusculo. *Colius. Genus 36.*

{ Rostrò superne & infernè convexo.

{ *Pyrrhula. Genus 37.*

{ Mandibulâ utrâque aduncâ, apicibus se de-

{ cussantibus. *Loxia. Genus 38.*

{ SECTION III.

ORDRE IX.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Quatre doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ,

Trois devant, un derrière :

Le bec en cône raccourci ;

Les deux mandibules droites. SECTION I.

{ Les bords de la mandibule supérieure échanrés vers le bout.

. *Le Tangara. Genre 31.*

{ Les deux mandibules entières ;

{ La pointe du cône grêle & allongée.

. *Le Chardonneret. Genre 32.*

{ La pointe du cône grosse & courte ;

{ La base du bec beaucoup moins large que la tête.

. *Le Moineau. Genre 33.*

{ La base du bec presque aussi large que la tête.

. *Le Gros-bec. Genre 34.*

{ Les bords des deux mandibules rentrants en-dedans.

. *Le Bruant. Genre 35.*

La mandibule supérieure crochue.

. SECTION II.

{ Le bec convexe en-dessus, & aplati en-dessous.

. *Le Coliou. Genre 36.*

{ Le bec convexe en-dessus & en-dessous.

. *Le Bouvreuil. Genre 37.*

Les deux mandibules crochues, & se croisant.

. *Le Bec-croisé. Genre 38.*

. SECTION III.

O R D O X.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis ,

Tribus anticè, uno posticè :

Rostrò subulato :

Naribus detectis.	SECTION I.
Ungue digiti postici subrecto, digitumque longitudine superante.	
.	<i>Alauda. Genus 39.</i>
Ungue digiti postici arcuato, digitumque longitudine non superante.	
.	<i>Ficedula. Genus 40.</i>
Naribus plumis basis rostri coopertis.	
.	<i>Parus. Genus 41.</i>
.	SECTION II.

ORDRE X.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: Quatre
doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ,

Trois devant, un derrière:

Le bec en alesne:

Les narines découvertes. SECTION I.

{ L'ongle du doigt de derrière presque
droit, & plus long que le doigt. . . .

. *L'Alouette. Genre 39.*

{ L'ongle du doigt de derrière courbé en
arc, & pas plus long que le doigt. . .

. *Le Becfigue. Genre 40.*

{ Les narines couvertes par les plumes de la
bâse du bec. . . . *La Mésange. Genre 41.*

. SECTION II.

ORDO XI.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis,

Tribus anticè, uno posticè :

Rostro cuneiformi. *Sitta. Genus 42.*

ORDO XII.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis,

Tribus anticè, uno posticè :

Rostro filiformi ,

{ Arcuato , ... SECTIO I.

{ Versus apicem crassitie sensim atque sensim minuyente , & in aciem acutissimum desinente. . . *Certhia. Genus 43.*

{ Per totam fermè longitudinem æquè crasso , & versus apicem parumper ampliato ; pedibus brevissimis.

{ *Polytmus. Genus 44.*{ Recto , horizontaliter compresso , & versus apicem parumper ampliato ; pedibus brevissimis. *Mellisuga. Genus 45.*

{ SECTIO II.

ORDRE XI.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Quatre
doigts ,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Trois devant , un derrière :

Le bec en forme de coin... *Le Torche-pot. Genre 42.*

ORDRE XII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Qua-
tre doigts ,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Trois devant , un derrière :

Le bec effilé ,

{ Courbé en arc , ... SECTION I.

{ Allant toujours en diminuant de grosseur,
& finissant par une pointe très-aiguë.

{ *Le Grimpereau. Genre 43.*

{ De la même grosseur dans presque tou-
te sa longueur , & un peu renflé vers
le bout : les pieds très-courts.

{ *Le Colibry. Genre 44.*

{ Droit , comprimé horizontalement , & un
peu renflé vers le bout : les pieds très-
courts. *L'Oiseau-mouche. Genre 45.*

{ SECTION II.

. *Le Condor. Genre 46.*

. *Le Condor. Genre 47.*

. *Le Condor. Genre 48.*

. *Le Condor. Genre 49.*

. *Le Condor. Genre 50.*

. *Le Condor. Genre 51.*

. *Le Condor. Genre 52.*

. *Le Condor. Genre 53.*

. *Le Condor. Genre 54.*

. *Le Condor. Genre 55.*

. *Le Condor. Genre 56.*

. *Le Condor. Genre 57.*

. *Le Condor. Genre 58.*

. *Le Condor. Genre 59.*

O R D O XIII.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : Digitis quatuor,

Omnibus usque ad exortum aut circiter discretis,

Duobus anticè, totidem posticè :

Rostro recto :

Linguâ longissimâ & lumbriciformi.

. SECTION I.

Rostro acuto : rectricibus flexibilibus. 1.

. *Torquilla. Genus 46.*

Rostro cuneiformi : rectricibus rigidis ,
cuneiformibus.

. *Picus. Genus 47.*

Linguâ rostrum longitudine non superante :
rostro longissimo , quadrangulâri , acu-
to *Galbula. Genus 48.*

. SECTION II.

Rostro modicè deorsum inflexo , superne con-
vexo , lateraliter compresso.

. SECTION III.

Basi rostri pennis rigidis , piliformibus , an-
trorsum versis obsitâ.

. *Bucco. Genus 49.*

Basi rostri pennis piliformibus destitutâ.

. *Cuculus. Genus 50.*

Rostro brevi , adunco , ... SECTION IV.

Latitudine crassitiem superante.

. *Trogon. Genus 51.*

Crassitie latitudinem superante ,

Superne cultrato.

. *Crotophagus. Genus 52.*

Superne convexo.

. *Psittacus. Genus 53.*

Rostro longo , crassitie caput æquante , serræ
instar denticulato ; utriusque mandibulæ api-
ce deorsum incurvo : linguâ pennæ æmulâ.

. *Tucana. Genus 54.*

. SECTION V.

ORDRE XIII.

ORDRE XIII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : quatre
doigts,

Tous séparés jusqu'à leur origine ou environ ,

Deux devant & deux derrière :

Le bec droit :

{ La langue très-longue & ressemblante à un
ver de terre. SECTION I.

{ Le bec pointu : les plumes de la queue
flexibles. *Le Torcol. Genre 46.*

{ Le bec en forme de coin : les plumes
de la queue roides & en forme de
coin. *Le Pic. Genre 47.*

{ La langue pas plus longue que le bec : &
le bec très-long, quadrangulaire & poin-
tu. *Le Jacamar. Genre 48.*

. SECTION II.

{ Le bec un peu courbé en en-bas, convexe en-
dessus & comprimé par les côtés.

. SECTION III.

{ La bête du bec garnie de plumes roides &
en forme de poils, tournées en-devant. . .

. *Le Barbu. Genre 49.*

{ La bête du bec dénuée de ces plumes en for-
me de poils. *Le Coucou. Genre 50.*

Le bec court & crochu, ... SECTION IV.

{ Plus large qu'épais.

. *Le Couroucou. Genre 51.*

{ Plus épais que large,

{ Tranchant en-dessus.

. *Le Bout-de-petun. Genre 52.*

{ Convexe en-dessus.

. *Le Perroquet. Genre 53.*

{ Le bec long, de la grosseur de la tête, den-
telé comme une scie ; le bout des deux man-
dibules courbé en en-bas : la langue ressem-
blante à une plume. . . *Le Toucan. Genre 54.*

. SECTION V.

ORDO XIV.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus ad calcaneum usque plumosis : digitis quatuor,
tribus anticis, uno postico ;Medio trium anteriorum cum extimo digito trium
articulorum spatio, cum intimo primi tantum
articuli intervallo arctè cohærente :

Rostro brevi & versùs apicem lateraliter compres-
so SECTION I.

{ Capite ornato corollâ longitudinali, plumosâ,
semicirculari.

. *Rupicola. Genus 55.*

{ Capite simplici *Manacus. Genus 56.*

Rostro conico, ferræ instar denticulato ; utriusque
mandibulæ apice deorsum incurvo

. *Momotus. Genus 57.*

. SECTION II.
Rostro recto, longiusculo, ... SECTION III.

{ Crasso, acuto *Ispida. Genus 58.*

{ Horizontaliter plano, obtuso.

. *Todus. Genus 59.*

Rostro arcuato, acuto.

. *Apiaster. Genus 60.*

. SECTION IV.

Rostro crasso, falciformi.

. *Hydrocorax. Genus. 61.*

. SECTION V.

ORDRE XIV.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : quatre
doigts, trois devant, un derrière ;

Celui du milieu des trois antérieurs étroitement uni
au doigt extérieur jusqu'à la troisième articu-
lation, & au doigt intérieur jusqu'à la pre-
mière :

- Le bec court & comprimé par les côtés vers le
bout SECTION I.
- La tête ornée d'une hupe longitudinale de
plumes, formant un demi-cercle
 - *Le Coq-de-roche. Genre 55.*
 - La tête simple. . . . *Le Manakin. Genre 56.*
- Le bec conique, dentelé comme une scie ; le
bout des deux mandibules courbé en en-bas. .
. *Le Momot. Genre 57.*
- SECTION II.
- Le bec droit, & assez long, . . . SECTION III.
- Gros & pointu. . . . *Le Martin-pêcheur. Genre 58.*
 - Applati horizontalement & obtus.
 - *Le Todier. Genre 59.*
- Le bec courbé en arc & pointu.
- *Le Guêpier. Genre 60.*
- SECTION IV.
- Le bec gros & en forme de faux
- *Le Calao. Genre 61.*
- SECTION V.

ORDO XV.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus in parte inferiore plumis destitutis :

Alis , pro mole corporis , parvis & volatui inutilibus :

Digitis duobus anticis , postico nullo : rostro recto , horizontaliter subplano ; apice subrotundo , unguiculato : superiore capitis parte calvâ & callosâ.

Struthio. Genus 62.

SECTION I.

Digitis tribus anticis , postico nullo.

SECTION II.

Rostro recto , horizontaliter subplano ; apice subrotundo.

Rhea. Genus 63.

Rostro recto , subconico : capite galeâ corneâ instructo : pallearibus binis in juguli medio.

Casuarus. Genus 64.

Digitis quatuor , tribus anticis , uno postico : rostro longo valido ; utriusque mandibulæ apice adunco.

Raphus. Genus 65.

SECTION III.

ORDO XVI.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus in parte inferiore plumis destitutis :

Alis sat magnis & volatui idoneis :

Digitis tribus anticis , postico nullo :

Rostro conico-incurvo.

Otis. Genus 66.

SECTION I.

Rostro recto , apice crassiori ,

Longissimo , ...

SECTION II.

Cylindræo.

Himantopus. Genus 67.

Laterâliter plano.

Ostræga. Genus 68.

Brevi.

Pluvialis. Genus 69.

SECTION III.

ORDRE XV.

ORDO XVII.

Aves quæ sunt

Digitis membranis destitutis :

Cruribus in parte inferiore plumis destitutis :

Alis fat magnis, & volatui idoneis :

Digitis quatuor, tribus anticis, uno postico :

Rostro recto, apice crassiori. SECTION I.

{ Unguiculis brevissimis.

. *Vanellus. Genus 70.*

{ Unguiculis longissimis.

. *Jacana. Genus 71.*

Rostro subrecto, sursum modicè tendente, horizontaliter paululum compresso.

. *Arenaria. Genus 72.*

. SECTION II.

Rostro superne convexo, apice lateraliter compresso.

. *Glareola. Genus 73.*

. SECTION III.

Rostro recto, lateraliter compresso; corpore lateraliter compresso.

. *Rallus. Genus 74.*

. SECTION IV.

Rostro gracili, ... SECTION V.

{ Mediæ longitudinis, recto; apice obtuso & levi.

. *Tringa. Genus 75.*

{ Longissimo, ...

{ Subrecto, sursum modicè tendente; apice obtuso & levi.

. *Limosa. Genus 76.*

{ Recto; apice obtuso & rugoso.

. *Scolopax. Genus 77.*

Rostro deorsum arcuato.

. *Numenius. Genus 78.*

. SECTION VI.

Rostro recto, horizontaliter plano; apice ampliato, subrotundo, spathæformi.

. *Platea. Genus 79.*

. SECTION VII.

Rostro crasso, longo, ... SECTION VIII.

{ Recto, acuto, ...

{ Levi. *Ciconia. Genus 80.*

{ Mandibulâ superiore sulco longitudinali utrinque exarata.

. *Ardea. Genus 81.*

{ Recto, lateraliter plano; mandibulæ superioris apice adunco.

. *Scopus. Genus 82.*

Rostro crasso, brevi; mandibulâ superiore cochleariformi; apice unguiculato.

. *Cochlearius. Genus 83.*

. SECTION IX.

Rostro brevi, recto; apice conico: capite ornato corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflata.

. *Balearica. Genus 84.*

. SECTION X.

Rostro conico-incurvo. SECTION XI.

{ Alis inermibus.

. *Cariama. Genus 85.*

{ Alis corniculis binis in parte anteriore armatis: corniculo cylindræo antrorsum arcuato in fronte.

. *Anhima. Genus 86.*

Rostro conico, lateraliter compresso: calvitio in fronte.

. *Porphyrio. Genus 87.*

. SECTION XII.

ORDRE XVII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts dénués de membranes :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Les ailes assez grandes, & propres pour le vol :

Quatre doigts, trois devant, un derrière :

Le bec droit & renflé vers le bout. SECTION I.

{ Les ongles très-courts.

. *Le Vanneau. Genre 70.*

{ Les ongles très-longs.

. *Le Jacana. Genre 71.*

Le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement.

. *Le Coulon-chaud. Genre 72.*

. SECTION II.

Le bec convexe en-dessus & comprimé par les côtés vers le bout.

. *La Perdrix-de-mer. Genre 73.*

. SECTION III.

Le bec droit & comprimé par les côtés: le corps applati par les côtés.

. *Le Râle. Genre 74.*

. SECTION IV.

Le bec menu, ... SECTION V.

{ De moyenne longueur, droit; le bout obtus & lisse.

. *Le Beccasseau. Genre 75.*

{ Très-long, ...

{ Plutôt recourbé en en-haut que droit; le bout obtus & lisse.

. *La Barge. Genre 76.*

{ Droit; le bout obtus & raboteux.

. *La Beccasse. Genre 77.*

Le bec courbé en arc en en-bas.

. *Le Courly. Genre 78.*

. SECTION VI.

Le bec droit, plat horizontalement; son bout plus large & arrondi en forme de spatule.

. *La Spatule. Genre 79.*

. SECTION VII.

Le bec gros, long, ... SECTION VIII.

{ Droit & pointu, ...

{ Lisse. *La Cigogne. Genre 80.*

{ Une rainure longitudinale de chaque côté sur la mandibule supérieure.

. *Le Héron. Genre 81.*

{ Droit, applati par les côtés; le bout de la mandibule supérieure crochu.

. *L'Ombrette. Genre 82.*

Le bec gros, court; la mandibule supérieure en forme de cuillère, & onguiculée à son bout.

. *La Cuillère. Genre 83.*

. SECTION IX.

Le bec court, droit & conique vers le bout: la tête ornée d'une hupe composée de plumes ressemblantes à des racines de Chien-dent.

. *L'Oiseau-royal. Genre 84.*

. SECTION X.

Le bec en cône courbé. SECTION XI.

{ Les ailes point armées.

. *Le Cariama. Genre 85.*

{ Les ailes armées de deux especes de cornes dans la partie antérieure: une petite corne cylindrique & courbée en arc en-avant sur le front.

. *Le Kamichy. Genre 86.*

Le bec en cône applati par les côtés: le front chauve.

. *La Poule-sultane. Genre 87.*

. SECTION XII.

ORDRE XVIII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,

Fendues : quatre doigts , trois devant , un derriere :

Les membranes simples : le bec droit & pointu. . .

. *La Poule-d'eau. Genre 88.*

. SECTION I.

Les membranes festonnées. SECTION II.

Le bec menu & droit ; la mandibule supérieure
courbée en en-bas vers le bout.

. *Le Phalarope. Genre 89.*

Le bec en cone applati par les côtés.

. *La Foulque. Genre 90.*

ORDRE XIX.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes ,

Demi-fendues : quatre doigts , dont les trois antérieurs

sont joints ensemble par les membranes , & le posté-

rieur séparé : les jambes placées tout-à-fait derriere ,

& cachées dans l'abdomen : le bec droit & pointu.

. *La Grebe. Genre 91.*

Aves quæ sunt

Digitis per totam longitudinem auctis membranis,

Integris :

Cruribus ad podicem positis , & intra abdomen conditis :

Digitis tribus anticis , membranis inter se connexis , digito postico nullo :

{ Rostro recto , acuto *Uria. Genus 92.*

. SECTION I.

{ Rostro lateraliter plano , transversim striato ,

. SECTION II.

{ Crassitie longitudinem æquante

. *Fratercula. Genus 93.*

{ Longitudine crassitiem superante

. *Alca. Genus 94.*

ORDO XXI.

Aves quæ sunt

Digitis per totam longitudinem auctis membranis ,

Integris :

Cruribus ad podicem positis , & intra abdomen conditis :

Digitis quatuor , tribus anterioribus membranis inter se connexis , postico soluto :

{ Rostro recto ; apice mandibulæ superioris adunco SECTION I.

{ Apice mandibulæ inferioris quasi truncato . .

. *Spheniscus. Genus 95.*

{ Apice mandibulæ inferioris rotundato . . .

. *Catarractes. Genus 96.*

{ Rostro recto , acuto *Mergus. Genus 97.*

. SECTION II.

LES OISEAUX, *Classe III.*

33

ORDRE XX.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,

Entieres :

Les jambes placées tout-à-fait derriere, & cachées dans l'abdomen :

Trois doigts devant, tous joints ensemble par les membranes ; & point de doigt derriere :

{ Le bec droit & pointu... *Le Guillemot. Genre 92.*

SECTION I.

{ Le bec applati par les côtés, & cannelé transversalement, ... SECTION II.

{ Aussi épais que long.

. *Le Macareux. Genre 93.*

{ Plus long qu'épais.

. *Le Pingoin. Genre 94.*

ORDRE XXI.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,

Entieres :

Les jambes placées tout - à - fait derriere, & cachées dans l'abdomen :

Quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par les membranes, & le postérieur séparé :

{ Le bec droit; le bout de la mandibule supérieure crochu SECTION I.

{ Le bout de la mandibule inférieure comme tronqué. *Le Manchot. Genre 95.*

{ Le bout de la mandibule inférieure arrondi. *Le Gorfou. Genre 96.*

{ Le bec droit & pointu... *Le Plongeon. Genre 97.*

. SECTION II.

I ij

ORDO XXII.

Aves quæ sunt

Digitis per totam longitudinem auctis membranis ,

Integris :

Cruribus circa corpus medium & extra abdomen positis ,

Corpore brevioribus :

Digitis tribus anticis , membranis inter se connexis , digito postico nullo : rostro lateraliter compresso ; apice mandibulæ superioris adunco , inferioris quasi truncato.

Albatrus. Genus 98.

ORDRE XXI.

ORDRE XXII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,
Entieres :

Les jambes avancées vers le milieu du corps , & hors
de l'abdomen ,

Plus courtes que le corps :

Trois doigts devant , tous joints ensemble par
les membranes , & point de doigt derriere :
le bec comprimé par les côtés ; le bout de la
mandibule supérieure crochu , & celui de la
mandibule inférieure comme tronqué.

. *L'Albatros. Genre 98.*

ORDO XXIII.

Aves quæ sunt

Digitis per totam longitudinem auctis membranis ;

Integris :

Cruribus circa corpus medium & extra abdomen
positis ,

Corpore brevioribus :

Digitis quatuor ;

Tribus anterioribus membranis inter se conne-
xis , postico soluto :

Rostro edentulo ,

Versùs apicem adunco , . . . SECTION I.

Subcylindraceo ;

Apice utriusque mandibulæ adun-
co *Puffinus. Genus 99.*

Apice mandibulæ superioris a-
dunco , inferioris quasi trun-
cato

. *Procellaria. Genus 100.*

Apice mandibulæ superioris a-
dunco , inferioris rotundato...

. *Stercorarius. Genus 101.*

Lateraliter compresso ; mandibulâ
inferiore infrâ angulosâ

. *Larus. Genus 102.*

Recto , lateraliter plano

. SECTION II.

Mandibulâ utrâque æqualis longitudi-
nis

. *Sterna. Genus 103.*

Mandibulâ inferiore multò longio-
re

. *Rygchopsalia. Genus 104.*

ORDRE XXIII.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,
Entières :

Les jambes avancées vers le milieu du corps, & hors
de l'abdomen,

Plus courtes que le corps :

Quatre doigts ;

Les trois antérieurs joints ensemble par les
membranes, & le postérieur séparé :

Le bec sans dentelures,

Crochu vers le bout, . . . SECTION I.

Presque cylindrique ;

Le bout des deux mandibules
crochu.. *Le Puffin. Genre 99.*

Le bout de la mandibule supé-
rieure crochu, & celui de la
mandibule inférieure comme
tronqué... *Le Pétrel. Genre 100.*

Le bout de la mandibule supé-
rieure crochu, & celui de la
mandibule inférieure arrondi. .

. . . *Le Stercoraire. Genre 101.*

Comprimé par les côtés; le dessous
de la mandibule inférieure angu-
leux. . . . *Le Goiland. Genre 102.*

Droit & aplati par les côtés. . . .

. SECTION II.

Les deux mandibules d'égale lon-
gueur.

.. *L'Hirondelle-de-mer. Genre 103.*

La mandibule inférieure beaucoup
plus longue que la supérieure. . . .

.. *Le Bec-en-ciseaux. Genre 104.*

ORDO XXIV.

Aves quæ sunt

Digitis per totam longitudinem auctis membranis ;

Integris :

Cruribus circa corpus medium & extra abdomen
positis ,

Corpore brevioribus :

Digitis quatuor ;

Tribus anterioribus membranis inter se conne-
xis , postico soluto :

Rostro denticulato ,

{ Subcylindræo ; mandibulæ superioris
apice adunco

. *Merganser. Genus 105.*

. SECTION I.

{ Superne convexo , infernè planiuscu-
lo , ... SECTION II.

{ Crassitie latitudinem æquante ; apice
unguiculato , obtuso

. *Anser. Genus 106.*

{ Latitudine crassitiem superante ; api-
ce unguiculato , obtuso

. *Anas. Genus 107.*

ORDRE XXIV.

O R D R E XXIV.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,

Entieres :

Les jambes avancées vers le milieu du corps, & hors
de l'abdomen,

Plus courtes que le corps :

Quatre doigts ;

Les trois antérieurs joints ensemble par les
membranes, & le postérieur séparé :

Le bec dentelé ,

{ Presque cylindrique ; la mandibule supé-
rieure crochue vers le bout.

. *L'Harle. Genre 105.*

. SECTION I.

{ Convexe en-dessus & applati en-des-
sous, ... SECTION II.

{ Aussi épais que large ; le bout on-
guiculé & obtus.

. *L'Oye. Genre 106.*

{ Plus large qu'épais ; le bout ongui-
culé & obtus.

. *Le Canard. Genre 107.*

ORDO XXV.

Aves quæ sunt

Digitis per totam longitudinem auctis membranis,

Integris :

Cruribus circa corpus medium & extra abdomen
positis,

Corpore brevioribus :

Digitis quatuor ;

Omnibus membranis inter se connexis :

{ Rostro acuto, ... SECTION I.

{ Recto. *Anhinga. Genus 108.*{ Deorsum modicè inflexo : rectricibus
binis longissimis.{ *Lepturus. Genus 109.*

{ Rostro apice adunco, ...

{ SECTION II.

{ Recto, conico. *Sula. Genus 110.*

{ Recto, subcylindræo.

{ *Phalacrocorax. Genus 111.*{ Recto, horizontaliter plano : gutture &
sub rostro bursa inflabili instructo. . .{ *Onocrotalus. Genus 112.*

ORDO XXVI.

Aves quæ sunt

Digitis per totam longitudinem auctis membranis,

Integris :

Cruribus circa corpus medium & extra abdomen
positis,Corpore longioribus : digitis quatuor, tribus an-
terioribus membranis inter se connexis, postico
soluto :{ Rostro denticulato, medium versùs deor-
sum incurvo ; mandibulâ inferiore latio-
re. *Phœnicopterus. Genus 113.*

{ SECTION I.

{ Rostro edentulo, ... SECTION II.

{ Gracili, longissimo, horizontaliter compres-
so, sursum arcuato.{ *Avocetta. Genus 114.*{ Brevi, recto. *Corrira. Genus 115.*

O R D R E X X V.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,

Entières :

Les jambes avancées vers le milieu du corps, & hors de l'abdomen,

Plus courtes que le corps :

Quatre doigts ;

Tous joints ensemble par les membranes :

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| { | Le bec pointu, ... | SECTION I. |
| | Droit. | <i>L'Anhinga. Genre 108.</i> |
| | Un peu courbé vers le bas : deux plu-
mes très-longues à la queue. | <i>Le Paille-en-cul. Genre 109.</i> |
| { | Le bec crochu vers le bout, ... | |
| | SECTION II. | |
| | Droit & conique. | <i>Le Fou. Genre 110.</i> |
| | Droit & presque cylindrique. | <i>Le Cormoran. Genre 111.</i> |
| | Droit & aplati horizontalement : une
poche membraneuse sous la gorge.
. | <i>Le Pélican. Genre 112.</i> |

O R D R E X X V I.

Les Oiseaux qui ont

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes,

Entières :

Les jambes avancées vers le milieu du corps, & hors de l'abdomen,

Plus longues que le corps : quatre doigts, dont les trois antérieurs sont joints ensemble par les membranes, & le postérieur séparé :

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| { | Le bec dentelé, courbé en en-bas vers le mi-
lieu ; la mandibule inférieure plus large que
la supérieure. | <i>Le Flamant. Genre 113.</i> |
| | SECTION I. | |
| { | Le bec sans dentelures, ... | SECTION II. |
| | Menu, très-long, comprimé horizontale-
ment & courbé en arc en en-haut. | <i>L'Avocette. Genre 114.</i> |
| | Court & droit. | <i>Le Cœur. Genre 115.</i> |

EXPLICATIO EXPLICATION

Figurarum septem primarum des Figures des sept premières
Tabularum. Planches.

Tabula I.

Planche I.

*Fig. 1. Pes sinister Colum-
bæ Liviæ.*

*Fig. 2. Pes dexter Phasiani
varii.*

*Fig. 3. Pes dexter Cassici
rubri.*

*Fig. 4. Pes sinister Asturis
maris.*

*Fig. 5. Pes dexter Hirun-
dinis domesticæ.*

*Fig. 6. Pes dexter Cardi-
nalis Madagascariensis.*

*Fig. 7. Pes dexter Alau-
dæ.*

*Fig. 8. Pes dexter Sit-
tæ.*

*Fig. 9. Pes dexter Melli-
fugæ Cayanensis majoris.*

*Fig. 10. Pes sinister Pici
viridis.*

*Fig. 11. Pes sinister Gal-
bulæ.*

*Fig. 12. Pes sinister Psitta-
ci minoris Carolinensis.*

*Fig. 13. Pes dexter Mana-
ci auro-capilli.*

*Fig. 14. Pes dexter Mo-
moti.*

*Fig. 15. Pes sinister Ispidæ
cœruleæ Madagascariensis.*

*Fig. 1. Patte gauche de Bi-
set.*

*Fig. 2. Patte droite de Fai-
san panaché.*

*Fig. 3. Patte droite de Cassi-
que rouge.*

*Fig. 4. Patte gauche d'Au-
tour mâle.*

*Fig. 5. Patte droite d'Hiron-
delle de cheminée.*

*Fig. 6. Patte droite de Car-
dinal de Madagascar.*

*Fig. 7. Patte droite d'A-
louette.*

*Fig. 8. Patte droite de Tor-
chepot.*

*Fig. 9. Patte droite du grand
Oiseau-mouche de Cayenne.*

*Fig. 10. Patte gauche de Pic
verd.*

*Fig. 11. Patte gauche de Ja-
camar.*

*Fig. 12. Patte gauche de Per-
ruche de la Caroline.*

*Fig. 13. Patte droite de Ma-
nakin à tête d'or.*

*Fig. 14. Patte droite de Mo-
mot.*

*Fig. 15. Patte gauche de Mar-
tin-pêcheur bleu de Madagascar.*

Fig. 16. Patte gauche de Calao des Philippines.

Fig. 16. Pes sinister Hydrocoracis Philippensis.

Planche II.

Tabula II.

Fig. 1. Patte droite d'Autruche réduite des trois quarts.

Fig. 1. Pes dexter Struthionis ad quartam partem redactus.

Fig. 2. Patte droite d'Huitrier.

Fig. 2. Pes dexter Ostreae.

Fig. 3. Patte droite de Vanneau armé du Sénégal.

Fig. 3. Pes dexter Vanelli armati Senegalensis.

Fig. 4. Patte droite de Chirurgien brun.

Fig. 4. Pes dexter Jacanæ armatae fuscae.

Fig. 5. Patte droite de Bécassine.

Fig. 5. Pes dexter Gallinaginis.

Fig. 6. Patte gauche de Courli.

Fig. 6. Pes sinister Numenius.

Planche III.

Tabula III.

Fig. 1. Patte gauche de Poule-d'eau.

Fig. 1. Pes sinister Gallinulae.

Fig. 2. Patte gauche de Foulque.

Fig. 2. Pes sinister Fulicae.

Fig. 3. Patte droite de petite Grébe.

Fig. 3. Pes dexter Colymbi minoris.

Fig. 4. Patte gauche de Pingoin.

Fig. 4. Pes sinister Alcae.

Fig. 5. Patte droite de Plongeon du Nord.

Fig. 5. Pes dexter Mergi Arctici.

Fig. 6. Patte droite de Mouette cendrée.

Fig. 6. Pes dexter Laricineri minoris.

Fig. 7. Patte gauche d'Hironnelle-de-mer.

Fig. 7. Pes sinister Sternæ.

Planche IV.

Tabula IV.

Fig. 1. Patte droite d'Harle.

Fig. 1. Pes dexter Mer-ganseris.

Fig. 2. Pes dexter Onocrotali Americani.

Fig. 3. Pes dexter Phœnicopteri, ad tertiam partem reductus.

Fig. 4. Pes sinister Avocette.

Tabula V.

Fig. 1. Caput Columbæ Romanæ.

Fig. 2. Caput Phasiani maris tempore coitus.

Fig. 3. Caput Monedulæ Philippensis.

Fig. 4. Caput Galguli.

Fig. 5. Caput Caslici rubri.

Fig. 6. Caput Xanthorni nigri Cayanensis.

Fig. 7. Caput Asturis fœminæ.

Fig. 8. Caput Aluconis.

Tabula VI.

Fig. 1. Caput Collurionis maris.

Fig. 2. Caput Turdi Pilaris leucocephali.

Fig. 3. Caput Muscicapæ Madagascariensis longicauda.

Fig. 4. Caput Buphagi.

Fig. 5. Caput Sturni.

Fig. 6. Caput Upupæ.

Fig. 7. Caput Promeropsis.

Fig. 2. Patte droite de Pélican d'Amérique.

Fig. 3. Patte droite de Flamant, réduite des deux tiers.

Fig. 4. Patte gauche d'Avocette.

Planche V.

Fig. 1. Tête de Pigeon Romain.

Fig. 2. Tête de Faisan mâle dans le temps de l'amour.

Fig. 3. Tête de Choucas des Philippines.

Fig. 4. Tête de Rollier.

Fig. 5. Tête de Cassique rouge.

Fig. 6. Tête de Carouge noir de Cayenne.

Fig. 7. Tête d'Autour femelle.

Fig. 8. Tête de petit Chatuant.

Planche VI.

Fig. 1. Tête d'Ecorcheur mâle.

Fig. 2. Tête de Litorne à tête blanche.

Fig. 3. Tête de Gobe-mouche à longue queue de Madagascar.

Fig. 4. Tête de Pique-bœuf.

Fig. 5. Tête d'Etourneau.

Fig. 6. Tête de Hupe ou Puput.

Fig. 7. Tête de Promérops.

Fig. 8. Tête d'Hirondelle de cheminée.

Fig. 9. Tête de Tangara verd du Pérou.

Fig. 10. Tête de Cardinal de Madagascar.

Fig. 11. Tête de Proyer.

Fig. 12. Tête de Bouvreuil mâle.

Fig. 13. Tête de Bec-croisé mâle.

Fig. 14. Tête de Rossignol de muraille mâle.

Fig. 15. Tête de Pipit verd.

Fig. 16. Tête de Mésange bleue.

Planche VII.

Fig. 1. Tête de Torchepot.

Fig. 2. Tête de Grimpereau verd de Madagascar mâle.

Fig. 3. Tête de Colibry de S. Domingue.

Fig. 4. Tête du grand Oiseau-mouche de Cayenne.

Fig. 5. Tête de Mouëtte cendrée.

Fig. 6. Tête de Bec-en-ciseaux.

Fig. 7. Tête d'Harle mâle.

Fig. 8. Tête de Canard fauvage femelle.

Fig. 8. Caput Hirundinis domesticæ.

Fig. 9. Caput Tangaræ Peruvianæ viridis.

Fig. 10. Caput Cardinalis Madagascariensis.

Fig. 11. Caput Cynchrami.

Fig. 12. Caput Pyrrhulæ maris.

Fig. 13. Caput Loxiæ maris.

Fig. 14. Caput Ruticillæ maris.

Fig. 15. Caput Silvix viridis.

Fig. 16. Caput Pari cœrulei.

Tabula VII.

Fig. 1. Caput Sittæ.

Fig. 2. Caput Certhiæ viridis Madagascariensis maris.

Fig. 3. Caput Polytmæ Dominicanensis.


Fig. 4. Caput Mellifugæ Cayanensis majoris.

Fig. 5. Caput Lari cinerei minoris.

Fig. 6. Caput Rygchopsalliæ.

Fig. 7. Caput Merganseris maris.

Fig. 8. Caput Boschadis fœminæ.












Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.



Fig. 13.



Fig. 14.



Fig. 15.







Fig. 16.



Fig. 12.







ORDO I

ORDRE I.

A V E S

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus usque ad exortum, aut circiter discretis: cruribus ad calcaneum usque plumosis: rostro recto; mandibula superioris apice crassiori parumper & incurvo: naribusque membranâ crassâ & molli semitectis donatâ.

Qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derriere, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: le bec droit; le bout de la mandibule supérieure un peu renflé & courbé: & les narines à demi-couvertes d'une membrane épaisse & molle.

IN illo ordine unicum continetur genus, scilicet *Columbinum*.

I.

Genus Columbinum.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes usque ad exortum, aut circiter, discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Tome I,

IL n'y a dans cet ordre qu'un seul genre, sçavoir celui des *Pigeons*.

I.

Le genre du Pigeon.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts dénués de membranes; trois devant, un derriere; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

L

Le bec droit ; le bout de la mandibule supérieure un peu renflé & courbé :

Les narines à demi-couvertes d'une membrane épaisse & molle.

Tous les Oiseaux de ce genre vivent uniquement de grains & de semences dures, qu'ils avalent sans les casser. Ils ne font à chaque couvée que deux œufs & deux petits, dont un est communément mâle & l'autre femelle : & pour compenser ce petit nombre, ils font plusieurs fois l'année. Le mâle est chargé de couvrir, ainsi que la femelle, ce qu'ils font l'un après l'autre, & chacun à leur tour. Ils nourrissent leurs petits en leur dégorgeant les grains qu'ils ont déjà avalés ; afin qu'étant macérés & ramollis dans le jabot, l'estomac des petits puisse les moudre & les digérer plus aisément.

Tous les Pigeons n'ont pas le bec d'une égale longueur : les uns l'ont très-court & assez épais ; & les autres l'ont plus menu & plus allongé.

** I. LE PIGEON DOMESTIQUE.

Columba minor versicolor, parte dorsi inferiore albâ . . .
COLUMBA DOMESTICA.

Columba coerulescens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante.
Faun. Suec. Linn. N^o. 174. (1. varietas).

Rostrum rectum ; mandibulae superioris apice crassiori parumper & incurvo :

Nares membranâ crassâ & molli semitectæ.

Omnes hujus generis Aves è granis tantummodo seminibusque durioribus victum quarunt, eaque integra deglutunt. Bina dumtaxat unâ vice ova ponunt, duosque pullos educant, quorum vulgò unus mas, alter verò fœmina : ad supplendum autem parvum numerum, sæpius in anno pariunt. Mas & fœmina laborem incubandi inter se partiuntur, vicissim scilicet incubantes. Cibus pullis ex ingluvie sua in os eructant ; ut scilicet in ingluvie maceratus & emollitus, à pullorum ventriculis facilius subigatur & digeratur.

Columbae rostri longitudine non omnes inter se conveniunt : nonnullæ enim rostra habent brevia admodum & crassiuscula, aliæ tenuia & longiuscula.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre I.* 69

- Columba coerulescens*, maculâ alarum duplici nigrâ. *Browne. Nat. Hist of Jamaic. pag. 468.*
- Columba. Aldro. Avi. Tom. II. pag. 353.*
Moehr. Avi. Gen. 52.
Rzac. Hist. Nat. Pol. pag. 301.
Prosp. Alp. Egypt. Vol. I. pag. 198.
- Columba domestica. Aldro. Avi. Tom. II. pag. 462, in qua icon satis accurata.*
Jonst. Avi. pag. 62. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 32.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 72. Sp. 2.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 237.
Charlet. Exer. pag. 84. N^o. I.
Charlet. Onomast. pag. 76. N^o. I.
- Columba domestica, seu vulgaris. Willugh. Ornith. pag. 130.*
Raj. Syn. Avi. pag. 59. N^o. A. 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.
- Columba vulgaris. Gesn. Avi. pag. 279, in qua icon minùs accurata.*
Raj. Syn. Avi. pag. 183. N^o. 21.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 302. N^o. XXVI.
- Columba vulgaris, vel domestica. Gesn. icon. Avi. pag. 57, in qua icon minùs accurata.*
- Columba domestica versicolor, pedibus nudis. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIV. Sp. 1.*
- Columba rusticorum, vulgaris, arvorum. Klein. Avi. pag. 118. N^o. I.*
- Pigeon. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 313; avec une figure assez mauvaise, page 314.*
Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 266.
- Pigeon sauvage ordinaire. Alb. Tom. III. pag. 17; avec une figure mal coloriée, pl. 42.*
- Coulon; Colombe; Pigeon; Pigeon privé. Bel. Portr. d'Ois. pag. 78. a. dans laquelle il y a une figure assez mauvaise.*
- Les Hébreux appellent le mâle JON; la femelle, JONAH; le jeune, GOZAL. Gesn. Aldrov.*
- Les Chaldéens, JONAH; JONETAH: & le jeune, BAR JONAH. Gesn. Aldrov.*
- Les Arabes, ATLEKEHA; GAMAMAH, ou CHAMAMAH; DAZAMACH: & le jeune, PHERAK HAMAN. Gesn. Aldrov.*
- Les Grecs, Περσιπία. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Willugh. Raj. Charlet. Schwenck. Klein. Περσιπία. Aldrov. Jonst. Schwenck. Περσιπία. Aldro. Περσιπία Οίνδιζ. Schwenck: & le jeune, Περσιπιδεα. Aldrov. Schwenck.*
- Les Perses, KAPHTAR: & le jeune, KEBUHAR, ou KAPHTAR BEZAR. Gesn. Aldrov.*
- Les Sarrafins, HEMAN. Aldrov.*
- Les Ismaélites, TAERA. Gesn.*
- Les Turcs, JUGARGEN. Gesn.*

Les Espagnols, PALOMA. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, COLOM. *Barr.*

Les Italiens, COLUMBO ; COLUMBA ; COLOMBO PUNIONO ; & quelques-uns, PALUMBO. *Bel. Gesn. Aldrov. & le jeune*, PICCIONE. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, TUB. *Gesn. Aldrov.* TAUBE. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* ZAME-TAUBE. *Gesn.* ZÄHME-TAUBE ; HEIMISCHE-TAUBE ; SCHLAG-TAUBE ; FLUG-TAUBE ; TENBEIN. *Schwenck.* HUSZ-TUBE. *Gesn. le mâle*, TEUBER. *Schwenck.* KUNTER. *Gesn. Aldrov. le jeune*, JUNGE-TUB, ou TEUBLE. *Gesn. Aldrov.* JUNGE-TAUBEN ; TEUBLIN. *Schwenck.*

Les Saxons, DUVE. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, GOLUB. *Gesn.*

Les Polonois, GOLAB. *Rzac.*

Les Flamands, DUVE. *Gesn. Aldrov. le mâle*, DUFFER, ou DOFFER : & la femelle, DUVE, ou DUYF. *Aldrov.*

Les Suédois, DUFWA ; HEM-DUFWA. *Linn.*

Les Anglois, COMMON-PIGEON ; COMMON-DOVE. *Willugh. Raj. Sibbald.* COMMON-WILD-DOVE. *Raj. Sloane. Alb.* COMMON-WILD-PIGEON. *Raj. Sloane.* COMMON-WILD-PIDGEON. *Alb. & quelques-uns*, CULVER. *Willugh. Raj.*

Les Anglois de la Jamaïque, HOUSE-PIGEON. *Browne.*

Le Pigeon domestique est assez connu pour n'avoir pas besoin d'une longue description. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Il a vingt-cinq pouces de vol. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de dix lignes ; sa queue de quatre pouces six lignes ; son pied d'un pouce ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quinze lignes : les latéraux sont un peu plus courts, & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, vont jus-

Columba domestica Avis est ita nota, ut amplâ descriptione non indigeat. Hujus longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices explet, ad extremos unguis decem tantum pollices & sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum duos pedes & unum pollicem lata est. Rostrum ab apice ad oris angulos decem lineas longum ; cauda quatuor pollices cum sex lineis ; pes unum pollicem ; medius trium digitorum anteriorum cum ungue quindecim lineas longitudine adæquat : digiti late-

rales paulò sunt breviores ; posticus verò omnium brevissimus. Alæ complicatæ caudæ extremitatem , excepto pollicis unius intervallo , attingunt. Columbæ domesticæ colore multùm variant ; aliæ enim sunt albæ ; aliæ nigricantes ; aliæ rufæ ; aliæ , idque frequentius , cinereo-cœruleæ collo viridi-aureo splendente , *cupri puri* colorem æmulante pro vario quo lucis radii incidunt modo : quædam omnibus suprà dictis coloribus variegantur : omnes verò , quovis colore imbuantur , parte dorsi inferiore albâ præditæ sunt. Rostrum fuscum ; & membrana quâ nares teguntur , materiâ velut furfuraceâ aspergitur , unde albicat. Pedes sunt rubri , ungues verò nigri. *Ex museo Realmuriano.*

qu'à un pouce de distance du bout de la queue. Les Pigeons domestiques varient beaucoup en couleur : les uns sont blancs ; d'autres noirâtres ; d'autres roux ; le plus grand nombre d'un gris-bleu , avec le col d'un verd-doré éclatant , & changeant en couleur de *cuivre de rosette* , selon qu'il est exposé aux rayons de lumière : quelques-uns sont variés de toutes ces couleurs ; mais tous , de quelque couleur qu'ils soient , ont la partie inférieure du dos blanche. Le bec est brun ; & la membrane qui couvre les narines est elle-même couverte d'une matiere farineuse , qui la fait paroître blanchâtre. Les pieds sont rouges , & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**** 2. LE PIGEON ROMAIN.**

Columba major versicolor. . . . COLUMBA ROMANA.

Columba domestica. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 463 , in qua icon satis accurata.

Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 32.

Columba domestica major. Willugh. Ornith. pag. 131. N°. 1. hujus icon satis accurata Tab. XXXIV , & insuper alia icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 60. N°. 1.

Les Italiens l'appellent TRONFO ; ASTURNELLATO, Willugh. Raj.

Les Anglois , RUNT-PIGEON. Willugh. Raj.

Cette espece de Pigeon est beaucoup plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied. Il a vingt-sept pouces de vol. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long ; sa queue cinq pouces six lignes ; son pied seize lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongue , un pouce neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , touchent presque le bout de la queue. Le Pigeon Romain varie en couleur comme le précédent : les uns sont blancs ; d'autres noirs ; d'autres roux ; d'autres cendrés ; d'autres sont variés de toutes ces couleurs ; & dans le plus grand nombre le col est orné de couleurs éclatantes & comme mêlées d'or. Le bec est noir dans les uns , & rouge ou couleur de chair dans les autres : & tous ont la membrane au-dessus des narines couverte d'une matiere farineuse , qui la fait paroître blanchâtre. Les pieds sont rouges , & les ongles noirs , & quelquefois blancs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Præcedentem crassitie multum superat hæc species. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices æquat , & ad extremos ungues unum pedem. Ab extremo ad extremum alarum extensarum viginti septem pollices lata est. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum ; cauda quinque pollices & sex lineas ; pes sexdecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum novem lineis : laterales paulò sunt breviores ; posticus brevissimus. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Columba Romana multum colore variat ut præcedens : aliæ enim albæ ; aliæ nigre ; aliæ rufæ ; aliæ cineræ ; aliæ omnibus suprà dictis coloribus variæ : in plerisque autem collum coloribus splendentibus auroque mixtis perlustratur. Aliæ rostro nigro donantur ; aliæ rostro rubro aut carneo : in omnibus verò membrana , qua cooperiuntur nares , materiâ velut furfuraceâ aspergitur , unde fit ut albicet. Pedes sunt rubri ; ungues nigri , quandoque albi. *Ex museo Realmuriano.*

Hujus speciei varietates Les variétés de cette espece
sunt sont

**** A. LE PIGEON PATU.**

Columba dasypes.

Columba pedibus hirsutis, sive pennatis. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 466, 467 & 468, in quibus icones non satis accuratæ.*

Columba hirsutis pedibus. *Jonst. Avi. hujus duæ icones ab Aldrovando mutuatae Tab. 32.*

Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab XXXIII. & icon satis accurata Tab. XXXIV.

Charlet. Exer. pag. 85. N°. 8.

Charlet. Onomazt. pag. 77. N°. 8.

Columba domestica versicolor, pedibus pennatis. *Barr. Ornith. Clas. III. Gen. XIV. sp. 2.*

Columba dasypes. *Schwenck. avi. fil. pag. 239.*

Columba tympanizans. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 145.*

Les Catalans l'appellent COLOM PATUT. Barr.

Les Allemands, RAUCHSEUFFIGE-TAUBEN ; GEHOESLETE-TAUBEN ; REUSSISCHE-TAUBEN. Schwenck. TRUMMEL-TAUBE. Frisch.

Les Anglois, ROUGH-FOOTED-DOVE. Willugh. ROUGH-FOOTED PIGEON. Willugh. Charlet.

Ab aliis differt pedibus ad extremos usque digitos plu- mosis.	On le distingue des autres par ses pieds qui sont couverts de plumes jusqu'au bout des doigts.
--	--

**** B. LE PIGEON HUPÉ.**

Columba cristata.

Columba nostra cristata. *Aldrov. avi. Tom. II. pag. 469, in qua icon minus accurata.*

Columba cristata. *Schwenck. avi. fil. pag. 239.*

Columba menstrua, sive cristata, sive pedibus plumosis. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 144.*

Columba cypria alia. *Aldrov. avi. Tom. II. pag. 472, 473, 474, 475 & 476, in quibus icones satis accuratæ.*

Columba cypria. *Jonst. avi. pag. 62. hujus tres icones ab Aldrovando mutuatae Tab. 32.*

Les Allemands l'appellent KEPPICHTE-TAUBEN. Schwenck. MON-TAUBE. Frisch,

Il ne diffère des autres que par les plumes de l'occiput, qui sont tournées en en-haut, & qui lui forment une hupe. Ab aliis distinguitur pennis occipitii fursum reflexis, quæ cristam efficiunt.

C. LE PIGEON DE NORVÈGE.

Columba Norvegica.

Columba Norvegica. *Schwenck, avi. fil. pag. 239.**Les Allemands l'appellent NORVEGISCHE-TAUBEN. Schwenck.*

Il est presque aussi gros qu'une Poule. Il est d'un blanc de neige; il a une hupe sur le sommet de la tête, & les pieds couverts de plumes. Magnitudine Gallinam ferè adæquat. Candoris est nivei, cristato vertice & pedibus plumosis.

D. LE PIGEON DE BARBARIE.

Columba Barbarica.

Columba cœrulescens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante.

*Faun. Suec. Linn. N°. 174. (4 varietas).*Columba Barbarica seu Numidica. *Willugh. Ornith. pag. 132. N°. 8.**hujus icon satis accurata Tab. XXXIV. sub titulo, Columba Numidica, seu Cypria.**Raj. Syn. avi. pag. 60. N°. 8.*An Columba vulgò Cretensis dicta? *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 478, in qua icon non satis accurata.**Les Anglois l'appellent BARBARY-PIGEON. Willugh. Raj.*

Celui-ci a le bec très-court; & les yeux entourés d'une large bande d'une peau nue, remplie de mammelons farineux, comme le Pigeon Messager. Rostrum huic brevissimum. Oculos cutis nudæ, tuberosæ, fursuraceæ circum latus ambit, ut in *Tabelariis*.

** E. LE PIGEON NONAIN.

Columba cucullata.

Columba cœrulescens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante.

Faun. Suec. Linn. N°. 174. (5 varietas).

Columba

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre I.* 75

Columba Anglica, vel Russica. *Gesn. Avi. pag. 279, in qua icon pessima.*
Columba Anglica, vel Russica; Palumbus cicur. *Gesn. icon Avi. pag. 57, in qua eadem icon.*

Columba Cypria cucullata. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 471, in qua icon satis accurata.*

Columba cucullata. *Jonst. Avi. pag. 62. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 32, sub titulo, Columbus.*

Charlet. Exer. pag. 84. N^o. 3.

Charlet. Onomazt. pag. 76. N^o. 3.

Klein. Avi. pag. 118. N^o. 5.

Columba cucullata, sive Jacobina. *Willugh. Ornith. pag. 132. N^o. 6. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXIII, sub titulo, Columba Cypria cucullata.*

Columba cucullata, seu Jacobea. *Raj. Syn. Avi. pag. 60. N^o. 6.*

Columba domestica cucullata. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIV. sp. 3.*

Columba galerita. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 150.*

Pigeon paté. *Bel. portr. d'Ois. pag. 78 b, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.*

Pigeon à chaperon, ou Jacobin. *Alb. Tom. III. pag. 18; avec une figure exacte Pl. 43.*

Les Ferrarois l'appellent SORELLA. Aldrov.

Les Allemands, ZAME-SCHLAG-TUB; WELSCH-TUB; GEHOESSLETE-TUB. Gesn. SCHLEYER-TAUBE; PARUQUEN-TAUBE. Frisch.

Les Flamands, CAPPER. Willug. Raj. Klein.

Les Anglois, JACOBINE-PIGEON. Willugh. Raj. Charlet. Klein. JACOBINE-PIGEON. Alb.

Rostrum, ut in præcedenti, brevissimum. Pennæ occipitii & colli superioris sursum sunt reflexæ, & occiput cingunt, cuculli Monachalis ferè in modum.

Il a, comme le précédent; le bec très-court. Les plumes de l'occiput & celles de la partie supérieure du col sont tournées en en-haut, & forment une espece de capuchon semblable à celui des Moines.

F. LE PIGEON A GORGE FRISÉE.

Columba Turbita.

Columba coerulescens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante.

Faun. Suec. Linn. N^o. 174. (3 varietas).

Columba Turbita dicta. *Willugh. Ornith. pag. 132. N^o. 7.*

Raj. Syn. Avi. pag. 60. N^o. 7.

Columba collo hirsuto. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 147.*

Tome I.

M

An Columba vulgò Indica dicta ? *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 477, in qua icon minùs accurata.*

Les Allemands l'appellent MOWCHEN. Frisch.

Les Flamands, CORTBECK. Willugh.

Les Anglois, TURBIT-PIGEON. Willugh. Raj.

Il ressemble aux précédents par la brièveté de son bec ; mais il en diffère par les plumes de sa poitrine, qui sont retournées de côté & d'autre, & comme frisées. Le sommet de sa tête est applati.

Rostrum ut in præcedentibus brevissimum ; ab illis autem distinguitur pennis in pectore utrinque reflexis. Vertice est plano seu depresso.

G. LE PIGEON FRISÉ.

Columba crispata.

Columba crispis pennis. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 470, in qua icon satis accurata.

Columba crispata. Schwenck. Avi. fil. pag. 239.

Columba sylvestris. Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 32.

Les Allemands l'appellent WOLLECHTE-TAUBEN. Schwenck.

Il est tout blanc, excepté ses doigts qui sont rouges. Tout le reste de son corps est couvert de plumes frisées.

Prorsus est candida, præter digitos rubentes. Pennis crispis in toto corpore vestitur.

** H. LE PIGEON TURC.

Columba Turcica.

Columba Persica, sive Turcica. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 481, in qua icon minùs accurata.

Columba Turcica & Persica. Jonst. Avi. pag. 62.

Columba Turcica, seu Persica. Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXIII.

Columba Turcica. Charlet. Exer pag. 85. N°. 6.

Charlet. Onomazi. pag. 76. N°. 6.

Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 149.

Klein. Avi. pag. 118. N°. 6.

Les Allemands l'appellent TURKISCHE-TAUBE. Frisch.

Les Anglois, TURKEY-PIGEON ; PERSIAN-PIGEON. Willugh.

Colore toto pullo, sive nigricante ab aliis distinguitur hæc varietas. Oculorum ambitus miniaceo colore tingitur: & membranæ nares regentes quàm in aliis multò sunt crassiores, & papillis rubris circumdatæ. Rostrum lutescit: pedes pallidè rubent.

Celui-ci se distingue par sa couleur obscure ou noirâtre, par le tour de ses yeux, qui est rouge, & par les membranes, qui sont au-dessus des narines, & qui sont beaucoup plus épaisses que dans les autres, & entourées de petits mammelons rouges. Le bec est jaune: & les pieds sont d'un rouge pâle.

**** I. LE PIGEON MESSAGER.**

Columba Tabellaria.

Columba Tabellaria. Willugh. Ornith. pag. 132. N°. 5. hujus icon non satis accurata Tab. XXXIV.

Raj. Syn. Avi. pag. 60. N°. 5.

Klein. Avi. pag. 118. N°. 4.

Les Anglois l'appellent CARRIER. Willugh. Raj. CARRIER-PIGEON. Willugh.

A *Columba Turcica* non multùm differt; ut illa, colore est obscure cœruleo aut nigricante. Oculi cute nudâ, tuberosâ, furfuraceâ, albidâ ambiuntur. Nares obducuntur membranis crassissimis, ad mediam usque rostri longitudinem extensis, tuberculis, ut circa oculos, furfuraceis circumdati. Rostrum mediæ longitudinis nigricat. Harum Columbarum usus fuit ad litteras cito transmittendas, unde *Tabellariæ* nomen.

Il ressemble beaucoup au *Pigeon Turc*; comme lui, il est d'un bleu foncé ou noirâtre. Ses yeux sont entourés d'une peau nue, remplie de tubercules farineux & blanchâtres. Les membranes qui couvrent les narines sont aussi très-épaisses, & s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur du bec; elles sont entourées de tubercules farineux, comme ceux qui sont autour des yeux. Son bec est d'une moyenne longueur, & noirâtre. On s'est servi de ces sortes de Pigeons pour envoyer promptement des lettres; ce qui leur a fait donner le nom de *Messagers*.

** K. LE PIGEON GRAND GOSIER.

Columba gutturosa.

Columba cœrulescens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante.

Faun. Succ. Linn. N° 174. (2 varietas).

Columba perperam gutturosa dicta. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 479, in qua icon satis accurata.

Columba gutturosa. Willugh. Ornith. pag. 131. N° 2. hujus icon satis accurata Tab. XXXIV.

Raj. Syn. Avi. pag. 60. N° 2.

Charlet. Exer. pag. 84. N° 2.

Charlet. Onomast. pag. 76. N° 2.

Jonst. Avi. pag. 62.

Klein. Avi. pag. 118. N° 2.

Columba strumosa, five *Columba œsophago inflato. Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 146.*

Les Allemands l'appellent KROPP-TAUBE, ou KROPPER. Frisch.

Les Flamands, CROPPER. Willugh. Raj. Charlet.

Les Suédois, KROPP-DUFWA. Linn.

Les Anglois, CROPPER. Willugh. Raj. Charlet. CROPPER-DOVE. Willugh.

Il est de la grandeur du *Pigeon Romain*; il varie, comme lui, beaucoup en couleur: mais il en diffère en ce qu'il a la faculté, en inspirant beaucoup d'air, d'enfler tellement son jabot, qu'il paroît plus gros que tout le reste de son corps.

Columbam Romanam magnitudine adæquat; ut illa, coloribus plurimum variat: ab ea tamen differt in eo quod ingluviem, aere attracto, mirum in modum inflat, ita ut toto reliquo corpore major evadat.

** L. LE PIGEON CAVALIER.

Columba Eques.

Columba Eques. Willugh. Ornith. pag. 132. N° 12.

Raj. Syn. Avi. pag. 61. N° 12.

Pigeon Cavalier. Alb. Tom. II. p. 30; avec une figure peu exacte Pl. 45.

Les Anglois l'appellent LIGHT HORSEMEN-PIGEON. Willugh. Raj. HORSMAN-PIGEON. Alb.

Cette variété provient du *Pigeon grand Gosier* & du *Pigeon*

Spuria est hæc varietas alterâ parente Columba Gut-

urofâ, alterâ *Tabellariâ*; *Messager*; c'est pourquoi elle adeoque participat de utraque. Membranæ enim nares tegentes sunt crassissimæ, ad mediam usque rostri longitudinem extensæ, tuberculifque furfuraceis asperguntur, sicut & oculorum ambitus: & ingluviem, aere attracto, mirum in modum inflat. Les membranes qui couvrent les narines sont très-épaisses, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur du bec, & sont parsemées de tubercules farineux, de même que le tour des yeux: elle a aussi la faculté, en inspirant de l'air, d'enfler beaucoup son jabot.

**** M. LE PIGEON BATTEUR.**

Columba percussor.

Columba coerulescens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante.

Faun. Suec. Linn. N°. 174. (6 varietas).

Columba percussor. Willugh. Ornith. pag. 132. N°. 9.

Raj. Syn. Avi. pag. 60. N°. 9.

Les Anglois l'appellent SMITER-PIGEON. Willugh. Raj.

Hæc inter volandum in orbem circumvolitat, & alas tam fortiter quatit, ut duorum asserum simul collisorum sonitum superet: unde remiges pennæ semper ferè fractæ conspiciuntur, ac quandoque etiam volare inde nequeat.

Cette variété tourne en rond lorsqu'elle vole; & elle bat des aîles avec tant de violence qu'elle fait plus de bruit que deux planches qu'on batteroit l'une contre l'autre: aussi le plus souvent les plumes de ses aîles se trouvent rompues, ce qui l'empêche quelquefois de voler.

**** N. LE PIGEON CULBUTANT,**

Columba Gyratrix.

Columba Gyratrix. Jonst. Avi. pag. 62.

Charlet. Exer. pag. 84. N°. 4.

Charlet. Onomazt. pag. 76. N°. 4.

Columba Gyratrix, seu vertaga. Willugh. Ornith. pag. 132. N°. 10.

Raj. Syn. Avi. pag. 61. N°. 10.

Columba Gestuosa, sive *Gesticularius*. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 148.*

Les Allemands l'appellent TUMMEL-TAUBE; TUMMLER. Frisch.

Les Anglois, TUMBLER-PIGEON. Willugh. Raj. CLAPPER-PIGEON. Charlet.

Il est petit & de différentes couleurs. Il se donne en volant différens mouvemens, & tourne sur lui-même de même qu'une bale qu'on jette en l'air.

Parva est & variis coloribus ornata. Inter volandum miros motus in aere exhibet, retrorsum se circumvolvendo, pilæ aut globi projecti speciem refert.

** O. LE PIGEON CUIRASSÉ.

Columba Galeata.

Columba Galeata. Jonst. Avi. pag. 63.

Willugh. Ornith. pag. 132. N°. 11.

Raj. Syn. Avi. pag. 61. N°. 11.

Les Anglois l'appellent HELMET-PIGEON. Willugh. Raj.

Il diffère des autres en ce que sa tête, les plumes de sa queue & les grandes des aîles sont toujours entr'elles de la même couleur; mais différente de celle du reste du corps; de sorte que si le corps est blanc, la tête, la queue & les grandes plumes des aîles sont noires ou de quelqu'autre couleur que ce soit: au contraire si le corps est noir ou bleu, la tête, la queue & les grandes plumes des aîles sont blanches, &c.

Ab aliis differt in eo quod caput, rectrices & majores remiges semper sint ejusdem coloris, sed diversi à colore reliqui corporis; ita ut si corpus album sit, caput, cauda & remiges sint nigrae aut alterius cujusve coloris: è contrà si corpus nigrum sit aut cœruleum, caput, cauda & remiges sunt albæ, &c.

** P. LE PIGEON-PAON.

Columba laticauda.

Columba tremula laticauda. Willugh. Ornith. pag. 131. N°. 3. hujus icon satis accurata Tab. XXXIV.

Raj. Syn. Avi. pag. 60. N^o. 3.

Charlet. Exer. pag. 85. N^o. 7.

Charlet. Onomazt. pag. 77. N^o. 7.

Columba laticauda, tremula, pavonia. Klein. Avi. pag. 118. N^o. 3.

Columba caudata. Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 151.

Les Allemands l'appellent PFAU-TAUBE; HUNER-SCHWANTZ. Frisch.

Les Anglois, BROAD-TAIL'D SHAKER. Willugh. Raj. QUAKER. Charlet.

Ab ingenti rectricum numero *laticaudæ* nomen sortita est hæc varietas. Caudam plerumque, cum obambulat, tenet erectam, *Gallopavonis* aut *Pavonis* instar, unde nomen. Caput & colum ultro citroque perpetuò ferè motitat, quare *Tremula* dicta est, sicut & subsequens.

Le grand nombre des plumes de sa queue lui a fait donner le nom de *Pigeon à large queue*. On l'a aussi appelé *Pigeon-paon*, parce que le plus souvent, en marchant, il porte sa queue élevée & étendue comme un *Dindon*, ou un *Paon*. Il remue presque sans cesse la tête & le col de côté & d'autre, ce qui lui a fait donner le nom de *Trembleur*, comme au suivant.

Q. LE PIGEON TREMBLEUR.

Columba Tremula.

Columba tremula angusticauda, seu acuticauda. Willugh. Ornith. pag. 132. N^o. 4.

Raj. Syn. Avi. pag. 60. N^o. 4.

Columba tremula acuticauda. Charlet. Exer. pag. 85. N^o. 7.

Charlet. Onomazt. pag. 77. N^o. 7.

Les Anglois l'appellent NARROW-TAIL'D SHAKER. Willugh. Raj. QUAKER. Charlet.

Tremulæ nomen adepta est propter tremulum corporis motum; in quo cum præcedente convenit: ab illa autem differt angustia caudæ.

On lui a donné le nom de *Trembleur*, à cause du mouvement presque perpétuel qu'il donne à son corps; en quoi il ressemble au précédent; mais il en diffère par sa queue qui est beaucoup plus étroite.

Columba cinereo-cœrulescens, tæniâ duplici transversâ nigrâ in alis, parte dorsi inferiore albâ . . . COLUMBA LIVIA.

Columba Livia. *Gesn. Avi.* pag. 307. *hujus icon minimè accurata* pag. 308.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 503. *hujus icon à Gesnero mutuata* pag. 504.

Jonst. Avi. pag. 64. *hujus icon à Gesnero mutuata* Tab. 32.

Charlet. Exer. pag. 84. N^o. 1.

Charlet. Onomazt. pag. 76. N^o. 1.

Columba Livia *Gesnero. Willugh. Ornith.* pag. 136.

Columba Livia *Gesneri. Raj. Syn. Avi.* pag. 62. N^o. 8.

Klein. Avi. pag. 119. N^o. 10.

Columba Livia, seu *Palumbus minor*, *Palumbulus*. *Rzac. Hist. nat.*

Pol. pag. 276.

Columba fera Saxatilis. *Schwenck. Avi. fil.* pag. 240.

Columba sylvestris, cinerea, omnium minima. *Barr. Ornith. Class. III.*

Gen. XIV. sp. 7.

Palumbus, vel *Palumbes minor*. *Gesn. icon. Avi.* pag. 66, in qua icon minimè accurata.

Palumbus minor; *Palumbulus*; *Livia*; *Columba Gazæ*. *Rzac. Auct.*

Hist. nat. Pol. pag. 401.

Phabes, seu *Palumbus minor*. *Aldrov. Avi. Tom. II.* pag. 497.

Biset. Bel. Hist. nat. des Oiseaux pag. 311; avec une très-mauvaise figure pag. 312.

Alb. Tom. III. pag. 18; avec une figure mal coloriée Pl. 44.

Biset; *Croiseau. Bel. portr. d'Ois.* pag. 77 b, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.

Ramier. Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 256.

Les Grecs l'appellent Φαπς. *Gesn. Πιλειδς. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Willugh. Schwenck. Φαβς. Aldrov.*

Les Italiens, PALUMBELLA *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac.*

Les Allemands, LOCH-TUB; HOLTZ-TAUBE; KLEINE WILDE-TUB.

Gesn. Aldrov. KLEINE HOLTZ-TAUBE; STEIN-TAUBE. Rzac. STEIN-TAUBEN; TURN-TAUBEN. Schwenck.

Les Polonois, TRUKAWKA; GRZYWACZ MNIEYSSY. *Rzac.*

Les Brabançons, CROISI. *Gesn.*

Les Anglois, STOCK-DOVE. *Gesn. Alb.*

Il est de la grosseur du *Pigeon Domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize

Crassitie Columbam Domestica adæquat. *Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices*

pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices cum sex lineis. Ab extremo ad extremum alarum extensarum viginti sex pollices lata est. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda quatuor pollices & totidem lineas; pes unum pollicem; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue quindecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ caudam extremam ferè attingunt. Caput, dorsi superior pars, alarum tectrices, pectus, ventèr, latera, crura, pennæque caudam superne & infernè tegentes ex cinereo cœrulescunt: pars dorsi inferior alba est. Collum viridi-aureum splendens, & pro eo quo lucis radii incidunt modo, in purpureum aut *cupri puri* colorem mutat. Remiges majores ex cinereo nigricant: sequentes aut secundariæ ex cinereo cœrulescunt apicibus nigris, quibus in utraque ala tænia duplex transversa nigra efficitur. Rectrices, ut corporis pennæ, cinerascunt, sed saturatius, apicibusque nigris donantur: utrinque autem extrema

Tome I.

pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Il a vingt-six pouces de vol. La longueur de son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est de dix lignes; celle de sa queue de quatre pouces quatre lignes; celle de son pied d'un pouce; & celle du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quinze lignes: Les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière encore plus. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, touchent presque le bout de la queue. La tête, la partie supérieure du dos, les couvertures des aîles, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un cendré tirant sur le bleu: la partie inférieure du dos est blanche: le col d'un verd-doré éclatant & changeant, selon qu'il est exposé aux rayons de lumière, en pourpre ou couleur de *cui-vre de rosette*. Les grandes plumes des aîles sont d'un cendré tirant sur le noir: celles qui suivent, ou les secondaires, sont d'un cendré tirant sur le bleu & terminées de noir; ce qui forme sur chaque aîle deux bandes transversales noires. Les plumes de la queue sont du même cendré que le corps;

N

mais un peu plus foncé, & terminées de noir; & la plus extérieure de chaque côté a ses barbes extérieures blanches. Le bec est d'un rouge pâle. Les pieds sont rouges; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 4. LE PIGEON DE ROCHE, OU LE ROCHERAIE.

Columba cinerea; pectore dilutè vinaceo; maculâ duplici fusco-nigricante in utraque ala; remigibus majoribus fuscis... COLUMBA SAXATILIS.

Columba Saxatilis M. Varronis. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 483, in qua icon minimè accurata.*

Columba Saxatilis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 136.*

Columba Rupicola. *Willugh. Ornith. pag. 136.*

Raj. Syn. Avi. pag. 63. N°. A. 11.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. p. 17.

Klein. Avi. pag. 119. N°. 9.

Palumbus rupicola. *Charlet. Onomast. pag. 77. N°. 2.*

Palumbes rupicola. *Charlet. Exer. pag. 85. N°. 2.*

Les Anglois l'appellent ROCK-PIDGEON. *Willugh. Raj. Charlet.*

Il est environ de la grosseur du *Biset*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces: celle de son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche de onze lignes; celle de sa queue de quatre pouces trois lignes; celle de son pied d'un pouce; & celle du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quinze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est

Columbam liviam crassitie circiter æquat. Ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem longa est, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longitudine æquat; cauda quatuor pollices & tres lineas; pes unum pollicem; & medius trium digitorum anteriorum cum ungue quindecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus om-

nium brevissimus. Alæ complicate caudam ferme extremam attingunt. Caput & colli pars inferior saturate cinerascunt. Partes colli & dorsi superiores, alarumque tectrices corpori viciniore sunt ex cinereo fusca; alarum tectrices alia, dorsi inferior pars, uropygium & pennæ caudam superne tegentes dilute cinerea. In collo superiore coloribus Columbinis splendentibus adornatur. Pectus colore dilute vinaceo tingitur. Venter, latera, crura, caudamque subtus tegentes pennæ dilute sunt cinerea. Remiges majores minoresque corpori viciniore fusciscunt : minores à corpore distantiores in exortu cinerascunt, apice nigricant. In utraque ala binæ sunt maculae fusconigricantes, altera in duabus remigibus minoribus corpori viciniore sita, altera verò in quatuor majoribus alarum tectricibus remigibus supradictis incumbentibus : maculae autem istæ pinnulis tantum exterioribus & versùs apices pennarum extant. Rectrices omnes in exortu sunt cinerea, apice nigricantes. Rostrum cinereum; pedes rubri; ungues nigri.

le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie inférieure du col sont d'un cendré foncé. Les parties supérieures du col & du dos, & les couvertures de l'aile les plus proches du corps sont d'un cendré brun; les autres couvertures de l'aile, la partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré clair. Il y a à la partie supérieure du col un peu de ces couleurs brillantes, qu'ont la plupart des Pigeons. La poitrine est d'une légère couleur vineuse. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré clair. Les grandes plumes de l'aile & les moyennes les plus proches du corps sont brunes : les moyennes les plus éloignées du corps sont cendrées à leur origine, & noirâtres vers leur bout. Il y a de plus sur chaque aile deux taches d'un brun noirâtre, l'une sur les deux moyennes plumes de l'aile les plus proches du corps, & l'autre sur les quatre grandes couvertures de l'aile qui tombent sur celles-là : & ces taches ne sont que sur les barbes extérieures & vers le bout de cha-

cune de ces plumes. Toutes les plumes de la queue sont cendrées à leur origine, & noirâtres vers leur bout. Le bec est gris ; les pieds sont rouges, & les ongles noirs. Il est passager. *M. de Reaumur* en a un dans son cabinet qui lui a été envoyé de *Malthe*, par *M. Godheu de Rivier*.

Une variété de cette espece est

Migratoria est hæc species. Ex istis una in museo Real-muriano à Maltha insula à D. Godheu de Rivier missa.

Hujus speciei varietas est

A. LE ROCHERAIE BLANC.

Columba alba faxatilis.

Columba agrestis. Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 143. Les Allemands l'appellent FELD-TAUBE. Frisch.

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du précédent ; mais sa couleur est différente : il est blanc par tout le corps, exceptés la tête, le croupion & la queue, qui sont d'un beau roux. Le bec est gris, comme celui du précédent ; ses pieds sont rouges ; & ses ongles couleur de chair. Il est de même passager.

Magnitudine & crassitie præcedentem circiter æquat ; colore autem ab illa differt. Per universum corpus alba est, exceptis capite, uropygio & caudâ, quæ splendide rufescunt. Rostrum, ut in præcedente, cinereum ; pedes rubri ; ungues carnei. *Migratoria est.*

** 5. LE PIGEON SAUVAGE.

Columba cinerea ; collo inferiore & pectore vinaceis ; maculâ duplici nigrâ in utraque ala ; remigibus quatuor majoribus nigris , oris exterioribus albis . . . OENAS SIVE VINAGO.

Columba cœrulescens, collo nitido , maculâ duplici alarum nigricante. Faun. Suec. Linn. N°. 174.

Columba cavernalis. Charlet. Exer. pag. 85. N°. 3.

Charlet. Onomast. pag. 77. N°. 3.

- Columba fera arborea. *Schwenck. Avi. fil. pag. 240.*
 Columba lignorum propriè. *Klein. Avi. pag. 119. N°. 8.*
 Columba agrestis, seu saxatilis Varroni; Vinago Gazæ. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 276.*
 Oenas. *Gesn. Avi. pag. 307.*
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 72. Sp. 1.
 Oenas, seu Vinago. *Gesn. icon. Avi. pag. 57.*
Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 497. icones minimè accuratæ, maris pag. 499, & fæminæ, pag. 500.
Jonst. Avi. pag. 64. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 32.
Willugh. Ornith. pag. 136. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXV.
Raj. Syn. Avi. pag. 62. N°. A. 10.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.
 Vinago Aldrovandi; Columba arborea, montana *Schwenckfeldii.*
Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 426.
 Vinago, five Columba montana. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 139.*
 Pigeon fuyard. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 312.*
 Pigeon ramier. *Alb. Tom. II. pag. 31; avec une figure mal coloriée Pl. 46.*
 On l'appelle aux environs de Montpellier, *ANGEL. Gesn. Aldrov.*
 Les Grecs l'appellent O'wàs. *Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Raj. Schwenck. Πειλίδς.*
Raj. Charlet.
 Les Boulonnois, *SASSAROLO. Aldrov.*
 Les Allemands, *HOL-TAUBEN; KOL-TAUBEN; BLAWE-TAUBEN.*
Schwenck. BLAU-TAUBE. Frisch. WILDE-TAUBE. Schwenck. Rzac.
LOCH-TAUBE. Schwenck. HOLTZ-TAUBE. Schwenck. Frisch.
 Les Silésiens, *WILDE-TAUBEN. Schwenck.*
 Les Polonois, *GOLAB DZIKI SINY. Rzac.*
 Les Suédois, *SKOGS-DUFWA. Linn.*
 Les Anglois, *STOCK-DOVE. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. WOOD-PIGEON. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. WOOD-PIDGEON. Alb.*

Columbam domesticam paululum crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum duos pedes & duos pollices æquat. Rostrum ab ipsius apice ad

Il est un peu plus gros que le Pigeon domestique. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de onze pouces six lignes. Il a deux pieds deux pouces de vol. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied un

pouce ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , quatorze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est enoore plus court. Les aîles , lorsqu'elles sont pliées , vont jusqu'à un pouce de distance du bout de la queue. La tête est cendrée. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un verd-doré changeant en couleur de *cui-vre de rosette* , selon qu'ils se trouvent exposés aux rayons de lumiere. La partie supérieure du dos & les couvertures des aîles sont d'un cendré obscur ; la partie inférieure du dos , le croupion , & les couvertures du dessus de la queue d'un cendré clair. La partie inférieure du col , depuis la tête jusque vers le milieu de sa longueur , est cendrée ; le reste du col , ainsi que la poitrine , est d'une couleur vineuse. Le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré clair. Les quatre ou cinq premières grandes plumes de l'aîle sont noires & ont leur bord extérieur blanc. Toutes les suivantes , ainsi que les moyennes , sont cendrées à leur origine & noirâtres vers leur bout. Il y a en outre sur chaque aîle deux taches noires ; l'une sur les deux moyennes plumes

oris angulos undecim lineas longum ; cauda quinque pollices ; pes pollicem unum ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ caudam extremam , excepto pollicis unius intervallo , attingunt. Caput cinereum : pars superior & latera colli viridi-aurea in *cupri puri* colorem mutant , pro eo quo lucis radii incidunt modo. Dorsi superior pars & tectrices alarum obscurè cinereæ ; dorsi pars inferior , uropygium , caudamque superne tegentes pennæ dilutè cinereæ. Pars colli inferior à capite ad medium usque collum est cinerea ; collum in reliqua longitudine & pectus colore vinaceo imbuuntur. Venter , latera , crura & pennæ caudam infernè tegentes dilutè cinerascunt. Primores quatuor aut quinque remiges nigricant , oris exterioribus albicantibus : remiges aliæ in exortu cinereæ , apice nigricantes. Caterùm in utraque ala duplex habetur macula nigra : altera duas remiges corpori finitimas notat ; altera tres majores alarum tec-

trices iis incumbentes. Utraque autem macula ad exterius scapi latus non longè ab apicibus pennarum sita. Rectrices omnes cinereæ ab exortu ad duas tertias longitudinis partes usque, reliquâ longitudine nigræ, exceptâ rectrice utrinque extimâ, cujus lateris exterioris medietas albet. Rostrum pallidè rubet: pedes rubri; ungues nigri.
Ex museo Realmuriano.

de l'aile les plus proches du corps, & l'autre sur les trois grandes couvertures de l'aile qui tombent sur celles-là: & ces taches ne sont que sur les barbes extérieures & vers le bout de chacune de ces plumes. Toutes les plumes de la queue sont cendrées depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; & le reste est noir, excepté la moitié des barbes extérieures de la plume la plus latérale, qui est blanche.

Le bec est d'un rouge pâle: les pieds sont rouges; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**** 6. LE PIGEON RAMIER.**

Columba cinerea; collo inferiore & pectore vinaceis; maculâ in collo utrinque albâ **PALUMBUS.**

Columba collo utrinque albo, ponè maculâ fuscâ. *Faun. Suec. Linn. N° 175.*

Columba sylvestris, cinerea, ex rubro & cœruleo mixta, pedibus nudis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIV. Sp. 5.*

Columba torquata. *Klein. Avi. pag. 119. N° 7.*

Palumbus. *Gesn. Avi. pag. 310, in qua icon minùs accurata.*

Linn. systh. nat. ed. 6. Gen. 72. sp. 3.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 313.

Prosp. Alp. Egypt. Vol. I. pag. 198.

Palumbus major, vel *torquatus.* *Gesn. icon. Avi. pag. 66, in qua icon minùs accurata.*

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 484. hujus icon pessima pag. 487.

Palumbus major. *Jonst. Avi. pag. 63.*

Palumbus torquatus. *Raj. Syn. Avi. pag. 62. No. A. 9.*

Charlet. Onomast. pag. 77. N° 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Palumbus torquatus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 135. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXV.*

Palumbus Plinio; *Palumbus major*; *Palumbus torquatus Gesnero & Aldrovando.* *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 290.*

- Palumbus major, feu torquatus Aldrovandi; Columba torquata; Columba sylvana. *Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 401.*
- Palumbus, sive Palumbes major; Columba torquata. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 138.*
- Palumbes torquatus. *Charlet. Exer. pag. 85. N^o. 1.*
- Ramier. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 307; avec une très-mauvaise figure pag. 308.*
- Ramier; Mansart; Coulon, ou Pigeon Ramier. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 76 b, dans laquelle est la même figure.*
- Les Grecs l'appellent $\Phi\alpha\sigma\alpha$. *Gesn. Ils appellent le mâle $\Phi\alpha\lambda$: Bel. Schwenck. & la femelle, $\Phi\alpha\sigma\sigma\alpha$. Aldrov. Jonst. Willugh. Raj. Schwenck. $\Phi\alpha\tau\lambda$. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Schwenck.*
- Les Grecs modernes, $\Phi\alpha\lambda\alpha$. *Aldrov. Jonst.*
- Les Espagnols, PALOMA TORCATZ. *Gesn. Aldrov.*
- Les Catalans, COLOM SILVESTRE; XIXELL. *Barr.*
- Les Italiens, TORQUATO. *Bel. Gesn. Aldrov. GHIANDARIA. Bel. Gesn. & quelques-uns, COLOMBO BUTARACCO. Gesn.*
- Les Italiens qui habitent les environs du Lac Majeur, TUDON. *Bel. Gesn.*
- Les Ferrarois, COLOMBO FAVARO. *Bel. Gesn. Aldrov. COLOMBO FAVACCO. Gesn.*
- Les Allemands, RINGEL-TUB; PLOCH-TUB. *Gesn. Aldrov. RINGEL-TAUBE. Frisch. PLOCH-TAUBE. Schwenck. HOLTZ-TAUBE. Schwenck. Rzac. WILDE-TAUBE. Rzac.*
- Les Silésiens, RINGEL-TAUBE. *Schwenck.*
- Les Suisses, SCHLAG-TUB; GROSS-HOLTZ-TUB. *Gesn. Aldrov.*
- Les Illyriens, DIWOKY. *Gesn. Aldrov.*
- Les Polonois, GRZYWACZ. *Rzac.*
- Les Hollandois, RING-DUVE. *Aldrov.*
- Les Flamands, KRIESS-DUVE. *Gesn. Aldrov.*
- Les Brabançons, MANSAU. *Gesn. Aldrov.*
- Les Suédois, RING-DUFWA. *Linn.*
- Les Oelandois, SIUTUT. *Linn.*
- Les Anglois, RING-DOVE. *Willugh. Raj. Sibbald. QUEEST. Raj. Charlet.*
- Les Anglois Septentrionaux, CUSHAT. *Aldrov. Raj.*

Il est de la grosseur du Pigeon Romain. Il a depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue dix-sept pouces six lignes de long, jusqu'à celui des ongles treize pouces : & vingt-neuf pouces de vol. La longueur de son bec depuis sa pointe jus-

Crassitie adæquat Columbam Romanam. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septemdecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues tredecim pollices. Apices remigum majorum, alis in contrarium

trarium extensis, viginti novem pollicum intervallo distant. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum; cauda sex pollices & quatuor lineas; pes tredecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem cum sex lineis: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ caudam extremam, excepto duorum pollicum intervallo, attingunt. Caput saturatè cinereum. Pars superior & latera colli viridi-aurea, & prout variè luci obijciuntur in cœruleum aut *cupri puri* colorem mutant. Inter colores istos splendentes in utroque colli latere maculâ albâ, velut torque quodam, exornatur. Dorsi superior pars, alarumque tectrices ex cinereo fufcescunt: dorsi pars inferior, uropygium & pennæ caudam superne tegentes dilutè cinerascunt. Pars inferior colli à capite ad mediam longitudinem est cinerea; collum in reliqua longitudine & pectus vinacea, & aliquid cinerei admixtum habent. Venter, latera, crura, caudamque subtus tegentes pennæ cinereo-albæ. Remi-

qu'aux coins de la bouche est de quatorze lignes; celle de sa queue de six pouces quatre lignes; celle de son pied de treize lignes; & celle du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, d'un pouce six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le moins long de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces de distance du bout de la queue. La tête est d'un cendré un peu foncé. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un verd-doré changeant en bleu ou en couleur de *cuivre de rosette*, selon qu'on les expose aux rayons de lumière: au milieu de ces couleurs brillantes & de chaque côté du col est une tache blanche, qui lui fait comme une espece de collier. La partie supérieure du dos & les couvertures des aîles sont d'un cendré brun; & la partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue, d'un cendré clair. La partie inférieure du col, depuis la tête jusqu'à vers le milieu de sa longueur, est cendrée: le reste du col ainsi que la poitrine est d'une couleur vineuse & mêlée d'un peu de cendré. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue

sont d'un joli gris-blanc. Les grandes plumes de l'aîle sont brunes, & depuis la seconde jusqu'à la septième inclusive-ment elles ont leur bord extérieur blanc. Les secondaires sont gris-brun. A l'origine de l'aîle bâtarde est une grande tache blanche, qui s'étend selon la longueur de l'aîle. Les plumes de la queue sont en-dessus d'un cendré foncé terminées de noirâtre, & en-dessous noires à l'origine & à l'extrémité, & le milieu est gris-blanc. L'iris des yeux est d'un jaune pâle. Le bec est jaunâtre; & la membrane, qui est au-dessus des narines, est rouge & couverte d'une matière farineuse & blanchâtre. Les pieds, qui sont couverts de plumes presque jusqu'à l'origine des doigts, sont rouges, ainsi que les doigts; & les ongles sont noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ges majores fuscæ; secunda & sequentes ad septimam usque inclusive oris exterioribus albescent. Remiges secundariæ griseo-fuscæ. Ad alæ notthæ radicem magna macula est alba secundum alæ longitudinem deorsum tendens. Rectrices superne saturatè cinerascunt apicibus nigricantibus, infernè in exortu & extremitate nigra, in medio verò cinereo-alba. Oculorum irides pallidè flavæ. Rostrum subflavum: membrana nares cooperiens rubra & furfure albicante aspersa. Pedes ferè ad exortum digitorum usque plumosi, rubri, sicut & digiti; ungues nigri. *Ex museo Realmuriano.*

** 7. LA TOURTERELLE.

Columba superne fusca, infernè alba; collo inferiore & pectore vinaceis; maculâ utrinque in collo nigrâ, tribus quatuorve tæniis albis variegatâ . . . TURTUR.

Columba collo utrinque albo, ponè maculâ fuscâ. Faun. Suec. Linn. N°. 175. (1 varietas).

Columba sylvestris, subtus albicans, superne versicolor. Barr. Ornith. Claf. III. Gen. XIV. sp. 6.

Columba Turtur, simpliciter. Klein. Avî. pag. 119. N°. 12.

Turtur. Gefn. Avî. pag. 316, in qua icon minùs accurata.

Gefn. icon. Avî. pag. 66, in qua eadem icon.

LES OISEAUX, Classe III. Ordre I. 93

- Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 505. maris icon non satis accurata pag. 509.*
Jonst. Avi. pag. 64. hujus icon ab Olina mutuata Tab. 33, & alia icon
ab Aldrovando mutuata Tab. 32.
Willugh. Ornith. pag. 134. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XXXV.
Raj. Syn. avi. pag. 61. N°. A. 2.
Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 72. sp. 4.
Charlet. Exer. pag. 85. N°. 5.
Charlet. Onomazt. pag. 77. N°. 5.
Schwenck. Avi. fil. pag. 362.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.
Sloane. Voy. of Jamaïc. pag. 304. N°. XXXI. hujus icon minimè
accurata Tab. 262. fig. 2.
Rzac. Hist. Nat. Pol. pag. 304.
Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 140.
Turtur nostras Schwenckfeldii. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 425.
Ear-Dove, id est, Turtur auritus. Raj. Syn. Avi. pag. 184. N°. 26.
Turtrelle. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 309; avec une très-mauvaise figure
pag. 310.
Tourte; Turterelle; Tortorelle; Turtrelle. Bel. portr. d'Ois. pag. 77
a, dans laquelle est la même figure.
Tourterelle. Alb. Tom. II. p. 31; avec une figure mal coloriée Pl. 47.
Tortora nostrale. Olina. pag. 34, in qua icon satis accurata.
Palomas Tortoras Oviedi. Raj. Sloane.
Les Hébreux l'appellent TOR. Gesn. THOR. Aldrov.
Les Chaldéens, SAPHNINA. Gesn. SAPHINA. Aldrov.
Les Arabes, SAPHNINA. Gesn.
Les Grecs, τρυγών. Bel. Aldrov. Willugh. Raj. τρυγών. Gesn. Aldrov.
Schwenck. τρυγών. Schwenck.
Les Perses, TETARU. Gesn. Aldrov.
Les Espagnols, TORTOLA. Gesn. Aldrov. TORTOLILLA. Aldrov.
Les Catalans, TORTORA; TORTRA COLOMA. Barr.
Les Italiens, TORTORA. Bel. Gesn. Aldrov. Olina. TORTORE; TORTOLE;
TURTURA. Bel. Gesn. Aldrov. TORTORELLA. Aldrov.
Les Allemands, TURTEL. Gesn. Aldrov. Schwenck. TURTEL-TUB. Gesn.
Aldrov. TURTEL-TAUBE. Schwenck. Rzac. Frisch.
Les Saxons, TURTEL-DUVE. Gesn. Aldrov.
Les Illyriens, HRDLICZE. Gesn. Aldrov.
Les Polonois, TRUKAWKA; SINOGARLICÀ. Rzac.
Les Flamands, TURTEL-DUVE. Aldrov.
Les Suédois, TURTUR-DUFWA. Linn.
Les Anglois, TURTLE-DOVE. Willugh. Raj. Charlet. Alb. TURTLE. Char-
let. TURTELL. Aldrov.
Les Anglois de la Jamaïque, EAR-DOVE. Sloane. Raj.

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de dix lignes; sa queue de quatre pouces; son pied de dix lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de douze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a un pied huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête & le haut de la partie supérieure du col sont cendrées: la partie supérieure du col la plus proche du dos, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont brunes. Les couvertures des aîles sont variées de brun foncé & de roux; c'est-à-dire, que chaque plume est brune dans son milieu & rousse vers ses bords. La partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont d'une jolie couleur vineuse; le bas de la poitrine & les côtés sont gris-brun: le ventre, les jambes, & les couvertures du dessous de la queue sont blanches.

Ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices longus est, & ad extremos ungues novem pollices. Longitudo rostri ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas aequat; caudæ quatuor pollices; pedis decem lineas; & trium digitorum anteriorum medii cum ungue duodecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Ab extremo ad extremum alarum extensarum unum pedem & octo pollices latus est; alæ verò complicatæ tres quartas longitudinis caudæ partes attingunt. Capitis pars superior, colli quoque superior pars versùs caput cinereæ: colli pars superior dorso finitima, dorsum, uropygium & pennæ caudam superne tegentes fuscæ. Alarum rectrices ex saturatè fusco & rufo variæ, ita ut quæque penna in medio sit fusca marginibus rufis. Colli pars inferior & pectus in suprema parte colore vinaceo tinguntur; pectoris infima pars & latera griseo-fuscæ: venter, crura & caudam subtus tegentes pennæ albæ. Remiges fuscescunt, oris exterioribus albicantibus. Rectrices su-

perne griseo-fusca, infernè nigricantes, omnibus, duabus intermediis exceptis, apice albis: utrinque extrema latera exteriora alba est. Utrumque colli latus magnâ maculâ nigrâ tribus quatuorve tæniis albis obliquè versùs dorsum descendantibus variegatâ, velut torque quodam, exornatur; quas maculas plumulæ apicibus albæ cætera nigræ efficiunt. Circulus nudus rubeus oculum ambit. Irides ex rubro flavæ. Rostrum cœruleo-fuscum; pedes rubri; ungues nigri.

Ex museo Realmuriano.

Les plumes de l'aile sont brunes, & ont leur bord extérieur blanchâtre. Celles de la queue sont gris-brun en-dessus & noires en-dessous, & toutes, excepté les deux du milieu, sont terminées de blanc: la plus extérieure de chaque côté a aussi ses barbes extérieures blanches. Il y a de chaque côté du col une grande tache noire sur laquelle sont trois ou quatre rayes blanches, qui descendent obliquement vers le dos, & qui sont comme une espèce de collier. Ces taches sont produites par des plumes noires & terminées de blanc. Les yeux sont entourés d'un petit cercle rou-

ge & dénué de plumes. L'iris est d'un rouge tirant sur le jaune. Le bec est d'un brun bleuâtre. Les pieds sont rouges; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Ad *D. de Reaumur* missa fuit à *D. Poivre* Turturis icon in *Sinarum imperio* ab ipso picta, à Turture nostrate non discrepans nisi corpore inferiore toto vinaceo.

M. Poivre a envoyé à *M. de Reaumur* le portrait d'une Tourterelle qu'il a peinte à la *Chine*, & qui ne diffère de la nôtre qu'en ce qu'elle a tout le dessous du corps vineux.

** 8. LA TOURTERELLE A COLLIER.

Columba superne ex albo rufescens, infernè alba; collo inferiore & pectore albis ad vinaceum tendentibus; collo superiore torque nigro cincto . . . TURTUR TORQUATUS.

Columba Turtur Indica, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 119. N° 13.*
Turtur Indicus. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 508. hujus icon minùs accurata pag. 510.*

Jonst. Avi. pag. 64. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 32.

- Frisch. hujus icon accurata Tab. 141.*
Turtur Indicus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 134. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXV.
Raj. Syn. Avi. pag. 61. N^o. 3.
Turtur Turcicus. Schwenck. Avi. fil. pag. 364.
Tourterelle des Indes. Alb. Tom. III. pag. 19 ; avec une assez bonne figure Pl. 45.
Les Allemands l'appellent TURCKISCH-TEUBLIN ; INDIANISCH-TEUBLIN. Schwenck. LACH-TAUBE. Frisch.
Les Silésiens, LACHENDES-TEUBLIN. Schwenck.
Les Anglois , INDIAN-TURTLE. Willugh. TURTLE-DOVE FROM THE EAST INDIES. Alb.

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue quatre pouces trois lignes ; son pied dix lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a un pied huit pouces de vol. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & les couvertures des aîles sont roussâtres, ou d'un blanc tirant vers le roux. La partie inférieure du col & la poitrine sont blanches avec une légère teinte d'une couleur vi-

Præcedentem crassitie paululum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem æquat, & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum ; cauda quatuor pollices cum tribus lineis ; pes decem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus adhuc brevior. Alis in contrarium extensis, majorum remigum apices viginti pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & tectrices alarum rufescunt, aut ex albo ad rufum inclinant. Colli pars inferior & pectus alba cum aliqua vinacei mixtura.

Venter, latera, crura & pen-
næ caudam infernè regentes
albæ. Uropygium ad griseo-
fuscum inclinat. Remiges
eodem imbuuntur colore,
oris exterioribus albicanti-
bus. Rectrices superne cine-
rascunt, omnibus, binis in-
termediis exceptis, apice
albis; infernè verò in exortu
sunt nigricantes, deinde di-
lutè cineræ, apicibus al-
bis: insuper utrinque extima
latere exteriorè albet. Tor-
quis niger duas circiter li-
neas latus collum superius
cingit. Oculorum irides mi-
niacæ: rostrum nigricat;
pedes rubri; ungues fuscii ad
luteum vergentes.

est noirâtre; les pieds sont rouges; & les ongles d'un brun jaunâtre.

Fœmina à mare discrepat colore albidiorè. Ex museo Realmuriano.

Hujus speciei varietas est

neuse. Le ventre, les côtés, les
jambes & les couvertures du
dessous de la queue sont blan-
ches. Le croupion tire un peu
vers le gris-brun. Les plumes
de l'aile sont de cette même
couleur, & ont leur bord ex-
térieur blanchâtre. Celles de la
queue sont cendrées en-dessus,
& toutes; excepté les deux du
milieu, terminées de blanc; &
en-dessous elles sont noirâtres
vers leur origine, ensuite d'un
cendré clair, & terminées de
blanc: la plus extérieure de
chaque côté a aussi ses barbes
extérieures blanches. La partie
supérieure du col est entourée
d'un collier noir d'environ deux
lignes de largeur. L'iris des
yeux est d'un beau rouge: le bec

est d'un brun

La femelle se distingue du
mâle, en ce qu'elle est plus
blanche. Du cabinet de M. de
Reaumur.

Une variété de cette espèce
est

A. LA TOURTERELLE MULET.

Turtur hybridus.

Turtur mixtus. Schwenck. Avi. fil. pag. 365.

Les Allemands l'appellent ZWITTER TURTEL-TAUBE. Schwenck.

Magnitudine *Turturem tor-*
quatum æquat. Vertex, col-
lum, pectus vinaceo colore

Elle est de la même grandeur
que la *Tourterelle à collier*. Le
sommet de sa tête, son col &

sa poitrine sont d'une couleur vineuse. Son dos est tout cendré & sans taches; on y apperçoit cependant une légère teinte de rougeâtre obscur. Elle a le ventre, le dessous des ailes & l'extrémité de la queue transversalement de la même couleur que la *Tourterelle à collier*. Les plumes des ailes sont brunes: les pieds d'un rouge de sang; & le bec d'un brun bleuâtre.

Cette variété vient d'une *Tourterelle* mâle, & d'une *Tourterelle à collier* femelle.

tinguntur. Dorsum cinereum totum, ex quo rubedinis subobscuræ quid elucet, absque maculis. Venter, alæ interiores & caudæ extrema pars per transversum ejusdem sunt coloris sicut *Turtur torquatus*. Remiges alarum pennæ fuscæ. Pedes rubor sanguineus tingit. Rostrum subcœruleum ex fusco.

Provenit hæc varietas ex conjugio *Turturis nostratis* masculi & *Torquati* fœminæ.

9. LA TOURTERELLE DE PORTUGAL.

Columba saturatè fusca; maculâ utrinque in collo albo & nigro variegatâ; rectricibus intermediis saturatè cinereis apice albis, lateralibus exterius & apice albis, interiùs saturatè cinereis . . . TURTUR LUSITANUS.

Columba Portugallensis. Klein. Avi. pag. 119. N°. 14.

Colombe de Portugal. Alb. Tom. II. pag. 32; avec une mauvaise figure Pl. 48.

Les Anglois l'appellent PORTUGAL-DOVE. Alb.

Elle est un peu plus grosse & plus grande que notre *Tourterelle*. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue, est d'un brun foncé. De chaque côté du col, vers le milieu de

Crassitie & magnitudine Turturem nostratem paululùm superat. Per universum corpus, caput scilicet, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera, crura, tectricesque caudæ superiores & inferiores, saturatè fuscescit. In utroque colli latere, mediam versùs longitudinem,

longitudinem, binæ aut tres pennæ nigræ splendentes, apicibus albis, extant. Alarum tectrices minimæ nigræ sunt, marginibus albis : cæteræ omnes saturatè fuscæ, marginibus luteis. Remiges nigricant, oris exterioribus luteis. Rectrices intermediae saturatè cinerascunt, apicibus albis : laterales verò in latere exteriori & apice albescent, in latere interiori sunt saturatè cineræ. Oculorum irides croceo colore tinguntur. Rostrum, unguisque nigri : pedes rubri. Habitat in *Lusitania*.

sa longueur, sont deux ou trois plumes d'un noir brillant & terminées de blanc. Les plus petites couvertures des ailes sont noires & bordées de blanc : toutes les autres sont d'un brun foncé & bordées de jaune. Les plumes de l'aile sont noirâtres & leur bord extérieur est jaune. Celles du milieu de la queue sont d'un cendré foncé & terminées de blanc : les latérales sont blanches à leur côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est d'un cendré foncé. L'iris des yeux est d'une belle couleur de safran. Le bec & les ongles sont noirs, & les pieds rouges. On la trouve en *Portugal*.

10. LE PIGEON DU MEXIQUE.

Columba fusca ; pectore candido ; alis extremis albis
COLUMBA MEXICANA.

Cehoiotl. Fern. Hist. nov. Hisp. pag. 42. cap. CXXXII.
Cehoiotl, Columba sylvestris. Raj. Syn. Avi. pag. 63. N°. 14.
Les Mexiquains l'appellent CEHOIOTL. Fern.

In universum corpus pen-
nis fuscis vestita est hæc spe-
cies, præter eas quæ pec-
tus & extremas vestiunt alas,
nimirum candidas. Oculo-
rum ambitus coccineus : iri-
des nigræ. Pedes rubri. Ha-
bitat in *Mexico*.

Cette espece est brune par
tout le corps, excepté la poi-
trine & les extrémités des ailes,
qui sont blanches. Le tour des
yeux est d'un rouge vif, & l'i-
ris noir. Les pieds sont rou-
ges. On le trouve au *Mexi-
que*.

11. LE PIGEON SAUVAGE DU MEXIQUE.

Columba superne fusca nigris maculis varia ; internè dilutè fulva ; rectricibus caudæ inferioribus cinereis ; remigibus , rectricibusque fuscis OENAS MEXICANA.

Columba Mexicana Hoilotl dicta Hernandesii. Raj. Syn. Avi. pag. 63. N°. 12.

Hoilotl , seu Columba. Fern. Hist. nov. Hisp. pag. 26. cap. LVI.

Les Mexiquains l'appellent HOILOTL. Fern.

Il est de la grandeur du *Pigeon domestique*. La tête , le col , le dos , le croupion , les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes & variées de taches noires. La poitrine , le ventre & les jambes sont d'un fauve clair : les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont cendrées. Les plumes des aîles & celles de la queue sont brunes. Le bec est noir ; & les pieds rouges. On le trouve au *Mexique* , dans les forêts & les endroits frais.

Columbæ domesticæ magnitudinem æmulatur. Caput , collum , dorsum , uropygium , caudam superne tegentes pennæ , alarumque rectrices fuscae sunt ac maculis conspersæ nigris. Pectus , venter & crura dilutè fulva : rectrices caudæ inferiores , quæque alas subtus cooperiunt , cinereæ. Remiges , rectricesque fuscae. Rostrum nigrum : pedes rubri. Frigidis , sylvestribusque vivit regionibus. Habitat in Mexico.

12. LE PIGEON SAUVAGE D'AMÉRIQUE.

Columba superne cinerea , internè vinacea ; maculis in utraque ala nigris ; remigibus fusco-nigricantibus , oris exterioribus majorum albicantibus ; rectricibus lateralibus cinereo-albis OENAS AMERICANA.

Columba Americana. Frisch. hujus icon accurata Tab. 142.

Columbus , Palumbus Caroliniensis. Klein. Avi. pag. 119. N°. 16.

Pigeon de passage. Catesb. Tom. I. pag. 23 ; avec une figure très-exacte Pl. 23.

Les Allemands l'appellent AMERICANISCHE-TAUBE. Frisch.

Les Anglois , PIGEON OF PASSAGE. Catesb.

Crassitie adæquat *Oenadem nostratem*. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim circiter pollices æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum. Caput, guttur, colli superior pars, dorsum, uropygium & pennæ caudam superne tegentes cinereæ. Alarum teñtrices ejusdem sunt coloris, maculisque quibusdam nigris variegatæ. Collum ad latera pulchris coloribus *Columbinis* perlustratur. Pars colli inferior, sicut & pectus, vinacea: venter, latera, crura & pennæ caudam subtus tegentes vinaceæ quoque, sed dilutiùs. Remiges ex fusco nigricant, oris exterioribus majorum albicantibus. Rectrices binæ intermediæ fusco-nigricantes; laterales verò ex cinereo albescent. Oculorum ambitus coccineus. Irides verò aurantio colore. Rostrum, unguisque nigri: pedes rubri. Habitat in *América*.

Il est de la grosseur de notre *Pigeon sauvage*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatorze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long. La tête, la gorge, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. Celles du dessus des ailes sont de la même couleur & variées de quelques taches noires. Les côtés du col sont ornés des belles couleurs de gorge de *Pigeon*. La partie inférieure du col & la poitrine sont vineuses: le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, mais plus claire. Les plumes de l'aile sont d'un brun noirâtre, & les grandes ont leur bord extérieur blanchâtre. Les deux du milieu de la queue sont d'un brun noirâtre, & les latérales sont d'un gris-blanc. Le tour des yeux est rouge, & l'iris orangé. Le bec & les ongles sont noirs, & les pieds rouges. On le trouve en *Amérique*.

13. LA TOURTERELLE D'AMÉRIQUE.

Columba superne obscurè fusca, infernè fusco-cinerea; collo inferiore & pectore roseis; maculâ infra aures nigrâ;

maculis in utraque ala nigris; rectricibus lateralibus versùs apicem nigris albo terminatis.... TURTUR AMERICANUS.

Pigeon à longue queue. *Edwards. Tom. I. pag. XV; avec une figure exacte Pl. 15.*

Elle est à peu près de la grosseur de notre Tourterelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; & sa queue environ six pouces. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères que jusqu'au quart de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête & la gorge sont d'un brun roussâtre; le derrière de la tête ou l'occiput est d'un cendré bleu: dans l'endroit où ces deux couleurs se joignent, précisément sous les oreilles, il y a de chaque côté une tache noire & ronde d'environ deux lignes de diamètre. Les parties supérieures du col & du dos, les plumes scapulaires & les couvertures des ailes sont d'un brun obscur; mais les scapulaires & les grandes couvertures des ailes les plus proches du dos sont marquées vers leur bout de taches noires, ovales, de différentes grandeurs. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue ti-

Crassitie Turturem nostratem circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim circiter pollices explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum; cauda sex circiter pollices. Alæ complicatæ quartam longitudinis caudæ partem non multum excedunt. Capitis anterior pars & guttur ex fusco rufescunt; capitis pars posterior sive occiput ex cinereo cœrulescit: eâ parte quâ coadunantur colores isti, infra aures scilicet, utrinque extat macula rotunda nigra, cujus diameter duas circiter lineas æquat. Partes colli & dorsi superiores, scapulares pennæ, alarumque tectrices sunt obscurè fuscæ; scapulares verò & alarum tectrices majores dorso finitimæ versùs apicem maculis donantur nigris, ovalibus & magnitudine discrepantibus. Pars dorsi inferior, uropygium, caudamque superne tegentes pennæ ad cinereum inclinant. Colli pars inferior &

pectus colore tinguntur *roseo*, qui color gradatim, versus ventrem procedendo, dilutior fit. Venter, crura & pennæ caudam subtus tegentes fusca cum aliqua cinerei mixtura. Ab oris angulis ad oculos usque tænia minima alba utrinque protenditur : albedine oculi quoque ambiuntur. Remiges sunt saturatè fusca, oris exterioribus rufescentibus. Rectrices omnes longitudine inæquales : intermedia binæ longiores ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque, quæ mediam longitudinem duarum intermediarum rectorum vix excedit. Binæ intermedia nigricant : laterales sunt cinereæ, apicibus albis ; inter quos colores lata adest tænia transversa nigra. Oculorum irides sunt obscurè rufæ. Rostrum corneum, basi dilutiùs apice saturatiùs. Pedes rubri ; ungues nigri. Habitat in *America*.

rent vers le cendré. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'une couleur de *rose* qui s'affoiblit par degrés, en allant du côté du ventre. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun mêlé d'un peu de cendré. Depuis les coins de la bouche jusqu'aux yeux s'étend de chaque côté une petite ligne blanche : le tour des yeux est de la même couleur. Les plumes de l'aile sont d'un brun foncé, & ont leur bord extérieur roussâtre. Celles de la queue sont toutes d'inégale longueur : les deux du milieu sont les plus longues ; & les latérales vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui excède à peine la moitié de la longueur de celles du milieu. Ces dernières sont noirâtres : les latérales sont cendrées & terminées de blanc ; mais ces deux couleurs sont séparées par une large bande transversale noire. L'iris des yeux est d'un roux obscur. Le bec est d'une couleur

de corne claire à sa base, & plus obscure vers son bout. Les pieds sont rouges ; & les ongles noirs. On la trouve en *Amérique*.

**** 14. LE PIGEON DE LA MARTINIQUE.**

Columba superne fusco-rufescens, infernè dilute fulvo-vinacea ; torque violaceo-aureo ; maculis in utraque ala nigris ;

restricibus lateralibus taniâ transversâ nigrâ donatis , apice albis COLUMBA MARTINICANA.

On l'appelle à la Martinique PERDRIX.

Il est à peu près de la grosseur du *Pigeon domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces , & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue trois pouces six lignes ; son pied onze lignes & demie ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , douze lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière l'est encore davantage. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête , la gorge , le col & la poitrine sont d'un marron tirant sur le pourpre ; mais les plumes qui entourent le bas du col , c'est-à-dire , la partie la plus voisine du corps , sont d'un violet doré très-éclatant , & forment comme une espece de collier. Le dos , le croupion , les couvertures des aîles & celles du dessous de la queue sont d'un brun tirant sur le roux , avec quelques taches noires sur les grandes couvertures des aîles les

Columbam domesticam crassitie circiter æquat. Ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices longa est , & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum longitudo ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas explet ; caudæ tres pollices cum sex lineis ; pedis undecim cum semi lineas ; & trium digitorum anteriorum medii cum ungue duodecim cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput , guttur , collum & pectus ex castaneo ad purpureum vergunt ; pennæ autem imum collum , eam scilicet partem corpori finitimam , cingentes violaceo-aureo splendente colore tinguntur , & torquem quodammodo efficiunt. Dorsum , uropygium , caudam superne tegentes pennæ , alarumque tectrices ex fusco rufescunt , & alarum majores tectrices corpori viciniore maculis quibusdam nigris variegantur.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre I.* 105

Venter, crura & caudæ rectrices inferiores dilutè sunt fulvo-vinaceæ : pennæ latera & alas subtus cooperientes cinereæ. Remiges majores nigricantes, oris exterioribus albicantibus ; minores quoque nigricant, apicibus cinereo-albis. Rectrices binæ intermediae dorso concolores ; laterales verò ab exortu ad duas circiter tertias longitudinalinis partes usque in latere exteriori sunt fusco-rufescentes, in latere interiore saturatè cinereæ : deinde tanià latâ transversâ nigrâ donantur, apicibus cinereo-albis : utrinque extrema etiam in latere exteriori ex cinereo albet. Rostrum, unguisque nigri : pedes rubri. Habitat in *Martinicana insula*, unde missa in *museum D. Aubry*.

On le trouve à la *Martinique*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

15. LE PIGEON DES INDES.

Columba superne fusco-rufescens, infernè dilutè cinereo-cœrulescens; maculâ infra aures nigrâ; rectricibus lateralibus obscurè cinereis, apice albis . . . COLUMBA INDICA.

Columba subfusca media, iride croceo, palpebris impinnis cœruleis:

Browne. nat. Hist. of Jamaïc. pag. 468.

Columba Indica fusca. Klein. Avi. pag. 120. N°. 26.

Pigeon brun des Indes. *Edwards. Tom. II. pag. LXXVI; avec une figure exacte Pl. 76.*

Les Anglois l'appellent WHITE-WINGED-DOVE. *Browne.*

Il est à peu près de la grosseur de *notre Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit ou neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; & sa queue environ trois pouces. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ à la moitié de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête, les joues, la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun roussâtre clair : le derrière de la tête & la partie supérieure du col sont d'un brun plus obscur. Au-dessous des oreilles, de chaque côté, il y a une longue tache noire placée transversalement, composée de plumes très-courtes, de façon qu'elle ne paroît que lorsque l'animal étend un peu le col. Au-dessous de ces taches les plumes ont vers leurs bords un lustre de verd & d'or, qui paroît plus ou moins, selon les différentes positions dans lesquelles elles se trouvent : le reste de la partie supérieure & des côtés du col est orné d'un lustre de violet. La partie supérieure du dos, les petites couvertures & quelques-unes des moyennes plumes de l'aile les plus proches du corps sont

Turturæ nostratæ crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo aut novem circiter pollices explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est ; cauda tres circiter pollices. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Capitis anterior pars, genæ, guttur, collum inferius & pectus ex fusco rufescunt, sed dilutè : capitis posterior pars & collum superius obscurè fuscescunt. Infra aures utrinque est macula longa nigra transversim posita : pennæ autem maculam efficientes ita breves sunt ut non appareant nisi collo extenso. Pennæ infra maculas sitæ in marginibus viridi-aureo splendente ornantur, qui color, pro vario quo lucis radii incidunt modo, plus minusve apparet : reliqua colli in parte superiore & ad latera violaceo splendenti perlustrantur. Dorsi pars superior, minores alarum tectrices & remiges quædam minores corpori finitimæ sunt obscurè fuscæ ad rufum inclinantes, & pro vario ad lucem obiectu, aliquid cærulei admixtum

tum habent. Majores alarum tectrices eodem imbuuntur colore, marginibus exterioribus & apicibus albis. Dorsi pars inferior, uropygium, & superiores caudæ tectrices sunt obscure cinereæ: venter, latera, crura, caudam infernè tegentes pennæ, quæque alas subtus cooperiunt dilutè cinereæ ad cœruleum vergentes. Remiges majores nigre, oris exterioribus dilutioribus: minores, corpori vicinioribus exceptis, etiam nigre, marginibus apicis albis. Rectrices binæ intermediae dorsi superioris colorem æmulantur: laterales sunt obscure cinereæ, apicibus albis. Cutis nuda splendide cœrulea oculos ambit. Oculorum irides coccineæ ad aureum colorem inclinant; rostrum nigricat: pedes rubri; ungues fusci. Frequenter citò citiùs caudam motitat, *Motacillarum* instar. Habitat in *India Orientali*.

d'un brun sombre & rouffâtre, qui selon qu'il est exposé à différens jours, paroît mêlé d'un peu de bleu. Les grandes couvertures de l'aîle sont de la même couleur; & elles sont bordées de blanc à leur côté extérieur & à leur bout. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré obscur: le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont d'un cendré clair & bleuâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, & ont leur bord extérieur d'une couleur plus claire: les moyennes, excepté les plus proches du corps, sont aussi noires & bordées de blanc à leur bout. Les deux plumes du milieu de la queue sont de la même couleur que la partie supérieure du dos: les latérales sont d'un cendré obscur & terminées de blanc. Les yeux sont entourés d'une peau d'un beau bleu, & dénuée de plumes.

L'iris est d'un rouge vif, tirant sur la couleur d'or; le bec noirâtre; les pieds sont rouges & les ongles bruns. Il remue fréquemment la queue comme les *Bergeronnettes*. On le trouve aux *Indes Orientales*.

16. LA TOURTERELLE RAYÉE DE LA CHINE.

Columba superne fusca tæniis transversis arcuatis nigris striata, infernè pallidè rosea; tectricibus alarum majoribus interme-

diis albis; remigibus nigris, oris exterioribus albis . . .
TURTUR SINENSIS STRIATUS.

Columba Sinensis, elegans. Klein. Avi. pag. 120. N^o. 22.

Colombe de la Chine. Alb. Tom. III. pag. 19; avec une figure mal coloriée Pl. 46.

Les Anglois l'appellent DOVE FROM CHINA. Alb.

Elle est à peu près de la grosseur de la *Tourterelle à collier*. Le sommet de la tête est cendré. Les joues & les côtés du col sont jaunes, les extrémités des plumes, le long de chaque côté du col, étant rouges. Cette couleur est séparée de celle du dessus du col par une bande longitudinale de plumes bleues. Le derrière de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun rayé transversalement de petites bandes noires, formant chacune un arc de cercle. La poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'une couleur de rose pâle. Les petites couvertures des ailes sont d'un brun plus clair que celui du dos, & leurs bouts sont variés d'une bande transversale blanche, qui est suivie d'une noire: les premières & les dernières des grandes couvertures sont noires, & ont leur bord extérieur blanc: celles du milieu sont tout-à-fait blanches.

Turturem torquatum crassitie circiter æquat. Vertex cinerascit. Collum ad latera & genæ flavæ; pennis tamen, secundum latera colli, in extremitate rubris; inter quem colorem & eum dorsum superius tingentem tænia adest longitudinalis pennis cœruleis composita. Capitis pars posterior & colli superior, dorsum, uropygium & caudæ tectrices superiores sunt fuscæ, tæniis transversis arcuatis nigris striatæ. Pectus, venter, latera & crura pallidè rosea. Alarum tectrices minores sunt fuscæ, sed quàm in dorso dilutiùs, & versùs apicem tæniâ albâ transversâ, quam tænia nigra sequitur, variegatæ: tectrices majores primores & ultimæ nigræ, oris exterioribus albis; intermediæ omnino albæ. Remiges nigræ, oris exterioribus albis. Rectrices dilutè fuscescunt. Oculorum irides albæ: rostrum cinereo-cœruleum. Pedes rubri: un-

gues albi. Habitat in *Sinensi regione.*

Les plumes de l'aîle sont noires, & leur bord extérieur est blanc. Celles de la queue sont d'un brun clair. L'iris des yeux est blanc : le bec cendré-bleu. Les pieds sont rouges ; & les ongles blancs. On la trouve à la Chine.

17 LA TOURTERELLE RAYÉE DES INDES.

Columba superne cinereo-fusca tæniis transversis arcuatis nigris striata, infernè rosea ; rectricibus lateralibus apice albis TURTUR INDICUS STRIATUS.

Columba Turtur Indiæ Orientalis. Klein. Avi. pag. 120. N°. 21.

Pigeon barré. Edwards. Tom. I. pag. XVI; avec une figure exacte Pl. 16.

Turturi nostrati paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem circiter pollices cum sex lineis æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est ; cauda tres circiter pollices & novem lineas. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. Synciput, genæ & guttur dilutè coerulescunt. Capitis pars superior & occiput ad rufum inclinant. Collum superius, dorsum, alarumque tectrices sunt cinereo-fuscæ, tæniis transversis arcuatis nigris striatæ. Uropygium & caudæ tectrices superiores concolores, sed tæniis transversis nigris destitutæ. Collum &

Elle est un peu moins grosse que notre Tourterelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; & sa queue environ trois pouces neuf lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ à la moitié de la longueur de la queue. Le synciput, les joues & la gorge sont d'un bleu clair. La partie supérieure de la tête & l'occiput sont roussâtres. La partie supérieure du col, le dos & les couvertures des aîles sont d'un cendré-brun rayé transversalement de petites bandes noires, formant chacune un arc de cercle. Le croupion & les cou-

vertures du dessus de la queue sont de la même couleur & sans rayes. Les côtés du col & ceux du corps sont bleuâtres, & variés de petites bandes transversales d'un bleu foncé & tirant sur le noir. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les jambes sont couleur de rose. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Depuis les narines jusqu'aux yeux s'étend de chaque côté une petite ligne blanche. Le tour des yeux est de la même couleur. Les plumes de l'aile & les deux du milieu de la queue sont d'un cendré-brun un peu plus foncé que celui du dos : les latérales sont de la même couleur & terminées de blanc. L'iris des yeux est d'un gris-bleu. Le bec est d'une couleur de corne un peu claire ; & la membrane qui est au-dessus des narines est d'un bleu clair. Les pieds sont d'un rouge pâle ; & les ongles bruns. On la trouve aux *Indes Orientales*.

corpus ad latera ad cœruleum tendunt, tæniisque minimis transversis saturatè cœruleis & ad nigrum inclinantibus variegantur. Colli pars inferior, pectus, venter & crura roseo colore tinguntur. Caudæ testrices inferiores albæ. A naribus ad oculos usque utrinque linea protenditur alba. Idem color oculos ambit. Remiges & rectrices binæ intermediæ cinereo-fusæ, sed paululùm quàm in dorso saturatiùs : laterales concolores, apicibus albis. Oculorum irides cinereo-cœuleæ. Rostrum dilutè corneum ; membrana autem nares cooperiens dilutè cœrulescit. Pedes pallidè rubri : ungues fuscii. Habitat in *India Orientali*.

** 18. LA TOURTERELLE DE LA CAROLINE.

Voyez Pl. VIII. Fig. 1.

Columba superne fusco-cinerea paululùm rufo admixto, infernè rufescens ; caudâ longissimâ acutâ ; remigibus cinereo-nigricantibus, oris exterioribus majorum albicantibus . . .
TURTUR CAROLINIENSIS.

Columba Turtur Caroliniensis. Klein. *Avi.* pag. 119. N°. 17.
Picacuroba. Pison. *Hist. nat.* pag. 86, in qua pessima icon.

Picacuroba Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 204.

Willugh. Ornith. pag. 134.

Jonst. Avi. pag. 140.

Tourterelle de la Caroline. Catesb. Tom. I. pag. 24; avec une figure exacte Pl. 24.

Les Anglois l'appellent TURTLE OF CAROLINA. Catesb.

Les Brasiliens, PICACUROBA. Marcgr. Jonst. Willugh.

Turturi nostrati paululum crassitie cedit. Ab apice rostri ad extremitatem caudæ decem pollices & sex lineas longus est, & ad ungues extremos septem pollices cum sex lineis. Rostri longitudo ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas æquat; caudæ quatuor pollices & sex lineas; pedis novem lineas; & medii trium digitorum anteriorum cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem adhuc brevior. Alæ complicatæ tertiam longitudinis caudæ partem paululum excedunt. Capitis pars anterior sive synciput, pars inferior colli & pectus rubescunt, qui color, in mare tantum, versùs pectus in violaceo-aureum splendentem mutatur, pro eo quo lucis radii incidunt modo. Capitis posterior pars sive occiput & colli pars superior ex cinereo fuscescunt. Dorsum, uropygium, caudam superne regentes pennæ & ala-

Elle est un peu plus petite que notre *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de longueur; sa queue quatre pouces six lignes; son pied neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête ou le synciput, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'une couleur rougeâtre, qui dans le mâle seulement se change vers la poitrine en un violet doré très-éclatant, & cela selon qu'on l'expose aux différents rayons de lumière. La partie postérieure de la tête ou l'occiput & la partie supérieure

du col sont d'un cendré rembruni. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles des ailes les plus proches du corps sont de la même couleur, & mêlées confusément d'un peu de roussâtre : les autres couvertures de l'aile sont du même cendré rembruni. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres. Les couvertures du dessous de l'aile sont cendrées. Il y a sur chaque aile quelques taches noires, qui sont placées vers le bout des grandes couvertures. Les plumes de l'aile sont d'un cendré noirâtre, & le bord extérieur des plus grandes est blanchâtre. Celles de la queue sont toutes d'inégale longueur : les deux du milieu sont les plus longues, & les latérales vont toutes en diminuant de longueur jusqu'à la plus extérieure, qui est très-courte. Les deux du milieu sont d'un cendré brun dans toute leur longueur : les deux qui les suivent de chaque côté sont en-dessus cendrées & marquées de noir dans leur milieu, & en-dessous noires depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, & le reste d'un cendré clair : les trois latérales les plus extérieures de chaque côté

rum tectrices corpori viciniore ejusdem sunt coloris, cui paululum rufescentis confusè admiscetur : alarum tectrices aliæ ex cinereo fufcescunt. Venter, latera, crura & caudam subtus tegentes pennæ rufescunt : quæ alas subtus cooperiunt cinereæ. Utraque ala maculis quibusdam nigris, versùs apicem majorum tectricum sitis, variegatur. Remiges ex cinereo nigricant, & oræ exteriores majorum albicant. Rectrices inæqualis sunt longitudinis : intermedia binæ longiores ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur, ad extimam usque brevissimam. Binæ intermedia per totam longitudinem ex cinereo fuscescunt : duæ utrinque sequentes superne sunt cinereæ & in medio nigro maculatæ, infernè verò ab exortu ad mediam longitudinem nigrae, in cetera longitudine dilutè cinereæ : tres utrinque extimæ infernè in exortu nigrae, apice albæ, supernè verò in exortu cinereæ apice albo, maculâ nigrâ inter cinereum & album positâ. Cutis cœrulea oculos ambit. Oculorum irides nigrae : rostrum nigricat : pedes

sunt rubri; & ungues fusci. sont en-dessous noires à leur origine & blanches à leur bout, & en-dessus cendrées à leur origine & blanches vers le bout avec une marque noire, qui sépare ces deux couleurs. Les yeux sont entourés d'une peau bleue. L'iris des yeux est noir: le bec noirâtre; les pieds rouges; & les ongles bruns.

Fœmina à *mare* differt in La femelle differe du mâle eo quod versùs pectus violaceo-aureo splendenti, sicut en ce qu'elle n'a point vers la poitrine ce violet doré éclatant mas, non perlustratur. dont le mâle est embelli.

Habitat in *Carolina*, *Brasil* & *insula Dominicopoli*, On la trouve à *la Caroline*, unde à *D. Chervain* in *mus-* au *Brésil* & à *saint Domingue*, *seum Readmurianum* missus d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*. est.

** 19. LA PETITE TOURTERELLE D'AMÉRIQUE.

Voyez *Pl. IX. Fig. 1.*

Columba superne fusco-cinerea, *inferne vinacea*; *collo inferiore & pectore fusco-nigricante maculatis*, *remigibus exterius & apice fusco-nigricantibus*, *interius rufis*
TURTUR PARVUS AMERICANUS.

Columba subfusca minima, *maculis nigris & ferrugineis aspera*, *iridibus miscellis*. *Browne. nat. Hist. of Jamaïc. pag. 469.*

Columba sylvestris minima Brasiliensis. *Willugh. Ornith. pag. 134.*

Raj. Syn. Avi. pag. 62. N°. 6.

Columbus minimus. *Klein. Avi. pag. 120. N°. 24.*

Turtur minimus alis maculosis. *Raj. Syn. Avi. pag. 184. N°. 25.*

Turtur minimus guttatus. *Sloane. voy. of Jamaïc. pag. 305. N°. XXXII. hujus icon pessima Tab. 261. fig. 3.*

Turtur Indicus, seu *Cocotzin*. *Euf. Nieremb. pag. 231.*

Turtur Indicus, seu *Cocotzin Nierembergii*. *Willugh. Ornith. pag. 135.*

Turtur Indicus, seu *Cocotzin Hernandezii*. *Raj. Syn. Avi. pag. 61. N°. 4.*

Turtur Barbadenis minimus. *Willugh. Ornith. pag. 135. hujus icon non satis accurata Tab. XXXVI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 62. N°. 5.

Cocotzin. *Fern. Hist. nov. Hisp. pag. 24. cap. XLIV.*

Cocotli. *Fern. Hist. nov. Hisp. pag. 23. cap. XLII.*

Picui pinima. *Pison. Hist. nat. pag. 86, in qua icon pessima.*

PicuiPINIMA Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 204.*

Jonst. Avi. pag. 140.

Petite Tourterelle rachetée. *Catesb. Tom. I. pag. 26; avec une figure exacte de la femelle Pl. 26.*

Ortolan de la Martinique. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 254.*

Les Anglois l'appellent LEAST BARBADOS-TURTLE, ou LEAST BARBADOS-TURTLE-DOVE. *Willugh.*

Les Anglois de la Jamaïque, GROUND-DOVE. *Sloane. Catesb. Browne.*

Les Mexiquains, COCOTZIN; COCOTLI. *Fern.*

Les Brasiiliens, PICUIPINIMA. *Marcgr. Jonst.*

Les habitans de saint Domingue, ORTOLAN BLANC.

Elle n'est guères plus grosse qu'une *Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue deux pouces; son pied six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent qu'au quart de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un joli cendré: le dos, le croupion, & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré plus foncé. Le front ou le synciput, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, les côtés, le ventre, & les

Craffitie Alaudam cristatam non multum superat. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri
ad caudam extremam sex
pollices & tres lineas adæ-
quat, & ad extremos un-
gues quinque pollices & sex
lineas. Rostrum ab ipsius api-
ce ad oris angulos septem
lineas longum est; cauda
duos pollices; pes sex li-
neas; & medius trium anti-
corum digitorum cum un-
gue octo lineas: laterales
paulò sunt breviores; postti-
cus verò digitus omnium
brevissimus. Alæ complicatæ
quartam longitudinis caudæ
partem non excedunt. Par-
tes capitis & colli superio-
res sunt cinereæ: dorsum;
uropygium, caudamque su-
perne tegentes pennæ satu-
ratore cinereo tinguntur.
Frons sive synciput, gut-
tur, colli pars inferior, pec-
tus, venter, latera & pennæ
caudam

caudam subtus tegentes colore imbuuntur vinaceo, maculis fuscis in collo inferiore & pectore vario, fusco colore cujusque pennæ medium occupante. Alarum rectrices aliæ sunt saturatè cinereæ, aliæ vinaceæ, & maculis quibusdam viridi anantino variegantur : quæ alas subtus tegunt sunt rufæ. Remiges eodem colore imbuuntur ; attamen in oris exterioribus & apice ex fusco nigricant, ita ut in alis complicatis nil rufi appareat. Rectrices binæ intermediæ cinereo tinguntur quàm in dorso saturatiore ; laterales verò nigricant. Oculorum irides aurantio colore. Rostrum in exortu pallidè rubet, apice nigricante. Pedes rubri ; unguës nigricantes.

Fœmina à *mare* discrepat in eo quod corporis pars inferior non ita sit vinacea, sed colore dilutiore & albicante prædita sit.

Habitat in variis *Americæ* locis. Ab *Insula Dominicali* in *musæum Realmurianum* à *D. Chervain* mas & fœmina missi fuerunt.

couvertures du dessous de la queue sont d'une couleur vineuse, avec quelques taches brunes à la partie inférieure du col & à la poitrine, cette dernière couleur occupant le milieu de chaque plume. Les couvertures du dessus de l'aile sont mêlées de cendré foncé & de vineux, avec quelques taches de verd de Canard : celles du dessous sont rouffes. Les plumes de l'aile sont de la même couleur, & terminées de brun foncé, ayant aussi leur bord extérieur de ce même brun, de façon que lorsque l'aile est pliée, il ne paroît rien de roux. Les deux plumes du milieu de la queue sont d'un cendré encore plus foncé que celui du dos ; & les latérales presque noires. L'iris des yeux est orangé. Le bec est d'un rouge pâle à son origine, & noirâtre vers le bout. Les pieds sont rouges ; & les ongles noirâtres.

La *femelle* diffère du *mâle*, en ce que le dessous de son corps n'est pas aussi vineux, mais d'une couleur plus claire & blanchâtre.

On la trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Le mâle & la femelle ont été envoyés de *saint Domingue* à *M. de Reaumur*, par *M. Chervain*.

** 20. LA PETITE TOURTERELLE BRUNE D'AMÉRIQUE.

Voyez Pl. VIII. Fig. 2.

Columba superne fusca, infernè sordide alba ad rufum inclinans; remigibus exterius & apice fusco-nigricantibus, interius rufis TURTUR PARVUS FUSCUS AMERICANUS.

Cocotzin aliud genus. Fern. Hist. nov. Hisp. pag. 24. cap. XLIV.

Willugh. Ornith. pag. 135.

Les Mexiquains l'appellent COCOTZIN, & quelques-uns, TLAPLALCOCOTLI. Fern.

C'est la plus petite espece de *Tourterelle* que je connoisse. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long; sa queue deux pouces; son pied six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ au tiers de la longueur de sa queue. Tout le dessus du corps, sçavoir les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun brillant comme de la soye. Les couvertures des aîles sont de

Specie istâ minorem non novi *Turturem*. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sex lineas longum est; cauda duos pollices; pex ses lineas; & trium anticorum digitorum medius cum ungue septem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus adhuc brevior. Alæ complicatae tertiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Corpus supra, partes scilicet superiores capitis & colli, dorsum, uropygium & caudam superne tegentes pennæ, fusco serici instar splendente tingitur. Alarum tectrices eodem imbuuntur colore, attamen ad rufum

paulisper inclinant ; & septem maculis variegantur parvis splendide calybeis , tribus scilicet supra minores , quatuor supra majores tectrices , ut videre est in *icone*. Guttur ex albo rufescit ; colli pars inferior & pectus rufescunt ex fusco : latera , venter , crura & caudam subtus tegentes pennæ ex fordidè albo ad rufum inclinant ; alas verò subtus tegentes sunt omnino rufæ. Remiges , sive majores sive minores aut secundariæ , exterius & apice ex fusco nigricantes , in latere verò interiore rufæ. Rectrices binæ intermediæ fuscæ : laterales omnes suprà in exortu cinerascunt , postea sunt nigra paululum fusco desinentes , infrà verò per totam longitudinem nigra , excepto apice , ut suprà , fusco : insuper binæ utrinque extimæ versùs apicem pinnulis exterioribus albo terminatis præditæ sunt. Pedes sunt rubri ; rostrum , unguisque fusci. Habitat in *Dominicopoli Insula* , unde à *D. Chervain* in *museum Realmurianum* missus.

la trouve à *saint Domingue* , d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

ce même brun , mais tirant un peu vers le roux. Sur ces couvertures sont sept petites taches d'une très-belle couleur d'acier poli , sçavoir trois sur les petites , & quatre sur les grandes , comme on le peut voir dans la *figure*. La gorge est d'un blanc roussâtre ; la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun roussâtre. Les côtés , le ventre , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale , & tirant vers le roux. Les couvertures du dessous de l'aîle sont rousses. Les plumes de l'aîle , tant les grandes que les moyennes ou secondaires , sont d'un brun noirâtre à leur côté extérieur & à leur bout , & rousses à leur côté intérieur. Les deux du milieu de la queue sont brunes : toutes les latérales sont en-dessus cendrées à leur origine , ensuite noires & terminées d'un peu de brun , & en-dessous noires dans toute leur longueur , excepté le petit bout , qui est brun comme dessus. Les deux plus extérieures de chaque côté ont aussi vers le bout leurs barbes extérieures terminées de blanc. Les pieds sont rouges ; le bec & les ongles bruns. On

** 21. LA TOURTERELLE DE CANADA.

Columba superne griseo-fusca, infernè sordidè alba; remigibus fuscis, oris exterioribus majorum flavicantibus; rectricibus cinereis . . . TURTUR CANADENSIS.

Elle est un peu plus grosse que notre *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue cinq pouces six lignes; son pied un pouce; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est encore plus. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, & les couvertures des ailes sont d'un gris-brun; la partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées: la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris-brun tirant vers le jaunâtre. Les côtés sont gris-blancs; le ventre & les jambes d'un blanc sale; & les couver-

Turturæ nostratæ crassitie paululùm superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim est pollicum, ad extremos verò ungues decem pollicum cum duabus lineis. Rostrum ab apice ad oris angulos mensuratum pollicem æquat; cauda quinque pollices & sex lineas; pes unum pollicem; medius verò trium digitorum anteriorum cum ungue unum pollicem & quatuor lineas explet: laterales paulò sunt breviores, & posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem paululùm excedunt. Capitis, colli & dorsi partes superiores, alarumque tectrices sunt griseo-fuscæ; dorsi pars inferior, uropygium & caudam superne tegentes pennæ cinereæ. Guttur, collum inferius & pectus ex griseo-fusco ad flavicantem inclinant. Latera cinereo-alba sunt; venter & crura sordidè alba; pennæque caudam sub-

tus tegentes albæ. Alarum rectrices sat amplis maculis fusco-nigricantibus donantur. Remiges & primariæ & secundariæ fuscæ sunt; oræ autem exteriores majorum flavicant. Rectrices cinereæ, exceptâ utrinque extimâ albâ: omnes verò, duabus intermediis exceptis, versùs exortum in latere interiore magnâ præditæ sunt maculâ rufâ, infra quam magna altera macula fusco-nigricans adest. Rostrum nigricat: pedes sunt rubri; unguës verò nigri.

A *mare* *fœmina* differt in eo quod pennæ caput, collum, pectus, partemque dorsi superiorem tegentes, alarumque rectrices sordidè albo-flavicante terminantur, unde partes istæ taniis striatioribus ejusdem coloris transversaliter striatæ apparent.

Habitat in *Canada*, unde mas & *fœmina* in *musæum Realmurianum* à *D. Gauthier Medico Regio missi fuerunt.*

tures du dessous de la queue d'un assez beau blanc. Les couvertures des ailes sont marquées d'assez grandes taches d'un brun noirâtre. Toutes les plumes de l'aile grandes & moyennes sont brunes; mais les grandes ont leur bord extérieur jaunâtre. Les plumes de la queue sont cendrées, excepté la plus extérieure de chaque côte, qui est blanche; & toutes, excepté les deux du milieu, ont vers leur origine à leurs barbes intérieures une grande tache rousse, au-dessous de laquelle est une autre grande tache d'un brun noirâtre. Le bec est noirâtre; les pieds sont rouges, & les ongles noirs.

La *femelle* se distingue, du *mâle* en ce que toutes les plumes de la tête, du col, de la poitrine & de la partie supérieure du dos, & les couvertures des ailes sont terminées de blanc sale & jaunâtre; ce qui fait paroître sur ces parties une petite rayeure transversale très-étroite de la même couleur.

On la trouve en *Canada*, d'où le mâle & la femelle ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. Gautier Medecin du Roi.*

** 22. LA TOURTERELLE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. IX. Fig. 2.

Columba superne griseo-fusca, infernè sordidè alba; caudâ longissimâ acutâ; remigibus majoribus interiùs rufis; rectricibus subtus nigris . . . TURTUR CAPITIS BONÆ SPEI.

Elle n'est guères plus grosse qu'une *Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue cinq pouces trois lignes; son pied six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, vont jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles des aîles sont gris-brun. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale. Il y a sur chaque aîle une tache brillante comme de l'acier poli. Les grandes plumes

Alaudam cristatam crassitie non multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem est pollicum cum sex lineis, & ad extremos ungues quinque pollicum & sex linearum. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septem lineas longum est; cauda quinque pollices & tres lineas; pes sex lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum exteriorem longitudine adæquat. Alæ complicatæ tertiam longitudinis caudæ partem attingunt. Caput, collum, pectus, dorsum, uropygium, caudam superne tegentes pennæ, alarumque tectrices sunt griseo-fusæ. Venter, latera, crura & pennæ caudam infernè tegentes sordidè albæ. In utraque ala macula adest colore calybis politi splendentis. Remiges majores in latere

extérieure & apice sunt fusca, in latere verò interiore rufa : minores aut secundaria in latere extérieure grisea, in interiore fusca. Rectrices inæqualis sunt longitudinis : intermediae binæ longiores ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad extimam usque brevior. Omnes infernæ nigrae sunt, exceptâ utrinque extimâ, quæ exterius & apice alba est ; supernæ autem duæ intermediae ex fusco nigricant cum laevi rufi mixtura, & laterales sunt in exortu griseo-fusca & versus apicem nigricantes. Rostrum pedesque sunt rubri, & ungues fusci. Habitat in *Senegale*, unde missus est in *musæum Realmurianum* à *D. Adanson* ; & in *Capite bonæ Spei*, unde missus à *D. Abbate de la Caille*.

au *Cap de bonne Espérance*, *M. l'Abbé de la Caille*.

Mas à *foemina* differt gutture & parte colli inferiore splendide nigris, & tectricibus alarum majoribus nigricante terminatis.

de l'aîle ont leurs barbes extérieures brunes ainsi que leur bout, & leurs barbes intérieures rouffes : les moyennes ou secondaires ont leurs barbes extérieures grises, & les intérieures brunes. Les plumes de la queue sont toutes d'inégale longueur : les deux du milieu sont les plus longues, & les latérales vont toutes en diminuant de longueur jusqu'à la plus extérieure, qui est la plus courte. Elles sont toutes noires en-dessous, excepté la plus extérieure de chaque côté, qui est blanche à son côté extérieur & à son bout ; & en-dessus les deux du milieu sont d'un brun noirâtre avec une légère teinte de roux, & les latérales sont gris-brun à leur origine & noirâtres vers leur bout. Le bec & les pieds sont rouges, & les ongles bruns. On la trouve au *Sénégal* d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson* ; & d'où elle a été envoyée par

Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il a la gorge & la partie inférieure du col d'un noir brillant, & les grandes couvertures de l'aîle terminées de noirâtre.

** 23. LA TOURTERELLE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. X. Fig. 1.

Columba superne griseo-fusca, infernè sordidè alba; remigibus omnibus interiùs rufis; rectricibus subtus nigris . . .
 TURTUR SENEGALENSIS.

Elle n'est pas si grosse qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes : celle du bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est de huit lignes ; celle de la queue de deux pouces neuf lignes ; celle du pied de huit lignes ; & celle du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est cendrée. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures des aîles sont d'un gris-brun. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col & la poitrine tirent vers la couleur vineuse, mais très-claire. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous

Merula crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices æquat, ad extremos ungues sex pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est ; cauda duos pollices & novem lineas ; pes octo lineas ; & medius trium digitorum anteriorum cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Capitis pars superior cinerascit. Colli superior pars, dorsum, uropygium & alarum testrices sunt griseo-fuscæ. Guttur albicat. Colli pars inferior & pectus ad vinaceum inclinant colorem, sed dilutiorem. Venter, latera, crura & penæ caudam subtus regentes sordidè albicant : quæ caudam superne tegunt sunt griseo-fuscæ & fusco-nigricante terminantur : quæ verò alas

alas subtus cooperiunt rufæ. Remiges & primariae & secundariae latere exteriori & apice fuscae sunt, & latere interiore rufæ. In utraque ala quædam sunt maculae viridiaureae splendentes in violaceum mutantes, sicut in collo Anatino; quæ maculae in pinnulis exterioribus majorum quorundam tectricum alarum collocantur. Rectrices omnes infernè nigrae sunt, exceptâ utrinque extimâ, quæ alba est in latere exteriori ab exortu ad duas tertias longitudinis partes usque, & insuper parvâ maculâ albâ apice donatur; superne verò duæ intermediae ex fusco nigricant, & laterales sunt in exortu griseofuscae & apice nigricantes. Utrinque extrema albo superne ut infernè maculatur. Rostrum pedesque rubent: ungues fuscescunt. Habitat in *Senegale*, unde in *musæum Realmurianum* à *D. Adanson* missus est.

de la queue sont d'un blanc sale. Celles du dessus de la queue sont gris-brun & terminées de brun noirâtre. Les couvertures du dessous de l'aile sont rousses. Les plumes de l'aile, tant les grandes que les secondaires, sont brunes à leur côté extérieur & à leur bout, & rousses à leur côté intérieur. Il y a sur chaque aile quelques taches d'un verd-doré éclatant & changeant en violet, & tel que celui du col de Canard: ces taches sont placées sur les barbes extérieures de quelques-unes des plus grandes couvertures de l'aile. Les plumes de la queue sont toutes noires en-dessous, excepté la plus extérieure de chaque côté, qui est blanche à son côté extérieur depuis son origine jusqu'aux deux tiers de sa longueur, & qui a de plus une petite tache blanche à son bout; & en-dessus les deux du milieu sont d'un brun noirâtre, & les latérales sont gris-brun à leur origine & noirâtres vers leur bout. La plus extérieure de chaque côté est marquée de blanc en-dessus

comme elle l'est en-dessous. Le bec & les pieds sont rouges; & les ongles bruns. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

** 24. LA TOURTERELLE A COLLIER DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XI. Fig. 1.

Columba superne griseo-fusca, infernè sordidè alba; remigibus fuscis, oris exterioribus sordidè albicantibus; collo superiore torque nigro cincto....TURTUR TORQUATUS SENEGALENSIS.

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de longueur; sa queue trois pouces; son pied neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est encore davantage. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, vont environ à la moitié de la longueur de la queue. La tête, le col & la poitrine approchent d'une couleur vineuse, un peu rembrunie aux parties supérieures de la tête & du col. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles des aîles sont d'un gris-brun. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale. Les couvertures du dessous de

Crassitie *Merulam* circiter aequat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem est pollicum cum sex lineis, & ad extremos ungues septem pollicum & octo linearum. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas aequat; cauda tres pollices; pes novem lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue decem lineas laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Alae complicatae mediam circiter caudae longitudinem attingunt. Caput, collum & pectus ad vinaceum inclinant colorem, qui color in partibus capitis & colli superioribus paululùm fuscescit. Dorsum, uropygium, caudam superne regentes pennae & alarum tectrices sunt griseo-fuscae. Venter, latera, crura, pennaeque caudam subtus regentes sordidè albæ. Quæ alas subtus cooperiunt cineræ. Remiges & majores

& minores ex fusco nigricant, oris exterioribus sordidè albicantibus. Rectrices binæ intermediæ sunt griseo-fuscæ; laterales verò ab exortu ad duas tertias longitudinis partes usque nigræ, reliquâ longitudine griseæ, quo colore latus exterius rectricis extimæ quoque imbuitur. Torquis niger tres circiter lineas latus collum superius cingit, & in colli lateribus torquis iste versùs caput assurgit. Rostrum nigricat; pedes rubent; ungues fuscescunt. Habitat in Senegale, unde in museum Realmurianum à D. Adanson missus est.

l'aîle sont cendrées. Les plumes de l'aîle, tant les grandes que les secondaires, sont d'un brun noirâtre, & ont leur bord extérieur d'un blanc sale. Les deux du milieu de la queue sont gris-brun; & les latérales sont noires depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, & le reste est gris, ainsi que le côté extérieur de la plume la plus extérieure de chaque côté. La partie supérieure du col est entourée d'un collier noir d'environ trois lignes de largeur; & aux côtés du col ce collier remonte un peu vers la tête. Le bec est noirâtre; les pieds sont rouges, & les ongles bruns. On la trouve au Sénégal, d'où elle a été envoyée à M. de Reaumur par M. Adanson.

**** 25. LA TOURTERELLE A GORGE TACHETÉE DU SÉNÉGAL.**

Voyez Pl. VIII. Fig. 3.

Columba superne fusco-rufescens, infernè alba; collo inferiore nigro maculato; remigibus exterius cinereis interiùs fuscis; rectricibus tribus extimis ultimâ medietate albis....

TURTUR GUTTURE MACULATO SENEGALENSIS.

Craffitie *Merulam* circiter æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem est pollicum cum novem lineis, & ad extremos ungues sex pollicum

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces

Sij

neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de huit lignes ; sa queue de quatre pouces ; son pied de neuf lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , de onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La tête , le col & la poitrine sont d'une assez belle couleur vineuse ; & la partie inférieure du col est tachetée de noir. La partie supérieure du dos est d'un brun mêlé de roux , c'est-à-dire , que chaque plume est brune & terminée de roussâtre. Les couvertures de l'aîle les plus proches du corps sont colorées de même : les autres sont cendrées. La partie inférieure du dos & le croupion sont aussi cendrés. Le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les couvertures du dessous de l'aîle sont cendrées. Les plumes de l'aîle , tant les grandes que les moyennes , sont brunes en-dessous , & en-dessus elles ont leurs barbes extérieures cendrées & les intérieures brunes. Celles de la queue sont noires

& novem linearum. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pes novem lineas ; & medius trium digitorum anticorum cum ungue undecim lineas : laterales paulo sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput , collum & pectus colore vinaceo perlustrantur ; & insuper collum inferius nigris maculis variegatur. Dorsi superior pars ex fusco rufescit ; quæque enim penna est fusca , oris rufescentibus. Alarum tectrices corpori viciniore ejusdem sunt coloris , cæteræ cinereæ. Dorsum in parte inferiore & uropygium cinerea. Venter , latera , crura & caudam subtus tegentes pennæ albæ : quæ alas subtus cooperiunt cinereæ. Remiges & majores & minores sunt infernè fuscæ , superne verò in latere exteriori cinereæ in interiori fuscæ. Rectrices infernè nigrae sunt ab exortu ad mediam usque longitudinem ; sex intermediis alterâ medietate cinereis , tribus utrinque extimis ultimâ medietate albis ; superne autem

sex intermediæ fuscæ cinereo admixto, & tres utrinque extimæ cinereo-nigricantes ab exortu ad mediam usque longitudinem, ultimâ medietate albâ. Rostrum nigricat; pedes rubent; ungues fuscescunt. Habitat in *Senegale*, unde in *museum Realmurianum* à *D. Adanson* missus est.

en-dessous depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & le reste est cendré dans les six du milieu, & blanc dans les trois latérales de chaque côté : & en-dessus les six du milieu sont d'un brun mêlé de cendré, & les trois latérales de chaque côté sont d'un cendré noirâtre depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & le reste est

blanc. Le bec est noirâtre; les pieds sont rouges, & les ongles bruns. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

**** 26. LA TOURTERELLE D'AMBOINE.**

Voyez Pl. IX. Fig. 3.

Columba rufa; caudâ longissimâ; pennis collum & pectus regentibus nigricante transversim striatis; remigibus fuscis; rectricibus fusco-rufescentibus.... **TURTUR AMBOINENSIS.**

Turturem nostratem crassitie circiter adæquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuordecim pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda octo pollices; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem: laterales paulò sunt breviores; &

Elle est à peu près de la grosseur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces; celle de son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est de dix lignes; celle de sa queue de huit pouces; celle de son pied de huit lignes; & celle du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, d'un pouce: les

latéraux sont un peu plus courts, & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois pouces au-delà de l'origine de la queue. La tête, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont rousses : les plumes du dessus de la tête, celles du col & de la poitrine ont chacune vers leur bout une raye transversale noirâtre. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos & les couvertures de l'aîle sont d'un brun foncé & terminées de roux. Les plumes de l'aîle sont de ce même brun foncé. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont rousses. Les plumes de la queue sont d'un brun tirant vers le roux. Elles sont toutes d'inégale longueur : les deux du milieu sont les plus longues, & toutes les autres vont en décroissant jusqu'à la plus extérieure, qui est la plus courte. Le bec & les pieds sont rouges, & les ongles bruns. Toutes les couleurs sont plus claires dans la femelle que dans le mâle. On la trouve dans l'Isle d'Amboine, d'où elle a été envoyée à M. le Comte de Bontinck, qui en a fait présent à M. de Reaumur.

posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad tres ultra caudæ exortum pollices protenduntur. Caput, collum, pectus, venter, latera, crura & caudam subtus tegentes pennæ sunt rufæ : quæ verò capitis partem superiorem, collum & pectus cooperiunt taniâ transversâ nigricante versùs apicem insigniuntur. Pennæ partem dorsi superiorem tegentes & tectrices alarum sunt saturatè fuscæ, rufo terminatæ. Remiges etiam saturatè fuscæ. Dorsi inferior pars, uropygium, caudamque superne tegentes pennæ rufæ. Rectrices ex fusco rufescunt. Inæqualis sunt longitudinis : binæ intermediae longiores ; laterales gradatim longitudine minuuntur ad extimam usque breviores. Rostrum pedesque rubent ; ungues fuscescunt. *Amare famina* discrepat in eo quod ipsius colores sint dilutiores. Habitat in *Amboinensi Insula*, unde missus ad D. Comitem de Bontinck, qui D. de Reaumur dono dedit.

** 27. LE PIGEON VIOLET DE LA MARTINIQUE.

Voyez Pl. XII. Fig. 1.

Columba castaneo-violacea; ventre rufescente; remigibus interiùs rufis. . . . COLUMBA VIOLACEA MARTINICANA,

Perdrix rousse. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 254.*

Turturæm crassitiæ circiter adæquat. Ipsiùs longitudo ab apicè rostri ad caudam extrêmam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum ab ipsiùs apicè ad oris angulos decem lineas longum est; cauda duos pollices & undecim lineas; pes tredecim cum semî lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue quatuordecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Caput, collum, pectus, dorsum, uropygium, caudam superne tegentes pennæ, alarumque tectrices sunt castaneo-violacæ. Venter, crura & pennæ caudam subtus tegentes rufescunt: quæ alas subtus cooperiunt, sicut & latera, rufæ. Remiges in latere exteriorè & apicè sunt casta-

Il est à peu près de la grosseur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue deux pouces onze lignes; son pied treize lignes & demie; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un marron changeant en violet. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres. Les côtés & les couvertures du dessous de l'aîle

sont rouffes. Les plumes de l'aile sont à leur côté extérieur & à leur bout d'un marron changeant en violet, & leur côté intérieur est roux. Celles de la queue sont par-tout d'un marron changeant en violet. Les yeux sont entourés de petits mammelons charnus d'un très-beau rouge. L'iris est de la même couleur. Le bec & les pieds sont rouges, & les ongles gris-bruns. On le trouve à la *Martinique*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Thibault de Chanvalon*.

J'en ai vu un chez *M. l'Abbé Aubry*, qui étoit d'une couleur beaucoup plus rembrunie. C'est une variété de cette espece,

neo-violaceæ; in latere autem interiore rufæ. Rectrices in utroque latere castaneo-violaceæ. Papillæ carnosæ coccineæ oculos ambiunt. Irides etiam coccineæ. Rostrum pedesque rubent; ungues ex griseo fuscescunt. Habitat in *Insula Martinicana*, unde in museum *Realmurianum* missa à *D. Thibault de Chanvalon*.

Hujus speciei varietatem vidi in museo *D. Aubry*, ad fuscum colorem magis accedentem.

28. LE PIGEON DE MONTAGNE DU MEXIQUE.

Columba rufo-purpurea; tectricibus alarum minoribus candidis *COLUMBA MONTANA MEXICANA*.

Columba Mexicana, montana, maxima. *Raj. Syn. Avi. pag. 63. N^o. 13.*
Hoiilotl. Fern. Hist. nov. Hisp. pag. 27. cap. LX.
Les Mexiquains l'appellent HOILOTL. Fern.

Il est presque aussi grand que le *Pigeon Romain*. Il est par tout le corps d'un roux tirant sur le pourpre, excepté les petites couvertures des aîles, qui sont blanches. Le bec & les pieds sont d'un rouge d'écarlatte.

Il y en a d'autres qui sont d'un fauve clair, si l'on en

Columbam Romanam magnitudine ferè adæquat. Per universum corpus colore rufo in purpureum vergente tingitur, exceptis tectricibus alarum minoribus candidis. Rostrum & pedes coccinei.

Aliæ sunt coloris fulvi; sed tamen diluti, exceptis quoque

quoque rectricibus alarum minoribus albis. Rostrum habent & pedes rubescentes; ungues nigros. Habitant in *Mexicanis montibus.*

excepte aussi les petites ouvertures des aîles, qui sont blanches. Ils ont le bec & les pieds rouges; & les ongles noirs. On les trouve dans les *montagnes du Mexique.*

**** 29. LE PIGEON ROUX DE CAYENNE.**

Voyez Pl. XII. Fig. 2.

Columba superne rufo-purpurea, infernè rufescens; collo inferiore & pectore carneis; remigibus, rectricibusque rufis
COLUMBA RUFA CAYENNENSIS.

Columba purpureo-rufescens, iridibus & palpebris coccineis. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 469.*

Columba minor fulva. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 304. N°. XXX. hujus icon minimè accurata Tab. 261. fig. 1.*

Perdix montana. *Raj. Syn. Avi. pag. 183. N°. 20.*

Perdrix de la Martinique, ou Turtur rubens cruribus & oculis coral-
linis. *Feuillée Journ. des Obs. phys. pag. 408. (ed. 1725).*

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent MOUNTAIN-PARTRIDGE. *Sloane. Raj. Browne, MOUNTAIN-WITCH; MOUNTAIN-DOVE. Browne.*

Præcedenti crassitie cedit. Ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas longa est, & ad extremos ungues octo pollices cum duabus lineis. Rostri longitudo ab ipsius apice ad oris angulos octo cum semi lineas æquat; caudæ duos pollices cum sex lineis; pedis undecim lineas; & trium digitorum anticorum medii cum ungue unum pollicem: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium breviss-

Il est un peu plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied onze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est

encore davantage. Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Tout le dessus du corps , savoir les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue , est d'un roux tirant sur le pourpre. La gorge , la partie inférieure du col & la poitrine sont couleur de chair. Le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres : celles du dessous de l'aile , les plumes de l'aile & celles de la queue sont rousses. Les yeux sont entourés de petits mammelons charnus d'un très-beau rouge : l'iris est de la même couleur. Le bec & les pieds sont rouges ; & les ongles gris-bruns. On le trouve à Cayenne , d'où il a été envoyé à M. de Reaumur par M. des Essars.

simus. Alæ complicatæ ultra mediam caudæ longitudinem paululùm protenduntur. Totum corpus suprà , partes scilicet capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , caudam superne tegentes pennæ , alarumque tectrices , ex rufo purpurascit. Guttur , pars colli inferior & pectus colore sunt carneo. Venter , latera , crura & pennæ caudam subtus tegentes rufescunt : quæ alas infernè cooperiunt , remiges , rectricesque rufæ. Papillis carnosis coccineis ambiuntur oculi : irides etiam coccineæ. Rostrum & pedes sunt rubri ; & ungues griseofusci. Habitat in *Cayennensi insula* , unde in *musæum Reaumurianum* missa à D. des Essars.

30. LE PIGEON DE GUINÉE.

Columba superne fusco-purpurascens in violaceum mutans ; infernè dilutè cinerea ; uropygio albo ; maculis in utraque ala triangularibus albis ; rectricibus obscurè cinereis , apice nigris COLUMBA GUINEENSIS.

Columba Guineensis. Klm. Avi. pag. 120. N°. 25.

Pigeon aux taches triangulaires. Edwards. Tom. II. pag. LXXV ; avec une figure très-exacte Pl. 75.

Craffitie adæquat *Columbam Romanam*, eamque magnitudine circiter attingit. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes protenduntur. Caput, guttur, pectus, venter, latera, crura & caudæ rectrices superiores & inferiores dilutè cinerascunt. Pennæ collum tegentes in medio concolores, marginibus rubescentibus, in aciem acutum desinunt. Dorsi pars superior ex fusco ad purpureum vergit, &, pro vario ad lucem objectu, in violaceum colorem mutat. Omnes alarum rectrices, presque minores remiges corpori finitimæ eodem colore imbuuntur, & ad apicem maculâ donantur albâ, isocellum referente triangulum, cujus acies versùs pennæ exortum assurgit, basis verò versùs apicem descendit. Cæteræ omnes remiges nigræ, oris exterioribus dilutè cinereis. Dorsi inferior pars & uropygium albescent. Rectrices sunt obscurè cineræ, apicibus nigris. Cutis nuda coccinea oculos ambit. Oculorum irides splendide aurantiæ. Rostrum nigricat; membrana autem nares cooperiens cinerea. Pe-

Il est de la grosseur du *Pigeon Romain*, & à peu près de la même grandeur. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un cendré clair. Les plumes qui couvrent le col sont de la même couleur dans leur milieu, & bordées de rougeâtre, chacune finissant en pointe aiguë. La partie supérieure du dos est d'un brun tirant sur le pourpre, & changeant, selon qu'on l'expose aux différens rayons de lumière, en une couleur violette. Toutes les couvertures des ailes, & les trois moyennes plumes les plus proches du corps sont de la même couleur, & ont chacune à leur bout une tache blanche formant un triangle isocelle, dont le sommet est tourné du côté de l'origine de la plume & la base vers le bout. Toutes les autres plumes de l'aile sont noires, & ont leur bord extérieur d'un cendré clair. La partie inférieure du dos est blanche, ainsi que le croupion. Les plumes de la queue sont d'un cendré obscur, & terminées de noir. Les yeux sont entourés d'une

peau dénuée de plumes & d'un rouge vif. L'iris est d'un bel orangé. Le bec est noirâtre; & la membrane, qui est au-dessus des narines, cendrée. Les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles bruns. On le trouve dans les *parties méridionales de Guinée*.

des pallidè rubri : ungues fusci. Habitat in *regionibus Guineæ meridionalibus*.

31. LE PIGEON DE LA JAMAÏQUE.

Columba superne fusco-purpurascens, infernè alba; restrictibus cœruleis lineâ albâ terminatis; vertice albo
COLUMBA JAMAICENSIS.

Columba minor ventre candido. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 303. N°. XXIX. hujus icon non satis accurata Tab. 262. Fig. 1.

Raj. Syn. Avi. pag. 183. N°. 23.

Columba minor Jamaycensis, ventre candido, D. Sloane. Raj. Syn. Avi. pag. 63. N°. 16.

Columba media, ventre candido. Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 469.

Les Anglois l'appellent WHITE-BELLY'D DOVE. Sloane. Raj. Browne.

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces. Il a seize pouces de vol. Son bec est long de huit lignes. La membrane qui est au-dessus des narines est fort élevée, & forme deux espèces de tubercules à la base du bec. L'iris des yeux est blanc. Le sommet de la tête & toute la partie inférieure du corps, sçavoir la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue, sont blanches. La partie supérieure du col est variée de bleu & de pourpre.

Ipsius longitudo ab apice rostri ad extremitatem caudæ novem pollices æquat. Alis in contrarium extensis majorum remigum apices sexdecim pollicum intervallo distant. Rostrum octo lineas longum. Membrana nares cooperiens duplici protuberantiâ est elata. Oculorum irides albæ. Vertex & tota pars prona, guttur scilicet, colli pars inferior, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus tegentes, albescent. Pars colli superior è cœruleo & purpureo versicolor. Dorsum,

uropygium, caudam superne tegentes pennæ & alæ fusco purpurascunt, cum aliqua rubri tinctura. Cauda cœrulea, cum linea in extremo alba. In *Jamaica* mense Januario in Savannis seu campestribus planis invenitur.

Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les ailes sont d'un brun tirant sur le pourpre, mêlé d'une légère teinte de rouge. La queue est bleue & terminée par une petite bande blanche. On le trouve au mois de Janvier à la *Jamaïque* dans les Savannes ou les plaines.

** 32. LA TOURTERELLE DE LA JAMAÏQUE.

Voyez Pl. XIII. Fig. 1.

Columba superne fusca ad vinaceum inclinans, infernè vinaceo-rufescens; pectore vinaceo; capite, guttureque cœruleis; taniâ infra oculos albâ . . . TURTUR JAMAICENSIS.

Columba capite nigro. Klein. Avi. pag. 119. N°. 15.

Tourterelle de la Jamaïque. Alb. Tom. II. pag. 32; avec une figure mauvaise & très-mal coloriée Pl. 49.

Les Anglois l'appellent TURTLE-DOVE FROM JAMAICA. Alb.

Columbam liviam crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim est pollicum, & ad extremos ungues novem pollicum cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda tres pollices cum undecim lineis; pes quindecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales paulò sunt

Elle est à peu près de la grosseur du *Biset*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue trois pouces onze lignes; son pied quinze lignes & demie; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de

derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête & la gorge sont bleues : cette couleur descend un peu le long du milieu de la partie inférieure du col, & est suivie de plumes noires, dont quelques-unes ont une bande transversale blanche. Depuis le dessous de la mâchoire inférieure jusqu'au derrière de la tête s'étend de chaque côté une bande blanche, qui passe par-dessous l'œil. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur le vineux. La partie inférieure du col (excepté son milieu) & la poitrine d'un très-beau vineux : le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue d'un vineux tirant sur le roux. Les plumes de l'aîle sont brunes, & ont leur bord extérieur roussâtre. Celles de la queue sont noirâtres en-dessous, & d'un cendré noirâtre en-dessus. Le bec est rouge à sa base, & son bout est cendré : les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve à la Jamaïque, d'où elle a été envoyée au cabinet du Roi.

breviores ; posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ paululùm ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Capitis pars superior, sicut & guttur, cœrulea, qui color secundùm colli inferioris longitudinem ad medium pergit, infra quem plumulæ nigræ, quibusdam taniâ transversâ albâ præditis, extant. Ab infima parte mandibulæ inferioris ad occipitium, infra oculos procedendo, tania utrinque protenditur alba. Colli superior pars, dorsum, uropygium, pennæ caudam superne tegentes, alarumque tectrices ex fusco ad vinaceum inclinant. Colli pars inferior (mediò excepto), sicut & pectus, pulchrè vinacea: venter, latera, crura, caudamque subtus tegentes pennæ ex vinaceo rufescunt. Remiges fuscæ, oris exterioribus rufescentibus. Rectrices infernè nigricantes, superne verò ex cinereo nigricant. Rostrum basi rubrum, apice cinereum : pedes, unguesque rubri. Habitat in *Jamaica*, unde in *musæum Regium* missus.

** 33. LE PIGEON DE ROCHE DE LA JAMAÏQUE.

Columba ex fusco cinereo-cœrulefcens; remigibus, rectricibusque fuscis; vertice albo . . . COLUMBA SAXATILIS JAMAICENSIS.

Columba minor capite albo. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 303. N°. XXVIII. hujus icon satis accurata Tab. 261. Fig. 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 63. N°. 18.

Columba minor Leucocoryphos. Raj. Syn. Avi. pag. 184. N°. 24.

Columba capite albo, Sloane. Klein. Avi. pag. 120. N°. 18.

Columba vertice depresso albido. Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 468.

Pigeon à la couronne blanche. Catesb. Tom. I. pag. 25; avec une figure très-exacte Pl. 25.

Goritas de Oviedo. Sloane. Raj.

Les Anglois l'appellent BLAD-PATE. Sloane. Raj. Browne. WHITE-CROWN'D-PIGEON. Catesb.

Crassitie circiter adæquat *Columbam domesticam*. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad
caudæ extremitatem trede-
cim pollices explet, & ad
extremos ungues decem pol-
lices & sex lineas. Rostrum
ab ipsius apice ad oris an-
gulos unum pollicem lon-
gum; cauda quinque polli-
ces; pes unum pollicem; &
medius trium digitorum an-
ticorum cum ungue octo-
decim lineas: laterales paulò
sunt breviores; posticus om-
nium brevissimus. Alæ com-
plicatæ duas tertias longitu-
dinis caudæ partes attingunt.
Capitis superior pars in adul-
tis alba; infra albedinem ex
purpureo versicolor. Collum

Il est à peu près de la gros-
seur du *Pigeon domestique*. Sa
longueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est de
treize pouces, & jusqu'à celui
des ongles de dix pouces six
lignes. Son bec depuis son bout
jusqu'aux coins de la bouche a
un pouce de long; sa queue
cinq pouces; son pied un pou-
ce; & le milieu des trois doigts
antérieurs, joint avec l'ongle,
un pouce six lignes: les laté-
raux sont un peu plus courts; &
celui de derriere est le plus court
de tous. Ses aîles, lorsqu'el-
les sont pliées, s'étendent jus-
qu'aux deux tiers de la longueur
de la queue. Toute la partie
supérieure de la tête est blan-
che dans les adultes, & au-des-

sous de cette couleur elle est d'un pourpre changeant. Le col est d'un verd changeant en bleu & en couleur de *cuivre de rosette*. Tout le reste du corps, sçavoir le dos, le croupion, les couvertures des aîles, celles du dessus & du dessous de la queue, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes, est d'un brun tirant sur le gris-bleu. Les grandes & les moyennes plumes des aîles, ainsi que celles de la queue, sont brunes. Les yeux sont entourés d'une peau blanche; & l'iris est jaune. Son bec est rouge à sa bâte, & blanc vers le bout. Les pieds sont rouges; & les ongles gris. On le trouve dans toutes les *Isles de Bahama*, à la *Jamaïque* & à *saint Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

Il multiplie beaucoup, & fait son nid dans les rochers.

Fœcundissima est hæc species. Inter rupes nidificat.

34. LE PIGEON A QUEUE ANNELÉE DE LA JAMAÏQUE.

Columba superne pallidè cœrulea, infernè alba; capite, collo inferiore & pectore purpurascens; caudâ pallidè cœruleâ, fasciâ transversâ nigrâ notatâ *COLUMBA CAUDÂ ANNULO CINCTÂ JAMAÏCENSIS*.

Columba caudâ torquatâ, seu fasciâ fuscâ notatâ. *Sloane. Voy. of Jamaica. pag. 302. N°. XXVII.*

Columba caudâ torquatâ, seu fasciâ notatâ, *Sloane. Klein. Avi. pag. 120. N°. 19.*

Columba caudâ fasciâ notatâ *D. Sloane. Raj. Syn. Avi. pag. 63. N°. 17.*

Columba caudâ fasciâ fuscâ notatâ, velut annulo cinctâ. *Raj. Syn. Avi. pag. 183. N°. 22.*

Columba

Columba major nigro cœrulefcens, caudâ falciatâ. Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 468.

Les Anglois l'appellent RING-TAIL'D PIGEON. *Sloane. Raj.* RING-TAIL PIGEON. *Browne.*

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices æquat. Extremitates majorum remigum, alis extensis, viginti pollicum intervallo distant. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est; cauda quatuor aut quinque pollices. Caput, collum inferius & pectus purpurascens pen- nis vestiuntur. Colli superior pars virefcit ex purpura, pennis, pro vario ad lucem objectu, versicoloribus, & serici instar splendentibus. Dorsum, uropygium & tectrices caudæ superiores pallide cœruleæ. Venter albicat: alæ fuscescunt; cauda verò, sicut dorsum, pallide cœrulea fasciâ seu areâ transversâ nigrâ donatur. Membrana nares cooperiens ad basin rostri duplici protuberantiâ elata est. Oculorum irides coccineæ. Habitat in *Jamaica.*

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces. Il a un pied huit pouces de vol. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; & sa queue quatre ou cinq pouces. La tête, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'une couleur de pourpre. La partie supérieure du col est d'un pourpre changeant en verd: ces couleurs varient selon qu'on les expose à différens jours, & elles ont tout le brillant de la soye. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu pâle. Le ventre est blanc; & les ailes brunes. La queue, qui est du même bleu que le dos, est marquée d'une large bande transversale noire. La membrane qui est au-dessus des narines, forme deux tubercules auprès de la bête du bec. L'iris des yeux est d'un rouge d'écarlatte. On le trouve à la *Jamaïque,*

35. LE PIGEON BLEU DU MEXIQUE.

Columba superne cœrulea, infernè rubea; tectricibus alarum

rubeis; remigibus, rectricibusque cœruleis COLUMBA
CÆRULEA MEXICANA.

Tlacahilotl. *Fern. Hist. nov. Hisp. pag. 46. cap. CLIX.*

Tlacahilotl, Columbæ sylvestris species. *Raj. Syn. Avi. pag. 63. N^o. 151*

Les Mexiquains l'appellent TLACAHILOTL. *Fern.*

Il est à peu près de la grosseur du *Pigeon domestique*. La tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les jambes sont bleues; il y a aussi quelques plumes rouges mêlées vers la tête & le col, sur-tout à sa partie inférieure. La poitrine, le ventre, les côtés, les couvertures des ailes & celles du dessous de la queue sont rouges. Les plumes des ailes & celles de la queue sont bleues. L'iris des yeux est rouge, ainsi que le bec & les pieds. On le trouve au *Mexique*.

Columbam domesticam magnitudine circiter æquat. Caput, collum, dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores & crura cœrulescunt, intersertis tamen juxta caput & collum, infernâ præcipuè parte, nonnullis rubeis pennis. Pectus, venter, latera, caudam infernè tegentes pennæ, alarumque tectrices rubent. Remiges & rectrices cœruleæ. Oculorum irides rubræ: rostrum quoque, pedesque rubri. Habitat in *Mexico*.

** 36. LE PIGEON RAMIER BLEU DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XIV. Fig. 1.

Columba cœruleo-nigricans; caudâ purpuro-violaceâ; pedibus plumosis PALUMBUS CÆRULEUS MADAGASCARIENSIS.

On l'appelle à Madagascar FOUNINGO-MENA-RABOU.

Il est un peu plus petit que le *Pigeon domestique*. Il a depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue dix pouces six

Columbæ domesticæ paululum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem

pollices & sex lineas aequat, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda tres pollices cum tribus lineis; pes undecim lineas; & medius trium digitorum anticorum cum ungue unum pollicem: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. In universum corpus saturatè cœruleo-nigricante splendente colore imbuitur. Pennæ caudam subtus tegentes & rectrices sunt splendide purpureo-violaceæ. Quæ collum cooperiunt longiores sunt & strictiores; & cœruleo-nigricanti aliquid cinerei videtur admixtum. In utroque capitis latere cutis est rubra in qua oculi siti sunt. Rostrum, pedes & digiti rubri; ungues nigri: pedes verò ferè ad exortum usque digitorum sunt plumosi. Habitat in *Insula Madagascariensi*, unde in *musæum Realmurianum* à *D. Poivre* allatus est.

lignes de long, & jusqu'à celui des ongles huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de onze lignes; sa queue de trois pouces trois lignes; son pied de onze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, d'un pouce: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est encore plus court. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Il est par tout le corps d'un bleu très-foncé, presque noir & brillant. Sa queue & les plumes qui la recouvrent en-dessous sont d'un pourpre-violet éclatant. Les plumes de son col sont longues & étroites, & il semble qu'il y ait un peu de cendré mêlé à leur couleur. Les yeux sont placés au milieu d'une peau rouge & dénuée de plumes. Le bec est rouge. Les pieds, qui sont couverts de plumes presque jusqu'à l'origine des doigts, sont de cette même couleur, ainsi que les doigts; & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 37. LE PIGEON RAMIER VERD DE MADAGASCAR,

Voyez Pl. XIV. Fig. 2.

Columba viridi-olivacea ; remigibus suprà nigricantibus subtus cinereis, oris exterioribus sulphureis ; pedibus plumosis...

PALUMBUS VIRIDIS MADAGASCARIENSIS.

Columba viridissimi coloris. Bont. Ind. Ori. pag. 62.

On l'appelle à Madagascar FOUNINGO MAÏTSOU.

Il est à peu près de la grosseur du *Pigeon domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces : celle de son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est de onze lignes : celle de sa queue de trois pouces six lignes. Son pied est long de neuf lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quatorze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le moins long de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, le col, la poitrine, le ventre & les côtés sont d'un verd d'olive : le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles des aîles sont du même verd, mais un peu plus foncé. Il y a vers le haut de l'aîle, à l'endroit qui répond au pli du poi-

Columbam domesticam crassitie circiter adæquat. Ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas longus est, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas æquat ; cauda tres pollices cum sex lineis ; pes novem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput, collum, pectus, venter & latera sunt viridi-olivacea : dorsum, uropygium, caudam superne tegentes pennæ & tectrices alarum ejusdem sunt coloris sed saturatoris. In parte alarum suprema, versùs articulum qui carpo humano respondet, macula rubescens adest. Remiges superne nigricant, infernè cinerascunt,

& ipsarum oræ exteriores sunt sulphureæ. Majores alarum tectrices eodem colore terminantur. Pennæ imum ventrem & crura tegentes eodem viridi quo corpus tingitur, sulphureo & nigricante variegantur: quæ caudam subtus cooperiunt albicante & rufo sunt variæ. Rectrices cinereæ, qui color in omnibus, duabus intermediis exceptis, in exortu quàm apice saturatior est. Rostrum & ungues cinerei; pedes & digiti rubri: pedes autem ferè ad exortum usque digitorum pennis sicut pennæ crurum variegatis cooperiuntur. Habitat in *Insula Madagascariensi*, unde in *musæum Realmurianum* à *D. Poivre* allatus est.

gnet, une petite tache rougeâtre. Les plumes de l'aîle sont noirâtres en-dessus & cendrées en dessous, & ont leurs barbes extérieures terminées de couleur de soufre. Les grandes couvertures de l'aîle sont terminées de cette même couleur. Le bas ventre & les jambes sont couvertes de plumes variées du même verd que celui du corps, de couleur de soufre & de noirâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont variées de roux & de blanchâtre. Les plumes de la queue sont cendrées; cette couleur est dans toutes, excepté les deux supérieures, plus foncée à leur origine qu'à leur bout. Le bec est cendré. Les pieds, qui sont couverts presque jusqu'à l'origine des doigts de plumes variées des mêmes couleurs que celles des jambes,

sont rouges, ainsi que les doigts; & les ongles cendrés. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 38. LE PIGEON VERD DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XI. Fig. 2.

Columba viridi-olivacea; collo dilutè castaneo; pectore aurantio; remigibus suprà nigricantibus subtus cinereis, oris exterioribus sulphureis; pedibus nudis. . . . COLUMBA VIRIDIS PHILIPPENSIS.

Columba Maderaspatana variis coloribus eleganter depicta. *Raj. Syn. Avi. pag. 196. N°. 15. hujus pessima icon Tab. II. Fig. 15.*
Les Anglois l'appellent PARROT-DOVE. *Raj.*

Il est un peu plus gros que notre Tourterelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue trois pouces six lignes; son pied onze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est encore plus court. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces au-delà de l'origine de la queue. La tête & la gorge sont d'un verd d'olive rembruni. Le col est d'un marron clair & vineux: le dos, le croupion, les côtés & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd d'olive. Celles du dessus de l'aîle sont de la même couleur, & les grandes sont terminées de soufre, ce qui forme sur l'aîle une raye transversale de cette couleur. La poitrine est orangée. Le ventre & les jambes sont d'un verd d'olive clair & tirant sur le jaune: cette couleur s'éclaircit & devient d'autant plus jaune qu'elle s'approche de l'anús, qui est lui-même tout-à-fait jaune. Les couvertures du dessous de la

Turturē nostratē paululū crassitie superat. Ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas longa est, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum; cauda tres pollices cum sex lineis; pes undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales paulō sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad duos ultra caudæ exortum pollices protenduntur. Caput, sicut & guttur, est obscurē viridi-olivaceum. Collum dilutē castaneum ad vinaceum inclinans: dorsum, uropygium, latera, caudamque superne tegentes pennæ viridi-olivaceæ: alarum teñtrices eodem colore tinguntur, majores verò sulphureo terminantur, quo fit in alis tania transversa sulphurea. Pectus aurantio colore imbuitur. Venter & crura dilutē viridi-olivacea ad luteum inclinans; qui color sensim atque sensim dilutior fit, & magis lutescit ad anum procedendo: anus autem omnino luteus est. Pennæ caudam subtus tegentes rufæ, & cau-

dam longitudine adæquant. Remiges superne nigricant, infernè cinerascunt, & ipsarum oræ exteriores sunt sulphuræ : è contrario rectrices superne cinerascunt, infernè nigricant. Rostrum in exortu nigricat, apice flavicat. Pedes sunt rubri; ungues nigri. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *musæum Realmurianum* à D. Poivre missa est.

Ab eodem missa fuit icon alterius columbæ in *Peninsula citra Gangem fluvium* habitantis, ab ista non discrepantis nisi capite cinereo-albo.

queue sont aussi longues que la queue même, & rousses. Les plumes de l'aile sont noirâtres en-dessus & cendrées en-dessous, & leur bord extérieur est d'une couleur de soufre. Celles de la queue au contraire sont cendrées en-dessus & noirâtres en-dessous. Le bec est noirâtre à son origine, & son bout est jaunâtre. Les pieds sont rouges, & les ongles noirs. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur par M. Poivre.

Il lui a aussi envoyé le portrait d'un autre, qui habite la *presqu'Isle au-delà du Gange*, & qui ne diffère de celui-la que parce qu'il a la tête d'un joli gris-blanc.

** 39. LE PIGEON VERD D'AMBOINE.

Voyez Pl. X. Fig. 2.

Columba viridi-olivacea; dorso castaneo; remigibus suprà nigris infrà cinereis, oris exterioribus flavis; pedibus nudis COLUMBA VIRIDIS AMBOINENSIS.

Crassitie Turturem circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem est pollicum & sex linearum, & ad extremos ungues novem pollicum cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas lon-

Il est à peu près de la grosseur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de dix

lignes ; sa queue de trois pouces huit lignes ; son pied de dix lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , d'un pouce : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un gris plus clair en-devant & plus foncé en arrière. Les côtés de la tête , la gorge , le col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les plumes de la queue , en-dessus seulement , sont d'un verd d'olive , qui tire sur le jaune à la partie inférieure du col & à la poitrine. Les plumes de la queue en-dessous sont noires à leur origine , & d'un gris-blanc vers leur bout. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale & jaunâtre. Le dos est d'un beau marron : les couvertures de l'aîle les plus proches du corps sont de cette même couleur ; celles qui couvrent le pli de l'aîle qui répond au pli du poignet , sont noirâtres ; & toutes les inférieures de ces deux sortes de plumes sont terminées de jaune , ce qui forme sur l'aîle

gum est ; cauda tres pollices & octo lineas ; pes decem lineas ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue pollicem unum : laterales paulò sunt breviores ; posticus adhuc brevior. Ala complicata duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Capitis superior pars cinerea , in syncipite dilutior , in occipite saturatior. Capitis latera sive genæ , guttur , collum , pectus , venter , latera , crura , uropygium , caudam superne tegentes pennæ , rectricesque superne sunt viridi-olivaceæ ; sed colli inferior pars & pectus ad flavum inclinant. Rectrices infernè in exortu nigra , & versùs apicem cinereo-albæ. Pennæ caudam subtus tegentes ex sordidè albo flavicant. Dorsum castaneum : alarum rectrices corpori viciniore eodem colore imbuuntur , inferioribus flavo terminatis ; quæ articulum carpo humano respondentem cooperiunt nigricant , inferioribus etiam flavo terminatis ; undè latæ transversa flava in utraque ala efficitur. Rectrices alarum majores superne nigra , infernè cinereæ , marginibus exterioribus , apicibusque

busque flavis. Remiges majores & minores superne quoque nigræ, infernè cineræ, oris exterioribus flavis; sed in majoribus remigibus strictius quàm in minoribus. Rostrum viridescit. Pedes, unguisque cinerascunt. Habitat in *Amboinensi Insula*, unde missa ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

dans les moyennes. Le bec est verdâtre. Les pieds sont gris, ainsi que les ongles. On le trouve à *Amboine*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

une large bande transversale de cette couleur. Les couvertures de l'aîle, qui suivent ces premières, sont noires en-dessus & grises en-dessous, & bordées extérieurement & terminées de jaune. Les grandes & les moyennes plumes de l'aîle sont aussi noires en-dessus & grises en-dessous, & bordées extérieurement de jaune; mais cette bordure est beaucoup plus étroite dans les grandes plumes que

40. LE PIGEON VERD DE L'ISLE S. THOMAS.

Columba viridis; tectricibus caudæ inferioribus flavis; remigibus & apice caudæ viridi-fuscis.... COLUMBA VIRIDIS INSULÆ SANCTI THOMÆ.

Columbæ sylvestris species ex insula sancti Thomæ. *Marcgr. Hist. Br.* pag. 213.

Jonst. Avi. pag. 146.

Columba sylvestris ex insula sancti Thomæ, *Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 134.*

Raj. Syn. Avi. pag. 62. N°. 7.

Columba ex insula sancti Thomæ *sylvestris*, *Willughbeii*, *Marcgravii. Klein. Avi. pag. 119. N°. 11.*

Columbarum nostratum magnitudine est & figurâ. Pennis vestitur per totum corpus viridibus, exceptis caudæ tectricibus inferioribus flavis. Remiges ex viridi fusciscunt, ut & extremitas

Il ressemble à nos Pigeons pour la grandeur & la figure. Il est verd par tout le corps, excepté les couvertures du dessous de la queue, qui sont jaunes. Les plumes de l'aîle & l'extrémité de la queue sont

d'un verd tirant sur le brun. Ses yeux sont noirs & entourés d'un cercle bleu. Son bec depuis sa bête jusqu'à la moitié de sa longueur est d'un rouge de sang, & de là jusqu'à son bout il est d'un bleu mêlé de blanc & de jaune. Ses pieds sont d'un jaune de safran; & ses ongles bruns. On le trouve dans l'Isle S. Thomas.

caudæ. Oculos habet nigros circulo cœruleo cinctos. Rostrum ab exortu ad medietatem usque sanguineum; à medietate verò ad apicem cœruleum cum albi & flavi mixtura. Pedes crocei: ungues fusci. Habitat in *Insula sancti Thomæ*.

** 41. LE PIGEON RAMIER DES MOLUQUES.

Voyez Pl. XIII. Fig. 2.

Columba superne viridi-aurea in cupri puri colorem mutans; infernè cinereo-alba ad vinaceum inclinans; tectricibus caudæ inferioribus castaneo - purpureis; rectricibus subtrus cinereis; pedibus plumosis . . . PALUMBUS MOLUCCENSIS.

Il est à peu près de la grosseur du Pigeon ramier. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue cinq pouces trois lignes; son pied quatorze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est encore davantage. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent en-

Palumbum crassitie circiter adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad extremitatem caudæ unius est pedis & quinque pollicum, & ad extremos ungues quindecim pollicum. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & quinque lineas longum; cauda quinque pollices cum tribus lineis; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ter-

tiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caput, guttur, collum, pectus, venter & crura sunt cinereo-alba, habentque aliquid vinacei admixtum. Dorsum, uropygium, caudam superne tegentes pennæ, alarumque teñtrices viridi-aureæ pro vario ad lucem objectu in *cupri puri* splendentis colorem mutant. Quæ alas subtus & latera cooperiunt pennæ cinereo-albæ: caudam infernè tegentes castaneo-purpureæ. Majores remiges sunt cinereæ & apicibus dorsi coloribus imbutæ: minores sive secundariæ in latere exteriori & apice dorsi colorem æmulantur, in latere verò interiori sunt cinereæ. Cauda constat rectricibus duodecim longitudine æqualibus, infernè cinereis, superne viridi-aureis, & sicut & dorsum, in *cupri puri* colorem mutantibus. Pedes ad mediam circiter longitudinem plumosi. Rostrum, pedes & ungues viridescunt. Habitat in *Molucis Insulis*, unde in *musæum D. Aubry* missus est. Nucibus muschatis victitat.

viron au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre & les jambes sont d'un gris-blanc mêlé d'une légère teinte de vineux. Le dos, le croupion, les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un verd-doré changeant en une très-belle couleur de *cuivre de rosette*. Les côtés & les couvertures du dessous de l'aile sont gris-blanc: celles du dessous de la queue sont d'un marron pourpré. Les grandes plumes de l'aile sont cendrées & terminées de la même couleur que celle du dos: les moyennes sont de cette dernière couleur à leur côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est cendré. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur, cendrées en dessous, & en dessus d'un verd-doré changeant, comme le dos, en couleur de *cuivre de rosette*. Les pieds sont couverts de plumes jusque vers la moitié de leur longueur. Le bec, les pieds & les ongles sont verdâtres. On le trouve aux *Moluques*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet. I. mange des noix muscades.

** 42. LE PIGEON RAMIER D'AMBOINE.

Voyez Pl. XV. Fig. 1.

Columba viridi-aurea in cupri puri colorem mutans; collo & pectore rubescentibus; remigibus fuscis, introrsum rufis...
PALUMBUS AMBOINENSIS.

Columba Turture nostrate minor; principibus coloribus superbiens, Indiæ Orientalis. Klein. Avi. pag. 120. N°. 20.

Pigeon à l'aile verte. Edwards. Tom. I. pag. XIV; avec une figure passable Pl. 14.

Crassitie Turturem circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices explet, & ad extremos ungues novem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda tres pollices; pes undecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes protenduntur. Synciput album, quæ albedo utrinque in taniam strictiorem, supra oculos extensam, evadit. Capitis superior pars saturatè cœrulescit. Capitis latera, collum & pectus rubescunt, qui color in collo superiore saturatior fit. Dorsi

Il est à peu près de la grosseur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue trois pouces; son pied onze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est encore plus court. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le devant de la tête est blanc, & cette couleur s'étend de chaque côté en une bande étroite, qui passe par-dessus les yeux. La partie supérieure de la tête est d'un bleuâtre foncé. Les côtés de la tête, le col & la poitrine sont rou-

pars superior, alarumque testrices sunt viridi - aureæ splendentes, & , pro vario quo lucis radii incidunt modo, in *cupri puri* splendentis colorem mutant. Alarum testrices quædam minimæ apicibus albæ, unde alarum pars suprema albo maculata. Dorsi pars inferior, uropygium, caudamque superne tegentes pennæ sunt cinereæ. Venter, latera, crura & pennæ caudam infernè tegentes fuscæ cum aliqua rubedinis mixtura : quæ alas subtus cooperiunt rufæ. Remiges saturatè fuscescunt, pinnulis interioribus ab exortu ad duas tertias longitudinis pennæ partes usque rufis. Rectrices nigræ, exceptis duabus utrinque extimis cinereis, apice nigris. Rostrum coccineum; membrana autem nares cooperiens cœrulescit. Pedes rubri; ungues dilutè fuscii. Habitat in *Amboinenfi Insula*, unde missus est ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

Le bec est rouge, & la membrane, qui est au-dessus des narines, bleuâtre. Les pieds sont rouges; & les ongles d'un brun clair. On le trouve à *Amboine*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

geâtres, & cette couleur est plus sombre à la partie supérieure du col. La partie supérieure du dos & les couvertures des aîles sont d'un verd - doré éclatant, & qui se change, selon qu'elles sont exposées à différens jours, en une très-belle couleur de *cuivre de rosette*. Quelques-unes des petites couvertures de l'aîle sont terminées de blanc, ce qui forme autant de petites taches de cette couleur vers le haut de l'aîle. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. Le ventre, les côtés, les jambes & les plumes qui recouvrent la queue en dessous sont brunes avec une légère teinte de rouge. Les couvertures du dessous de l'aîle sont rouffes. Les plumes de l'aîle sont d'un brun foncé, & ont depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur leurs barbes intérieures rouffes. Celles de la queue sont noires, excepté les deux plus extérieures de chaque côté, qui sont cendrées & terminées de noir.

Le bec est rouge, & la mem-

brane, qui est au-dessus des narines, bleuâtre. Les pieds sont rouges; & les ongles d'un brun clair. On le trouve à *Amboine*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

** 43. LA TOURTERELLE VERTE D'AMBOINE.

Voyez Pl. XV. Fig. 2.

Columba viridi-aurea in cupri puri colorem mutans; collo inferiore purpuro - violaceo, . . . TURTUR VIRIDIS AMBOINENSIS.

Elle n'est pas si grosse que notre *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de longueur; sa queue deux pouces une ligne; son pied huit lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête & la gorge sont cendrées. La partie postérieure de la tête & la supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, celles des ailes, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un verd-doré éclatant & changeant, selon qu'on les expose aux rayons de

Turturi nostrati crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & novem lineas æquat, & ad extremos unguis septem pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum; cauda duos pollices cum linea una; pes octo lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Capitis pars anterior & guttur cinerascunt. Capitis posterior pars & colli superior, dorsum, uropygium, caudam superne regentes pennæ, alarum tectrices, pectus, venter, latera & crura splendide viridi-aurea pro vario ad lucem objectu in cupri puri splendentis colorem mutant. Colli inferior pars est purpuro-violacea. Tectrices alarum

maiores superne tantum marginibus exterioribus donantur sulphureis. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ cinereæ. Remiges majores & minores superne in latere exteriori & apice eodem imbuuntur colore quo corpus tingitur, in latere verò interiori nigricant; & infernè obscurè sunt cinereæ. Rectrices superne viridi-aureæ cupri puri splendentem colorem mutant. Sulphureoque colore terminantur, omnibus, binis intermediis exceptis, in latere interiori paululum nigricantibus; infernè verò nigricant, apicibus sordidè albis. Pennæ caudam infernè tegentes sordidè albæ paululum viridescentis admixtum habent. Rostrum, pedesque rubent; ungues ex griseo fuscescunt. Habitat in *Amboinensi Insula*, unde missus ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

& les ongles gris-bruns. On la trouve à *Amboine*, d'où elle a été envoyée à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

44. LE PIGEON DE NINCOMBAR.

Columba superne cœruleo, rubro, purpureo, luteo & viridi versicolor, infernè obscurè fusca; colli pennis longioribus

lumière, en une très-belle couleur de *cuivre de rosette*. La partie inférieure du col est d'un très-beau violet-pourpre. Les grandes couvertures de l'aile sont terminées en-dessus du côté extérieur seulement d'une couleur de soufre. Les couvertures de dessous de l'aile sont cendrées. Les plumes de l'aile, tant les grandes que les moyennes, sont en-dessus de la même couleur que celle du corps à leur côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est noirâtre; & en-dessous elles sont d'un cendré rembruni. Celles de la queue sont en-dessus de ce beau verd-doré changeant en couleur de *cuivre de rosette* & terminées de couleur de soufre, toutes, excepté les deux du milieu, ayant un peu de noirâtre à leur côté intérieur; & en-dessous elles sont noirâtres & terminées de blanc sale. Les plumes qui recouvrent la queue en-dessous sont d'un blanc sale, mêlé d'un peu de verdâtre. Le bec & les pieds sont rouges;

& strictioribus ; remigibus tribus primoribus cœruleis ; re-
trixibus albis COLUMBA NICOMBARIENSIS.

Col. la Nincombar , Indica. *Klein. Avi. pag. 120. N^o. 23.*
Pigeon. Nincombar. *Alb. Tom. III. pag. 20 ; avec des figures mal*
coloriées, Pl. du mâle Pl. 47. & celle de la femelle Pl. 48.
Les Anglois l'appellent PIGEON FROM THE NINKCOMBAR. *Alb.*

Il est un peu plus grand que
le Pigeon Romain. La tête &
la gorge sont d'un noir char-
geant en bleu. Le col, le dos
& le croupion sont couverts de
plumes variées de bleu, de rou-
ge, de pourpre & de jaune, le
tout mêlé d'un très-beau verd.
Les plumes du col sont lon-
gues & étroites. La poitrine,
le ventre, les côtés & les jam-
bes sont d'un brun obscur. Les
couvertures des ailes sont ver-
tes, excepté les trois plus
grandes les plus éloignées du
corps, qui sont bleues : les trois
premières des plumes de l'aile
sont du même bleu ; & toutes
les autres sont mêlées de brun
& de roux. Les plumes de la
queue sont blanches. L'iris des
yeux est rouge. Le bec est cen-
dré. Les pieds sont bruns en-
dessus & jaunes en-dessous.

La membrane qui tapisse les
parois intérieures du gésier,
devient très-épaisse, & ac-
quiert la dureté de la corne.
J'ai vu de ces sortes de mem-
branes, qui avoient plus de deux
lignes d'épaisseur,

*Columbam Romanam pau-
lulum magnitudine antecel-
lit. Caput & guttur sunt ni-
gro-cœrulea. Pennæ cœru-
leo rubro, purpureo & lu-
teo, quibus viride splendens
admiscetur, variegatæ col-
lum, dorsum & uropygium
cooperiunt. Quæ collum te-
gunt longiores sunt & stric-
tiores. Pectus, venter, la-
tera & crura obscurè fusces-
cunt. Alarum testrices viri-
des, tribus exceptis majori-
bus à corpore remotioribus
cœruleis. Primores tres re-
miges eodem cœruleo tin-
guntur ; cœteræ omnes fusco
& rufo admiscuntur. Rec-
trices albæ. Oculorum iri-
des rubræ. Rostrum cine-
reum. Pedes superne fusci,
inferne flavi.*

Membrana partes ventri-
culi interiores cooperiens
crassissima fit, & cornu du-
ritie æmulatur. Hujus spe-
ciei membranas vidi, duas
lineas crassitie excedentes.

Fœmina



Martinet del. et sculp.

1. Tourterelle de la Caroline. 2. Petite Tourterelle brune d'Amérique. 3. Tourterelle à gorge tachetée du Sénégal.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Petite Tourterelle d'Amérique. 2. Tourterelle du Cap de bonne Espérance. 3. Tourterelle d'Amboine.



Designé et Gravé par Martinet.

1. Tourterelle du Sénégal.

2. Pigeon verd d'Amboine.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Tourterelle à Collier du Sénégal.

2. Pigeon verd des Philippines.



Designé et Gravé par Martinet.

1. Pigeon violet de la Martinique.

2. Pigeon roux de Cayenne.



Designé et Gravé par Martinet

1. Tourterelle de la Jamaïque.

2. Pigeon ramier des Molluques.

THE BIRD




Illustration of a bird



Desiné et Gravé par Martinet.

1. Pigeon ramier bleu de Madagascar.

2. Pigeon ramier verd de Madagascar.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pigeon ramier d'Amboine.

2. Tourterelle verte d'Amboine.

LES OISEAUX, Classe III. Ordre I. 155

Femina à mare discrepat in eo quod colores ipsius minùs sint splendentes, & pennas non ita longas in collo obtineat.

Habitat in Insulis Nicombariensibus.

La femelle diffère du mâle en ce que ses couleurs sont moins brillantes, & que les plumes du col ne sont pas si longues.

On le trouve dans les Isles de Nincombar.





ORDRE II.

LES OISEAUX

ORDO II.

A V E S

Qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine : les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : & le bec en cône courbé.

Digitis quatuor membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus circiter usque ad exortum discretis : cruribus ad calcaneum usque plumosis : & rostro conico incurvo donatæ.

TOUS les Oiseaux de cet ordre vivent principalement de grains. Ils font à chaque couvée. une grande quantité de petits. Ils font leur nid par terre ; parce que la mere ne se donne point la peine de nourrir ses petits nouvellement nés, mais, quoiqu'ils ne soient encore que couverts de duvet, ils sortent du nid, suivent leur mere, courant çà & là, & ramassent la nourriture qui leur convient. Ils ont les trois doigts antérieurs joints ensemble à leur origine par un commencement de membrane, qui s'étend tout au plus jusqu'à la première articulation.

Les uns ont la tête ornée de

OMNES hujus ordinis Aves granis præcipue victitant. Multiparæ sunt. Humi nidificant, quia scilicet pulli recenter exclusi non aluntur à matribus, sed densâ lanugine vestiti, huc illuc cursitantes, matres sequuntur, cibum rostellis colligentes. Digniti tres anteriores in hoc ordine Avium in exortu inter se connectuntur rudimento membranæ ad primum usque articulum & non ultra extenso.

Aliæ hujus ordinis Aves

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre II.* 157

capite donantur paleis prædito : aliæ capite paleis destituto. In duas sectiones illas dividimus : prima continet eas quæ capite paleis prædito donantur, ut *Gallo-pavo*, *Gallus*, *Meleagris* : & secunda illas quarum caput paleis destituitur (*vide Tab. V. Fig. 2*), ut *Lagopus*, *Perdix*, *Phasianus*.

membranes charnues : & les autres ont la tête dénuée de ces membranes. Je les divise en deux sections : dans la première sont ceux qui ont la tête ornée de membranes charnues, comme le *Dindon*, le *Cog*, la *Peintade* : & dans la seconde ceux qui ont la tête dénuée de ces membranes (*voyez Pl. V. Fig. 2*), comme la *Gelinotte*, la *Perdrix*, le *Faisan*.

SECTIO I.

Eæ quæ capite donantur paleis prædito.

HÆc sectio tribus constat generibus, palearum numero & situ à se invicem discrepantibus. Aliæ enim hujus sectionis Aves paleâ unâ longitudinali, sub gutture pendulâ, donantur, ut *Gallo-pavo* : aliæ paleis binis longitudinalibus, sub gutture pendulis ; & cristâ membranaceâ in fronte, ut *Gallus* : aliæ tandem paleis binis longitudinalibus, prope rictum oris, utrinque unâ, pendulis ; & cornu conico in fronte præditæ sunt, ut *Meleagris*.

Omnes hujus sectionis Aves sunt *domestica*.

SECTION I.

Ceux qui ont la tête ornée de membranes charnues.

Cette section est composée de trois genres, qui se distinguent entr'eux par le nombre & la position des membranes charnues. Des Oiseaux de cette section les uns ont une membrane charnue, longitudinale, pendante sous la gorge, comme le *Dindon* : d'autres ont deux membranes charnues, longitudinales, pendantes sous la gorge ; & une crête membraneuse sur le front, comme le *Cog* : d'autres enfin ont deux membranes charnues, longitudinales, pendantes à côté de l'ouverture du bec ; & une corne conique sur le front, comme la *Peintade*.

Tous les Oiseaux de cette section sont *domestiques*.

*Le genre du Dindon.**Genus Gallo-pavonis.*

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts dénués de mem-
branes; trois devant, un der-
rière; tous séparés environ
jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plu-
mes jusqu'au talon :

Le bec en cône courbé :

Une membrane charnue, longi-
tudinale, pendante sous la
gorge.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis
desituti; tres scilicet an-
tici, posticus unus; om-
nes circiter usque ad exor-
tum discreti :

Crura ad calcaneum usque
plumosa :

Rostrum conico-incurvum :

Palea una longitudinalis, sub
guttore pendula.

** I. LE DINDON.

Voyez Pl. XVI.

Gallo-pavo carunculâ in fronte donatus GALLO-PAVO.

Gallo-pavus. Gesn. Avi. pag. 481. hujus icon minimè accurata pag. 482.

Gesn. icon. Avi. pag. 56, in qua eadem icon.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 279.

Gallo-pavus, sive Gallus Indicus. Frisch. hujus icon accurata Tab. 122.

*Gallo-pavo. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 35. icones non satis accuratæ,
maris pag. 39, & fæminæ pag. 40.*

*Jonst. Avi. pag. 39. maris icon Tab. XXIV, item & fæminæ sub titulo,
Gallus Indicus; icones ab Aldrovando mutuatæ: & insuper maris icon
non satis accurata Tab. XXIX, sub titulo, Gallus Indicus.*

Linn. systh. nat. ed. 6. Gen. 67. sp. 1.

Gallo-pavo; Meleagris. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

*Gallo-pavo, sive Meleagris & Numidica Avis. Willugh. Ornith. pag.
113. hujus icon satis accurata Tab. XXVII.*

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 301. N°. XXII.

*Gallo-pavo, seu Avis Numidica & Meleagris quibusdam. Raj. Syn.
Avi. pag. 51. N°. A. 3.*

Raj. Syn. Avi. pag. 182. N°. 16.

*Gallo-pavo; Gallus Indicus; Meleagris. Charlet. Exer. pag. 81. N°. II.
Charlet. Onomazt. pag. 72. N°. II.*

- Meleagris. *Faun. Suec. Linn. N°. 164.*
 Meleagris vulgaris. *Klein. Avi. pag. 112. N°. 1.*
 Meleagris vericolor vulgaris. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XI. sp. 1.*
 Meleagris caudam erigens. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 470.*
 Gallus Indicus vulgo ; Meleagris Græcis ; Gallo-pavus Gesnero ; Pavogallus Aldrovando ; aliis Avis Lybica , Avis Numidica. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 301.*
 Cenchramus. *Moehr. Avi. Gen. 47.*
 Gibber , *Bellonii.*
 Coc-d'Inde. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 248 ; avec d'assez mauvaises figures pag. 249.*
Bel. portr. d'Ois. pag. 60 a , où sont les mêmes figures.
 Coq-d'Inde. *Alb. Tom. III. pag. 14 ; avec une figure mal coloriée Pl. 35.*
 Poule d'Inde. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 266.*
Les Espagnols l'appellent PAVON DE LAS INDIAS. Gesn. Aldrov.
Les Catalans, INDIOT ; GALL-D'INDI ; GALL DE LAS INDIES. Barr.
Les Italiens appellent le mâle GALLO-D'INDIA. Bel. Gesn. Aldrov. & la femelle GALLINA D'INDIA. Aldrov.
Les Allemands, le mâle INDIANISCHE HAHN. Frisch. INDIANISCHER-HAN ; KALEKUTTISCHER-HAN. & la femelle INDIANISCH-HUN ; WELSCH-HUN. Gesn. Aldrov. Schwenck. KALEKUTTISCH-HUN. Gesn. Aldrov. CALECUTISCH-HUN. Schwenck.
Les Polonois, INDYK ; KUR-INDYYSKI. Rzac.
Les Suédois, KALKON. Linn.
Les Anglois, TURKEY. Willugh. Raj. Sloane. Sibbald. Browne. Alb. TURKY-COCK. Charlet. KOK OF INDE. Gesn. Aldrov.

Aves omnes domesticas crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & quatuor pollices explet , & ad extremos ungues tres pedes & totidem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos pollices & unam lineam longum est ; cauda duodecim pollices & sex lineas ; pes quinque pollices ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & sex li-

C'est le plus gros de tous les Oiseaux domestiques. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds quatre pouces , & jusqu'à celui des ongles de trois pieds trois pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces une ligne de long ; sa queue douze pouces six lignes ; son pied cinq pouces ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , trois pouces six lignes : les latéraux font un

peu plus courts ; & celui de derriere n'a que quinze lignes de long. Il a quatre pieds cinq pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête & la partie du col , qui en est la plus voisine , sont dénuées de plumes , & couvertes seulement d'une peau toute garnie de mammelons charnus , d'un rouge vif , excepté ceux qui sont sur le sommet de la tête & la partie supérieure du col , qui sont variés de blanc , de bleu & de rouge. Au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur est un appendice charnu ou espece de caroncule rouge , qui lorsqu'elle est contractée , a tout au plus un pouce de long , mais qui peut s'étendre jusqu'à la longueur de trois pouces & demi : alors elle couvre le bec en partie , & pend au-dessous de plus d'un pouce. Le *mâle* a au milieu de la poitrine un petit faisceau de poils roides , longs de six pouces , & qui ressemblent assez aux *foyes* de Cochon. (J'ai vu quelques femelles , qui avoient un pareil faisceau de poils , mais pas aussi long). Le *Dindon* varie en couleur , comme les autres Oiseaux domestiques. Le grand nombre est noir : d'autres sont

neas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus quindecim linearum longitudinem non excedit. Alarum extensarum extremitates quatuor pedum & quinque pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multùm protenduntur. Caput & pars colli capiti finitima pennis omnino destituuntur : obducuntur tantùm pelle papillis aspera carnosis , coccineis , exceptis illis in capitis vertice & parte colli superiore sitis , albo , cœruleo & coccineo variegatis. Supra mandibulæ superioris exortum appendicula quædam carnea sive caruncula rubra eminet , quæ contracta unius pollicis longitudinem non excedit , autamen ad tres usque cum semi pollices protendi potest : sic protensa rostrum partim cooperit , & citra illud pollicis unius longitudine inferiùs dependet. *Mas* in medio pectore fasciculo donatur pilis constante rigidis , sex pollices longis , *Setarum* porcinarum æmulis. (Quasdam observavi foeminas , pari pilorum fasciculo , non tamen æquè longo , præditas). *Gallopavones* colore variant ,

sicut & aliæ Aves domesticæ. Plerique sunt nigri : alii grisei , alii rufi , alii albi , alii denique omnibus istis coloribus variegati. Gallopavones nigri quâdam viridis mixturâ perlustrantur , quo viridi eò magis imbuuntur pennæ quò uropygio viciniore sunt ; uropygium autem , secundum varios aspectus , coloribus *Columbinis* ornatum videtur. Partem dorsi superiorem tegentes pennæ , alarumque tectrices superiores apice sunt quasi quadratim abscissæ. Octodecim rectricibus cauda constat : Avis autem caudam erigit secundum directionem longitudini corporis ferè perpendicularem , eamque in orbem explicat , & sic tres quartas circuli partes efformat. *Mas* in parte utriusque pedis posteriore calcari donatur crassissimo , brevi & obtuso.

Fœmina à *mare* discrepat in eo quod calcari careat , & carunculâ prædita sit minori multò & breviori. Caudam non gestat erectam , sicut *mas* , nec eam in orbem explicat.

gris , d'autres roux , d'autres blancs & d'autres sont variés de toutes ces couleurs. Les noirs ont sur leurs plumes un certain lustre de verd , qui est d'autant plus apparent qu'elles s'approchent plus du croupion , sur lequel on apperçoit aussi dans certains jours les belles couleurs de *gorge de Pigeon*. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos & le dessus des aîles , sont comme coupées quarrément par le bout. La queue est composée de dix-huit plumes , dont l'Animal , en élevant sa queue dans une direction presque perpendiculaire à la longueur de son corps , & en l'étendant , forme les trois quarts d'un cercle. Le *mâle* a à la partie postérieure de chaque pied un ergot très-gros , court & obtus.

La *femelle* diffère du *mâle* en ce qu'elle n'a point d'ergot , & que sa caroncule est beaucoup plus petite & plus courte. Elle n'élève point sa queue , comme le *mâle* , ni ne l'étend en rond.

A. LE DINDON HUPÉ.

Gallo-pavo cristatus.

Meleagris , Gallo-pavo cristatus. *Klein. Avi. pag. 113. N°. 21*

Dindon à crête blanche. *Alb. Tom. II. pag. 23 ; avec une figure passable Pl. 33.*

Les Anglois l'appellent CRESTED-TURKEY. Alb.

Il ne diffère des *Dindons* ordinaires qu'en ce qu'il a sur la tête une hupe de plumes blanches.

A Gallo-pavonibus vulgaribus non discrepat nisi cristâ, quam in capite gestat, pennis albis conflatâ.

B. LE DINDON SAUVAGE.

Gallo-pavo sylvestris.

Gallo-pavo sylvestris Novæ Angliæ. Raj. Syn. Avi. pag. 51. N°. 3.
Les Anglois l'appellent NEW-ENGLAND WILD-TURKEY. Raj.

Il est beaucoup plus grand que le *Dindon* ordinaire ; car on en trouve qui pèsent quarante livres : il y en a même qui vont jusqu'à soixante. Il en diffère encore en ce qu'il est d'un noir beaucoup plus foncé. On le trouve à la *Nouvelle Angleterre*.

A Gallo-pavone vulgari differt magnitudine ; sunt enim qui quadraginta imò sexaginta libras pendent. Ab eo etiam discrepat in eo quod sit intensius niger. Habitat in Nova Anglia.

2. LE DINDON DU BRÉSIL.

Gallo-pavo carunculâ in fronte carens , . . . GALLO-PAVO BRASILIENSIS.

Alector Brasiliæ. Klein. Avi. pag. 112. N°. 4.

Phasianus fuscus Brasiliensis. Klein. Avi. pag. 114. N°. 2.

Phasianus Brasiliensis Jacu-pema dictus Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 56. N°. 2.

Jacu-pema. Pison. Hist. nat. pag. 81, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Jacu-pema Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 198, in qua icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 136. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.

Jacu-pema Brasiliensium Marcgravio. Willugh. Ornith. pag. 118. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXVIII.

Guan,

Guan, ou Quan. *Edwards. Tom. I. pag. XIII; avec une figure exacte*

Pl. 13.

Les Brasiliens l'appellent JACU-PEMA. Marcgrav. Jonst. Willugh. Raj.

Crassitie Gallinam paululum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos circiter pedes & sex pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos circiter pollices longum est; cauda unum pedem; pes tres pollices cum tribus lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Capitis latera sive genæ cute teguntur nudâ, coeruleâ ad purpureum vergente, in cujus medio oculi siti sunt. Palea, sub gutture pendula, in collo inferiore ad sesquidigiti longitudinem protenditur: splendide rubet, rarisque pilis nigris obsita est. Carunculâ in fronte caret. In vertice pennæ extant nigræ, longiores: Avis autem eas in cristam erigere potest. (Quædam hujus speciei cristâ omnino destituuntur: fortasse hæc sunt

Tome I,

Il est un peu plus gros qu'une Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds six pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a environ deux pouces de long; sa queue un pied; son pied trois pouces trois lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne passent guères l'origine de la queue. Les côtés de la tête ou les joues sont couvertes d'une peau nue, d'un bleu tirant sur le pourpre, au milieu de laquelle sont placés les yeux. La membrane charnue qu'il a sous la gorge, s'étend le long de la partie inférieure du col l'espace d'un pouce six lignes: elle est d'un très-beau rouge, clair semée de poils noirs. Il n'a point de caroncule sur le front. Le sommet de la tête est couvert de plumes noires assez longues, que l'Oiseau peut élever en forme de hupe. (Quelques-uns

Z

n'ont aucune apparence de huppe : ce sont peut-être des femelles). Tout le corps paroît au premier coup d'œil couvert de plumes noires mêlées d'un peu de brun : mais si l'on y regarde de plus près & dans certains jours , le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue jettent un éclat de couleur de *cuivre*. Les couvertures des aîles ont un lustre de verd & de violet ; & les plumes des aîles tirent vers la couleur de pourpre. La partie inférieure du col , la poitrine & le ventre sont variés de petites taches blanches. Les jambes , les couvertures du dessous de la queue & les plumes de la queue sont d'un noir mêlé d'un peu de brun. L'Iris des yeux est d'un orangé terni. Le bec & les ongles sont noirs : & les pieds d'un rouge éclatant. On le trouve au *Brésil*.

III.

Le genre du Coq.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts dénués de membranes ; trois devant , un derrière ; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

foeminae). Primo aspectu pennis nigris , quibus aliquid fusci admixtum est , in univ-
ersum corpus vestita videtur hæc Avis ; si verò attentius inspectetur , & pro vario quo lucis radii incidunt modo , dorsum , uropygium & caudæ tectrices superiores *cupri puri* colorem æmulantur. Alarum tectrices ad viride & violaceum vergunt : remiges autem ad purpureum inclinant colorem. Colli pars inferior , pectus & venter maculis albis variegantur. Crura , caudæ tectrices inferiores , rectricesque nigræ , cum aliqua fusci mixtura. Oculorum irides sordidè aurantiæ. Rostrum , unguesque nigri : pedes splendide rubri. Habitat in *Brasilia*.

III.

Genus Gallinaceum.

Hujus character est
Digiti quatuor , membranis destituti ; tres scilicet antici , posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :



Desiné et Gravé par Martinet.

Dindon.

Rostrum conico-incurvum : Le bec en cone courbé :
 Paleæ binæ longitudinales, Deux membranes charnues,
 sub gutture pendulæ : longitudinales, pendantes
 sous la gorge :
 Crista membranacea in fron- Une crête membraneuse sur le
 te. front.

Omnes hujus generis species non sunt veræ species, sed potius *Galli* & *Gallinæ domesticæ* varietates; omnes enim differentia, quibus alia ab aliis discrepant, quandoque in uno eodemque individuo simul coeunt. Attamen in sex species Gallos videmus; notæ enim, quibus inter se differunt, in pullos constanter reperiuntur, modò parentes cum nulla alia specie coitu juncti fuerint.

Cauda in hoc genere *Avium* singularem formam obtinet; quæ caudæ forma ad hoc genus ab omnibus aliis distinguendum omnino sufficeret, si omnes hujus species essent caudatæ: una autem prorsus caudâ caret. Cauda, quam gestant erectam, quatuordecim constat rectricibus, septem in uno latere septem in altero inclinatis, & ita dispositis ut inter se angulum acutum efforment: quæ rectricum directio hujus generis *Avibus* peculiaris est,

Toutes les especes de ce genre ne sont plutôt que des variétés du *Coq* & de la *Poule domestique*; puisque toutes les différences, qui les distinguent entr'elles, se trouvent quelquefois réunies dans le même individu. Cependant nous en ferons six especes; parce que les marques, qui les caractérisent, se trouvent constamment dans les petits, pourvû que les peres & meres n'ayent point été mêlés avec d'autres especes.

La queue dans ce genre d'Oiseaux est d'une forme tout-à-fait singuliere; & ce seroit un caractere très-propre à le distinguer de tous les autres, s'il se trouvoit dans toutes les especes; mais il y en a une qui en est totalement privée. Cette queue, qu'elles portent droite, est composée de quatorze plumes, dont sept sont inclinées d'un côté & sept de l'autre, de façon qu'elles forment ensemble un angle très-aigu. Cette direction des plumes de la queue est particuliere aux Oiseaux de

ce genre, & ne convient à aucun autre connu. Ils ont les ailes courtes, & qui ne passent pas l'origine de la queue. Les mâles ont à chaque pied un ergot, qui devient quelquefois très-long & très-pointu.

& nulli alteri Avi notæ convenit. Alis donantur brevibus & caudæ exortum non excedentibus. Mares in utroque pede calcari donantur quandoque longissimo. & acutissimo.

**** I. LE COQ ET LA POULE.**

Gallus versicolor GALLUS DOMESTICUS. GALLINA DOMESTICA.

Gallus versicolor vulgaris. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIII. sp. 4.

Gallus caudâ compressâ ascendente. Faun. Suec. Linn. N°. 165.

Gallus caudâ erectâ, cristâ carneâ. Browne. nat. Hist. of Jamaica. pag. 470.

Gallus. Moehr. Avi. Gen. 49.

Euf. Nieremb. pag. 214.

Gallus Gallinaceus. Gesn. Avi. pag. 394. hujus icon non satis accuratæ pag. 395.

Jonst. Avi. pag. 49. maris & fæminæ icones satis accuratæ Tab. XXIX.

Charlet. Exer. pag. 84. N°. XVII.

Charlet. Onomazt. pag. 75. N°. XVII.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 68. sp. 1.

Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 432.

Gallus, vel Gallus Gallinaceus, & Gallinaceus. Gesn. icon. Avi. pag. 52, in qua icon non satis accurata.

Gallus Gallinaceus & Gallina. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 183.

Raj. Syn. Avi. pag. 182. N°. 15.

Gallus Gallinaceus & Gallina domestica. Willugh. Ornith. pag. 109. maris & fæminæ icones satis accuratæ Tab. XXVI.

Raj. Syn. Avi. pag. 51. N°. A. 1.

Sloane. Voy. of Jamaica. pag. 301. N°. XXI.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Gallus Gallinaceus; Ales lucis Martiali; Ales prænuntia lucis Ovidio.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 302.

Gallus domesticus. Schwenck. Avi. fil. pag. 264.

Alector. Klein. Avi. pag. 111. N°. 1.

Coc. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 242; avec une assez bonne figure pag. 243.

Coq; Gau; Geau; Gal; Gog. Bel. Portr. d'Ois. pag. 58 a, dans laquelle est la même figure.

Coq d'Hambourg. *Alb. Tom. III. pag. 13 ; avec une figure mal coloriée Pl. 32.*

Capus. *Gesn. Avi. pag. 427 , in qua icon satis accurata.*

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 343. hujus icon non satis accurata pag. 345.

Jonst. Avi. pag. 59. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 30 , sub titulo ,
Capo.

Schwenck. Avi. fil. pag. 276.

Capus ; Capo. *Gesn. icon. Avi. pag. 54 , in qua icon satis accurata.*

Capo. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.*

Gallus spado , seu Capo. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 302.*

Chapon. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 59 a , où il y a une assez bonne figure.*

Gallina. *Gesn. Avi. pag. 430 , in qua icon satis accurata.*

Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 200.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 303.

Gallina ; Gallina villatica , vel villaris. *Gesn. icon. Avi. pag. 53 , in qua eadem icon.*

Gallina villatica. *Schwenck. Avi. fil. pag. 266.*

Poule. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 245 , dans laquelle il y a une assez bonne figure.*

Geline ; Poule. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 58 b , dans laquelle est la même figure.*

Poule commune. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 266.*

Gallinarum pullus. *Schwenck. Avi. fil. pag. 275.*

Les François appellent le mâle COQ : lorsqu'il est châtré , CHAPON. La femelle , POULE : lorsqu'elle n'a pas encore pondu , GELINE : & le jeune , POULSIN : & lorsqu'il est un peu grand , POULET.

Les Hébreux , le mâle, SIKVI : & la femelle , SAKVIA. *Aldrov.*

Les Chaldéens , le mâle , TARNEGUE : & la femelle , TARNEGULA. *Gesn. Aldrov.*

Les Syriens , TARNAGOLA. *Aldrov.*

Les Sarrafins , le mâle , DIC : & la femelle , TERFESE. *Gesn. Aldrov.*

Les Grecs , le mâle , Αλέκτορ. *Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet. Schwenck. Αλεκτρων. Bel. Aldrov. Jonst. Willugh. Schwenck. Βριτός ; Κίμψος ;*

Κοκκοβόας ὄρνις ; Κόρυβαν ; Κόττος ; Κροκίας ; Κοτίκας μηδικός ; Ολοφωτος ;

Ὀρλοβόας ; Ὀρλάλικος ; Πέρσικος ὄρνις ; Σέρκος ; Σέλικος ; Ωΐδος ὄρνις. Jonst.

Κορκορα ὄρνις. Aldrov. Lorsqu'il est châtré , Αλεκτρων ἐκτομικς. Schwenck.

La femelle , Αλεκτορίς. Bel. Aldrov. Schwenck. Α'λεκτόριδα ; Α'λεκτρίωναι ;

Κίκαν ; Ὀρλάλιδα. Jonst. Ὀρνις ὄρλιαις. Schwenck. Et les jeunes , Α'λεκτορο-

πouλα ; Ὀρνιδοπouλα ; Νεοσσοὶ ὄρνιδες. Schwenck. Νέοσσοι ν'ιρακίς ἱπποί ;

Νεοτίδες ὄρλααχοί. Jonst.

Les Abissins , les mâles , lorsqu'ils sont châtrés , AROAZES. *Aldrov.*

Les Espagnols , le mâle , GALLO. Et la femelle , GALLINA. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans , GALL. *Barr.*

Les Italiens , le mâle , GALLO. Lorsqu'il est châtré , CAPPON ; CAPPONE.

- La femelle*, GALLINA. *Bel. Gefn. Aldrov. Et le jeune*, PULCINO; POLLO; POLLASTRO. *Aldrov.*
- Les Savoyards*, le mâle, COQ; GAU; GEAU; COG. *Et la femelle*, POULE; GELINE; GELINETTE. *Aldrov.*
- Les Allemands*, le mâle, HAN; HAUSS-HAN. *Gefn. Aldrov. Schwenck. HAHN. Rzac. GUL; GUGGEL. Lorsqu'il est châtré*, KAPPUN; KAPPAUN. *Gefn. Aldrov. KAPUN. Schwenck. KAPHAN. La femelle*, HUN. *Gefn. Aldrov. Schwenck. HENN. Gefn. Aldrov. HENNE. Et le jeune*, HEUNLIN; JUNGE-HEUNLIN; JUNG-HAENLIN; KEUCHLIN. *Schwenck. HUNCKEL; HUOLNE. Aldrov.*
- Les Illyriens*, KOKOT. *Gefn.*
- Les Polonois*, le mâle, KUR; KOGUT. *Lorsqu'il est châtré*, KAPLUN. *Et la femelle*, KURA; KOKOSZ. *Rzac.*
- Les Hollandois*, le jeune, KUIJCKEN. *Aldrov.*
- Les Flamands*, le jeune, KIJCKEN. *Aldrov.*
- Les Suédois*, le mâle, HENS; TUPP. *Et la femelle*, HENA. *Linn.*
- Les Anglois*, le mâle, COK. *Gefn. Aldrov. DUNGHILL-COCK. Willugh. Raj. Sloane. Browne. HOUSE-COCK, ou ROOST-COCK. Charlet. Lorsqu'il est châtré*, CAPON. *La femelle*, HEN. *Gefn. Aldrov. DUNGHILL-HEN. Willugh. Raj. Sloane. Et le jeune*, CHUJK. *Aldrov.*

Cet Oiseau est par-tout si connu, qu'il est inutile de le décrire. Il y en a de beaucoup plus grands les uns que les autres. Nous n'en connoissons point qui varient autant en couleur : les leurs sont très-vives, sur-tout dans les mâles. Ils portent sur le front une crête membraneuse, dentelée comme une scie, & deux membranes charnues, pendantes sous la gorge. Au-dessous des oreilles il y a une peau nue, d'un très-beau blanc.

Le mâle diffère de la femelle par les deux plumes du milieu de la queue, qui sont très-longues & courbées en arc, par les plumes du col & du croupion, qui sont longues & étroi-

Adeo omnibus in terris nota & familiaris est hæc Avis, ut ei curiosius describendæ diù insistere omnino supervacaneum foret. Aliæ aliis sunt majores. Plurimum colore variant, & splendidissimis coloribus ornantur, præcipuè mares. Cristam membranaceam, serratam in fronte gestant, & paleas binas sub gutture dependentes. Infra aures cutis est nuda candidissima.

Mas à fœmina distinguitur rectricibus duabus intermediis longissimis & arcuatis, colli & uropygii pennis longissimis & strictioribus, & calcaribus quibus in pe-

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre II.* 169

dibus donatur, dum iis *fœmina* prorsus caret. *Ex museo Realmuriano.*

tes, & par les ergots qu'il a aux pieds, tandis que la *femelle* en est tout-à-fait dépourvue. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Hujus speciei varietates sunt Les variétés de cette espece sont

** A. LE COQ HUPÉ ET LA POULE HUPÉE

Gallus cristatus. Gallina cristata.

Gallus caudâ compressâ ascendente. Faun. Suec. Linn. N°. 165. (1 varietas).

Gallus Gallinaceus, cristâ in vertice plumosâ densissimâ, & undequaque diffusâ. Raj. Syn. Avi. pag. 51. N°. A. 1.

Gallina alba cristata. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 307, in qua icon satis accurata.

Gallina villatica alba cristata. Willugh Ornith. pag. 110.

Les Suédois l'appellent TOFS HENS. Linn.

In omnibus cum aliis conveniunt, præterquam quod habeant in vertice pennas longiores, quæ cristam plumosam efformant. *Ex museo Realmuriano.*

Ils ne diffèrent du *Coq* & de la *Poule* ordinaire qu'en ce que les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres, & forment une hupe. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** B. LE COQ ET LA POULE A CINQ DOIGTS.

Gallus & Gallina penthadactylos.

Gallus domesticus. Frisch. maris icon accurata Tab. 127.

Gallina domestica. Frisch. fœminæ icon accurata Tab. 128.

Pullicenus quinque digitis in utroque pede. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 545, in qua hujus icon minus accurata.

Les Allemands appellent le mâle HAUS HAHN ; & la femelle HAUS HENNE. Frisch.

Ab aliis differunt numero digitorum, qui sunt quinque in utroque pede, tres scilicet antici, postici bini ; quod

Ceux-ci diffèrent des autres par le nombre de leurs doigts. Ils en ont cinq à chaque pied, sçavoir trois devant & deux der-

riere. C'est une espece de monstruosité. *Du cabinet de M. de Reaumur.* quodammodo monstruosum est. *Ex museo Realmuriano.*

**** C. LE COQ ET LA POULE DE PADOUE.**

Gallus Patavinus. Gallina Patavina.

Gallus Patavinus & Gallina Patavina. Aldrov. Avi. Tom. II. icones satis accuratæ, maris pag. 310, & feminae pag. 311. Jonst. Avi. pag. 57. maris & feminae icones ab Aldrovando mutuatae Tab. XXIX.

Willugh. Ornith. pag. 110.

Gallus major exoticus. Schwenck. Avi. fil. pag. 266.

Gallus cristatus. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIII. sp. 1.

Les Catalans l'appellent GALL DE MONACO; GALL CAPARUT. Barr.

Les Allemands, GROSSER WELSCHER-HAN; PADUANISCHER-HAN. Schwenck.

Cette variété a presque le double de grandeur & de grosseur de nos *Cogs & Poules* ordinaires : d'ailleurs elle leur ressemble en tout. C'est celle que nous appelons *Poule de Caux*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Magnitudine ab aliis distinguuntur; *Gallis* enim & *Gallinis* vulgaribus sunt duplò ferè majores. Hæ sunt quas *Poules de Caux* vocamus. *Ex museo Realmuriano.*

**** D. LE COQ ET LA POULE DE TURQUIE.**

Gallus Turcicus. Gallina Turcica.

Gallus Turcicus & Gallina Turcica. Aldrov. Avi. Tom. II. icones satis accuratæ, maris pag. 314, & feminae pag. 315 & 316.

Jonst. Avi. pag. 57. maris & feminae icones ab Aldrovando mutuatae Tab. 30.

Willugh. Ornith. pag. 110.

Ils ne diffèrent des nôtres que par la variété & la beauté de leur plumage. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Colorum varietate & pulchritudine præcipuè à nostratibus differunt. *Ex museo Realmuriano.*

**** E.**

**** E. LE COQ ET LA POULE D'ANGLETERRE.**

Gallus Anglicanus. Gallina Anglicana.

Gallus Anglicanus. Frisch. maris icon accurata Tab. 129.

Gallina Anglicana. Frisch. feminae icon accurata Tab. 130.

Les Allemands appellent le mâle ENGLISCHE HAHN ; & la femelle ENGLISCHE HENNE. Frisch.

Crassitie nostrates non antecellunt, verum altitudine superant ; cruribus enim & pedibus donantur quàm in aliis multò longioribus. In cæteris cum nostratibus conveniunt. *Ex museo Realmuriano.* Ils ne sont pas plus gros que les nôtres, mais ils sont plus haut montés : leurs jambes & leurs pieds sont beaucoup plus longs. Du reste ils ressemblent parfaitement aux nôtres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**** 2. LE COQ NAIN ET LA POULE NAIN.**

Gallus pedibus brevissimis GALLUS ET GALLINA PUMILIO.

Gallus Gallinaceus pumilio. Raj. Syn. Avi. pag. 51. N°. A. I.

Gallus pumilio. Frisch. maris icon accurata Tab. 133.

Gallina pumilio. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 309, in qua icon accurata.

Willugh. Ornith. pag. 110, hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.

XXVI.

Gallina pumilio, seu nana. Jonst. Avi. pag. 57. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.

Gallina pumila. Frisch. feminae icon accurata Tab. 134.

Les Allemands appellent le mâle KRUP HAHN ; & la femelle KRUP HUHN. Frisch.

Les Anglois, le mâle, CREEPER. Raj. & la femelle, DWARF-HEN. Willugh.

Gallis & Gallinis vulgaribus sunt similes : crassitie & colorum varietate cum iis conveniunt : sed cruribus donantur brevissimis ; unde Pumilionis nomen. Ex museo Realmuriano. Cette espece est tout-à-fait semblable aux Coqs & Poules ordinaires. Elle est de la même grosseur & varie de même en couleur : mais elle a les jambes très-courtes ; c'est ce qui lui a fait donner son nom. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Les variétés de cette espece
sont

Hujus speciei varietates
sunt

**** A. LE COQ PATU ET LA POULE PATUE.**

Gallus & Gallina plumipes.

Gallus & Gallina pedibus pennatis. *Aldrov. Avi. Tom. II. icones satis accuratæ, maris pag. 312, & femina pag. 313.*

Gallus & Gallina pedibus hirsutis & pennatis. *Willugh. Ornith. pag. 110.*

Gallus plumipes, capite magno globofo. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIII. sp. 5.*

Gallus. *Jonst. Avi. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.*

Gallus minor. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 136.*

Gallina minor. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 137.*

Les Catalans l'appellent GALL DELS PEUS GUARNITS DE PLUMES. *Barr.*

Les Allemands appellent le mâle KLEINE HAHN MIT RAUCHEN FUSSEN;
& la femelle, KLEINE HUHN MIT RAUCHEN FUSSEN. *Frisch.*

Ceux-ci ressemblent en tout
au précédent: ils en diffèrent
seulement en ce qu'ils ont les
pieds couverts de plumes jus-
qu'à l'origine des doigts. Du
cabinet de M. de Reaumur.

Præcedentem in omnibus
æmulantur: ab eo tantum
discrepant in eo quod pedes
habeant ad digitos usque
plumosos. *Ex museo Real-
muriano.*

**** B. LE COQ ET LA POULE DE BANTAM.**

Gallus Banticus. Gallina Bantica.

Gallus minor Banticus. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 471.*

Gallus parvulus. *Bont. Ind. Ori. pag. 65.*

Coq de Bantam. *Alb. Tom. III. pag. 14; avec une figure mal coloriée,
Pl. 33.*

Femelle du Coq de Bantam. *Alb. Tom. III. pag. 14; avec une figure
mal coloriée Pl. 34.*

Les Anglois appellent le mâle BANTAM-COCK; & la femelle, BANTAM-
HEN. *Alb.*

Cette variété est semblable
à la précédente: comme elle,
elle a les pieds couverts de plu-
mes jusqu'à l'origine des doigts;

Hæc varietas præcedenti
similis est: ut illa, pedes
habet ad digitos usque plu-
mosos, sed in latere exte-

riore tantum. Ab ea etiam differt pennis crurum longissimis & ultra calcaneos multum extensis. Mas audacissimus est, & libenter praelium committit contra Gallos etiamsi se ipso duplò majores. *Ex museo Realmuriano.*

mais du côté extérieur seulement. Elle en diffère aussi en ce que les plumes de ses jambes sont très-longues & passent de beaucoup les talons. Le mâle est courageux & hardi : il se bat volontiers contre d'autres Coqs, fussent-ils même deux fois plus grands que lui. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**** 3. LE COQ FRISÉ ET LA POULE FRISÉE.**

Voyez le mâle Pl. XVII. Fig. 1.

Gallus pennis sursum reflexis GALLUS CRISPUS.
GALLINA CRISPA.

Gallus caudâ compressâ ascendente. *Faun. Suec. Linn. N°. 165. (3 varietas).*

Gallus Gallinaceus crispus. *Raj. Syn. Avi. pag. 51. N°. A. 1.*

Gallus plumis crispis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIII. sp. 2.*

Gallus monstruosus. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 329, in qua icon non satis accurata.*

Gallina pennis reflexis. *Frisch, hujus icon accurata Tab. 135.*

Gallina Frislandica. *Willugh. Ornith. pag. 110.*

Gallina lanigera vel lanata. *Gesn. Avi. pag. 483, in qua icon pessima.*

Gallina lanigera. *Gesn. icon Avi. pag. 54, in qua eadem icon.*

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 339, in qua icon à Gesnero mutuata.

Jonst. Avi. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 30.

Gallina lanigera Indica. *Schwenck. Avi. fil. pag. 269.*

Les Allemands appellent la femelle STRAUBIGE-HENNE. *Frisch. TEURCKISCHE-HENNE; WOLLECHTE-HENNE. Schwenck.*

Les Suédois, la femelle, KROLL-HENA. *Linn.*

In omnibus cum nostratibus conveniunt, præterquam quod pennas habeant per totum corpus sursum reflexas & quasi crispas. *Ex museo Realmuriano.*

Cette espece a toutes ses plumes retournées en en-haut & comme frisées : c'est la seule chose qui la distingue des autres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 4. LE COQ ET LA POULE NEGRE, OU DE MOZAMBIC.

Gallus cristâ & paleis nigris GALLUS MOZAMBI-
CANUS. GALLINA MOZAMBICANA.

Gallus & Gallina carne nigrâ. *Bont. Ind. Ori. pag. 65.*

Mozambicana Gallina. *Euf. Nieremb. pag. 214.*

Willugh. Ornith. pag. 298.

Celle-ci diffère des autres non-seulement par la couleur de ses plumes, qui sont presque toujours noires, mais encore parce que la crête, les membranes charnues qu'elle a sous la gorge, l'épiderme & le périoste sont tellement noirs, que lorsqu'elle est cuite, il semble qu'on l'ait fait bouillir dans de l'encre. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Ab aliis discrepat hæc species non solum colore penarum, quæ ferè in omnibus nigræ sunt, sed quia in illa cristâ, palææ, epiderma & periosteum nigro colore imbuuntur, ita ut cocta in atramento elixa putetur. *Ex museo Realmuriano.*

** 5. LE COQ ET LA POULE SANS CROUPION,
OU DE PERSE.

Gallus uropygio carens GALLUS PERSICUS. GALLINA
PERSICA.

Gallus caudâ compressâ ascendente. *Faun. Suec. Linn. N°. 165. (2 varietas).*

Gallus non caudatus. *Frisch. maris icon accurata Tab. 131.*

Gallus Gallinaceus, caudâ seu uropygio carens. *Raj. Syn. Avi. pag. 51.*

N°. A. 1.

Gallus reetricibus carens. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 471.*

Gallus duplici cristâ, coronam referente. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIII. sp. 3.*

Gallus & Gallina ex Persia. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 318. icones non satis accuratæ, maris pag. 317, & femina pag. 318.*

Gallus Persicus & Gallina Persica. *Jonst. Avi. pag. 58. maris & femina icones ab Aldrovando mutuata Tab. 30.*

Willugh. Ornith. pag. 110. maris icon ab Aldroyando mutuata Tab. XXVI.

Gallina non caudata. Frisch. femina icon accurata Tab. 132.

Les Allemands appellent le mâle KLUT-HAHN; & la femelle, KLUT-HENNE. Frisch.

Les Suédois, GUMP-HËNS. Linn.

Les Anglois, RUMKIN. Willugh. Raj.

In omnibus cum nostratibus conveniunt, magnitudine, crassitie & colorum varietate; sed uropygio & rectricibus prorsus carent. *Ex museo Realmuriano.*

Cette espece ressemble aux autres par sa grandeur, sa grosseur & la variété de ses couleurs; mais elle n'a point du tout de croupion, & conséquemment point de queue. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**** 6. LE COQ ET LA POULE DU JAPON.**

Voyez la femelle Pl. XVII. Fig. 2.

Gallus pennis pilorum æmulis GALLUS JAPONICUS.
GALLINA JAPONICA.

Magnitudo circiter eadem cum nostratibus, sicut & crassities. Pennis in toto corpore vestiuntur albis, sed singularibus; pinnulæ enim scapo affixæ nullo modo inter se connectuntur, sed sunt disjunctæ & pilorum æmulæ. Pedes sunt ad digitos usque plumosi in latere exteriori tantum: digitus quoque trium anticorum extimus ad unguem usque plumosus. *Ex museo Realmuriano.*

de même couvert de plumes jusqu'à l'ongle. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Ils sont à peu près de la même grandeur & même grosseur que nos *Coqs* & *Poules* ordinaires. Ils sont couverts par tout le corps de plumes blanches, mais très-singulieres; car leurs barbes ne sont point jointes ensemble, comme dans les plumes ordinaires, mais elles sont séparées & imitent assez bien des poils. Leurs pieds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine des doigts du côté extérieur seulement: & le doigt extérieur de ceux de devant est

*Le genre de la Peintade.**Genus Meleagridis.*

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts dénués de mem-
branes; trois devant, un der-
rière; tous séparés environ
jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plu-
mes jusqu'au talon :

Le bec en cône courbé :

Deux membranes charnues ,
longitudinales, pendantes à
côté de l'ouverture du bec :

Une corne conique sur le front.

Hujus character est
Digiti quatuor, membran-
is destituti; tres scilicet an-
tici, posticus unus; om-
nes circiter usque ad exor-
tum discreti :

Crura ad calcaneum usque
plumosa :

Rostrum conico-incurvum :

Palaë binae longitudinales ,
prope rictum oris, utrin-
que una, pendulae :

Cornu conicum in fronte.

Les Oiseaux de ce genre
n'ont point d'ergots.

Calcaribus carent hujus
generis Alites.

** I. LA PEINTADE.

Voyez Pl. VIII.

Meleagris niger, cinereo supra nigrum in parte corporis su-
periore sparso, maculis orbiculatis albis varia; marginibus
exterioribus remigum albo transversim striatis
MELEAGRIS.

Meleagris. Gefn. Avi. pag. 478.

Moehr. Avi. Gen. 48.


Meleagris, vel *Gallus Numidicus*, aut *Mauritanus sylvestris. Gefn. Avi.*
pag. 480, in qua hujus icon satis accurata.

Meleagris; Gallus Numidicus vel Mauritanus sylvestris. Gefn. icon.
Avi. pag. 61, in qua eadem icon.

Gallus vertice corneo. Linn. systh. nat. ed. 6. Gen. 68. sp. 2.

Gallus niger, maculis ovalibus & orbiculatis. Barr. Ornith. Class. IV.
Gen. XIII. sp. 6.

Gallus clamosus maculis minoribus orbiculatis varius, cristâ corneâ,



Desiné et Gravé par Martinet.

1. Coq frisé.

2. Poule du Japon.

caudâ horizontali. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 470.*

Gallus & Gallina Guineensis. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 302. N°. XXIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 52. N°. 8.

Gallina Guinea. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 336. hujus icon non satis accurata pag. 337.*

Jonst. Avi. pag. 58. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 30. & rursus icon minimè accurata Tab. XXIV, sub titulo, Gallina Africana.

Willugh. Ornith. pag. 115. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI.

Gallina Guinea; veterum Meleagris. *Raj. Syn. Avi. pag. 182. N°. 17.*

Gallina Guineæ Aldrovando; quibusdam Numidica Gallina, & Meleagris; Perdix Terræ Novæ. *Mus. Worm. pag. 297, in qua icon à Marcgravio mutuata.*

Gallina Africana. *Marcgr. Hist. Br. pag. 192, in qua icon minùs accurata.*

Jonst. Avi. pag. 131. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.

Willugh. Ornith. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXVII.

Gallina Africana, sive Numidica. *Gesn. Avi. pag. 481.*

Frisch. hujus icon accurata Tab. 126.

Gallina Africana, sive Guineensis. *Charlet. Exer. pag. 83. N°. XIII.*

Charlet. Onomazt. pag. 75. N°. XIII.

Gallina Africana Jonstoni. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 130.*

Gallina peregrina. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 201.*

Alector Guineensis. *Klein. Avi. pag. 111. N°. 2.*

Quetele. *Pison. Hist. nat. pag. 92, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Afra Avis Horatio. *Gesn.*

Peintade. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 79; avec une figure exacte Pl. 47.*

Poule Pintade. *Des March. Tom. III. pag. 323.*

Poule de la Guinée. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 246; avec une figure peu exacte pag. 247.*

Poule de la Guinée; Perdrix des Terres Neufves. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 59 b, dans laquelle est la même figure.*

Knorhaan. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 169; avec la figure de Marcgrave pag. 172. N°. 2.*

Les Grecs l'appellent Μελανίς. *Gesn.*

Les François de la Guiane, POULE PINTADE. *Barr.*

Les Italiens, GALLINA DI NUMIDIA. *Bel.*

Les Allemands, FREMEUDER WILDER HAN USS AFRICA, ODER BARBARIJEN; KEUR-HENN. *Gesn. PERT HUH. Frisch.*

Les Anglois, GUINY-HEN. Willugh. Raj. Charlt. GUINEA-HEN. Browne.

PINTADO. Raj.

Les Congois, QUETELE. Marcgr. Pison. Jonst.

Elle est à peu près de la grosseur d'une Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue cinq pouces neuf lignes; son pied deux pouces neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière n'a qu'onze lignes de long. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à un pouce au-delà de l'origine de la queue. La tête est dénuée de plumes: quelques-unes ont seulement au-dessus de l'origine du bec un petit bouquet composé de poils roides, longs de quatre lignes & assez ressemblans aux foyes de Cochon. Les joues sont bleuâtres dans le mâle, & rouges dans la femelle. L'espece de corne conique, qui est sur le front, est un peu courbée en arrière, & couverte d'une peau d'un fauve-brun, ou rougeâtre. Les membranes charnues qui

Gallinam crassitie circiter adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem & pollices decem. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum; cauda quinque pollices cum novem lineis; pes duos pollices & novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus undecim linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum ad unius pollicis distantiam extenduntur. Caput pennis destituitur: quædam tamen supra rostri exortum tantum fasciculo donantur pilis constante rigidis, quatuor lineas longis, & setarum Porcinarum æmulis. Genæ in mare cœrulescunt, in fœmina rubent. Cornu conicum, in fronte situm, paululum retrorsum incurvatur. Cutis fulvo-fusca aut rubescens illud

lud cooperit. Paleæ prope
riſtum oris utrinque pendu-
læ, pulcherrimo rubore tin-
guntur. Colli pars ſuprema
pennis veſtitur nigris, rariſ-
ſimis, pilorum æmulis, in
parte colli ſuperiore ſurſum
& verſus caput tendentibus.
Colli pars infima ex cinereo
ad violaceum inclinat. Dor-
ſum, uropygium, pennæ
caudam ſuperne tegentes,
alarumque teſtrices ex ni-
gro, albo & cinereo varie-
gantur; ita ut quæque penna
ſit in fundo nigra, maculis
varia orbiculatis, albis, or-
dinatim poſitis, quarum am-
bitus niger, abſque ulla al-
terius coloris mixtura, reli-
quo fundo perpulchrè cine-
reo variegato. Maculæ albæ
in dorſo minores. Pectus,
venter, latera, crura & cau-
dæ teſtrices inferiores ni-
græ, maculis orbiculatis,
albis, quàm in dorſo majo-
ribus, variæ, nullo ſupra
nigrum cinereo admixto. Re-
miges majores nigricantes,
maculis albis variæ: mino-
res dorſo concolores; mar-
ginibus omnium remigum
exterioribus albo tranſver-
ſim ſtriat. Rectrices cine-
reæ, maculis orbiculatis,
albis, nigro circumdatis va-
riæ. Cauda, ut in *Perdici-*

pendent à côté de l'ouverture
du bec, ſont d'un très-beau rou-
ge. Le haut du col eſt couvert
de plumes noires, reſſemblantes
à des poils, & très-clair ſe-
mées. La direction de ces poils
à la partie ſupérieure du col eſt
vers la tête. Le bas du col eſt
d'un cendré tirant ſur le violet.
Le dos, le croupion, les cou-
vertures des aîles & celles du
deſſus de la queue ſont variées
de noir, de blanc & de cendré,
de façon que le fond eſt noir,
parſémé de petites taches ron-
des, blanches, poſées en ſimmé-
trie. Le tour de chacune de ces
taches eſt noir & ſans mélange;
& le reſte du fond eſt joliment
ſémé de cendré. Ces taches ſont
plus petites ſur le dos qu'ailleurs.
La poitrine, le ventre, les cô-
tés, les jambes & les couver-
tures du deſſous de la queue
ſont noires & variées de taches
rondes, blanches, plus grandes
que celles du dos. Il n'y a ſur
le noir aucun mélange de cen-
dré. Les grandes plumes des
aîles ſont noirâtres, variées de
taches blanches: les moyennes
ſont de la couleur du dos; mais
toutes ont leur bord extérieur
rayé tranſverſalement de blanc.
Les plumes de la queue ſont
cendrées, variées de taches ron-
des, blanches, entourées de noir.
Sa queue eſt arrondie comme

celle des *Perdrix* ; & elle la porte, comme elles, un peu panchée vers le bas. Le bec est rouge à son origine, & couleur de corne vers le bout. Les pieds & les ongles sont gris-bruns.

La femelle diffère du mâle par la couleur de ses joues, qui sont rouges, tandis que celles du mâle sont bleuâtres.

On la trouve en *Afrique* d'où elle a été portée en différens pays. Du cabinet de M. de Reaumur.

Une variété de cette espèce est

bus, rotundata; eamque, ut *Perdices*, gestat *Meleagris* paululum deorsum tendentem. Rostrum in exortu rubrum, apice corneum. Pedes & ungues griseo-fusci.

Fœmina à mare discrepat colore genarum, quæ rubræ sunt, genis maris cœrulefcentibus.

Habitat in *Africa*, unde in varias regiones advecta fuit. Ex museo *Realmuriano*.

Hujus speciei varietas est

A. LA PEINTADE A POITRINE BLANCHE.

Meleagris pectore albo.

Gallus clamorosus, maculis minoribus orbiculatis variis, cristâ corneâ, caudâ horizontali, pectore albo. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 470.*

Poule de Guinée. *Alb. Tom. II. pag. 24*; avec une figure pas assez exacte *Pl. 35.*

Les Anglois l'appellent GUINY-HEN. *Alb.*

Les Anglois de la Jamaïque, WHITE-BREADED GUINEA-HEN. *Browne.*

Elle diffère de la précédente en ce qu'elle a la poitrine blanche, variée de quelques grandes taches noires, dans lesquelles sont de petites taches blanches. Les quatre premières plumes de l'aile, ainsi que ses quatre plus grandes couvertures les plus éloignées du corps, sont aussi blanches. On la trouve à la Jamaïque.

A præcedente differt in eo quod pectore donetur albo, maculis majusculis nigris, minimis maculis albis variatis, vario. Primores quatuor remiges, sicut & quatuor alarum testrices majores à corpore remotiores, in hac quoque albescent. Habitat in *Jamaica*.



SECTIO II.

SECTION II.

Ea quæ capite donantur paleis destituto.

Ceux qui ont la tête dénuée de membranes charnues.

TRia in illa sectione continentur genera Avium, pedibus & caudâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim pedibus donantur plumosis, ut *Lagopus* : aliæ pedibus nudis ; inter quas aliæ caudam habent brevem, ut *Perdix* ; aliæ caudam longam, ut *Phasianus*.

Omnes hujus sectionis Alites sunt *sylvestres*.

V.

Genus Lagopodis.

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum conico-incurvum :

Caput paleis destitutum :

Pedes plumosi.

Calcaribus carent hujus generis Aves.

Cette section contient trois genres d'Oiseaux, dont les caractères sont tirés des pieds & de la queue. Les uns ont les pieds couverts de plumes, comme la *Gelinote* : & les autres ont les pieds nus. Parmi ces derniers les uns ont la queue courte, comme la *Perdrix* : & les autres ont la queue longue, comme le *Faisan*.

Tous les Oiseaux de cette section sont *sauvages*.

V.

Le genre de la Gelinote.

Son caractère est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derrière ; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec en cône courbé :

La tête dénuée de membranes charnues :

Les pieds couverts de plumes.

Les Oiseaux de ce genre n'ont point d'ergots.

Bbij

** I. LE COQ-DE-BRUYERES.

Lagopus superne ex cinereo & nigricante transversim striata (mas), rufo, nigro & cinereo varia (fœmina); maculâ in scapulis albâ; remigibus minoribus fuscis, exterius & apice fusco & rufescente variis *UROGALLUS MAJOR*.

Lagopus maximus. Klein. *Avi.* pag. 115. N°. 1.

Urogallus. Gesn. *Avi.* pag. 490. maris icon minùs accurata pag. 491.

Linn. *Systh. nat.* ed. 6. Gen. 70. sp. 1.

Urogallus simpliciter, vel *Urogallus major*. Gesn. icon. *Avi.* pag. 58, in qua eadem icon.

Urogallus, seu *Tetrao*. Aldrov. *Avi.* Tom. II. pag. 59. icones non satis accuratæ, maris pag. 64, & fœminæ pag. 65.

Urogallus; *Tetrao major Aldrovandi*. Willugh. *Ornith.* pag. 123. maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab. XXX.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16. maris icon pessima Tab. 18, & fœminæ icon minimè accurata Tab. 14, sub titulo, *Capriculca*.

Urogallus, seu *Tetrao major Aldrovandi*. Raj. *Syn. Avi.* pag. 53. N°. A. 1.

Urogallus major. Jonst. *Avi.* pag. 40. maris icon à Gesnero mutuata Tab. XXV. & insuper maris icon ab Aldrovando mutuata eâdem Tab. sub titulo, *Urogallus*, seu *Tetrao alius*.

Schwenck. *Avi. Sil.* pag. 369.

Urogallus major; *Tetrao Plinii*, *Gallus Alpinus* & *Urogen dictus*. Charlet. *Exer.* pag. 81. N°. IV.

Charlet. *Onomazt.* pag. 73. N°. IV.

Urogallus major, seu *Tetrao major Gesneri*; *Erythrotæ Plinii*; *Gallus montanus*; *Gallus sylvestris*; *Gallus Alpinus*. Rzac. *Auct. Hist. nat. Pol.* pag. 427.

Urogallus, seu *Gallus montanus*; *Gallus sylvestris Aldrovando* & *Gesnero*; *Tetrao Plinii*; *Gallus Alpinus aliis*. Rzac. *Hist. nat. Pol.* pag. 297.

Tetrao rectricibus exterioribus subrevioribus, alarum basi albâ maculâ. Faun. Suec. Linn. N°. 166.

Tetrao. Bell. *Obs.* pag. 17.

Euf. Nieremb. pag. 235, in qua maris icon à Gesnero mutuata.

Tetrao, sive *Urogallus*. Frisch. maris icon accurata Tab. 107. & insuper capitis & pedis icones accuratæ Tab. 108.

Tetrix Aristotelis. Jonst. Charlet.

Perdix longicauda, *lagopus*, *nigricans*, *maculis cinereis*. Barr. *Ornith. Classe IV. Gen. XV. sp. 7.*

- Coq de bois , ou Faisan bruyant. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 249 ; avec une figure peu exacte du mâle , pag. 250.*
- Coq de bois ; Faisan bruyant. *Bel. portr. d'Ois. pag. 60 b , dans laquelle est la même figure.*
- Coq & Poule noire des montagnes de Moscovie. *Alb. Tom. II. pag. 22 ; avec des figures mal coloriées , du mâle Pl. 29 , & de la femelle Pl. 30.*
- Grygallus. *Charlet. Exer. pag. 81. N°. V. (fœmina).*
Charlet. Onomazt. pag. 73. N°. V. (fœmina).
- Grygallus major. *Gesn. Avi. pag. 495 , in qua fœminæ icon satis accurata.*
Gesn. icon. Avi. pag. 60 , in qua eadem icon.
Jonst. Avi. pag. 41. fœminæ icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXV.
- Tetrax Nemefiani Poetæ , seu Grygallus major. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 69. fœminæ icon satis accurata pag. 71.*
- Urogallina major. *Schwenck. Avi. fil. pag. 371.*
- Urogallina major Schwenckfeldii. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 428.*
- Les François appellent le mâle COQ DE LIMOGES.
- Les Auvergnacs , FAISAN BRUYANT. *Bel. Gesn.*
- Les Hébreux , DUKIPHAT. *Aldrov.*
- Les Grecs , le mâle , Ερωζόρας. *Bel. Τετριξ. Aldrov. Schwenck. & la femelle , Γρυόκρυξ. Schwenck.*
- Les Athéniens , Οΰραξ. *Aldrov. Schwenck.*
- Les Catalans , GALL SALVATGE. *Barr.*
- Les Italiens , GALLO CEDRONE. *Bel. Gesn. GALLO ALPESTRE ; FASAN NEGRO ; FASIANO ALPESTRE. Bel.*
- Les Vénitiens , GALLO DI MONTAGNA. *Willugh. Klein.*
- Les Vicentins , GALLO SALVATICO. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Grisons , STOLZO ; STOLGO ; STOLCO. *Gesn. Aldrov.*
- Les Trentins , CEDRON. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Savoyards , COQ DE BOIS. *Bel. Gesn.*
- Les Allemands , le mâle , OR-HAN ; AWER-HAN ; PIRCK-HUN ; GROSSER BERG-FASAN. *Gesn. Aldrov. OR-HUN. Willugh. UR-HAN. Gesn. Aldrov. Rzac. UR-HAHN. Rzac. OHR-HAN ; AVER-OCHSSE ; BERG-FASAN. Schwenck. AVER-HAN. Schwenck. Rzac. AVER-HAHN. Rzac. Frisch. & la femelle , GRUGEL-HAN. Gesn. Aldrov. Schwenck.*
- Les Silésiens , la femelle , AVER-HENNE. *Schwenck.*
- Les Illyriens , le mâle , TETRZEW. *Gesn. Aldrov. TETREZ. Aldrov.*
- Les Polonois , GLUSZEC. *Rzac.*
- Les Suédois , KJAEDER ; TJÆDER. *Linn.*
- Les Anglois , le mâle , COCK OF THE WOOD. *Raj. Charlet. Sibbald. COCK OF THE MOUNTAIN. Willugh. Raj. Charlet. MOUNTAIN-COCK ; & la femelle , MOUNTAIN-HEN. Alb.*

Pavonem crassitie circiter

Il est à peu près de la gros-
Bb iij

feur d'un *Paon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds quatre pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes de long; sa queue un pied; son pied deux pouces six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que treize lignes de longueur. Il a trois pieds dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne passent guères l'origine de la queue. La tête & le col, excepté le bas de sa partie inférieure, sont d'un cendré varié de très-petites rayes transversales noirâtres. La gorge est noire. Les plumes scapulaires & les couvertures des aîles sont rayées transversalement & en ziczacs de brun & de rouffâtre. Les longues plumes du dessous des épaules & les petites du dessus sont blanches, ce qui forme, lorsque l'aîle est pliée, une tache de cette couleur vers l'épaule. Le dos, le croupion & les petites couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement & en ziczacs de cendré & de noirâtre. Les

æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & novem pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes & quatuor pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & decem lineas longum est; cauda unum pedem; pes duos pollices cum sex lineis; & medius trium digitorum anticorum cum ungue tres pollices & tres lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem tredecim linearum longitudinem non excedit. Alis extensis, extremitates majorum remigum trium pedum & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ exortum non multum excedunt. Caput & collum, exceptâ colli inferioris infimâ parte, cinerascunt, lineisque minimis transversis nigricantibus variegantur. Guttur nigrum, Scapulares pennæ, alarumque testrices tæniis transversis, undulatis, fuscis & rufescentibus variæ. Longiores sub scapulis albæ, sicut & supra scapulas minimæ: alis verò complicatis, albæ hæ pennæ ad scapulas maculam ejusdem coloris grandiusculam efficiunt. Dorsum, uro-

pygium & caudæ testrices superiores minimæ taniis tranversis, undulatis, alternim cinereis & nigricantibus variegantur. Pennæ autem majores, caudam superne cooperientes, ex cinereo nigricant, apicibus albis. Harum maximæ caudam extremam ferè attingunt. Colli inferioris infima pars viridi *Anatino* perlustratur. Pectus, venter & latera ex fusco nigricant, & maculis quibusdam albis variegantur. Testrices caudæ inferiores sunt ex nigricante & albo variæ: crura fusca, cum aliqua albi mixtura. Pennæ fuscæ pedes vestiunt ad exortum usque digitorum in parte anteriore tantum, posteriori parte nudâ. Remiges majores fuscæ: minores concolores; attamen lateris exterioris maxima pars & apices fusco & rufescente undulatum variegantur. Sexdecim rectricibus nigris cauda constat. Supra oculos cutis est rubra seu minacea, peninis destituta. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum cinereo-album. Digiti fusci appendiculas utrinque squamosas obtinent. Ungues nigri. Et hæc est *maris* descriptio.

grandes couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré noirâtre, & terminées de blanc. Les plus grandes de ces dernières s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le bas de la partie inférieure du col est d'un verd lustré, pareil à celui du col d'un *Canard*. La poitrine, le ventre & les côtés sont d'un brun noirâtre, varié de quelques taches blanches. Les couvertures du dessous de la queue sont variées de noirâtre & de blanc. Les jambes sont brunes, variées aussi d'un peu de blanc. Les pieds sont couverts de plumes brunes jusqu'à l'origine des doigts dans la partie antérieure seulement; la partie postérieure est nue. Les grandes plumes de l'aile sont brunes: les moyennes sont de la même couleur; mais une grande partie de leur côté extérieur & leur bout sont variés en ziczacs de brun & de roussâtre. La queue est composée de seize plumes noires. Au-dessus des yeux est une peau d'un rouge vif & dénuée de plumes. L'iris des yeux est couleur de noisette. Le bec est gris-blanc. Les doigts sont bruns, & garnis de chaque côté de petits appendices écailleux. Les ongles sont noirs. C'est là la description du *mâle*.

La femelle est plus petite que lui dans toutes ses proportions. Elle en diffère aussi par sa couleur. La tête, le col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont variées de roux, de noir & de cendré. La gorge est rousse & sans taches. La poitrine est d'un roux pâle, rayé transversalement de lignes noires; & chaque plume est terminée de blanc. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue tirent plus sur le cendré. Les couvertures des ailes sont variées de brun, de roux & de blanc; & chaque plume est terminée de cette dernière couleur. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que celles du mâle. Celles de la queue sont rousses, rayées transversalement de noir. Le reste comme dans le mâle.

On les trouve sur les Alpes, en Allemagne, sur-tout en Westphalie & en Italie, d'où ils ont été envoyés à M. de Reaumur.

Fœmina ei magnitudine & crassitie cedit. Colore etiam ab illo discrepat. Caput, collum, dorsum, uropygium & caudam superne vestiunt pennæ ex rufo, nigro & cinereo variæ. Guttur rufum, nullis in eo maculis. Pectus pallidè rufescit, lineis transversis nigris striatum; apicibus pennarum albidis. Venter & caudæ tectrices inferiores magis ad cinereum inclinant. Alarum tectrices ex fusco, rufo & albo variegantur; quæque autem penna apice albet. Remiges remigibus maris concolores. Rectrices verò sunt rufæ, nigro transversim striatæ. Reliqua sicut in mare se habent.

Habitant in *Alpibus montibus*, in *Germania*, præsertim in *Westphalia* & in *Italia*, unde in *musæum Real-murianum* missi sunt.

** 2. LE COQ-DE-BRUYERES A QUEUE FOURCHUE.

Lagopus nigro-violacea (mas), rufa tæniis transversis nigris varia (*fœmina*); maculâ in scapulis albâ; remigibus minoribus albis, apice fuscis (nigro transversim striatis in *fœmina*), albo terminatis; caudâ bifurcâ *UROGALLUS MINOR*.

Lagopus; *Urogallus minor*. *Klein. Avi. pag. 116. N°. 2.*

Urogallus

- Urogallus minor, vel Tetraon minor. *Gesn. Avi. pag. 493. maris icon non satis accurata pag. 494.*
- Urogallus minor; Tetraon minor. *Gesn. icon Avi. pag. 59, in qua eadem icon.*
- Urogallus minor. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 67. maris icon à Gesnero mutuata pag. 68.*
Jonst. Avi. pag. 41. maris icon à Gesnero mutuata Tab. XXV.
Charlet. Exer. pag. 81. N°. IV.
Charlet. Onomazt. pag. 73. N°. IV.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 372.
- Tetrao remigibus secundariis à medio basin versus albis; caudâ bifurcâ. *Faun. Suec. Linn. N°. 168.*
- Tetrao, seu Urogallus minor. *Raj. Syn. Avi. pag. 53. N°. A. 2.*
- Tetrao, seu Urogallus minor Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 124. maris icon à Gesnero mutuata Tab. XXXI.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.
- Tetrao minor. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 70. sp. 3:*
Frisch. maris icon satis accurata Tab. 109.
- Tetrao minor, seu Urogallus minor Aldrovandi; Grygallus minor; Tetrax; Phasianus montanus; Gallus Betularum. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 421.*
- Tetrax Nemesiano; Erythrontaon Plinio; Grygallus Aldrovando & Gesnero; aliis Urogallus minor, Tetrao minor. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 295.*
- Coq de Bruyere, ou Francolin. *Alb. Tom. I. pag. 21; avec une figure passable du mâle Pl. 22.*
- Grygallus minor. *Gesn. Avi. pag. 496. (femina).*
Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 72.
Jonst. Avi. pag. 41.
- Tetrao minor femina, seu Urogallina minor; Gallina Betularum. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 422.*
- Urogallina minor. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 373;*
- Gallus Betulæ. *Gesn. Avi. pag. 493. (femina).*
- Attagen major; Perdix Asclepia major. *Charlet. Exer. pag. 81. N°. VII: (femina).*
Charlet. Onomazt. pag. 73. N°. VII. (femina).
- Coq de Bruyere femelle. *Alb. T. II. pag. 23; avec une figure passable Pl. 34.*
- Les Italiens l'appellent GALLO ALPESTRE. *Gesn. FASIANO ALPESTRE; FASAN NEGRO. Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, le mâle, BROM-HAN. *Gesn. Rzac. BROM-HAHN. Rzac. KLEINER OR-HAN; BIRG-FASAN. Gesn. Aldrov. KLEINER BERG-FASAN. Gesn. & la femelle, BIRCK-HUN. Gesn. Schwenck.*
- Les Silésiens, le mâle, BIRCK-HAHN. *Rzac. Frisch. BIRCK-HAN: & la femelle, BIRCK-HENNE. Schwenck.*

Les Allemands-Suisses , le mâle , LAUB-HAN : & la femelle , SPIL-HAN. Gefn. Aldrov. Schwenck. SPILL-HAN. Gefn. Aldrov.

Les Polonois , le mâle , CIETRZEW : & la femelle , CIECIORKA. Rzac.

Les Suédois , ORRE. Linn.

Les Anglois , le mâle , HEATH-COCK. Willugh. Raj. Alb. BLACK-GAME ; BLACK-GROUS. Willugh. Raj. Charlet. Alb. & la femelle , HEATH-HEN. Willugh. Charlet.

Les Anglois Septentrionaux , le mâle , BLACK-COCK. Raj. Sibbald. la femelle , GREY-HEN : & le jeune , GREY-GAME. Raj.

Il est beaucoup plus gros qu'un *Faisan*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds quatre pouces, & jusqu'à celui des ongles de vingt-quatre pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; sa queue neuf pouces ; son pied deux pouces sept lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle ; deux pouces deux lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a que neuf lignes & demie de long. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne passent l'origine de la queue que d'un pouce six lignes. La tête, le col, la partie inférieure du dos & le croupion sont d'un noir-violet très-éclatant. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos & la poitrine sont noires, & bordées de ce même noir-violet. Le ventre, les côtés, les couvertures du

Phasianum crassitie multum superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & quatuor pollices æquat, & ad extremos ungues viginti quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda novem pollices ; pes duos pollices cum septem lineis ; & trium digitorum antiquorum medius cum ungue duos pollices & duas lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus novem & semilinarum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ ad unius pollicis & sex linearum intervallum ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, collum, dorsi pars inferior & uropygium sunt nigro-violacea splendentia : pennæ autem partem dorsi superiorem & pectus regentes nigræ, marginibus nigro-violaceo nitentibus. Venter,

latera, alarum tectrices & pennæ caudam superne cooperientes nigricant, exceptis quibusdam alarum tectricibus minimis supra scapulas albis : alis verò complicatis albæ istæ plumulæ ad scapulas maculam ejusdem coloris efficiunt. Imum ventrem & anum tegentes pennæ nigricant, apicibus albis. Quæ caudam subtus cooperiunt, alarumque tectrices inferiores albæ. Crura ex fusco & albo variegantur : & pedes pennæ concolores vestiunt ad exortum usque digitorum. Remiges majores fuscæ, scapis albicantibus : minores verò albæ, scapis fuscis ; earum insuper apices fuscescunt, marginibus albis. Cauda constat sexdecim rectricibus nigris, in saturatè violaceum mutantibus : rectrices octo intermediæ quatuor pollicum longitudine ab extrema superantur ; & quatuor utrinque extremæ apicibus donantur extrorsum flexis ; unde cauda maximè bifurcæ. Supra oculos papillæ extant carneæ, miniaceæ, figuram arcuatam simul efficientes. Rostrum nigrum. Digiti fusci appendiculas utrinque squamosas longiores & strictiores obtinent. Ungues nigri-

dessus de la queue & celles de l'aîle sont noirâtres, excepté quelques-unes des plus petites vers l'épaule, qui sont blanches ; ce qui forme en cet endroit, lorsque l'aîle est pliée, une tache de cette couleur. Les plumes du bas ventre & de l'anus sont noirâtres & terminées de blanc. Les couvertures du dessous de la queue, & celles du dessous de l'aîle sont tout-à-fait blanches. Les jambes sont variées de brun & de blanc : & les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont brunes, & leur tige est blanchâtre : les moyennes sont blanches, & ont la tige brune : leur bout est aussi brun & terminé d'un petit bord blanc. La queue est composée de seize plumes d'un noir changeant en violet très-foncé : les huit du milieu sont plus courtes de quatre pouces que la plus extérieure ; & les quatre extérieures de chaque côté ont leur bout tourné en-dehors ; ce qui rend la queue très-fourchue. Au-dessus des yeux sont de petits mammelons charnus d'un rouge très-vif, & qui forment ensemble un arc de cercle. Le bec est noir. Les doigts sont bruns, & garnis de chaque côté d'appendices écailleux

longs & étroits. Les ongles sont noirâtres. C'est là la description du *mâle*.

La *Femelle* est plus petite que lui dans toutes ses dimensions. Elle en diffère aussi par sa couleur. Tout son corps, savoir la tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des ailes (excepté les plus petites les plus proches de l'épaule, qui sont blanches), la poitrine, le ventre & les côtés, est couvert de plumes rousses, variées de petites rayes transversales noires. Cette couleur paroît un peu grisâtre à la poitrine & au ventre. La gorge est blanchâtre. Les grandes plumes de l'aile sont brunes : les moyennes sont blanches à leur origine, & leur bout est brun, rayé transversalement de noir, & terminé de blanc. Les plumes de la queue sont rousses, & rayées transversalement de noir : celles du milieu sont plus courtes que les latérales ; ce qui rend la

comme dans le *mâle*.
On les trouve sur les côtes des montagnes dans le *Nord* de l'*Angleterre* & de l'*Ecosse*, & dans les *Alpes Suisses*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. Altman*.

Une variété de cette espèce est

cant. Et hæc est *maris* descriptio.

Fœmina ei magnitudine & crassitie cedit. Colore etiam ab illo differt. Per universum corpus, caput scilicet, collum, dorsum, uropygium, alarum tectrices superiores (exceptis minimis ad scapulas albis), pectus, ventrem & latera, pennis vestitur rufis, tæniis minimis transversis nigris variegatis ; qui color in pectore & ventre paululum ad cinereum inclinatur. Guttur albicat. Remiges majores fusæ : minores in exortu albæ, apicibus fuscis, nigro transversim striatis, albo terminatis. Rectrices rufæ, tæniis transversis nigris variæ : intermediae sunt laterales breviores ; unde fit cauda bifurca. Reliqua ut in *mare* se habent.

queue fourchue. Le reste est

Habitant in montium altiorum lateribus regionum *Angliæ* & *Scotiæ Septentrionalium*, & in *Alpibus Helveticis*, unde missi sunt in *Museum Realmurianum* à *D. Altman*.

Hujus speciei varietas est

A. LE COQ-DE-BRUYERES PIQUETÉ.

Urogallus minor punctatus.

Tetrao caudâ bifurcâ subtus albo punctata. Faun. Suec. Linn. N°. 167.

Grygallus. Linn. systh. nat. ed. 6. Gen. 70. sp. 2.

Aliud Galli sylvestris Genus. Gesn. Avi. pag. 477, in qua maris icon pessima.

Gesn. icon. Avi. pag. 61, in qua eadem icon.

Gallus Scoticus sylvestris. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 340. maris icon à Gesnero mutuata pag. 341.

Jonst. Avi. pag. 58.

Les Suédois l'appellent RACKLEHANE, ou RACKELHANE. Linn.

Les Roslagiens, ROSLARE. Linn.

Les Ecoffois appellent le mâle BLACK-COCK : & la femelle, GREY-HEN.

Gesn. Aldrov.

Mas & foemina marem præcedentis & foeminam fati bene æmulantur : in eo tantum ab iis differunt quod mas collo, pectore, alis, cruribusque punctis rubicundis aspersus sit ; & foemina leucophæa maculis nigris varia. Mas & foemina subtus maculis quibusdam albis variegantur. Habitat in sylvis in Suecia & Scotia.

Le mâle & la femelle ressemblent assez au mâle & à la femelle du précédent : ils en diffèrent seulement en ce que le mâle a le col, la poitrine, les ailes & les jambes semées de petits points rougeâtres ; & la femelle est grise, variée de taches noires. Ils ont tous deux quelques taches blanches dans le dessous du corps. On les trouve dans les bois, en Suède & en Ecoffe.

** 3. LA GELINOTE.

Lagopus superne cinerea fusco & rufescente varia ; remigibus griseo-fuscis, exteriùs & apice rufescente variis ; rectricibus lateralibus fusco & cinereo-albo variis, fasciâ transversâ nigricante versùs apicem donatis BONASA,

Lagopus Corylorum. Klein. Avi. pag. 116. N°. 3.

Bonasia. Linn. systh. nat. ed. 6. Gen. 70. sp. 5.

- Tetrao rectricibus cinereis punctis nigris fasciâ latâ nigrâ exceptis intermediis duabus. *Faun. Suec. Linn. N° 170.*
- Gallina Corylorum, seu Bonasa Alberto dicta. *Gesn. Avi. pag. 228. hujus icon satis accurata pag. 229.*
- Gallina Corylorum. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 80. hujus icon non satis accurata pag. 82.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 55. N° 6.*
- Charlet. Exer. pag. 81. N° VI.*
- Charlet. Onomazt. pag. 73. N° VI.*
- Schwenck. Avi. Sil. pag. 277.*
- Gallina Corylorum Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 126. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXI.*
- Gallina Corylorum, Alberto Bonasa & Orix. *Jonst. Avi. pag. 42. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXV.*
- Attagen; Recentioribus Bonasa. *Gesn. icon. Avi. pag. 63, in qua icon satis accurata.*
- Attagen, seu Gallina Corylorum; Bonasa Alberti. *Rzac. Auth. Hist. nat. Pol. pag. 366.*
- Attagen; Gallina rustica Bellonio; Gallina Corylorum; Perdix montana; Perdix sylvestris Gesnero. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 272.*
- Gelinote de bois. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 252, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.*
- Gelinette de boys. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 61 a, où est la même figure.*
- Les Turcs l'appellent JABANTAU. *Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens, PERDICE ALPESTRE. *Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens, aux environs des Alpes & du Lac majeur, PERNIS ALPEDICA. *Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens, aux environs de Bresse, FRANCOLINO. *Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens, aux environs de Belinzone, FAZANELLA. *Aldrov.*
- Les Allemands, HASEL-HUN. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. HASEL-HENNE; ROTT-HUN. Schwenck.*
- Les Allemands, aux environs de Nuremberg, HAZLE-HUN. *Willugh. Raj.*
- Les Hongrois, TSCHASARMADAR. *Gesn. Aldrov.*
- Les Illyriens, GERZABEK, ou TZIERZIABEK. *Gesn. Aldrov.*
- Les Polonois, JARZABEK. *Rzac.*
- Les Suédois, HJAERPE; HIERPE. *Linn.*
- Les Anglois, HAZEL-HEN. *Charlet.*

Elle est à peu près de la grosseur d'une Bartavelle. Sa longueur depuis le bout du bec Perdicem graciam crassitie circiter adæquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad cau-

de extremitatem quatuordecim est pollicum, & ad extremos ungues duodecim pollicum cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum; cauda quinque pollices; pes sexdecim & semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septemdecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus quinque linearum longitudinem non excedit. Alis extensis, extremitates majorum remigum unius pedis & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ non ultra quartam longitudinis caudæ partem protenduntur. Capitis & colli partes superiores rufescente, fusco & cinereo sunt transversim striatæ. Dorsum, uropygium & caudæ tectrices superiores cinereæ, lineis minimis & punctulis fuscis & rufescentibus variæ, taniis quibusdam transversis nigricantibus in parte dorsi superiore admixtis. Plumula supra basin mandibulæ superioris extantes, nigræ: supra nares parvula est utrinque macula alba: inter rostrum & oculos alia est utrinque ejusdem coloris macula; & tertia post oculum

jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied seize lignes & demie; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix-sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que cinq lignes de long. Elle a environ un pied neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'au quart de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont rayées transversalement de rouffâtre, de brun & de cendré. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré varié de petites lignes & de petits points bruns & rouffâtres, avec quelques lignes transversales noirâtres à la partie supérieure du dos. Les plumes qui couvrent la bête du demi-bec supérieur, sont noires: au-dessus de chaque narine est une petite tache blanche: entre le bec & l'œil il y en a une de chaque côté de pareille couleur, & une autre derrière l'œil. Au-dessus des yeux est une peau rouge, dénuée de plumes. La

gorge est noire (dans le mâle seulement), & ce noir est entouré de blanc. Les plumes qui couvrent la partie inférieure du col, sont rousses, rayées transversalement de noirâtre & terminées de blanc : celles de la poitrine & du ventre sont brunes, entourées de blanc, avec une tache de la même couleur dans leur milieu, de façon qu'il n'y a presque que le blanc qui paroît, lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. Celles des côtés sous les épaules sont rousses & terminées de blanc. Les jambes sont d'un cendré-roussâtre, mêlé d'un peu de blanc. Les petites couvertures du dessous de la queue sont blanches ; les grandes sont roussâtres, variées de brun & terminées de blanc. Celles du dessous de l'aîle sont d'un gris-brun, varié de blanc. Les couvertures du dessus de l'aîle & les scapulaires sont variées de roux, de brun & de noirâtre, & quelques-unes ont une tache blanche vers leur bout. Les plumes de l'aîle sont d'un gris-brun, varié de roussâtre du côté extérieur & à leur bout. La queue est composée de seize plumes : les deux du milieu sont de la couleur du dos ; toutes les latérales sont variées de brun & de gris-blanc ; elles ont de plus

extat. Supra oculos cutis est rubra, pennis destituta. Gut-tur nigrum (in mare tantum), quem nigrorem cingit albedo. Collum inferius vestitur pennis rufis, nigricante transversim striatis, apicibus albis. Quæ pectus & ventrem tegunt sunt fuscæ, marginibus albis, albâ insuper maculâ in medio extante ; ita ut pennis se ipsis incumben-tibus, ferè nil nisi albedo appareat. Latera sub armis rufa, pennarum apicibus albis. Crura ex cinereo rufescunt, cum aliqua albi mixtura. Caudæ rectrices inferiores minores albæ ; majores rufescentes, fusco variegatæ, apicibus albis. Quæ alas sub-tus tegunt pennæ cinereo-fuscæ, albo variæ. Alarum rectrices superiores & scapulares pennæ rufo, fusco & nigricante variegatæ, quibusdam versùs apicem maculâ albâ donatis. Remiges sunt cinereo-fuscæ, in latere exteriore & apice rufescente variæ. Cauda constat sex-decim rectricibus : binæ intermediæ dorso concolores : septem utrinque laterales apicibus sunt cinereo-albæ ; succedit deinde in singulis area lata transversa nigra ; reliquum rectricis ad exor-tum

tum usque fusco & cinereo-albo varium. Rostrum nigrum : pedes & ungues griseo-fusci. Digiti appendiculis squamosis brevissimis utrinque præditi sunt. Pedes plumosi in parte anteriore tantum ad mediam usque longitudinem, medietate inferiore & parte posteriore nudis.

Fœmina à *mare* discrepat in eo quod nigrore in gutture careat, & cutis supra oculos nuda rubore non ita splendenti appareat.

Habitat in *Germania* & circa *Alpes*, unde missa in *museum Realmurianum* à *D. de Tencin*.

vers leur bout une large bande transversale noirâtre, & sont terminées de gris-blanc. Le bec est noir : les pieds & les ongles sont gris-bruns. Les doigts sont garnis de chaque côté d'appendices écailleux très-courts. Les pieds ne sont couverts de plumes qu'à la partie antérieure, & jusqu'à la moitié de leur longueur seulement.

La *femelle* diffère du *mâle* en ce qu'elle n'a point de noir à la gorge, & que la peau nue, qu'elle a au-dessus des yeux, n'est pas d'un si beau rouge.

On la trouve en *Allemagne* & aux environs des *Alpes*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur*, par *Madame de Tencin*.

** 4. LA GELINOTE DES PYRÉNÉES.

Voyez Pl. XIX. Fig. 1.

Lagopus olivaceo, flavicante, nigro & rufo varia; ventre albo; torque duplici nigro; rectricibus duabus intermediis longissimis, apice strictioribus . . . BONASA PYRENAICA.

Lagopus altera; Perdix Damascena Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 148, in qua icon à Bellonio mutuata.

Lagopus altera. Jonst. Avi. pag. 46. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. XXVIII.

Perdix Damascena Bellonii, quam Aldrovandus Lagopodem alteram Plinii existimat. Willugh. Ornith. pag. 128.

Raj. Syn. Avi. pag. 55. N°. 7.

Perdix lutea, maculis castaneis, caudâ duabus pennis nigris longissimis terminatâ. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XV. sp. 5.

Perdix Alchata, seu Filacotona Aldrovandi. Klein. Avi. pag. 115. N°. 5.

Alchata. Gesn. Avi. pag. 311.

- Alchata, vel Alfuachat & Filacotona Arabum. *Gesn. Avi. pag. 307, in qua hujus icon non satis accurata, sub titulo, Oenas.*
- Alchata, sive Filacotona Arabum. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 501. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 502.*
- Jonst. Avi. pag. 64. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 32.*
- Alchata, sive Filacotona Aldrovandi. *Charlet. Exer. pag. 85. N^o. 4, in qua hujus icon minùs accurata.*
- Charlet. Onomazt. pag. 77. N^o. 4, in qua eadem icon.*
- Oenas Aristoteli; Gazæ Vinago. *Gesn. icon. Avi. pag. 67, in qua icon non satis accurata.*
- Petit Coq de Bruyere aux deux aiguilles à la queue. *Edwards. Glanur. pag. 84. Chap. XXXIX; avec une figure exacte Pl. 249.*
- Perdris de Damas ou de Syrie. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 258; avec une très-mauvaise figure pag. 259.*
- Perdris de Damas. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 63 a, dans laquelle est la même figure.*
- Les Arabes l'appellent ALCHATA; FILACOTONA. *Gesn. Aldrov. ALFUACHAT. Gesn.*
- Les Grecs, *Συροπερδιξ. Bel.*
- Les Turcs, KATA. *Edwards.*
- Les Catalans, PERDIU DE GARRIRA; GANGA. *Barr.*
- Les Italiens, PERDICE DAMASCENE. *Bel.*
- Les Anglois, LITTLE PIN-TAILED GROUS. *Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur d'une *Perdrix grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de sept lignes; sa queue de cinq pouces neuf lignes; son pied d'un pouce; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de onze lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière n'a que deux lignes de long. Ses

Perdicem cineream crassitie circiter æquat. A rostri apice ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas longa est, & ad extremos unguis decem pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septem linearum longitudinem æquat; cauda quinque pollicum & novem linearum; pes unius pollicis; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim linearum: laterales multò sunt breviores; posticus vero duas lineas longi-

tudine non excedit. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Capitis & colli partes superiores & dorsum olivaceo, flavicante, nigro & rufo variegantur; ita tamen ut pennæ quædam nigro & rufo transverse sint striatæ, apicibus flavicantibus, & pennæ aliæ olivaceæ, apicibus quoque flavicantibus. Uropygium tæniis transversis alternatim nigris & rufis varium. Tectrices caudæ superiores nigro & flavicante transverse striatæ. Alarum tectrices minimæ ex fusco ad castaneum vergunt; sequentes colore sunt dilutiores, flavicante & castaneo saturatiore oblique striatæ; maximæ olivaceæ, flavicante variegatæ, apicibus nigris. Oculorum ambitus niger; ex qua nigredine tænia parva longitudinalis concolor post oculum utrinque procedit. Genæ fulvæ: guttur nigrum. Colli inferioris summa pars olivacea: deinde sequuntur duæ strictiores tæniæ transversæ nigrae, octodecim linearum intervallo à se ipsis distantes, & quasi duplicem torquem efficientes. Binas inter tænias istas spatium rufum. Pectus, ven-

ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, & le dos sont variées d'olivâtre, de jaunâtre, de noir & de roux; de façon qu'il y a quelques plumes qui sont rayées transversalement de ces deux dernières couleurs & terminées de jaunâtre, & d'autres olivâtres, terminées aussi de jaunâtre. Le croupion est rayé transversalement de noir & de roux. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de noir & de jaunâtre. Les plus petites de l'aile sont d'un brun tirant sur le marron; celles qui les suivent sont d'une couleur plus claire, & rayées obliquement de jaunâtre & de marron foncé; & les plus grandes sont olivâtres, variées de jaunâtre & terminées de noir. Le tour des yeux est noir; & derrière l'œil est de chaque côté une petite bande longitudinale de cette même couleur. Les joues sont fauves; la gorge est noire. La partie inférieure du col est d'abord olivâtre; cette couleur est suivie de deux bandes étroites transversales noires, distantes l'une de l'autre de dix-huit lignes, & qui forment comme un double collier. L'espace

contenu entre ces deux bandes est roux. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de l'aile sont blanches. Celles du dessous de la queue sont, depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, rayées transversalement de noirâtre & de roux, le reste est blanc. Les grandes plumes de l'aile sont cendrées & terminées de brun, & ont leur tige noire : les premières des moyennes sont de la même couleur, & ont leur bord intérieur blanc : celles qui les suivent sont cendrées à leur côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est blanc. Enfin les plus proches du corps sont olivâtres; & toutes ont leur tige noire. La queue est composée de seize plumes : les deux du milieu ont presque le double de la longueur des latérales, & la partie qui les excède est très-étroite. Toutes ces plumes sont d'un cendré mêlé confusément d'olivâtre : les deux côtés des deux du milieu, & le côté extérieur de toutes les latérales sont rayés transversalement de jaunâtre. La partie des deux du milieu, qui excède les latérales, est noirâtre, & toutes les latérales sont terminées de blanc. Le bec & les

ter, latera, crura & alæ inferius pennis teguntur albis. Rectrices caudæ inferiores ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque nigricante & rufo transversim sunt striatæ, in reliqua longitudine albæ. Remiges majores cinereæ, apicibus fuscis, scapis nigris : minorum primariæ concolores, oris interioribus albis : sequentes in latere exteriori & apice cinereæ, in latere verò interiori albæ : corpori viciniores olivaceæ ; omnibus autem scapis nigris. Sexdecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ lateralibus sunt ferè duplò longiores ; pars verò lateralium longitudinem excedens fit strictior. Rectrices omnes cinereæ, olivaceo confusè admixto : binæ intermediæ in utroque latere & laterales in latere exteriori tantum flavicante transversim sunt striatæ. Duæ intermediæ in parte lateralium longitudinem excedente nigricant ; & laterales apicibus donantur albis. Rostrum & pedes cinerei ; ungues nigri. Digni appendiculas squamosas brevissimas obtinent. Pedes in parte anteriore tantum bre-

vissimis pennis vestiuntur albis.

ces écailleux très-courts. Le dessous des pieds seulement est couvert de petites plumes blanches très-courtes.

Alteram ari sculptam fuisset curavi (*Tab. XIX. Fig. 2*), ab ista discrepantem in eo quod multò magis variegata sit. Universum corpus in parte superiore rufo, flavicante, nigro & saturatè cinereo quasi transversim striata videtur. Guttur non nigricat; sed triplici torque nigro donatur, dum altera duplici tantùm prædita sit. Nil olivacei obtinet, nisi spatium duos torques superiores separans. An præcedentis foemina, aut saltem ipsius varietas? Icones confule: differentias meliùs demonstrabunt quàm optimæ descriptiones præbere possent.

Habitant in *Syria* & *Pyrænæis montibus*, unde in *musæum Realmurianum* missæ à *D. Barrere*.

pieds sont cendrés; & les ongles noirs. Les doigts sont garnis de chaque côté d'appendices

J'en ai fait graver une autre (*Pl. XIX. Fig. 2*), qui diffère de la précédente en ce qu'elle est beaucoup plus variée. Tout le dessus de son corps est comme rayé transversalement de roux, de jaunâtre, de noir & de cendré foncé. Sa gorge n'est pas noire; mais elle a trois colliers de cette couleur, au lieu que l'autre n'en a que deux; & elle n'a d'olivâtre que l'espace contenu entre les deux premiers colliers. C'est, selon les apparences, la femelle, ou du moins une variété de la précédente. Les figures feront mieux sentir en quoi elles diffèrent que la meilleure description ne pourroit l'exprimer.

On les trouve en *Syrie*, & sur les *Pyrénées*, d'où elles ont été envoyées à *M. de Reaumur* par *M. Barrere*.

** 5. LA GELINOTE D'ECOSSE.

Voyez *Pl. XXII. Fig. 1.*

Lagopus rufo & nigricante transversim striata; remigibus majoribus fuscis; rectricibus quatuor utrinque extimis nigricantibus . . . BONASA SCOTICA.

Gallus palustris. Gefn. Avi. pag. 231, in qua icon minimè accurata.

Gefn. icon. Avi. pag. 61, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 342, in qua icon à Gefnero mutuata.

Jonst. Avi. pag. 58. hujus icon à Gefnero mutuata Tab. 30.

Les Allemands l'appellent MUR-HAN. Gefn. Aldrov.

Les Ecoſſois, MWYR-COK. Gefn. Aldrov.

Elle eſt un peu plus groſſe que notre *Gelinote*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de quatorze pouces, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces ſix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; ſa queue quatre pouces; ſon pied un pouce ſix lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes: les latéraux ſont beaucoup plus courts; & celui de derrière n'a que quatre lignes & demie de long. Ses aîles, lorsqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures du deſſus de la queue, les petites du deſſus de l'aîle, la poitrine, le ventre & les côtés ſont rayés tranſverſalement de roux & de noirâtre. La gorge eſt preſque tout-à-fait rouſſe. Les jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont rayées tranſverſalement de brun, de gris & de rouſſâtre,

Bonafam noſtratam craſſitie paululùm ſuperat. Ipfius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quatuordecim pollices æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices cum ſex lineis. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos novem lineas longum; cauda quatuor pollices; pes unum pollicem & ſex lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & cinqüe lineas: laterales multò ſunt breviores; & poſticus quatuor & ſemi linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ mediam ferè caudæ longitudinem attingunt. Caput, collum, dorſum, uropygium, tectrices caudæ ſuperiores, alarum tectrices minimæ, pectus, venter & latera ruſo & nigricante tranſverſim variegantur. Guttur ferè omnino ruſum. Crura & quæ caudam ſubtus cooperiunt pennæ fuſco, grifeo & ruſcente tranſverſim ſtriata. Alarum tec-

trices inferiores fusco & albo variæ ; superiores majores & majores remiges fuscæ : remiges minores concolores , sed in latere exteriore & apice rufescente variæ. Sexdecim rectricibus cauda constat : octo intermediæ dorso concolores ; quatuor utrinque extimæ nigricant. Rostrum nigricat. Pedes ad exortum usque digitorum, in parte anteriore tantum , pennis vestiuntur cinereo-albis. Digni & ungues grisei. Habitat in *Scotia* , unde missa in *musæum Realmurianum* à *D. Morton*.

Celles du dessous de l'aîle sont variées de brun & de blanc. Les grandes couvertures du dessus & les grandes plumes de l'aîle sont brunes : les moyennes sont de la même couleur , & variées de rouffâtre du côté extérieur & à leur bout. La queue est composée de seize plumes : les huit du milieu sont de la même couleur que le dos ; & les quatre extérieures de chaque côté sont noirâtres. Le bec est noirâtre. Les pieds sont garnis jusqu'à l'origine des doigts , dans la partie antérieure seulement , de plumes d'un gris-blanc. Les doigts & les ongles sont gris. On la trouve en *Ecosse* , d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *Milord Morton*.

6. LA GELINOTE DE LA BAYE DE HUDSON.

Lagopus superne obscurè fusca aurantio & cinereo varia , infernè alba maculis lunatis nigris varia ; taniâ duplici post oculos albâ ; remigibus majoribus nigricantibus , marginibus exterioribus albo respersis BONASA FRETI HUDSONIS.

Lagopus è fusco & albo in inferiore corporis parte , è fusco & nigro in superiore , ad oculos duabus lineis albis varia. *Klein. Avi. pag. 117. N° 6.*

Coq de Bruyeres brun & tacheté. *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. pag. 50 ; avec une figure exacte Pl. I.*

Francolini brun-tacheté. *Edwards. Tom. II. pag. LXXI ; avec une figure exacte Pl. 71.*

Elle est un plus grosse qu'une *Perdrix grise*. Le sommet de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun obscur, varié d'orangé & de cendré. Au-dessus des narines il y a des plumes brunes, tournées en devant. Depuis la base du bec jusqu'à l'œil s'étend une petite bande longitudinale blanche; derrière les yeux il y en a de chaque côté deux autres de même couleur, dont l'inférieure est la plus longue: & au-dessus des yeux est une peau rouge, dénuée de plumes. La gorge est d'un blanc-jaunâtre, semé de petites taches noirâtres. La partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont d'un orangé terni, varié de taches transversales noires en forme de croissant, dont la convexité est en enbas. Il y a aussi un peu de blanc mêlé avec l'orangé & le noir de la poitrine. Le bas de la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches, avec une légère teinte de jaunâtre, & variées, comme le col, de taches transversales noires en forme de croissant, dont la convexité est en enbas. Les jambes & les pieds sont couverts jusqu'à l'o-

Perdicem cineream crassitie paululum superat. Vertex capitis, colli superior pars, dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices obscurè fuscae aurantio & cinereo variegantur. Supra nares pennæ sunt fuscae antrorsum versæ. A basi rostri ad oculum usque tænia parva longitudinalis protenditur alba; post oculos duæ sunt utrinque aliæ tæniæ longitudinales albæ, inferiore taniâ longiore. Supra oculos cutis est rubra, pennis destituta. Guttur ex albo flavescit, maculis minimis nigricantibus rersis. Pars colli inferior & pectoris summa sunt sordide aurantiæ, maculis transversis nigris lunatis variæ, quarum convexitas deorsum tendit: in pectoris aurantio & nigro aliquid albi admiscetur. Pectoris infima pars, venter, latera & caudæ tectrices inferiores albæ, cum aliqua flavescientis mixtura, & sicut collum, maculis transversis nigris lunatis variæ, quarum convexitas deorsum tendit. Crura & pedes ad exortum usque digitorum pennis vestiuntur fuscis, nigro transversim striatis: quæ alas subtus cooperiunt fuscae, apicibus albis. Quædam ex scapularibus

bus pennæ longiores versùs apicem maculâ donantur longitudinali albâ. Alarum tectrices superiores sunt obscurè fuscæ, marginibus dilutiùs fuscis, tæniâ quoque dilutiùs fuscâ introrsum secundùm margines parallelatim extensâ. Remiges majores nigricant, marginibus exterioribus albo resperfis: minores sunt dilutè fuscæ, tæniis obscuriùs fuscis transversim striatæ. Rectrices fusco imbuuntur saturatiore & ad nigrum inclinante: binæ intermediæ fusco diluto & rufescente, ad aurantium vergente, transversim variegantur; & laterales maculis minimis concoloribus asperguntur. Rostrum, unguisque nigri: digiti fusci, appendiculis squamosis utrinque præditi. Ungues longiores. Habitat in *Freto Hudsonis*.

rigine des doigts de plumes brunes, rayées transversalement de noir. Les couvertures du dessous de l'aîle sont brunes & terminées de blanc: quelques-unes des plus longues des plumes scapulaires ont aussi vers leur bout une tache longitudinale blanche. Les couvertures du dessus de l'aîle sont d'un brun obscur, bordées d'un brun plus clair, ayant aussi en-dedans une bande du même brun-clair, qui s'étend parallèlement à leurs bords. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres & parsemées de blanc sur leur bord extérieur: les moyennes sont d'un brun-clair, rayé transversalement de bandes d'un brun plus obscur. Les plumes de la queue sont d'un brun foncé & presque noir: les deux du milieu sont rayées transversalement d'un brun clair & rougeâtre, tirant sur l'orangé; & toutes les latérales sont parsemées de petites taches de la

même couleur. Le bec & les ongles sont noirs: les doigts sont bruns, & garnis de chaque côté d'appendices écailleux. Les ongles sont assez longs. On la trouve à la *Baye de Hudson*.

** 7. LA GELINOTE DE CANADA.

Voyez *Pl. XX. Le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.*

Lagopus superne ex nigricante & cinereo-fusco (ruso admixto in *fæmina*) transversim striata; remigibus majoribus fuscis, exteriùs cinerascente variis . . . *BONASA CANADENSIS.*

Elle est un peu plus petite que la *Gelinote ordinaire*. La longueur du mâle depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue quatre pouces quatre lignes; son pied seize lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que six lignes de long. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne passent guères l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête, le col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de noirâtre & de gris-brun. Cette dernière couleur est plus claire sur la partie inférieure du dos qu'ailleurs. Au-dessus des narines sont de petites plumes d'un très-beau noir, après lesquelles il y a de chaque côté une petite tache blanche: il y en a une autre de la même couleur de chaque côté au-dessous & derrière l'œil. Au-dessus des yeux sont de petits mammelons rouges. La gorge & la poitrine sont noires: les plumes du ventre sont

Bonasa vulgari paululūni crassitie cedit. Maris longitudo ab apice rostri ad extremitatem caudæ tredecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum; cauda quatuor pollices cum quatuor lineis; pes sexdecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus sex linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Capitis pars superior, collum, dorsum, uropygium & tectrices caudæ superiores ex nigricante & cinereo-fusco sunt transversim striatæ; cinereo-fusco in parte dorsi inferiore dilutior. Supra nares plumulæ extant nigerrimæ: deinde sequitur utrinque parva macula alba: alia est insuper utrinque macula alba infra & post oculum sita. Supra oculos extant papillæ rubræ. Guttur & pectus nigra. Ventrem vestiunt pennæ concolores apicibus albis, excepto medio ventre pennis omnino nigris tecto. Quæ latera

cooperiunt ex nigricante & cinereo-fusco sunt transversim striatæ, & versùs apicem in medio taniâ donantur longitudinali albâ, quæ tania versùs pennæ exortum procedendo sensim atque sensim latitudine minuitur. Caudam subtus tegentes pennæ ex albo & nigro variegantur. Alarum tectrices ex fusco & cinereo-fusco variæ. Remiges majores fuscæ, in latere exteriori tantùm paululùm cinerascens variegatæ: minores alarum tectricibus concolores. Rectrices nigrae, apicibus rufis. Pedes ad exortum usque digitorum pennis vestiuntur cinereo-fuscis. Rostrum nigrum: digiti & ungues grisei.

sont garnis jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un gris-brun. Le bec est noir: les doigts & les ongles sont gris.

Fœmina mari magnitudine & crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum; cauda tres pollices & octo lineas; pes quindecim lineas; & trium digitorum anticorum medius

de la même couleur & terminées de blanc, excepté au milieu du ventre, où elles sont toutes noires. Celles des côtés sont rayées transversalement de noirâtre & de gris-brun, & ont dans le milieu de leur bout une bande longitudinale blanche, qui va toujours en rétrécissant en montant vers l'origine de la plume. Les couvertures du dessous de la queue sont variées de noir & de blanc. Celles des ailes sont variées de brun & du même gris que celui du dos. Les grandes plumes de l'aile sont brunes & variées, du côté extérieur seulement, d'un peu de grisâtre: les moyennes sont de la même couleur que les couvertures des ailes. Les plumes de la queue sont noires & terminées de roux. Les pieds

La *Femelle* est plus petite que le *mâle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue trois pouces huit lignes; son pied quinze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce

cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a que cinq lignes & demie de long. Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne passent guères l'origine de la queue. Elle diffère encore du *mâle* par sa couleur. Tout le dessus du corps , sçavoir la tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue , est rayé transversalement de roux , de noirâtre & de gris-brun : ces couleurs sont par plus grandes taches vers la partie supérieure du dos. Les plumes qui couvrent la partie inférieure & les côtés du col , sont rousses , avec une bande transversale , noirâtre vers leur bout. Celles de la poitrine sont rayées de bandes transversales alternativement rousses & noirâtres , & terminées de blanc sale & rousâtre. Les plumes du ventre & les couvertures du dessous de la queue sont rayées de même de noirâtre & de blanc sale & rousâtre. Celles des côtés sont aussi variées transversalement de brun , de rousâtre & d'un peu de gris-brun , & terminées de blanc sale. Les grandes plumes de l'aile sont , comme dans le mâle , brunes & variées du côté extérieur seulement d'un peu

cum ungue unum pollicem cum quinque lineis : laterales paulò sunt breviores ; & posticus quinque linearum & semi longitudinem non excedit. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Colore etiam à *mare* discrepat. Universum corpus superius , caput scilicet , colli pars superior , dorsum , uropygium , caudam superne tegentes pennæ , alarumque tectrices , rufo , nigricante & cinereo-fusco transversim striatum : qui colores in parte dorsi superiore majores maculas efformant. Pars inferior & latera colli pennis vestiuntur rufis , tæniâ transversâ nigricante versùs apicem donatis. Quæ pectus cooperiunt tæniis transversis alternatim rufis & nigricantibus variegatæ , apicibus sordidè albo-rufescentibus. Quæ ventrem tegunt , tectricesque caudæ inferiores nigricante & sordidè albo-rufescente sunt transversim striatæ. Latera pennis vestiuntur fusco & rufescente , cinereo - fusco admixto , transversim variegatæ , apicibus sordidè albis. Remiges majores , ut in *mare* , fuscæ , in latere exteriori tantum

paululum cinerascens variegata : minores iisdem ac in dorso coloribus varia. Rectrices rufo & nigricante transversim striatae. Pedes ad exortum usque digitorum pennis vestiuntur cinereo-fuscis. Rostrum fuscum : digiti & ungues grisei.

Habitant in *Canada*, unde missæ in *musæum D. Aubry*.

de grisâtre : les moyennes sont variées des mêmes couleurs que le dos. Celles de la queue sont rayées transversalement de roux & de noirâtre. Les pieds sont garnis jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un gris-brun. Le bec est brun : les doigts & les ongles sont gris.

On les trouve en *Canada*, d'où on les a envoyées à *M. l'Abbé Aubry*, qui les conserve dans son cabinet.

**** 8. LA GROSSE GELINOTE DE CANADA.**

Voyez Pl. XXI. Fig. 1.

Lagopus superne ex fusco, rufo, nigro & cinereo, sordide albo admixto, varia; fasciculis pennarum nigrarum longiorum summis alis incumbentibus; remigibus majoribus fuscis, exterius sordide albo variis BONASA MAJOR CANADENSIS.

Bonasam nostratem paululum crassitie antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum; cauda sex pollices cum octo lineis; pes unum pollicem & octo lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem

Elle est un peu plus grosse que *notre Gelinote*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue six pouces huit lignes; son pied un pouce huit lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes : les latéraux sont un

peu plus courts; & celui de derriere n'a que six lignes de long. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à deux pouces au-delà de l'origine de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue sont variées de brun, de roux, de noir & de cendré, avec un peu de blanc sale mêlé en quelques endroits. La gorge & la partie inférieure du col sont rousses, variées de quelques petites taches & de bandes transversales brunes. Les plumes qui couvrent le haut de la poitrine, sont noirâtres & terminées de gris-blanc, & forment en cet endroit une bande transversale; aux deux bouts de laquelle de chaque côté est un paquet de plumes noires, plus longues que les autres, terminées d'une couleur brillante & changeante en verd-doré, & dont les bouts sont un peu tournés vers le bas. Ces paquets de plumes tombent sur le haut de chacune des ailes, lorsqu'elles sont pliées. Le bas de la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont rayées transversalement de brun & de blanc sale & roussâtre. Les grandes plumes de l'aile sont brunes,

& sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus sex lineas longitudine non superat. Alæ complicatæ ad duos ultra caudæ exortum pollices extenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, caudam superne tegentes pennæ, alarumque tectrices fusco, rufo, nigro & cinereo, cum aliqua quibusdam in locis sordidè albi mixtura, variegantur. Guttur & collum inferius rufa, quibusdam maculis minimis & tæniis transversis fuscis varia. Pennæ pectoris partem supremam cooperientes nigricant, apicibus cinereo-albis, & eo in loco transversam efficiunt tæniam, ad cujus extremitates utrinque fasciculus extat nigris constans pennis, cæteris longioribus, colore splendente & in viride-aureum mutante terminatis, apicibus deorsum flexis; qui pennarum fasciculi summis alis complicatis incumbunt. Pectoris infima pars, venter, latera & caudæ tectrices inferiores fusco & sordidè albo-rufescente sunt transversim striatæ. Remiges majores fuscæ, in latere exteriori sordidè albo variæ: minores dorso concolores. Rectrices

cinereo & nigro variegata : nigredo autem supra cinereum transversas efficit tannias strictiores, exceptâ eâ versûs caudæ extremitatem extante, aliis multò latiore : in intervallo verò tannias inter istas transversas contento nigrore cinereum perpulchrè spargitur. Pennæ griseo-fuscæ in maxima longitudinis parte pedes vestiunt. Rostrum, digiti & ungues fusci. Habitat in *Canada*, unde missa in *museum D. Aubry*.

& leur côté extérieur est varié de blanc sale : les moyennes sont de la couleur du dos. Celles de la queue sont variées de cendré & de noir ; le noir forme sur le cendré des bandes transversales assez étroites, excepté celle qui est vers le bout de la queue, qui est beaucoup plus large que les autres : dans l'espace contenu entre ces bandes transversales, le noir est joliment semé sur le cendré. Les pieds sont couverts dans la plus grande partie de leur longueur de plumes d'un gris-brun. Le bec, les doigts & les ongles

sont bruns. On la trouve en *Canada*, d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry*, qui la conserve dans son cabinet.

9. LA GELINOTE HUPÉE.

Lagopus cristata, rufo & nigricante transversim & undulatum varia ; maculis in pectore & ventre albis ; remigibus fuscis, marginibus exterioribus rufo variis ; rectricibus lateralibus nigris ATTAGEN.

Lagopus altera Plinii. *Willugh. Ornith. pag. 128.*

Raj. Syn. Avi. pag. 54. N°. A. 3.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Klein. Avi. pag. 117. N°. 5.

Attagen. Gesn. Avi. pag. 225.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 72. hujus icon satis accurata pag. 75.

Bell. Obs. pag. 16.

Frisch. femine icon accurata Tab. 112.

Attagen Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 125. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXI.

Raj. Syn. Avi. pag. 54. N°. 4.

Attagen ; Perdix Asclepica quibusdam. Jonst. Avi. pag. 41. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI.

Attagen minor; Perdix Asclepica minor. *Charlet. Exer. pag. 81. N°. VII.*
Charlet. Onomazt. pag. 73. N°. VII.

Francolin. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 240; avec une très-mauvaise figure pag. 241.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 57 b, dans laquelle est la même figure.

Coq de marais. *Alb. Tom. I. pag. 22; avec les figures mal coloriées, du mâle Pl. 23, & de la femelle Pl. 24.*

Les Grecs l'appellent Ατταγας. *Bell. Aldrov. Ατταγνα. Aldrov. Α'ταγλυ.*
Bel.

Les Grecs modernes, Ταγίνα, *Bell.*

Les Italiens, FRANCOLINO. *Bell. Aldrov. Raj.*

Les Allemands, HASEL-HUHN. *Frisch.*

Les Anglois, RED-GAME. *Willugh. Raj. Alb. GREY-GAME. Charlet. Ils appellent le mâle GOR-COCK. Willugh. Raj. MOOR-COCK. Willugh. Raj. Sibbald. la femelle, MOOR-HEN; & la troupe de petits, GOR-FOUL, & POUTS. Raj.*

Les Ecoffois, MOOR-FOWL. *Sibbald.*

Elle est plus grosse que la *Bartavelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces. La tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue sont variées de roux & de noirâtre; de façon que chaque plume est rayée transversalement & en ziczacs de ces deux couleurs alternativement. Il y a aussi sur le milieu du dos & les plumes scapulaires quelques taches noires assez grandes. La poitrine, le ventre, les côtes & les couvertures du dessous de la queue sont presque de la couleur du dos; mais il y a quelques taches blanches assez grandes sur le milieu de la poitrine & du ventre.

Craffitie Perdicem Græcam antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices æquat. Caput, collum, dorsum, uropygium, pennæ caudam superne tegentes, alarumque tectrices rufo & nigricante variegantur, ita ut quæque penna transversim & undulatum duobus istis coloribus alternatim sit striata. In medio dorso & scapularibus pennis quædam sunt maculæ majusculæ nigræ. Pectus, venter, latera & caudæ tectrices inferiores dorso ferè concolores; attamen medium pectus & venter maculis quibusdam majusculis donantur albis. Guttur & pectus

pectus in suprema parte rufa, absque ulla alterius coloris mixtura. Alarum rectrices inferiores majores albescentes. Remiges fuscae, marginibus exterioribus rufis variis. Pennae, quibus ala notata constat, sunt interius albae. Extrema remigum sequente brevior est: tertia autem omnium longissima. Sexdecim rectrices caudam componunt: binae intermediae iisdem ac in dorso coloribus transversim variegantur, laterales omnibus nigris. Pennae cinerae, punctulis nigris aspersae, pedes vestiunt ad exortum usque digitorum. Supra utrumque oculum cutis est nuda, coccinea, figuram quasi lunatam, in mare quam in femina latiore, efficiens. Rostrum basis circumdatur pennis (in mare tantum) nigris, punctulis minimis albis aspersis: & ad basin mandibulae inferioris macula utrinque extat majuscula alba. Rostrum & ungues nigricant: digiti griseo-fusci, appendiculas utrinque squamosas obtinent.

doigts sont gris-bruns. Ils sont garnis de chaque côté d'appendices écailleux.

Femina à mare discrepat in eo quod rufis dilutior
Tome I.

La gorge & le haut de la poitrine sont roux, sans mélange d'autre couleur. Les grandes couvertures du dessous de l'aile sont blanches. Les plumes de l'aile sont brunes, & leur bord extérieur est varié de roux: celles de l'aile bâtarde sont blanches du côté intérieur. La plus extérieure des plumes de l'aile est plus courte que la suivante; & la troisième est la plus longue de toutes. La queue est composée de seize plumes: les deux du milieu sont variées transversalement des mêmes couleurs que le dos; & toutes les latérales sont noires. Les pieds sont couverts jusqu'aux doigts de plumes grises, semées de petits points noirs. Au-dessus de chaque œil est une peau nue, d'un très-beau rouge, formant une espèce de croissant, plus large dans le mâle que dans la femelle. Les plumes qui entourent la base du bec (dans le mâle seulement) sont noires & semées de très-petits points blancs: & à la base du demi-bec inférieur il y a aussi de chaque côté une assez grande tache blanche. Le bec & les ongles sont noirâtres; & les

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est d'un roux plus
Ff

pâle, & qu'elle est variée de taches blanches par tout le corps.

On les trouve sur les montagnes d'*Auvergne*, sur les *Pyrenées* & les *Alpes*, sur les hautes montagnes d'*Italie* & de *Sicile*, & en *Angleterre* sur les hautes montagnes des provinces de *Derby*, d'*Yorck*, de *Westmorland*, & sur celles de la principauté de *Galles*.

tingatur, & maculis albis in universo corpore sit variegata.

Habitant in *Arverniensibus*, *Pyrenæis* & *Alpibus* montibus, in montibus altissimis *Italiae* & *Siciliae*, & in *Anglia* in altissimis montibus *Derbiensibus*, *Eboracensibus*, *Westmorlandicis* & *Cambro-Britannicis*.

10. LA GELINOTE HUPÉE D'AMÉRIQUE.

Lagopus cristata, fusco-rufescens, lineis nigris & albicantibus transversim striata; remigibus majoribus nigricantibus, exteriùs rufescente maculatis; rectricibus subtus nigris
ATTAGEN AMERICANA.

Lagopus, sive *Urogallus minor Americanus*, fuscus, in cervice plumis alas imitantibus. *Klein. Avi. pag. 117. N^o. 7.*

Cocq de bois d'Amérique. *Catesb. append. pag. 1*; avec une figure exacte *Pl. 1.*

Elle est environ d'un tiers plus grosse qu'une *Perdrix*. Sa queue a trois pouces de long. Ses yeux sont noirs; & l'iris est couleur de noisette. Tout son corps est couvert de plumes d'un brun-roussâtre, rayées transversalement de lignes noires & blanchâtres, mêlées ensemble. Cette couleur est plus claire dans la partie inférieure du corps. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres, & tachées de roussâtre du côté ex-

Crassitie tertiâ circiter parte *Perdicem* superat. Cauda tres pollices longitudine adæquat. Oculi sunt nigri; & eorum irides avellanæ. In toto corpore vestitur peninis fusco-rufescentibus, lineis nigris & albicantibus, simul admixtis, transversim striatis: qui color in parte corporis inferiore sit dilutior. Remiges majores sunt nigricantes, rufescente maculatæ, sed in latere exteriori

tantum. Rectrices superne dorso concolores, subtus verò nigrae. Pennae capitis verticem cooperientes caeteris sunt longiores; & cum eas erigit Avis, parvulam cristam efformant. Quod autem in hac Ave maximè singulare, quodque ab aliis omnibus notis Avibus eam præcipuè distinguit, sunt duo pennarum fasciculi, tres pollices longi, parvulas alas satis bene imitantes, in parte colli superiore, prope caput, utrinque siti. Unusquisque fasciculus quinque constat pennis, alia aliis intumbentibus, ad instar remigum, quæque gradatim longitudine minuuntur, longiore pennâ introrsum sitâ. Fasciculi isti, parvulas quasi alas imitantes, sunt ad libitum Avis mobiles: eos ferè semper secundum colli longitudinem extensos gerit, illosque non erigit, nisi dum perturbatur. (*Fœmina* istis caret pennarum fasciculis: in aliis omnibus *mari* similis). Pennae flavicantes pedes vestiunt ad exortum usque digitorum. Rostrum fuscum; digiti flavi. Habitat in *America*.

térieur seulement. Celles de la queue sont en-dessus de la même couleur que le dos, & en-dessous elles sont noires. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres; & lorsque l'Oiseau les redresse, elles lui forment une petite hupe. Ce que cet Oiseau a de très-singulier, & qui le distingue de tous les autres connus, ce sont deux petits paquets de plumes, longs de trois pouces, ressemblants assez à de petites aîles, placés, sçavoir un de chaque côté, sur la partie supérieure du col, assez près de la tête. Chacun de ces paquets est composé de cinq plumes, couchées les unes sur les autres, comme celles des aîles, & décroissant en longueur par degrés, la plus longue étant en-dedans. L'Oiseau peut mouvoir ces especes de petites aîles à sa volonté. Il les tient ordinairement couchées le long du col, & ne les élève que lorsqu'il est troublé. (*La femelle* n'a point ces petits paquets de plumes: à cela près elle ressemble assez au *mâle*). Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes jaunâtres. Le bec est brun; & les doigts sont jaunes. On la trouve en *Amérique*.

II. LA GELINOTE HUPÉE DE PENNSILVANIE.

Lagopus cristata, variis fuscis superne variegata, nigro admixto, infernè alba, aurantio admixto; pectore maculis lunatis nigris vario; rectricibus nigro transversim striatis, apice cinereis ATTAGEN PENNSILVANIÆ.

Coq de Bruyere à fraise. *Edwards. Glanur. pag. 79. Chap. XXXVIII; avec une figure exacte Pl. 248.*

Les Anglois l'appellent RUFFED HEATH-CKOCK ou RUFFED GROUS. Edwards.

Les Habitans de Pensilvanie, FAISAN. Edwards.

Elle tient le milieu pour la grosseur entre le *Faisan* & la *Perdrix*. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue quatre pouces; son pied dix-huit lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que huit lignes de long. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus des ailes sont joliment variées de bruns de différentes nuances, mêlés de noir. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres; & lorsque l'Oiseau les redresse, elles lui forment une hupe. Celles qui couvrent la partie supérieure du col, sont de même assez longues; & l'Oiseau peut les re-

Crassitie Phasiano cedit, Perdicem antecellit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes octodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus octo linearum longitudinem non excedit. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, alarumque tectrices superiores fusco, modò saturatius, modò dilutius, perpulchrè variegantur, cum aliqua nigri mixtura. In summo capite pennæ extant cæteris longiores, quibus, dum eas erigit Avis, crista efficitur. Quæ partem colli superiorem vestiunt, majorem quoque longitudinem obtinent;

Avis autem eas erigere postest, more *Gallorum*; & tunc torquem quodammodo efformant. Guttur & pars colli inferior pennis vestiuntur splendidè fuscis, ad aurantium inclinantibus. Quæ pectus, ventrem, latera & crura tegunt, alunt, cum aliqua aurantii tinctura, maculis quibusdam lunatis nigris in lateribus & pectore respersis. Tectrices caudæ inferiores sunt pallidè aurantiæ, maculis albis variæ: quæ alas subtus cooperiunt, albo & griseo variegantur. Scapulares pennæ sunt dorso concolores, oris tamen exterioribus albis. Remiges dorso quoque concolores, sed paulò saturatiùs, fusco dilutiore maculantur. Tectrices caudæ superiores fusco pariter, modò saturatiùs, modò dilutiùs, variegantur, apicibus cinereis; supra quem colorem cinereum tænia extat nigra, marginibus utriusque pennæ parallela. Rectrices dorsi coloribus exornantur, & insuper nigro transversim sunt striatæ, apicibus cinereis; in cinereo autem tænia adest transversa nigra, cæteras tæbias latitudine superans. Plumæ basis mandibulæ superioris

dresser à la manière des *Cogs*, & s'en former une espèce de cravate. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un brun éclatant & tirant sur l'orangé. La poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte d'orangé, avec quelques taches noires, en forme de croissant, sur la poitrine & les côtés. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un orangé pâle, varié de taches blanches: celles du dessous des ailes sont variées de gris & de blanc. Les plumes scapulaires sont variées des mêmes couleurs que le dos, & ont de plus leur bord extérieur blanc. Les plumes des ailes sont d'une couleur un peu plus foncée que le dos, & variées de taches d'un brun plus clair. Les couvertures du dessous de la queue sont aussi variées de différens bruns & terminées de cendré, au-dessus duquel est une bande noire, qui s'étend parallèlement aux bords du bout de chaque plume. Celles de la queue sont variées de même que le dos, rayées transversalement de noir & terminées de cendré, sur lequel est aussi une bande transversale noire, mais plus large que les autres. Les plumes de la base du demi-bec supérieur

sont tournées en-devant , & couvrent les narines. Le bec est d'une couleur de corne brunâtre. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes blanches , qui imitent assez du poil ; & les doigts sont couleur de chair. On la trouve en *Pensilvanie*.

antrorsum incumbunt , næresque tegunt. Rostrum ex colore corneo fufcescit. Plumæ albæ , pilorum æmulæ , pedes vestiunt ad exortum usque digitorum. Digiti colore imbuuntur carneo. Habitat in *Pensilvania*.

** 12. LA GELINOTE BLANCHE.

Lagopus hyeme alba , æstate albo & fusco varia ; rectricibus lateralibus nigricantibus , apice albis LAGOPUS.

Lagopus. Gesn. Avi. pag. 576. hujus icon minùs accurata pag. 577.

Gesn. icon. Avi. pag. 65, in qua eadem icon.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 70. sp. 4.

Frisch. hujus icones accuratissimæ Tab. 110 & 111.

Lagopus simpliciter. Klein. Avi. pag. 116. N°. 4, in qua icon accurata.

Lagopus Avis Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 127. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXII.

Raj. Syn. Avi. pag. 55. N°. 5.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Perdix alba , sive *Lagopus. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 143. hujus icon minùs accurata pag. 147.*

Jonst. Avi. pag. 46. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII.

Perdix alba; Lagopus. Charlet. Exer. pag. 83. N°. 5.

Charlet. Onomast. pag. 74. N°. 5.

Perdix alba , seu *Lagopus Jonstoni. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XV. sp. 4.*

Perdix alba , seu *Perdix petrosa* , *Lagopus dicta. Rzac. Auc. Hist. nat.*

Pol. pag. 411.

Attagen candida. Bell. Obs. pag. 16.

Tetrao rectricibus albis ; intermediis nigris , apice albis. Faun. Suec.

Linn. N°. 169.

Perdrix blanche. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 259.

Perdrix blanche. Edwards. Tom. II. pag. LXXII ; avec une figure exacte Pl. 72.

Voy. de la B. de Hud. Tom. I. pag. 51 ; avec une figure exacte Pl. I.

Perdrix. Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 77.

Andersf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. pag. 49.

- Lagopus varia. *Gefn. Avi. pag. 578, in qua icon pessima.*
Gefn. icon. Avi. pag. 64, in qua eadem icon.
 Lagopus altera Gefneri, sive varia. *Willugh. Ornith. pag. 127.*
 Tertium Lagopodis Genus. *Gefn. Avi. pag. 579.*
 Les François l'appellent PERDRIX BLANCHE.
 Les Grecs, *Λαγριν.* Aldrov. *Jonst.*
 Les Italiens, HERBEY; PERDICE ALPESTRE. *Gefn. Aldrov. & en quelques endroits, PERDICE PETROSA. Aldrov.*
 Les Italiens des environs du Lac majeur l'appellent, lorsqu'elle a pris sa couleur d'été, COLMESTRE. *Gefn. Willugh.*
 Les Grisons, RABOLANE. *Willugh. Raj. RABALINO. Klein. & quelques-uns, RHONCAS. Gefn. Aldrov.*
 Les Trentins, PERDICE BIANCHE DELLA MONTAIGNE, ou PERNISE BIANCHE DELLA MONTAIGNE. *Gefn. Aldrov. & lorsqu'elle a pris sa couleur d'été, OTORNO. Gefn. Willugh.*
 Les Savoyards, PERDRIX BLANCHE. *Willugh. Raj. Sibbald.*
 Les Savoyards, voisins des Vallesans, ARBENNE. *Gefn. Aldrov.*
 Les Lombards, URBAN. *Gefn. Aldrov.*
 Les Allemands, SCHNEE-HOUN; SCHNEE-VOGEL; BERG-HOUN; WYSS-RAEB-HOUN; WYSZ-WILD-HOUN; SCHRAT-HOUN. *Gefn. Aldrov. SCHNEE-HUHN. Rzac. Frisch. BERG-HUHN. Frisch.*
 Les Suisses, STEIN-HOUN. *Gefn. Aldrov. Willugh. STEIN-HUHN. Rzac. Frisch.*
 Les Polonois, KUROPATWA SNIEZNICZKA. *Rzac.*
 Les Suédois, RIPA; SNOE-RIPA. *Linn.*
 Les Islandois, RYPEN. *Andersf.*
 Les Groenlandois, RYPER. *Andersf.*
 Les Lapons, CHERUNA. *Linn.*
 Dans les Alpes Laponnes on l'appelle SNOE-RIPER. *Andersf.*
 Les Ecoffois l'appellent PTARMIGAN. *Sibbald.*

Perdicem rubram crassitie antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum; cauda quatuor pollices; pes tredecim lineas; & trium digitorum

Elle est plus grosse que notre *Perdrix rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue quatre pouces; son pied treize lignes; & le milieu des trois

doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix-huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a que quatre lignes de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Pendant l'hyver elle est blanche par tout le corps : elle a cependant de chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, une petite tache noire ; & au-dessus de chaque œil est une petite bande de mammelons charnus, d'un très-beau rouge. Les grandes plumes de l'aîle, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la sixième inclusivement, ont leur tige noirâtre. La queue est composée de dix-huit plumes : les quatre du milieu sont blanches, & toutes les latérales sont noirâtres & terminées d'un petit bord blanc. Les pieds & même les doigts sont couverts jusqu'à l'origine des ongles de plumes blanches. Les ongles sont bruns ; & le bec est noir. Pendant l'été elle est variée de blanc & de brun ; & quelquefois de marron, rayé transversalement de noir. On la trouve dans les *Pays du Nord*, & en *France* & en *Italie* sur les hautes montagnes. Du cabinet de M. de Reaumur.

anticorum medius cum ungue unum pollicem cum sex lineis : laterales paulò sunt breviores ; & posticus quatuor linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Hyeme in universo corpore alba est ; exceptâ tamen parvâ maculâ nigrâ, inter rostrum & oculos utrinque sitâ. Supra utrumque oculum parvula est fascia papillis constans carnosis, coccineis. Remiges majores, à secunda scilicet ad sextam usque inclusivè, scapis donantur nigricantibus. Octodecim rectricibus cauda constat : quatuor intermediæ albæ, laterales verò nigricantes, margine albo terminatæ. Pedes, sicut & digiti, ad exortum usque unguum pennis vestiuntur albis. Ungues fusci : rostrum nigrum. Æstate albo & fusco variegatur ; quandoque etiam castaneo, nigro transversim striato. Habitat in *Septentrionalibus regionibus*, in *Galliæ* quoque & *Italiæ* montibus altissimis, *Ex museo Realmuriano*.



Designé et Gravé par Martinet

1. Gelinote des Pyrénées, mâle.

2. Gelinote des Pyrénées, femelle.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Gelinote de Canada, mâle.

2. Gelinote de Canada, femelle.



Genus Perdicis.

Le genre de la Perdrix.

Hujus character est

Son caractere est d'avoir

Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet anteriori, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Rostrum conico-incurvum:

Le bec en cone courbé:

Caput paleis destitutum:

La tête dénuée de membranes charnues:

Pedes nudi:

Les pieds nuds:

Cauda brevis.

La queue courte.

**** 1. LA PERDRIX GRISE.**

Perdix ex cinereo, rufo & nigro varia; pectore maculâ castaneâ, soleæ equinæ æmulâ, insignito; rectricibus septem extimis rufis, apice cinereis PERDIX CINEREA.

Perdix. Gesn. Avi. pag. 669. hujus icon minùs accurata pag. 670.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 103.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 327.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 291.

Frisch. hujus icon accurata Tab. 114.

Perdix minor (vel fulva Bellonio). Gesn. icon. Avi. pag. 64, in qua icon minùs accurata.

Perdix minor, sive cinerea. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 140. hujus icon non satis accurata pag. 141.

Perdix cinerea, seu minor. Jonst. Avi. pag. 46. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII.

Perdix cinerea, seu minor Jonstoni. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XV. sp. 2.

Perdix cinerea. Charlet. Exer. pag. 83. N°. 3.

Charlet. Onomazt. pag. 74. N°. 3.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Linn. systh. nat. ed. 6. Gen. 70. sp. 7.

Perdix cinerea Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 118. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII.

- Raj. Syn. Avi. pag. 57. N^o. A. 2.*
Perdix cinerea, vulgaris, nostras, Aldrovandi, Gesneri, Raji & aliorum. Klein. Avi. pag. 114. N^o. 1.
Perdix cinerea, seu campestris Aldrovandi, Schwenckfeldii. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 408.
Perdix vulgaris. Charlet. Exer. pag. 83. N^o. 7.
Charlet. Onomazt. pag. 75. N^o. 7.
Tetrao maculâ nudâ coccineâ ponè oculos, rectricibus ferrugineis. Faun. Suec. Linn. N^o. 172.
Avis externa Plinio. Gesn.
Perdrix. Alb. Tom. I. pag. 24; avec une figure mal coloriée Pl. 27.
Perdrix grise, ou Gouache. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 257; avec une figure peu exacte pag. 258.
Perdris; Perdris gringette; Perdris griesche; Perdris grise; Perdris goache; Perdris des champs. Bel. Portr. d'Ois. pag. 62 b, dans laquelle est la même figure.
On l'appelle aux environs de Montpellier, RASCLE. Gesn. Aldrov.
Les Hébreux l'appellent KORE. Gesn. Aldrov.
Les Chaldéens, KOREA. Gesn. Aldrov. KORIATH. Aldrov.
Les Arabes, CUBETH. Gesn. Aldrov.
Les Grecs, Πέρδικα. Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet. Schwenck. Σιρίλαρος. Aldrov. Jonst.
Les Grecs modernes, Πέρδικα. Aldrov. Jonst. Πέρδικα. Schwenck.
Les Candiots, Πέρδικα. Jonst.
Les Turcs, ZIL. Gesn. ZAL. Aldrov.
Les Portugais, CODORNIX. Gesn. Aldrov.
Les Espagnols, PERDIZ. Gesn. Aldrov.
Les Italiens, PERDICE. Bel. Gesn. Aldrov. PERNICE. Aldrov. Willugh.
PERNISSETTE. Bel. Gesn. STARNA. Bel. Gesn. Aldrov. Willugh.
Les Italiens, aux environs du Lac majeur, PERNIGONA. Bel. Gesn. Aldrov.
Les Allemands, VAELD-HOUN. Gesn. Aldrov. WILD-HUN; FELD-HUN. Schwenck. FELD-HUHN. Rzac.
Les Silésiens, RAEB-HOUN. Gesn. Aldrov. RAEB-HUN. Schwenck. REB-HUN. Rzac. REB-HUHN. Rzac. Frisch.
Les Illyriens, KUROPTWA. Gesn. Aldrov.
Les Polonois, KUROPATHWA. Gesn. Aldrov. KUROPATWA. Rzac.
Les Flamands, PERDIJS. Gesn. Aldrov.
Les Suédois, RAPP-HOENA. Linn.
Les Anglois, PARTRIDGE. Alb. COMMON-PARTRIDGE. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam

duodecim pollices & septem lineas aëquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum; cauda tres pollices; pes unum pollicem & quinque lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue eandem mensuram explet: laterales paulò sunt breviores; posticus autem quinque linearum longitudinem non excedit. Digiti tres anticos rudimentum membranæ, ad primum usque articulum extensæ, in exortu inter se connectit. Alis extensis, extremitates majorum remigum octodecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad unum pollicem ultra caudæ exortum protenduntur. Frons, capitis latera & guttur dilutè rufescunt. Capitis superior pars ex fusco rufescit, lineisque longitudinalibus, minimis, flavicantibus variegatur. Supra oculos papillæ sunt rubræ. Collum superius ex cinereo, rufo & nigro transversim varium. Dorsum, uropygium & tectrices caudæ superiores concolores, quæque pennæ taniâ strictiore transversâ rufâ

est de douze pouces sept lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue trois pouces; son pied un pouce cinq lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, aussi un pouce cinq lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que cinq lignes de long. Les trois doigts antérieurs sont joints ensemble à leur origine par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a dix-huit pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées; s'étendent à un pouce au-delà de l'origine de la queue. Le front, les côtés de la tête & la gorge sont d'un roux clair. La partie supérieure de la tête est d'un brun-rouffâtre, avec de petites lignes longitudinales, jaunâtres. Au-dessous des yeux sont de petites excroissances de chair rouges. La partie supérieure du col est joliment variée transversalement de cendré, de noir & d'un peu de roux. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, & chaque plume a vers le bout une étroite bande transversale, rous-

se. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un cendré-bleuâtre, varié de même transversalement de noir, avec quelques petites taches rousses. Au bas de la poitrine est une large bande marron, qui a la forme d'un fer à cheval. Les plumes des côtés sont de la même couleur que celles de la poitrine, & chacune a vers le bout une large bande transversale, rousse, & sa tige est blanchâtre. Le bas ventre est d'un blanc sale & jaunâtre. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres, variées transversalement de noirâtre, & chaque plume a dans son milieu une ligne blanchâtre, qui s'étend selon la longueur de la tige. Les couvertures de l'aile & les plumes scapulaires sont variées comme le dessus du corps, & ont de plus de grandes taches rousses : chacune a aussi dans son milieu une ligne d'un blanc-roussâtre, qui s'étend selon la longueur de sa tige. Les couvertures du dessous de l'aile sont blanches. Les plumes de l'aile sont gris-blanc en-dessous, & en-dessus les grandes sont brunes, rayées transversalement de blanc-roussâtre; & les moyennes sont variées de brun, de roux & de blanc-roussâtre. La queue est composée de vingt

versus apicem donatâ. Collis pars inferior & pectus ex cinereo cœrulescunt, nigroque transversim striantur, maculis quibusdam rufis admixtis. Imum pectus maculâ castaneâ, soleæ equinæ æmulâ, insignitur. Ad latera pectori concolor, quæque tamen penna tæniâ versus apicem latâ, transversâ, rufâ & scapo albicante donatur. Venter infimus ex sordidè albo flavescit. Crura & tectrices caudæ inferiores rufescentes, nigricante transversim variæ, lineâ albicante, secundùm scapi longitudinem extensâ, in medio cujusque pennæ positâ. Alarum tectrices & scapulares pennæ dorso concolores, maculis insuper majusculis, rufis admixtis: uniuscujusque etiam pennæ medium lineâ albo-rufescente, secundùm scapi longitudinem extensâ, præditum est. Alarum tectrices inferiores albæ. Remiges infernè cinereo-albæ; superne verò majores fuscæ, albo-rufescente transversim striatæ: & minores ex fusco, rufo & albo-rufescente variegatæ. Viginti rectricibus cauda constat: sex intermedia dorso concolores: septem utrinque extrema rufâ, apicibus cinereis.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre II.* 223

Rostrum, pedes, unguesque plumas : les six du milieu sont cinereo-cœrulescentes. Mas variées des mêmes couleurs in parte pedis posteriore cal- que le dos, & les sept autres cari obtuso donatur. Habi- de chaque côté sont rousses & tat in campis & pratis. *Ex terminées de cendré. Le bec, museo Realmuriano.* les pieds & les ongles sont d'un cendré-bleuâtre. Le mâle a à

la partie postérieure du pied un ergot obtus. On la trouve dans les champs & les prairies. *Du cabinet de M. de Reau- mür.*

Hujus speciei varietates Les variétés de cette espece sunt sont

A. LA PERDRIX GRISE BLANCHE.

Perdix cinereo-alba.

Perdix cinerea. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 115.*
Les Silésiens l'appellent WEISSE-REB-HUHN. Frisch.

Colore à præcedente dif- Elle diffère de la précédente fert. Pennæ enim in toto en ce que toutes ses plumes corpore sunt cinereo-albæ, font d'un gris-blanc, varié de lineis minimis, transversis & petites lignes brunes, transver- undatis, fuscis variæ, cum sles & en ziczacs, & mêlé d'une aliqua rufescentis mixtura. légère teinte de roussâtre.

* * B. LA PERDRIX DE DAMAS.

Perdix Damascena.

Perdix Damascena. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 143. hujus icon satis accurata pag. 142.*

Jonst. Avi. pag. 46. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII.
Klein. Avi. pag. 114. N°. 2.

Perdix Damascena Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 119. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 57. N°. 3.

Charlet. Exer. pag. 83. N°. 4.

Charlet. Onomazt. pag. 74. N°. 4.

Les Anglois l'appellent DAMASENS-PARTRIDGE. Willugh.

Elle ressemble tellement à la *Perdrix grise* par sa couleur, qu'on a peine à la distinguer du premier coup d'œil. Elle en diffère cependant en ce qu'elle est plus petite. Son bec est plus allongé que celui de la *Perdrix grise* : & ses pieds tirent sur le jaune. C'est la petite espèce de *Perdrix grise* qu'on trouve en différentes provinces de France.

** 2. LA PERDRIX DE MONTAGNE.

Voyez Pl. XXI. Fig. 2.

Perdix dilutè castanea, pennarum dorsi marginibus ad fuscum vergentibus; capite & collo supremo fulvis; rectricibus septem extimis dilutè castaneis, . . . PERDIX MONTANA.

Perdix fuscus. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 114. B.
Les Silésiens l'appellent SCHWARTZ-BRAUNE - REB-HUHN. Frisch.

Elle est à peu près de la grosseur de la *Perdrix grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied un pouce six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a

Craffitie *Perdicem cineream* circiter adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem est pollicum & novem linearum, & ad extremos ungues undecim pollicum cum duabus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est; cauda duos pollices & decem lineas; pes octodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septemdecim lineas: laterales paulò sunt brevior.

res; & posticus quatuor linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ ultra mediam caudæ longitudinem paululùm extenduntur. Caput, guttur & collum supremum fulva. Collum infimum, pectus, ventris pars suprema, latera & caudæ tectrices inferiores dilutè castaneæ. Dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ caudam superne tegunt, alarumque tectrices concolores; cujusque tamen pennæ margine ad fuscum paululùm inclinante; maculis quoque quibusdam griseis admixtis in parte dorfi superiore & scapularibus pennis, quandoque etiam in tectricibus alarum. Venter, imus & crura dilutissimo imbuuntur fulvo. Ala notha & majores remiges griseofusca, latere exteriori paululùm rufescentis admixto: minores remiges alarum tectricibus concolores, ipsarumque margines paucogriseo & albicante variegantur. Viginti tectricibus cauda constat: sex intermediæ ex castaneo ad fuscum vergunt, apicibus paucogriseo aut albicante variis: septem utrinque extremæ dilutè castaneæ. Rostrum cinereum. Pedes,

que quatre lignes de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le haut du col sont fauves. Le bas du col, la poitrine, le haut du ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un marron clair. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur, mais le bord de chaque plume tire un peu sur le brun; & il y a un peu de gris mêlé à la partie supérieure du dos & aux plumes scapulaires, & quelquefois même aux couvertures des aîles. Le bas ventre & les jambes sont d'un fauve très-clair. L'aîle bâtarde & les grandes plumes des aîles sont d'un gris-brun, & leur côté extérieur est mêlé d'un peu de roussâtre: les moyennes sont de la même couleur que les couvertures des aîles, & leurs bords sont variés d'un peu de gris & d'un peu de blanchâtre. La queue est composée de vingt plumes: les six du milieu sont d'un marron tirant sur le brun, & variées vers leur bout d'un peu de gris ou de blanchâtre: & les sept autres de chaque côté sont d'un marron clair. Le

bec est cendré. Les pieds & les ongles sont gris-bruns. On la trouve sur les montagnes : elle descend quelquefois dans les plaines, & se mêle avec les *Perdrix grises*. Du cabinet de M. de Reaumur,

unguesque griseo-fusci. Habitat in montibus : in campestria loca quandoque descendit, & cum *Perdicibus cinereis* cohabitat. Ex museo Realmuriano,

3. LA PERDRIX DE MONTAGNE DU MEXIQUE.

Perdix ex fusco, pallenti & fulvo variâ; capite, gutture & lateribus nigro maculatis; rostro, pedibusque ex rubeo candescentibus *PERDIX MONTANA MEXICANA*,

Ococolin, seu *Perdix montana*. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 32. cap. LXXXV.

Ococolin, seu *Perdix montana Hernandezii*. Raj. Syn. Avi. pag. 57. N^o. 1.

Les Mexiquains l'appellent OCOCOLIN. Fern.

Elle est beaucoup plus grosse que la *Perdrix grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui des ongles est d'un pied neuf pouces. Tout son corps est couvert de plumes variées de brun, de jaunâtre & de fauve ; cependant la plus grande partie de la tête & du col est fauve, & semée de plumes grises & blanches. La partie supérieure de la tête, la gorge & les côtés sont aussi variées de taches noires. Les ailes sont cendrées en-dessous, & en-dessus elles sont grises, variées de taches blanches & fauves. L'iris des yeux est noir. Le bec & les pieds sont d'un

Perdicem cineream crassitie multum superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad extremos ungues unum pedem & novem pollices æquat. Totius corporis color ex fusco, pallenti & fulvo variegatur; caput tamen, collumque magna ex parte fulvescunt, & insperguntur pullis ac candentibus peninis, velut quæ circa superiorem capitis sunt partem, in lateribus & gutture, nigris. Alæ infernè cinereæ sunt, ac pullæ superne, maculisque albis & fulvis distinctæ. Oculorum irides nigræ. Rostrum & pedes candescunt ex rubeo,

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre II.* 227

beo. Habitat in *Mexicanis* rouge pâle. On la trouve au
regionibus temperatis, aut *Mexique*, où elle habite les
paulò frigidioribus. endroits les plus tempérés &
les moins chauds.

4. LA PERDRIX DU BRÉSIL.

Perdix obscurè flaves cens; maculis fuscis variegata
PERDIX BRASILIENSIS.

Perdix major olivaria, longiusculo & nigro rostro. *Barr. Hist. Fr. Eq.*
pag. 138.

Perdix Americana, olivaria, longiusculo & nigro rostro. *Barr. Ornith.*
Class. IV. Gen. XV. sp. 8.

Perdix Brasiliiana, Jambu dicta Pisoni. *Willugh. Ornith. pag. 119.*
Raj. Syn. Avi. pag. 57. N° 4.

Jambu. *Pison. Hist. nat. pag. 81, in qua hujus icon pessima.*

Jambu Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 192.*

Jonst. Avi. pag. 131.

Les François de la Guiane l'appellent GROSSE PERDRIX. Barr.

Les Indiens de la Guiane, TINAMOU. Barr.

Les Brasiliens, JAMBU. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.

<i>Perdicibus nostratibus</i> ma- gnitudine & crassitie par. <i>Pennæ</i> per totum corpus sunt obscurè flavescentes, verùm fusco mixtæ atque maculatæ. Rostrum longiusculum est & nigrum. Arboribus insidet. Ova ponit splendide cœru- lea. Habitat in <i>Brasilia</i>.	Elle est de la même gran- deur & de la même grosseur que <i>nos Perdrix</i>. Tout son corps est couvert de plumes d'un jau- nâtre obscur, mêlé & taché de brun. Son bec est assez long & noir. Elle perche sur les arbres. Ses œufs sont d'un très-beau bleu. On la trouve au <i>Brésil</i>.
---	---

5. LA GROSSE PERDRIX DU BRÉSIL.

Perdix obscurè cinerea; capite & collo obscurè flavo & nigro
punctulatis; gutture albicante; remigibus nigris
PERDIX MAJOR BRASILIENSIS.

Psophia crepitans, nigra, pectore columbino. *Barr. Ornith. Class. III.*
Gen. XXXVI.

Tome I.

H h

Gallina sylvatica, crepitans, pectore columbino. *Barr. Hist. Fr. Equi*
pag. 132.

Gallina sylvestris Macucagua Brasiliensibus dicta Marcgravio. *Willugh.*
Ornith. pag. 116. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXVI.

Gallina sylvestris Macucagua Brasiliensibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi.*
pag. 53. N^o. 9.

Tarda Macucagua. *Klein. Avi. pag. 18. N^o. 4.*

Macucagua. *Pison. Hist. nat. pag. 88, in qua hujus icon à Marcgravio*
mutuata.

Joan. de Laet. Nov. orb. pag. 557.

Jonst. Avi. pag. 125.

Macucagua Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 213, in qua icon mi-*
nimè accurata.

Jonst. Avi. pag. 146. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 61.

Oiseau-Trompette. *Comdam. Voy. des Amaz. pag. 174.*

Les Espagnols de la province des Maynas l'appellent TROMPETERO. Com-
dam.

Les Indiens de la Guiane, AGAMI. Barr. Comdam.

Les Brasiliens, MACUCAGUA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.

Elle est plus grosse qu'une Poule ordinaire. Son bec a plus d'un pouce & demi de long ; & son pied deux pouces & demi. Ses doigts sont assez gros , & armés d'ongles courts & obtus. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas plus loin que le corps. La tête & le col sont variés de petits points noirs & d'un jaune obscur. La gorge est blanche. Le dos , la poitrine , le ventre & les jambes sont d'un cendré obscur. Les couvertures des aîles sont d'un brun varié de lignes noires en point d'Hongrie. Les plumes de l'aîle sont tout-à-fait noires. Elle n'a point de queue. Les narines sont grandes & placées vers la moitié de la lon-

Gallinam vulgarem crassitie superat. Rostrum plus sesquidigitum longum ; pes duos cum semî digitos. Dígiti sunt crassiusculi , unguibus brevibus, obtusis præditi. Alæ complicatæ cum corpore desinunt. Caput & collum punctulata sunt obscurè flavo & nigro. Guttur albicat. Dorsum , pectus , venter & crura obscurè cinerei sunt coloris. Alarum tectrices fusca , per totum nigro undatim varia. Remiges pennæ totaliter nigra. Caudâ caret. In rostri medietate duo habet narium foramina ampla ; oculos nigros ; post eos aliquanto spatío aures , more Gallinarum ; rostrum nigrum ;

pedes cœrulescentes ; un-
gues griseos. Ova ponit *Gal-*
linaceis paulò majora, co-
loris cœruleo-viridis. Habi-
tat in *Brasilia & Guiana.*
gueur du bec. Elle a des yeux
noirs, derrière lesquels à une
petite distance sont placées les
oreilles, comme dans les *Pou-*
les. Le bec est noir. Les pieds
sont bleuâtres ; & les ongles
gris. Ses œufs sont un peu plus gros que ceux des *Poules*,
& d'un bleu-verdâtre. On la trouve au *Bresil* & dans la
Guiane.

6. LA PERDRIX DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

Perdix superne fusco-rufescens nigro variegata, infernè ad
flavum inclinans nigro transversim striata ; gutture albo ;
taniâ supra oculos albâ ; rectricibus fuscis . . . PERDIX
NOVÆ ANGLIÆ.

Perdix Novæ Angliæ. *Klein. Avi. pag. 115. N°. 3.*

Tetrao lineâ superciliarum albâ. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 471.*

Perdrix de la Nouvelle Angleterre. *Alb. Tom. I. pag. 25 ; avec une*
figure mal coloriée Pl. 28.

Les Anglois l'appellent NEW ENGLAND PARTRIDGE. *Alb.*

Les Anglois de la Jamaïque, PARTRIDGE. *Browne.*

Perdici cinereæ magnitu-
dine cedit. Caput, collum,
dorsum, uropygium, pennæ
caudam superne tegentes,
alarumque rectrices ex fusco
ad rufum inclinant, & nigro
variegantur, collo superio-
re maculis quibusdam, par-
vulis, albis prædito. Guttur
albicat. Caput in utroque la-
tere taniâ donatur longitu-
dinali albâ, ab exortu rostri,
supra oculos, ad occipitium
usque ductâ. Pectus, venter
& latera ad flavum inclinant,

Elle est plus petite que la
Perdrix grise. La tête, le col,
le dos, le croupion, les cou-
vertures des ailes & celles du
dessus de la queue sont d'un
brun tirant sur le roux, varié &
bigarré de noir, avec quelques
petites taches blanches à la
partie supérieure du col. La
gorge est blanche ; & il y a de
chaque côté de la tête une ban-
de longitudinale de la même
couleur, qui commence à l'o-
rigine du bec, passe par-dessus
les yeux, & va jusqu'à l'occi-

put. La poitrine, le ventre & les côtés sont d'une couleur tirant sur le jaune, & rayée transversalement de noir. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont jaunâtres & variées de taches de marron. Les plumes des ailes & celles de la queue sont brunes. L'iris des yeux est jaune. Le bec & les ongles sont noirs : & les pieds sont d'un brun clair. On la trouve à la Nouvelle Angleterre & à la Jamaïque.

nigroque transversim sunt striata. Crura & caudæ rectrices inferiores sunt flavescens, maculis castaneis variæ. Remiges, rectricesque fusæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum, unguesque nigri : pedes dilutè fusci. Habitat in *Nova Anglia* & *Jamaica*.

7. LA PERDRIX D'AMÉRIQUE.

Perdix superne fusco-rufescens nigro variegata, infernè albo-flavescens nigricante varia ; tribus utrinque taniis in capite nigris ; rectricibus obscurè fuscis PERDIX AMERICANA.

Perdix virginiana. *Klein. Avi. pag. 115. N°. 6.*

Perdix Américaine. *Catesb. append. pag. 12 ; avec une figure exacte Pl. 12.*

Les Anglois l'appellent AMERICAN PARTRIDGE. *Catesb.*

Elle est beaucoup plus petite que la *Perdrix grise*. Les côtés de la tête & la gorge sont d'un blanc-jaunâtre. De chaque côté de la tête sont trois bandes noires, sçavoir une qui commence à la narine, passe bien au-dessus des yeux, & va se rendre, en se courbant, jusqu'au-dessous de l'occiput : une seconde, qui commence vers l'origine du demi-bec inférieur, & passe par-dessous les yeux : & enfin une troisième transversale qui

Perdici cineræ crassitie multum cedit. Capitis latera & guttur ex albo flavescunt. In capite insuper tres utrinque sunt taniæ nigræ, una scilicet prope nares incohata, supra oculos ducta, & reflexa, infra occipitium protenditur : altera versùs mandibulæ inferioris exortum orta, infra oculos ducta : tertia denique transversa, infra guttur sita, & utrinque ad capitis posteriorem par-

tem usquē extensa, torquem quodammodo efficiens. Vertex capitis, colli pars superior, dorsum, uropygium & caudæ tectrices superiores fusco-rufescentes, nigro variæ. Pars colli inferior, pectus, venter & crura ex albo flavescent & nigricante variegantur. Laterum pennæ fusco-rufescentes, albo variæ. Caudæ tectrices inferiores rufescentes, maculis rotundis, nigris variegatæ. Alarum tectrices fusco-rufescentes maculis nigris variegantur. Remiges majores obscurè fuscescent, oris exterioribus rufescentibus : minores alarum tectricibus concolores. Rectrices obscurè fuscæ, absque ulla alterius coloris mixtura. Oculorum irides rubræ. Rostrum nigrum : pedes fusci. Arboribus insidet : in sylvestribus locis libentiùs quàm in campis degit. Habitat in *America*.

arbres, & fréquente les bois On la trouve en *Amérique*.

prend sous la gorge, & s'étend de chaque côté jusque vers le derriere de la tête, en formant une espece de collier. Le sommet de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre, bigarré de noir. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les jambes sont d'un blanc-jaunâtre, varié de noirâtre. Les plumes des côtés sont d'un brun-roussâtre, varié de blanc. Les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres & variées de taches rondes, noires. Les couvertures des aîles sont d'un brun-roussâtre, marqué de taches noires. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun obscur, & leur bord extérieur est roussâtre : les moyennes sont de la même couleur que les couvertures des aîles. Celles de la queue sont d'un brun obscur & sans mélange. L'iris des yeux est rouge. Le bec est noir : & les pieds sont bruns. Elle perche sur les

plus que les pays découverts.

** 8. LA PERDRIX DU SÉNÉGAL.

Voyez le mâle Pl. XXIV. Fig. 1.

Perdix rufo, fusco, & sordide albo variegata ; tribus utrin-

que in capite taniis, duabus nigris, alterâ albâ
 PERDIX SENEGALENSIS.

Elle est plus grosse que notre *Perdrix rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue trois pouces; son pied deux pouces une ligne; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que six lignes de longueur. Les trois doigts antérieurs sont joints ensemble à leur origine par une petite membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Les ailes, lorsqu'elles sont pliées, vont un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Tout le corps est joliment varié de roux, de brun & de blanc sale. La partie supérieure de la tête est rousse & sans taches. Les côtés de la tête sont d'un blanc sale, & marqués de petites taches longues & brunes. La gorge est d'un blanc sale & sans taches. De chaque côté de la tête sont trois petites bandes, sçavoir

Perdicem rubram crassitie superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem usque tredecim pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unius pollicis longitudinem æquat; cauda trium pollicum; pes duorum pollicum & lineæ unius; & trium digitorum anticorum medius cum ungue viginti linearum; laterales paulò sunt breviores; & posticus sex linearum longitudinem non antecellit. Digi tres antici in exortu rudimento membranæ, ad primum usque articulum tantum extenso, inter se connectuntur. Alæ complicatæ paululum ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Per universum corpus rufò, fusco & sordidè albo perpulchrè variegatur. Capitis superior pars rufa, immaculata. Capitis latera, sive genæ sordidè albæ, maculis minimis, longiusculis, fuscis variæ. Guttur sordidè albicat absque ulla macula. Tres utrinque extant in capite taniæ, una scilicet nigra, stric-

tissima, ab exortu rostri supra oculum ducta & post oculum desinens; supra quam alia est alba ab exortu etiam rostri multò ultra oculos protensa : & supra hanc albam altera est tania nigra ab exortu quoque rostri ad partem capitis posteriorem ducta , in qua desinit. Collum rufum, maculis minimis, fuscis & sordidè albis varium. Dorsum, uropygium, alarum tectrices, remiges, rectricesque fusco, rufo & sordidè albo variegantur. Pectus, venter, latera, crura & caudæ tectrices inferiores iisdem variæ coloribus, ex quibus tamen fuscus & sordidè albus majorem partem obtinent, & parùm rufi admiscetur. Iconem consule : varietates enim istas excellentiùs ostendet quàm accuratior descriptio eas exprimere possit. Rostrum corneum. Pedes, unguisque fusci. Pes uterque calcaribus binis præditus est. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Adanson.*

Et hæc est *maris* descriptio. *Fæminam* non novi.

une noire & très-étroite, qui commence à l'origine du bec, & va se terminer derriere l'œil en passant par-dessus. Au-dessus de celle-ci est une bande blanche, qui commence de même à l'origine du bec, & va se terminer bien au-delà des yeux. Au-dessus de cette dernière est une autre bande noire, qui commence encore à l'origine du bec, & va se terminer derriere la tête. Le col est roux & marqué de petites taches brunes & de blanc sale. Le dos, le croupion, les couvertures des aîles, les plumes des aîles & celles de la queue sont variées de brun, de roux & de blanc sale. La poitrine, le ventre, les cotés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont variées de ces mêmes couleurs, mais le brun & le blanc sale dominant, & il y a peu de roux. L'inspection de la figure fera mieux voir cette variété que la meilleure description ne pourroit l'exprimer. Le bec est de couleur de corne. Les pieds & les ongles sont bruns. Il y a à chaque pied deux ergots. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson.*

Celle que je viens de décrire est un mâle. Je ne connois pas la femelle.

9. LA PERDRIX DE LA CHINE.

Voyez le mâle Pl. XXVIII. A. Fig. 1.

Perdix fusca, maculis orbiculatis, albicantibus & rufescentibus varia; dorso fusco & rufescente transversim striato; quatuor utrinque in capite taniis, duabus nigricantibus, aliâ rufescente, alterâ albâ *PERDIX SINENSIS*.

Les Chinois l'appellent Tche-Cou.

Je n'ai jamais vu cette espece de *Perdrix*. Je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait sur l'animal vivant à la *Chine* même, par *M. Poivre*.

Elle est un peu plus grosse que notre *Perdrix rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue deux pouces deux lignes; son pied un pouce sept lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes; les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que six lignes de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'éten-

Hanc *Perdix* speciem non novi. Ipsi descriptionem desumpsi, eamque æri insculptam esse curavi ex icone animalis in *Sinensi* regione à *D. Poivre* ad vivum depicta.

Perdicem rubram nostratam crassitie paululum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim circiter pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem cum semi lineas longum; cauda duos pollices cum lineis binis; pes unum pollicem & septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septemdecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus sex linearum longitudinem non superat. Ala complicata

complicata caudæ exortum non excedunt. Quatuor utrinque in capite tæniæ longitudinales, omnes ab exortu rostri ductæ, ad capitis posteriorem partem protenduntur, duæ scilicet nigricantes, quarum superior latior est & per oculos ducitur, inferior verò secundum maxillæ inferioris longitudinem extenditur: duas inter tæniæ istas nigricantes altera extat tænia alba; & supra eas altera rufescens. Capitis vertex fuscus, maculis minimis albicantibus varius. Guttur album. Collum, pectus, venter, latera, alarumque rectrices fuscæ, maculis orbiculatis, albicantibus & rufescentibus variegatæ. Dorsum, uropygium & caudæ rectrices superiores pennæ fusco & rufescente transversim striatæ. Remiges fuscescunt, tæniisque variegantur transversis, albicantibus, in utroque remigis latere arcuatis. Rectrices rufescentes, tæniis transversis nigris, in utroque rectricis latere arcuatis, striatæ, apicibus nigris. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, unguisque nigricantes: pedes rufi. Mas in parte pedis posteriore calcari donatur duas cum semi

dent pas au-delà de l'origine de la queue. Il y a de chaque côté de la tête quatre bandes longitudinales, qui commencent toutes à l'origine du bec, & s'étendent jusqu'au derrière de la tête, sçavoir deux noirâtres, dont la supérieure est la plus large, & passe par les yeux, & l'inférieure s'étend le long de la machoire inférieure: entre ces deux en est une blanche, & au-dessus une roussâtre. Le sommet de la tête est brun, varié de petites taches blanchâtres. La gorge est blanche. Le col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures des ailes sont brunes, variées de taches rondes, blanchâtres & roussâtres. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de brun & de roussâtre. Les plumes des ailes sont brunes & variées de rayes transversales, blanchâtres, qui forment sur chaque côté de la plume un petit arc de cercle. Celles de la queue sont roussâtres, rayées transversalement & terminées de noir. Ces rayes noires forment, comme sur les ailes, un petit arc de cercle sur chaque côté de la plume. L'iris des yeux est couleur de noisette. Le bec est noirâtre, ainsi que les ongles: & les pieds sont

roux. Le mâle a à la partie postérieure du pied un ergot long de deux lignes & demie, & pointu. On la trouve à la Chine.

lineas longo, acuto. Habitat in *Sinenſi regione*.

**** 10. LA PERDRIX ROUGE.**

Perdix ſuperne grifeo-fuſca, infernè ruſa; penniſ laterum tæniâ ſimplici nigrâ donatiſ; rectricibuſ quinque extimiſ ruſiſ; roſtro, pedibuſque rubriſ. . . . *PERDIX RUBRA.*

- Perdix ruſa.* *Aldrov. Avi. Tom. II. hujus icon peſſima pag. 139. (Deſcriptio eſt Perdicis græcæ).*
Jonſt. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII.
Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.
Klein. Avi. pag. 115. N^o. 4.
Charlet. Exer. pag. 83. N^o. 2.
Charlet. Onomazt. pag. 74. N^o. 2.
Perdix ruſa, ſive major. Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. XV. ſp. 3.
Perdrix rouge. Alb. Tom. I. Pl. 29, dans laquelle eſt une figure mauvaiſe & mal coloriée. (La deſcription eſt celle de la Bartavelle).
Perdrix franche. Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag. 255; avec une figure paſſable pag. 256.
Perdrix gaille, gaye, ou gaule; Perdrix rouge, ou aux pieds rouges; Pernille. Bel. Portr. d'Oiſ. pag. 62 a, dans laquelle eſt la même figure. Les Grecs l'appellent Περδική. Bel.
Les Catalans, PERDIU XERRA. Barr.
Les Angloiſ, RED-LEG'D PARTRIDGE. Willugh. RED-LEGG'D PARTRIDGE.
Alb. SPANISH PARTRIDGE. Charlet.

Elle eſt un peu plus groſſe que la *Perdrix grife*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de douze pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces ſix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; ſa queue trois pouces dix lignes; ſon pied un

Craſſitie Perdicem cineream paululùm antecellit. Ipiuſ longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duodecim polliceſ & novem lineas æquat, & ad extremos unguēſ tredecim polliceſ & ſex lineas. Roſtrum ab ipſiuſ apice ad oriſ anguloſ novem lineas longum; cauda treſ polliceſ & decem lineas;

pes unum pollicem cum sex lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus sex linearum longitudinem non excedit. Alarum extensarum extremitates octodecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Capitis pars anterior sive synciput griseo-fuscum; pars verò posterior sive occiput ex fusco ad rufum inclinat. Guttur albicat: quæ albedo nigrâ circumdatur taniâ, à naribus utrinque inchoatâ, infra oculos ductâ, indeque sub gutture reflexâ, in quo torquem quodammodo efficit. In utroque capitis latere taniâ extat supra oculum longitudinalis alba, infra occipitium producta & desinens. Pennæ inferiorem partem & latera colli tegentes cinereæ, maculisque duabus nigris versùs apicem, utrinque unâ, notatæ. Pars colli superior ex fusco rufescit; quæque autem penna, infra occipitium sita, binis maculis obliquis nigris versùs apicem, utrinque unâ, insignitur. Dorsum, uropygium,

pouce six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a que six lignes de long. Elle a dix-huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Le devant de la tête ou le synciput est gris-brun; le derriere de la tête ou l'occiput est d'un brun tirant vers le roux. La gorge est blanche: cette couleur est entourée d'une bande noire, qui prend de chaque côté aux narines, passe par-dessous les yeux, & de là en tournant va se rendre sous la gorge, où elle forme une espèce de collier. Il y a de chaque côté de la tête une bande longitudinale, blanche, qui commence au-dessus de l'œil & va se terminer au-dessous de l'occiput. La partie inférieure & les côtés du col sont couverts de plumes cendrées, qui ont chacune deux taches noires vers leur bout, sçavoir une de chaque côté. La partie supérieure du col est d'un brun-roux; mais les plumes qui sont au-dessous de l'occiput ont chacune vers leur bout deux taches obliques, noires, sçavoir une de chaque côté. Le dos, le croupion, les

couvertures du dessus de la queue & celles des ailes sont d'un gris-brun. La poitrine est d'un joli cendré. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont rouffes. Les plumes des côtés sont cendrées à leur origine, ensuite elles ont une raye transversale blanche, qui est suivie d'une noire, & sont terminées de roux. Les plumes de l'aile sont d'un gris-brun, & le bord extérieur des grandes est jaunâtre. La queue est composée de seize plumes : les quatre du milieu sont d'un gris-brun ; celle qui les suit de chaque côté est rouffe du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur ; & les cinq plus extérieures de chaque côté sont tout-à-fait rouffes. L'iris des yeux est d'un beau rouge, ainsi que les paupières. Le bec & les pieds sont rouges ; & les ongles bruns. Le mâle a à la partie postérieure du pied un ergot obtus. On la trouve dans les bois.

Du cabinet de M. de Reaumur.

Une variété de cette espece est

**** A. LA PERDRIX**

Perdix rufo-alba.

Elle est de la même grosseur & de la même grandeur que la

alarum tectrices & pennæ caudam superne tegentes sunt griseo-fusca. Pectus dilutè cinerascit. Venter, crura & caudæ tectrices inferiores rufa. Pennæ latera cooperientes in exortu cineræ, deinde taniâ transversâ albâ, quam tania sequitur nigra, donatæ, apicibus rufis. Remiges pennæ griseo-fusca, oris exterioribus majorum flavescens. Sexdecim rectricibus cauda constat : quatuor intermediae sunt griseo-fusca ; quæ eas utrinque sequitur in latere exteriori rufa, in interiore verò griseo-fusca ; & quinque utrinque extremae in utroque latere rufa. Oculorum irides & palpebræ coccineæ. Rostrum, pedesque rubri ; ungues fusci. Mas in parte pedis posteriore calcari obtuso donatur. Habitat in sylvis. *Ex museo Realmuriano.*

Hujus speciei varietas est

ROUGE BLANCHE.

Magnitudine & crassitie præcedentem adæquat. Ut

illa, rostro, pedibusque rubris, & oculorum iridibus & palpebris coccineis prædita est; ab ea autem colore discrepat. Capitis pars superior ex fusco rufescit. In reliquo corpore ex sordide albo ad rufum vergit; & pennæ latera tegentes tæniis transversis, rufis insigniuntur. In parte colli superiore magis ad rufum inclinat quam in aliis corporis partibus. Habitat cum præcedente. Ab *Aurelia* in *musæum Realmurianum* missa fuit à *D. Salerne*.

précédente. Elle a, comme elle, le bec & les pieds rouges, ainsi que l'iris des yeux & les paupières; mais elle en diffère par sa couleur. Le dessus de sa tête est d'un brun-roux. Tout le reste de son corps est d'un blanc sale & roussâtre; & les plumes des côtés ont des rayes transversales, rouffes. La nuance de roussâtre est un peu plus forte par-dessus le col qu'aileurs. On la trouve avec la précédente. Elle a été envoyée d'*Orléans* à *M. de Reaumur* par *M. Salerne*.

II. LA PERDRIX ROUGE DE BARBARIE.

Perdix superne obscurè fusca ad cinereum vergens, infernè dilutè fusca; torque castaneo, maculis orbiculatis, albis vario; pennis laterum tæniâ simplici nigrâ donatis; rectricibus lateralibus in exortu cinereis, ultimâ medietate sordide aurantiis; rostro, pedibusque rubris *PERDIX RUBRA BARBARICA*.

Perdix Barbara. *Klein. Avi. pag. 115. N° 4.*
Perdix rouge de Barbarie. *Edwards. Tom. II. pag. LXX; avec une figure exacte Pl. 70.*

Perdici cinereæ paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues tredecim pollices. Alis extensis extremitates majorum remi-

Elle est un peu moins grosse que la *Perdrix grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Elle a un pied sept pouces de vol; & ses ailes,

lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un beau marron : cette couleur descend en s'obscurcissant derrière la tête, & va former autour du col un anneau, lequel est parsemé de taches rondes, blanches. Les côtés de la tête & la gorge sont d'un cendré clair & bleuâtre, qui passe même par-dessus les yeux. De chaque côté, environ à la place des oreilles, il y a une tache qui tire sur le brun. La partie supérieure du col & le dos sont d'un brun obscur & tirant sur le cendré. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. Celles du dessus des ailes & les plumes scapulaires sont d'un beau bleu, bordées de marron. La partie inférieure du col, au-dessous de l'anneau, est d'un cendré qui s'affoiblit peu à peu, & va se confondre avec la couleur de la poitrine, qui est une couleur de rose pâle. Le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aile sont d'un brun clair. Les plumes des côtés sont cendrées à leur origine, ensuite elles ont une raye transversale blanche, qui est suivie d'une noire, & sont ter-

gum unius pedis & septem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Capitis pars superior coloris est splendide castanei ; qui color, partem versus capitis posteriorem procedendo, obscurior fit, & in collo torquem efficit, maculis orbiculatis, albis varium. Capitis latera & guttur colore imbuuntur ex dilutè cinereo cœrulescente, supra oculos extenso. Prope aures aut circiter utrinque macula extat ad fuscum inclinans. Colli pars superior & dorsum ex obscurè fusco ad cinereum vergunt. Uropygium & caudæ tectrices superiores cinereæ. Alarum tectrices & scapulares pennæ sunt splendide cœruleæ, & marginibus donantur castaneis. Pars colli inferior infra torquem cinerea, qui color, versus pectus procedendo, sensim atque sensim fit dilutior, & cum pectoris colore pallidè roseo gradatim immiscetur. Venter, crura, caudæ tectrices inferiores & pennæ alas subtus cooperientes dilutè fusca. Quæ latera vestiunt in exortu cinereæ, deinde taniâ transversâ albâ, quam taniâ se-

quitur nigra, præditæ, apicibus aurantiis. Remiges majores ex obscurè fusco ad cinereum vergunt, & versùs apicem oris exterioribus donantur dilutè fusco-flavescentibus : minores remiges majoribus concolores, sed dilutiores. Rectrices intermedix saturatè cinereæ, fusco transversim striatæ : laterales verò ab exortu ad mediam circiter usque longitudinem cinereæ, in altera medietate sordidè aurantiæ. Oculorum ambitus coccineus ; irides avellaneæ. Rostrum, pedesque splendide rubri ; ungues fusci. Mas in parte pedis posteriore parvulis calcaribus obtusis præditus est. Habitat in *Barbaria*.

minées d'orangé. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun obscur tirant sur le cendré ; & leur bord extérieur, vers le bout seulement, est d'un brun clair & jaunâtre : les moyennes sont de la même couleur que les grandes, mais plus claire. Les plumes du milieu de la queue sont d'un cendré foncé, rayé transversalement de brun : les latérales sont cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & l'autre moitié est d'un orangé terni. Le tour des yeux est d'un beau rouge, & leur iris est couleur de noisette. Le bec & les pieds sont d'un rouge d'écarlatte ; & les ongles sont bruns. Le mâle a à la partie postérieure des pieds de petits ergots obtus. On la trouve en *Barbarie*.

** 12. LA BARTAVELLE.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 1.

Perdix superne cinerea, infernè dilutè rufa ; pennis laterum tæniâ duplici nigrâ donatis ; rectricibus quinque extimis in exortu cinereis, ultimâ medietate rufis ; rostro, pedibusque rubris PERDIX GRÆCA.

Perdix infernè subfulva, maculosa, superne olivaria, rostro pedibusque rubris. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XV. sp. 1.*

Perdix major, quam Itali vulgò Coturnicem vocant. *Gesn. Avi. pag. 681. hujus icon minùs accurata pag. 682.*

Perdix major, rostro & cruribus rubris : Perdix Græca. *Gesn. icon. Avi. pag. 64, in qua eadem icon.*

- Perdix Græca. Charlet. Exer. pag. 83. N^o. 1.*
Charlet. Onomazt. pag. 74. N^o. 1.
Klein. Avi. pag. 115. N^o. 4.
Perdix Græca Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 137.
Jonst. Avi. pag. 46.
Perdix Græca Bellonii, seu rufa major. Willugh. Ornith. pag. 121. hujus icon satis accurata Tab. XXIX, sub titulo, Perdix rubra.
Perdix Græca, seu rufa major Bellonii. Raj. Syn. Avi. pag. 57. N^o. A. 5.
Perdix rufa. Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 70. sp. 6.
Frisch. hujus icon accurata Tab. 116.
Perdix rufa, seu Perdix major. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 138. (icon est Perdix rubra).
Perdix rufa, five major. Jonst. Avi. pag. 46.
Perdix rufa Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 119.
Raj. Syn. Avi. pag. 57. N^o. A. 5.
Perdix rubens. Bell. Obs. pag. 17.
Tetrao rectricibus cinereis, superiore medietate hinc inde rufis. Faun. Suec. Linn. N^o. 171.
Perdix de Grece. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 255.
Perdix rouge. Alb. Tom. I. pag. 25. (la figure est celle de la Perdix rouge).
Les Arabes l'appellent CUBUGI; CUBEGI; CABEGI; CABAGI. Gesn.
Les Grecs, κακιάλα. Aldrov. Jonst.
Les Candiots, Κοβύρο. Bell.
Les Catalans, PERDIU. Barr.
Les Italiens, CHOTRONISSE. Gesn. COTURNISE. Bel. Aldrov. COTURNICE. Willugh. Raj. Klein. COTURNO. Willugh. Raj.
Les Savoyards, PERDRIX GAYE; PERDRIX GAILLE; PERDRIX GAULE; PERDRIX AUX PIEDS ROUGES. Gesn.
Les Lombards, auprès des Alpes, PERNISO, ou PERNISA. Bel. Gesn.
Les Hauts Vallesans, PERNISSE. Gesn.
Les Allemands, ROT-HUN; WELTSCH-RAEB-HUN; PERNIJSSE; PARNIJSSE. Gesn.
Les Allemands, aux environs de Cologne, ROT-RAEB-HUN. Gesn. ROTHE-ITALIANISCHE REB-HUHN. Frisch.
Les Suédois, AOKER-HOENA. Linn.

Elle est beaucoup plus grosse que la *Perdix rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui

Perdicem rubram crassitie multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices æquat, & ad extremos

mos ungues quatuordecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est ; cauda tres pollices & totidem lineas ; pes unum pollicem & septem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum novem lineis : laterales paulò sunt breviores ; & posticus quinque lineas longitudine non superat. Alarum extensarum extremitates unius pedis & octo pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multùm protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, alarum tectrices, pennæ caudam superne regentes & pectus cinerascunt, cum aliqua in parte dorso superiore & pectore rufi mixtura. Genæ, guttur & pars colli inferior albæ : quæ albedo nigrâ circumdatur taniâ, à naribus utrinque inchoatâ, supra oculos ductâ, inde secundùm colli latera, & supra pectus reflexâ, in quo torquem quodammodo efficit. Venter, crura & caudæ tectrices inferiores dilutè rufæ aut flavescens. Latera vestiuntur pennis in exortu cinereis,

des ongles de quatorze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue trois pouces trois lignes ; son pied un pouce sept lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a que cinq lignes de long. Elle a un pied huit pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, celles des aîles & la poitrine sont cendrées, avec un peu de roux mêlé à la partie supérieure du dos & à la poitrine. Les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont blanches : cette couleur est entourée d'une bande noire, qui commence de chaque côté aux narines, passe par-dessus les yeux, le long des côtés du col, & va se rendre au-dessus de la poitrine, où elle forme une espece de collier. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux clair ou jaunâtre. Les plumes des côtés sont cendrées à leur origine : ensuite elles ont

une bande transversale noire, qui est suivie d'une blanchâtre ou roussâtre; cette seconde est suivie d'une autre noire; & chaque plume est terminée de roux. Les plumes de l'aîle sont brunes: les grandes sont marquées de roussâtre du côté extérieur vers leur bout; & les moyennes sont marquées dans le même endroit de gris ou de blanchâtre. La queue est composée de quatorze plumes: les quatre du milieu sont cendrées: toutes les autres sont cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & l'autre moitié est rousse. Le tour & l'iris des yeux & le bec sont d'un très-beau rouge. Les pieds, le dessus des doigts & les ongles sont d'un rouge plus pâle; & le dessous des doigts est d'un jaune sale. Le mâle a à la partie postérieure du pied un ergot obtus. Elle est très-frequente dans les *Iles Cyclades* & de *Grece*, & sur-tout sur les bords de la mer en *Crete*. On la trouve aussi en *Italie*, & sur les montagnes des *Alpes*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *Madame de Tencin*.

deinde taniâ insignitis transversâ nigrâ, quam tania sequitur albicans aut rufescens; post hanc rursus sequitur altera tania nigra, apicibus utriusque pennæ rufis. Remiges fuscæ sunt, majoribus versùs apicem in latere exteriori tantùm rufescente maculatis, minoribus verò etiam versùs apicem in eodem latere griseo aut albicante notatis. Quatuordecim rectricibus cauda constat: quatuor intermediæ sunt cinereæ: quinque utrinque extremæ ab exortu ad median circiter usque longitudinem cinereæ, ultimâ medietate rufâ. Oculorum ambitus & irides, rostrumque splendenti rubore tinguntur; pedes, digiti in parte superiore tantùm & ungues pallidiùs rubri; digiti verò in parte inferiore sordidè flavi. Mas in parte pedis posteriore calcari obtuso donatur. In *Insulis Cycladibus* & *Græciæ*, ac maximè in *Crætæ* maritimis frequentissima est. Habitat quoque in *Italia* & *Alpibus* montibus, unde in *museum Realmurianum* à *D. de Tencin* missa fuit.

** 13. LE FRANCOLIN.

Voyez le mâle Pl. XXIII. Fig. 2.

Perdix superne ex nigricante & rufo-flavicante varia, infernè nigra, albo maculata; torque dilutè castaneo; reëtricibus lateralibus nigris, in exortu albo transversim striatis. (*Mas*).
 Perdix in toto corpore ex nigricante & rufo-flavicante varia.
 (*fœmina*) FRANCOLINUS.

Attagen seu Perdix. *Jonst. Avi. fœminæ icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVII.*

Francolinus. *Gesn. Avi. pag. 228.*

Francolino. *Olin. pag. 33, in qua fœminæ icon satis accurata.*

Francolino Italorum. *Willugh. Ornith. pag. 125. fœminæ icon ab Olin. mutuata Tab. XXXI, sub titulo, Francolinus Olinæ.*

Raj. Syn. Avi. pag. 54. N°. 4.

Francolin. *Tournef. Voy. du Lev. ed. in-4°. Tom. I. pag. 412, dans laquelle il y a une figure assez exacte du mâle.*

Tournef. Voy. du Lev. ed. in-8°. Tom. II. pag. 111, dans laquelle est la même figure.

Edwards. Glanur. pag. 75. Chap. XXXVI; avec une figure exacte Pl. 246.

Les Italiens l'appellent FRANCOLINO. Olin.

Les Anglois, FRANCOLIN. Edwards.

On l'appelle à l'Isle de Samos, PERDRIX DE PRAIRIES. Tournef.

Perdicem rubram crassitie circiter æquat. Ipsi-
 tudo ab apice rostri ad cau-
 dæ extremitatem duodecim
 pollices & tres lineas ex-
 plet, & ad extremos unguis
 duodecim pollices. Rostrum
 ab ipsius apice ad oris angu-
 los unum pollicem longum
 est; cauda tres pollices &
 quatuor lineas; pes unum
 pollicem & octo lineas; &
 trium digitorum anticorum

Il est à peu près de la gros-
 seur de la *Perdrix rouge*. Sa lon-
 gueur depuis le bout du bec
 jusqu'à celui de la queue est
 de douze pouces trois lignes,
 & jusqu'à celui des ongles de
 douze pouces. Son bec depuis
 son bout jusqu'aux coins de la
 bouche a une ponce de long;
 sa queue trois pouces quatre li-
 gnes; son pied un ponce huit
 lignes; & le milieu des trois
 doigts antérieurs, joint avec

l'ongle, un pouce quatre lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a que cinq lignes de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, & les couvertures des aîles sont joliment variées de noirâtre & de roux - jaunâtre. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont noires, & rayées transversalement de roux - jaunâtre ou de blanc. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, les côtés & le haut du ventre sont noirs, & les côtés sont variés de tâches blanches joliment distribuées: il y en a aussi quelques-unes, mais fort petites, sous la gorge, & une grande sur chaque joue, derriere & un peu au-dessous de l'œil. La figure fera mieux voir toutes ces variétés de couleurs, que la description ne peut les exprimer. Un large collier d'un marron clair entoure le col. Le bas ventre est roux, rayé transversalement de blanc. Les couvertures du dessous de la queue sont tout-à-fait rousses. Les jambes sont grises, mêlées confusément d'un peu de roux, &

medius cum ungue unum pollicem cum quatuor lineis: laterales paulò sunt breviores; & posticus quinque linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Capitis, colli & dorsi partes superiores, alarumque tectrices nigricante & rufo-flavescente perpulchrè variegantur. Dorsi pars inferior, uropygium & caudæ tectrices superiores nigrae sunt & rufo-flavescente aut albo transversim striatæ. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, latera & ventris pars suprema nigra; latera autem maculis albis, ordinatè sparsis, variantur: in gutture quædam quoque sunt, sed minimæ, albæ maculae; & quæque gena majusculâ maculâ albâ, infra & post oculum sitâ, insignitur. Iconem consule; hujus inspectione colorum varietates magis fient sensibiles. Torque lato dilutè castaneo collum ambitur. Imus venter rufus, albo transversim striatus. Pennæ caudam infernè tegentes rufæ. Crura grisea, cum aliqua rufi mixtura, tæniis transversis nigricantibus variegantur. Remiges nigricantes, maculis

majusculis, transversis, rufo-flavescentibus notatæ. Rectrices quatuor intermedia nigrae sunt, & per totam longitudinem rufo-flavescente transversim striatæ: laterales quoque nigrae, & ab exortu ad duas tertias circiter usque longitudinis partes albo transversim striatæ; in reliqua verò longitudine nigrae, absque ulla alterius coloris mixtura. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum ex fusco nigricat. Pedes, unguisque rubescunt.

Fœmina à mare discrepat magnitudine, quâ ei cedit, & colore in universo corpore ex nigricante & rufo-flavescente vario.

Habitat in *Italia, Cypria Insula, Insula Samos & Ægypto*, unde missus est in *Malham Insulam* ad *D. Godeheu*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

rayées transversalement de noirâtre. Les plumes de l'aîle sont noirâtres, avec de grandes taches transversales, d'un roux-jaunâtre. Les quatre du milieu de la queue sont noires & rayées transversalement dans toute leur longueur de roux-jaunâtre: les latérales sont aussi noires & rayées transversalement de blanc, mais seulement depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur: le reste est tout-à-fait noir. L'iris des yeux est couleur de noisette. Le bec est d'un brun noirâtre. Les pieds & les ongles sont rougeâtres.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est un peu plus petite en toutes ses proportions, & qu'elle est des mêmes couleurs par tout le corps, sçavoir variée de noirâtre & de roux-jaunâtre.

On le trouve en *Italie*, dans l'*Isle de Chypre*, l'*Isle de Samos* & en *Égypte*, d'où il a été envoyé à *Malthe* à *M. Godeheu*, qui en a ensuite fait présent à *M. de Reaumur*.

** 14. LA CAILLE.

Perdix superne flavicante, rufo, nigro & griseo variegata, infernè sordidè albo-flavicans; tribus in capite taniis albicantibus; reatricibus nigricantibus, rufescente transversim striatis COTURNIX.

Coturnix. *Gesn. Avi. pag. 352. hujus icon minimè accurata pag. 353.*

- Gesn. icon. Avi. pag. 71, in qua eadem icon.*
Willugh. Ornith. pag. 121. maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.
Raj. Syn. Avi. pag. 58. N°. A. 6.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.
Charlet. Exer. pag. 84. N°. XV.
Charlet. Onomazi. pag. 75. N°. XV.
Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 70. sp. 8.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 247.
Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 198.
Moehr. Avi. Gen. 51.
Coturnix Latinorum. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 150. maris & fœminæ icones non satis accuratæ pag. 153.
Jonst. Avi. pag. 47. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII.
Coturnix nigro torque circumdata. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIV. sp. 1. (mas).
Coturnix unicolor grisea. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIV. sp. 2. (fœmina).
Coturnix vulgaris nostras. Klein. Avi. pag. 115. N°. 1.
Coturnix; Perdix nana Theophrasto. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 277.
Coturnix, seu Quiscula, Quisquilla. Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 376.
Cothurnix. Frisch. maris & fœminæ icones accuratæ Tab. 117.
Tetrao pedibus nudis, corpore griseo maculato, lineâ superciliarum albâ. Faun. Suec. Linn. N°. 173.
Qualea & Quiscula Recentioribus. Gesn.
Caille. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 263; avec une figure très-peu exacte pag. 264.
Bel. Portr. d'Ois. pag. 64 a, dans laquelle est la même figure.
Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 158.
Alb. Tom. I. pag. 26; avec une figure mal coloriée Pl. 30.
Les Hébreux l'appellent SCHELAU. Gesn. Aldrov.
Les Chaldéens, SELAU. Gesn. Aldrov. SHALIU. Aldrov.
Les Arabes, SHALIU. Aldrov. SALUI. Gesn. Aldrov.
Les Grecs, ὄρνις. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet. Schwenck.
Les Grecs modernes, ὄρνις. Aldrov. Jonst. Schwenck. ὄρνις. Jonst.
Les Perses, MOREGZAG. Gesn. Aldrov. MOREG-ZEHA. Aldrov.
Les Espagnols, CUADERVIZ. Gesn. Aldrov.
Les Catalans, GUALLE; GUATLA. Barr.
Les Italiens, QUAGLIA. Bel. Gesn. Aldrov. Charlet. QUALLIA. Bel. Gesn.
Les Allemands, WACHTEL. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. Frisch.
Les Illyriens, KRZIEPELKA, ou KRZEPELKA. Gesn. Aldrov.
Les Polonois, PRZEPIORKA. Rzac.
Les Flamands, QUACKEL. Gesn. Aldrov. Schwenck,
Les Suédois, WACHTEL. Linn.

Les Anglois appellent le mâle, QUAIL. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. & la femelle, HEN-QUAIL. Willugh.

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem æquat pollices & sex lineas, & ad extremos ungues novem pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipso apice ad oris angulos septem lineas longum est; cauda unum pollicem; pes tredecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem: laterales paulò sunt breviores; & posticus trium cum semi linearum longitudinem non superat. Digiti tres antici rudimento membranæ, ab exortu ad primum usque articulum extenso, inter se connectuntur. Alis extensis, majorum remigum extremitates quatuordecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Capitis pars superior nigro & rufescente variegatur, & insuper tribus donatur tæniis longitudinalibus, strictioribus & albicantibus, unâ scilicet in capitis vertice, & utrinque alterâ supra oculos ductâ. Pennæ partem colli superiorem, dorsum & uropygium

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue un pouce; son pied treize lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que trois lignes & demie de longueur. Les trois doigts antérieurs sont joints ensemble à leur origine par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a quatorze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne passent guères l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête est variée de noir & de roussâtre; & a de plus trois bandes longitudinales, étroites & blanchâtres, sçavoir une qui passe sur le sommet de la tête & une de chaque côté par-dessus les yeux. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du col, le dos & le croupion, & les plumes scapulaires ont chacune dans leur milieu une bande longitu-

dinale, jaunâtre, qui s'étend selon la longueur de la tige de la plume, & le reste est varié de noir, de roux & d'un peu de gris. La gorge, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aile sont d'un blanc sale & jaunâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont roussâtres & variées de petites taches noirâtres; & chaque plume a dans son milieu une petite ligne longitudinale, blanche, très-étroite. Les plumes des côtés ont une bande longitudinale, blanche dans leur milieu, & chaque côté est roux, avec quelques petites taches noirâtres. Les couvertures de l'aile sont d'un brun-roux, & chaque plume a dans son milieu une petite ligne longitudinale, jaunâtre, très-étroite. Les plumes de l'aile sont grises en-dessous, & en-dessus d'un gris-brun, & leur côté extérieur est varié de bandes transversales, roussâtres. Celles de la queue sont noirâtres & rayées transversalement de roussâtre. Le bec est cendré. Les pieds & les ongles sont couleur de chair.

La *female* diffère du *mâle* en ce qu'elle n'a point de taches noirâtres à la partie inférieure du col, à la poitrine & sur les

cooperientes, sicut & scapulares, nigro, rufo & paucogriseo sunt variegatæ; quæque etiam penna in medio donatur taniâ longitudinali, flavicante, secundum scapi longitudinem extensâ. Guttur, venter, crura, caudæ tectrices inferiores, alasque subtus tegentes pennæ ex sordidè albo flavescunt. Pars colli inferior & pectus rufescunt, parvulisque nigricantibus maculis variegantur; & quæque penna lineâ longitudinali, strictissimâ, albâ in medio prædita est. Latera pennis vestiuntur taniâ longitudinali, albâ in medio donatis, utroque latere rufo, maculis quibusdam minimis, nigricantibus vario. Alarum tectrices pennæ ex fusco rufæ, lineolâ longitudinali, strictissimâ, flavescente in medio præditæ. Remiges infernè griseæ, superne verò griseofuscæ, latere exteriorè taniis transversis, rufescentibus vario. Rectrices nigricant, & taniis rufescentibus, transversis variegantur. Rostrum cinereum. Pedes, unguisque carnei.

Fœmina à *mare* differt in eo quod maculis nigricantibus in parte colli inferiore, pectore & lateralibus sit destituta,

tituta, quodque istis in locis saturatiore rufo tingatur. Quædam in gutture maculâ longitudinali, fuscâ donantur.

Migratoria est hæc Avis. Habitat in segetibus & pratis. *Ex museo Realmuriano.*

Hujus speciei varietas est

plumes des côtés, & en ce que le roux est beaucoup plus vif dans ces endroits. Quelques-unes ont sous la gorge une tache longitudinale, brune.

La Caille est un Oiseau de passage. On la trouve dans les bleds & les prairies. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Une variété de cette espèce est

A. LA GRANDE CAILLE.

Coturnix major.

Coturnix major. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 277.*

Les Polonois l'appellent CHROSCIEL. *Rzac.*

Præcedenti similis est in omnibus, exceptâ magnitudine, quâ eam antecellit. Habitat pariter in segetibus & pratis.

Elle ne diffère de la précédente que par sa grandeur. On la trouve de même dans les bleds & les prairies.

15. LA CAILLE DE JAVA.

Perdix flavicante, rufo, nigro & griseo variegata; rostro longiore. COTURNIX JAVENSIS.

Coturnix Indica. *Bont. Ind. Ori. pag. 64. hujus icon non satis accurata pag. 65.*

Coturnix Indica Bontii. *Willugh. Ornith. pag. 123. hujus icon à Bontio mutuata Tab. XXIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 58. N°. 7.

Turturem crassitie non excedit. Colore pennarum Coturnici nostri admodum respondet: flavicante, rufo, nigro & griseo, ut illa, va-

Elle n'est pas plus grosse qu'une Tourterelle. Elle ressemble parfaitement à notre Caille par la couleur de ses plumes: elle est, comme elle, variée de

jaunâtre, de roux, de noir & de gris: elle en diffère cependant par son bec, qui est un peu plus long. Elle chante de temps en temps ainsi que *notre Caille*: mais son chant est tout-à-fait différent; il ressemble plutôt au cri horrible que font les *Butor*s dans les marais. Les mâles sont très-courageux, & se battent entr'eux comme font *nos Coqs*. On la trouve dans les forêts de l'*Ile de Java*.

riegatur: ab illa tamen differt rostro paulò longiore. Sonum quoque per intervalla edit, ut *Coturnix* etiam solet; verùm is longè diversus est à *Coturnicam* voce, & magis refert sonum illum horribilem quem *Ardea stellar*es inter arundineta in paludibus edunt. Mares inter se pugnacissimi sunt, non secus ac *Galli*. Habitat in sylvis *Javae*.

**** 16. LA CAILLE DE MADAGASCAR.**

Voyez Pl. XXIV Fig. 2.

Perdix infernè cinerea, superne è cinereo, rufo & nigro variegata; gutture & collo inferiore nigris.... COTURNIX MADAGASCARIENSIS.

Elle est un peu plus petite que *notre Caille ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes; & jusqu'à celui des ongles de sept pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de huit lignes; sa queue d'un pouce six lignes; son pied de neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de onze lignes: l'extérieur est un peu plus court; & l'intérieur l'est encore davantage. Elle est

Coturnici nostrati paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sex pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices cum duabus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est; cauda octodecim lineas; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas: exterior paulò brevior est; interior adhuc brevior. Di-

gito postico caret hæc species, quod maximè singulare; attamen, cum unicum hujus speciei individuum viderim, utrum omnia hujus speciei individua digito postico careant, aut solummodo individuum à me observatum prorsus ignoro. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Capitis pars superior, genæ & colli latera albo & nigro, paucò rufo admixto, variegantur. Pars colli superior, dorsum, uropygium & caudæ tectrices superiores cinereo, nigro & rufo perpulchrè sunt variegatæ, aut potius transversim striatæ. Quibusdam in locis tæniæ nigræ alias tæniæ latitudine superant; unde corpus quibusdam maculis nigris aspersum videtur. Alarum tectrices pennæ cinereo & rufo confusè mixtæ sunt, rufo colore cinereum superante: quæque autem penna pluribus donatur maculis rotundis, albis, supra quas aliæ extant maculæ parvæ, nigræ, semicirculum referentes. Pennæ scapulares iisdem ac dorsum coloribus, eodemque modo variegantur, & insuper tæniâ longitudinali, albâ in utroque

singulière en ce qu'elle n'a point de doigt derrière. Mais, comme je n'en ai jamais vu qu'une de cette espèce, je ne sçais si c'est un défaut de l'espèce même, ou seulement de l'individu que j'ai été à portée de voir. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne passent guères l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête, les joues & les côtés du col sont variés de noir, de blanc & d'un peu de roux. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont très-joliment variées, ou plutôt rayées transversalement de cendré, de noir & de roux. En quelques endroits les rayes noires sont plus larges que les autres; ce qui produit sur le corps quelques taches de cette couleur. Les couvertures des aîles sont mêlées confusément de cendré & de roux, mais cette dernière couleur paroît dominer; & elles ont chacune plusieurs taches blanches, rondes, surmontées d'autres petites taches noires en demi-cercle. Les plumes scapulaires sont variées comme le dessus du corps, & ont de chacun de leurs côtés une bande longitudinale, blanche. La gorge & la partie inférieure du col sont noires. Les côtés de la

poitrine sont roux. Le milieu de la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de l'aile sont cendrées. Celles du dessous de la queue sont d'un roux-jaunâtre, & quelques-unes ont quelques rayes transversales, noires. Les plumes de l'aile sont cendrées en-dessous, & en-dessus elles sont brunes : & les trois ou quatre premières des grandes ont le bord extérieur blanc. Celles de la queue sont rayées transversalement à peu près comme le dessus du corps. Le bec, les pieds & les ongles sont cendrés. On la trouve à *Madagascar*, d'où elle a été apportée à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

latere præditæ sunt. Guttur nigrum, sicut & pars colli inferior. Pectoris latera rufa. Pectus in medio, venter, latera, crura, alarumque rectrices inferiores cinereæ. Pennæ caudam subtus tegentes ex rufo flavescent, & quædam aliquibus donantur tæniis transversis, nigris. Remiges subtus sunt cinereæ, superne fuscæ; trium aut quatuor primarum majorum remigum oris exterioribus albis. Rectrices dorso ferè concolores, iisdemque coloribus transversim striatæ. Rostrum, pedes, unguesque cinerei. Habitat in *Madagascariensi Insula*, unde in museum *Realmurianum* à *D. Poivre* allata est.

** 17. LA CAILLE DES PHILIPPINES;

Voyez Pl. XXV. Fig. 1.

Perdix superne ex dilutè fusco & nigricante varia, infernè castanea; genis & collo inferiore albis; gutture nigro; rectricibus castaneis COTURNIX PHILIPPENSIS.

Caille de la Chine. *Edwards. Glanur. pag. 77. Chap. XXXVII; avec une figure exacte Pl. 247.*

Les Anglois l'appellent CHINESE QUAIL. *Edwards.*

Elle n'est pas plus grosse qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre

Crassitie Alaudam non antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices ex-

plet, & ad extremos ungues quatuor pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos trium cum semi linearum longitudinem æquat; cauda sex linearum; pes septem cum semi linearum; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue octo linearum: laterales paulò sunt breviores; & posticus duarum cum semi linearum longitudinem non superat. Alæ complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Corpus superius, partes scilicet capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, alarum tectrices & pennæ caudam superne tegentes, dilutè fusco & nigricante perpulchrè variegatur. Guttur nigrum. Genæ & pars colli inferior albæ. In utroque capitis latere, in media scilicet gena alba, lineola extenditur nigra, à basi mandibulæ inferioris inchoata, & deinde reflexa guttur nigrum attingit. Inter colli inferioris albedinem & pectoris colorem tania extat parvula, transversa, nigra. Pectus saturatè cinereum, maculis quibusdam splendidè castaneis varium. Venter, crura & caudæ tectrices inferiores splendidè castanæ. Remiges

pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois lignes & demie de long; sa queue six lignes; son pied sept lignes & demie; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes; les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a que deux lignes & demie de longueur. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Tout le dessus du corps, sçavoir les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles des aîles, est joliment varié de brun clair & de noirâtre. La gorge est noire. Les joues & la partie inférieure du col sont blanches. De chaque côté de la tête, au milieu du blanc des joues, est une petite ligne noire, qui commence à la base du demi-bec inférieur, & va en tournant joindre le noir de la gorge. Le blanc de la partie inférieure du col est séparé de la couleur de la poitrine par une petite bande transversale, noire. La poitrine est d'un cendré foncé, varié de quelques taches d'un beau maron. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de

la queue font de ce même marron. Les plumes des ailes font d'un brun clair ; & celles de la queue font marron. Le bec est noir. Les pieds font jaunâtres ; & les ongles tirent sur le brun. On la trouve à la Chine & dans les *Isles Philippines*, d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry*, qui la conserve dans son cabinet.

Celle de la Chine est un peu plus grosse que celle que je viens de décrire ; & elle a la poitrine maculée de noir.

pennæ dilutè fuscæ ; rectrices castaneæ. Rostrum nigrum. Pedes flavescent ; ungues ad fuscum inclinant. Habitat in *Sinenfi regione & Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Aubry* missa fuit.

Quæ in *Sinenfi regione* habitat modò descriptam paululùm crassitie antecellit ; nigroque in pectore maculatur.

18. LA CAILLE DU MEXIQUE.

Perdix superne fulvo & cándido mixta, infernè fulva ; capite & collo nigro & albo variis ; pedibus fulvis ,... COTURNIX MEXICANA.

Coturnix Indica, Coyolcozque, seu colli sonalis dicta. *Euf. Nieremb. pag. 232.*

Coyolcozque, seu colli sonalis. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 19. cap. XXIV. Jonst. Avi. pag. 158.*

Coyolcozque, seu coli sonalis. *Raj. Syn. Avi. pag. 158.*

Coyolcozque, seu coli sonalis ; Coturnix Indica. *Willugh. Ornith. pag. 304.*

Les Mexiquains l'appellent COYOLCOZQUE. *Fern. Nieremb. Jonst. Willugh. Raj.*

Elle est de la même grandeur que notre Caille. Elle lui ressemble aussi par son chant, son vol & sa façon de vivre ; elle se nourrit des mêmes aliments ; mais elle en diffère par sa couleur. Le sommet de la

Magnitudine, cantu, nutrimento, volatu & moribus *Coturnicem nostratam* æmulatur : ab illa autem colore discrepat. Verticem & collum nigrantes, albæque pennæ vestiunt, & ténias

ab utroque latere, adeoque à collo ad utrumque oculum constituunt atque effor-
mant. Reliquum corpus su-
perne est ex fulvo, candido-
que commixtum, inferne
verò totum fulvum. Oculi
atri sunt, & pedes fulvi. Ha-
bitat in *Mexico*, campestri-
bus locis frequens. tête & le col sont couverts de
plumes noires & blanches, &
qui forment de chaque côté
des bandes, qui s'étendent de-
puis le col jusqu'aux yeux. Le
reste du corps est par-dessus va-
rié de fauve & de blanc; &
par-dessous il est tout-à-fait
fauve. Les yeux sont noirs;
& les pieds fauves. On la trou-
ve au *Mexique*, où elle se tient
le plus souvent dans les champs.

19. LA GRANDE CAILLE DU MEXIQUE.

Perdix fulva; capite albo & nigro variegato; dorso & extre-
mitatibus remigum candentibus; rostro, pedibusque nigris....
COTURNIX MAJOR MEXICANA.

Coturnix alia omnium maxima fulvaque. *Jonst. Avi. pag. 157.*
Coturnix Indica alia, omnium maxima fulva. *Euf. Nieremb. pag. 232.*
Willugh. Ornith. pag. 304.
Raj. Syn. Avi. pag. 158.
Colin genus omnium maximum. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 22. cap.*
XXXIX.

Magnitudine *Coturnicem* Elle est beaucoup plus grande
nostratam multum antecellit. que *notre Caille*. La tête & le
Caput & collum albo & ni- col sont variés de noir & de
gro colore variegantur. Dor- blanc. Le dos est blanchâtre.
sum est candens. In reliquo Tout le reste du corps est cou-
corpore pennis vestitur ful- vert de plumes fauves. Celles
vis. Remiges etiam fulvæ, des ailes sont de la même cou-
extremitatibus candentibus. leur, excepté leurs extrémités,
Rostrum verò, pedesque ni- qui sont blanchâtres. Le bec
gri. Habitat in *Mexico*. & les pieds sont noirs. On la
trouve au *Mexique*.

** 20. LA CAILLE DE LA LOUIZIANE.

Voyez Pl. XXII. Fig. 2.

Perdix superne castanea nigro transversim & undatim striata ;
 infernè sordidè grisea nigricante transversim striata ; gutture
 albo ; taniâ supra oculos albâ ; rectricibus lateralibus cine-
 reis ; rostro , pedibusque rubris... , COTURNIX LUDOVICIANA.

Coturnix Indica , Colcuicuiltic dicta , seu Coturnicis simulacrum. *Euf.*
Nieremb. pag. 232.

Colcuicuiltic. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 19. cap. XXV.*

Colcuicuiltic , seu Coturnicis simulacrum, *Jonst. Avi. pag. 158.*

Willugh. Ornith. pag. 304.

Raj. Syn. Avi. pag. 158.

Attagen Americanus. *Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 113.*

Les Allemands l'appellent AMERICANISCHE HASEL-HUHN. Frisch.

Les Mexiquains , COLCUICUILTIC. Fern. Nieremb. Jonst. Willugh. Raj.

Elle est de la grosseur de notre Caille. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces , & jusqu'à celui des ongles de huit pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long ; sa queue deux pouces quatre lignes ; son pied quinze lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , treize lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a que quatre lignes de long. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête est variée

Crassitie Coturnicem nostratam æmulator. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices æquat , & ad extremos unguis octo pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sex lineas longum est ; cauda duos pollices & quatuor lineas ; pes quindecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas : laterales paulo sunt breviores ; & posticus quatuor lineas longitudine non superat. Ala complicata mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput vestiunt pennæ ex nigro

nigro & castaneo variegatæ ,
pennis scilicet nigris , apice
castaneis. In utroque capitis
latere tania extat alba , à na-
ribus inchoata , supra ocu-
los ducta ferè ad occipitium
usquè ; indè reflexa & secun-
dum colli longitudinem ex-
tensa. Guttur albicat. Col-
lum superius ex castaneo ,
nigro & albo varium. Dor-
sum , uropygium , scapula-
res pennæ , alarum tectrices ,
& caudam superne tegentes
castaneæ , taniis minimis ,
transversis & undatis , nigris
variæ. Partem colli inferio-
rem , pectus , ventrem , la-
tera & crura vestiunt pen-
næ fordidè albæ , nigricante
transversim striatæ ; quibus-
dam maculis rufis in collo
& lateribus admixtis. Caudæ
tectrices inferiores rufæ , api-
cibus albo - rufescentibus :
quæque etiam penna maculâ
nigrâ versùs apicem prædita
est. Remiges fuscæ ; oris ex-
terioribus majorum griseis ;
& latere exteriorè minorum
maculis rufescentibus varie-
gato. Rectrices binæ inter-
mediæ castaneæ , taniis mi-
nimis , transversis & undatis ,
nigris variæ : laterales verò
cinereæ ; quædam tamen co-
loribus rectricum interme-
diarum apice donantur : qui

de noir & de marron , cette
derniere couleur terminant cha-
que plume. De chaque côté de
la tête est une bande blanche ,
qui commence aux narines ,
passe par-dessus les yeux , & va
jusque vers l'occiput ; & de-là
s'étend de chaque côté le long
du col. La gorge est blanche.
La partie supérieure du col est
variée de marron , de noir & de
blanc. Le dos , le croupion , les
plumes scapulaires , les cou-
vertures du dessus de la queue
& celles des aîles sont d'un
marron varié de petites rayes
transversales & en point d'Hon-
grie , noires. La partie inférieure
du col , la poitrine , le ventre ,
les côtés & les jambes sont d'un
gris sale , rayé transversalement
de noirâtre ; avec quelques ta-
ches rouffes au col & aux cô-
tés. Les couvertures du dessous
de la queue sont rouffes & ter-
minées de blanc-rouffâtre : cha-
cune a aussi une tache noire
vers le bout. Les plumes de
l'aîle sont brunes : le bord exté-
rieur des grandes est gris ; & le
côté extérieur des moyennes
est varié de taches rouffâtres.
Les deux plumes du milieu de
la queue sont d'un marron va-
rié de petites rayes transver-
sales & en point d'Hongrie , noi-
res : toutes les latérales sont
cendrées ; quelques-unes ce-

pendant sont terminées par les couleurs de celles du milieu ; & ces couleurs occupent sur chaque plume d'autant moins d'espace qu'elle est plus extérieure. Le bec , les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve au *Mexique* & à la *Louiziane* , d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur*.

colores eò minus spatium occupant , quò exterior est penna. Rostrum , pedes , unguisque rubri. Habitat in *Mexico* & *Ludovicia* , unde in *museum Realmurianum* missa fuit.

** 21. LA CAILLE HUPÉE DU MEXIQUE.

Voyez Pl. XXV. Fig. 2.

Perdix cristata ; maculis rufis , fuscis , nigris & sordide albo-flavicanibus varia ; cristâ & gutture fulvis ; rectricibus fusco & griseo variegatis *COTURNIX MEXICANA CRISTATA*.

Coturnix eleganter variegata & cristata. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 129.
Coturnix Americana , eleganter variegata & cristata. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XIV. sp. 3.
Coturnix Quauhtzonecolin nuncupata. Jonst. Avi. pag. 157.
Coturnix Indica Quauhtzonecolin dicta. Raj. Syn. Avi. pag. 158.
Euf. Nieremb. pag. 232.
Quauhtzonecolin ; Coturnix Indica, Willugh. Ornith. pag. 304.
Colin genus , Quauhtzonecolin nuncupatum. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 22. cap. XXXIX.
Les Mexiquains l'appellent QUAUHTZONECOLIN. Fern. Nieremb. Jonst. Willugh. Raj.

Elle est un peu moins grosse que notre Caille. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces neuf lignes , & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long ; sa queue

Coturnici nostrati paululum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem lineas aëquat , & ad extremos ungues sex pollices cum totidem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sex lineas lon-



Desiné et Gravé par Martinet

1. Grosse Gelinote de Canada. 2. Perdrix de Montagne.



Desiné et Gravé par Martinet

1. Gelinote d'Ecosse.


2. Caille de la Louisiane



Designé et gravé par Martinet.

1. Bartavelle.

2. Francolin, mâle.






Desiné et Gravé par Martinet

1. Perdrix du Sénégal.

2. Caille de Madagascar.



gum ; cauda duos pollices & quatuor lineas ; pes unum pollicem ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus tres lineas longitudine non excedit. Ala complicata paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Cristam strictam , pollicem longam in capite gerit. Capitis pars superior & crista fulvæ : guttur quoque fulvum. Genæ, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, alarum tectrices & penna caudam superne & inferne cooperientes maculis rufis, fuscis, nigris & sordide albo-flavescentibus perpulchrè variegantur ; color autem niger in genis & collo, & rufus in ventre & pectore majus spatium occupant. Iconem consule : varietates istas meliùs præbebit quàm descriptio accuratissima eas exprimere possit. Remiges sunt fuscæ : rectrices fusco & griseo pulchrè variegatæ. Rostrum crassissimum est & fuscum ; pedes quoque & ungues fusci. Habitat in *Guania* & *Mexico*, unde in museum *D. Aubry* missa fuit.

deux pouces quatre lignes ; son pied un pouce ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a que trois lignes de longueur. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Elle porte sur la tête une hupe longue d'un pouce, & assez étroite. La partie supérieure de la tête, la hupe & la gorge sont fauves. Les joues, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles des aîles sont joliment variées par taches de roux, de brun, de noir & de blanc sale & jaunâtre. Le noir domine aux joues & au col ; & le roux domine au ventre & à la poitrine. La figure fera mieux voir cette variété que la description ne peut l'exprimer. Les plumes de l'aile sont brunes : celles de la queue sont joliment variées de brun & de gris. Le bec est fort épais & brun ; ainsi que les pieds & les ongles. On la trouve dans la *Guiane* & au *Mexique*, d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry*, qui la conserve dans son cabinet.

VII.

Le genre du Faisan:

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec en cône courbé:

La tête dénuée de membranes charnues:

Les pieds nus:

La queue longue.

VII.

Genus Phasian.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum conico-incurvum:

Caput paleis destitutum:

Pedes nudi:

Cauda longa.

** I. LE FAISAN.

Phasianus internè castaneo-purpureus, marginibus pennarum nigris in violaceum mutantibus; collo supremo viridi-aureo in saturatè coeruleum & violaceum mutante; rectricibus duodecim intermediis nigro transversim striatis. (*Mas*).
Phasianus ex fusco, griseo, rufescente & nigricante variegatus; rectricibus duodecim intermediis nigro transversim striatis. (*fœmina*) . . . PHASIANUS.

Phasianus. *Gesn. Avi. pag. 683. hujus icones minùs accurata pag. 684 & 686.*

Gesn. icon. Avi. pag. 62, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 45. icones satis accuratæ, maris pag. 48, & fœminæ pag. 49.

Jonst. Avi. pag. 40. hujus icon non satis accurata Tab. XXIV.

Willugh. Ornith. pag. 117. maris icon non satis accurata Tab. XXVIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 56. N^o. A. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 331.

Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 123.

Phasianus vulgaris. *Linn. Systk. nat. ed. 6. Gen. 69. sp. 1.*

- Phasianus simpliciter. *Klein. Avi. pag. 114. N^o. 1.*
 Phasianus; Phasidis Ales. *Charlet. Exer. pag. 81. N^o. III.*
Charlet. Onomazt. pag. 72. N^o. III.
 Phasianus Capitolino; Phasidis Ales Statio. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 304.*
 Perdix longicauda, eleganter variegata. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XV. sp. 6.*
 Tetrao. *Moehr. Avi. Gen. 50.*
 Fagiano. *Olin. pag. 49, in qua icon satis accurata.*
 Faïsan. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 253; avec une figure passable pag. 254.*
Bel. Portr. d'Ois. pag. 61 b, dans laquelle est la même figure.
Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 157.
 Phaïsan. *Alb. Tom. I. pag. 23; avec une figure passable du mâle Pl. 25; & une figure mal coloriée de la femelle Pl. 26.*
Les Grecs l'appellent Φασιανός. Bel. Gesn. Aldrov. Φασιανός. Bel. Schwenck.
Les Turcs, SUGLUN. Gesn. SURGLUN. Aldrov.
Les Espagnols, FAISAN. Gesn. Aldrov.
Les Catalans, FLAYSANT Barr.
Les Italiens, FAGIANO; FASANO. Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Olin.
FASAN. Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck.
Les Allemands, FASAN. Gesn. Aldrov. Frisch. FASIAN. Gesn. Aldrov.
Les Hollandois, FASAEN. Aldrov.
Les Flamands, FASANT. Gesn. Aldrov.
Les Illyriens, BAZIANT. Gesn. Aldrov.
Les Polonois, BASANT. Gesn. Aldrov. BAZANT; FAZYAN. Rzac.
Les Anglois, PHEASANT. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. FESAN; FESANT. Aldrov.
Les Chinois, THI-KHI.

Crassitie Caponem circiter æquat. Ipsi-
 us longitudo
 ab apice rostri ad caudam
 extremam duos pedes de-
 cem pollices & sex lineas
 explet, & ad extremos un-
 gues unum pedem decem
 pollices cum undecim lineis.
 Rostrum ab ipsius apice ad
 oris angulos quindecim li-
 neas longum; cauda viginti
 pollices & quatuor lineas;
 pes duos pollices & novem
 lineas; & trium digitorum

Il est à peu près de la gros-
 seur d'un Chapon. Sa longueur
 depuis le bout du bec jusqu'à
 celui de la queue est de deux
 pieds dix pouces six lignes, &
 jusqu'à celui des ongles d'un
 pied dix pouces onze lignes.
 Son bec depuis son bout jus-
 qu'aux coins de la bouche a
 quinze lignes de longueur; sa
 queue un pied huit pouces qua-
 tre lignes; son pied deux por-
 ces neuf lignes; & le milieu
 des trois doigts antérieurs, joint

avec l'ongle, deux pouces six lignes : les latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derrière n'a que neuf lignes de long. Il a deux pieds six pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête & l'occiput sont d'un verd-doré obscur. Les côtés de la tête ou les joues sont dénudées de plumes & couvertes seulement de petits mammelons charnus , d'un rouge très - vif. Dans le tems de l'amour il a de chaque côté de la tête , au-dessus des oreilles , un petit bouquet de plumes d'un verd-doré , représentant des especes de cornes. De l'angle inférieur des oreilles partent quelques plumes plus longues que les autres , & noirâtres. Le synciput , la gorge & la partie du col la plus proche de la tête sont d'un verd-doré changeant en bleu foncé & en violet éclatant. Le reste du col , la poitrine , le haut du ventre & les côtés sont couverts de plumes d'un marron-pourpre très-brillant , & bordées par le bout d'un noir de velours changeant en un violet très-éclatant. Les plumes du col sont échancrées en cœur par le bout , & la bordure noire remonte en cet endroit

anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas : laterales multò sunt breviores ; & posticus novem linearum longitudinem non excedit. Alis extensis , extremitates majorum remigum duorum pedum & sex pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Capitis pars superior & occipitium viridi-aureo obscuro tinguntur. Capitis latera sive genæ plumis nudæ , papillis tantum carnosiss , splendide coccineis obducuntur. In tempore coitus in utroque capitis latere , supra aures , fasciculus extat pennarum viridi-aurearum , corniculorum æmulus. Auribus adnascuntur in ipsarum angulo inferiori plumæ quædam cæteris longiores & nigricantes. Synciput , guttur & pars colli capiti finitima viridi-aurea , saturatè cœruleo & violaceo splendenti colore variant. Collum in reliqua longitudine , pectus , venter supremus & latera pennis vestiuntur splendidissimè castaneo - purpureis , apicis marginibus nigris , holoserici villosi instar splendentibus , & in violaceum splendidissimum colorem

mutantibus. Pennæ istæ, col-
lum vestientes, in apice cor-
datim sunt emarginatæ; ni-
gredo autem eo in loco, se-
cundum istam directionem,
versus pennæ exortum assur-
git. Quæque penna in exortu
fusco colore imbitur, qui
color, pennis aliæ aliis incum-
bentibus, nullo modo appa-
ret. Scapulares pennæ, quæ-
que dorsum vestiunt in me-
dio fuscæ, marginibus casta-
neo-purpureis; quæque au-
tem penna in fusco colore
taniâ donatur albicante, cir-
cumferentiæ pennæ paralle-
lâ, quam taniam quibusdam
in pennis maculæ fuscæ va-
riegant. Pennæ uropygium
tegentes, tectricesque cau-
dæ superiores in medio ru-
fescence & fusco sunt varie-
gatæ, & ipsarum margines
castaneo-purpureæ aliquid
viridi-aurei admixtum ha-
bent. Quæ partem dorsi in-
feriorem & uropygium ves-
tiunt pennæ in apice sunt
cordatim emarginatæ; tec-
trices verò caudæ superiores
in filamenta quædam quasi
desinunt. Venter imus, crura
& tectrices caudæ inferiores
rufescentes, fusco admixto.
Alarum tectrices minores
fuscæ & albo-rufescente va-
riegantur: majores in medio

vers l'origine de la plume se-
lon la direction de cette échan-
crure. Chacune de ces plumes
est brune à son origine; mais
cette couleur ne paroît pas lors-
qu'elles sont couchées les unes
sur les autres. Les plumes sca-
pulaires & celles qui couvrent
le dos sont brunes dans leur mi-
lieu, & bordées de marron-pour-
pré, ayant chacune dans leur
brun une bande blanchâtre, pa-
rallèle à la circonférence de la
plume: cette bande est variée
dans quelques-unes de taches
brunes. Les plumes du crou-
pion & les couvertures du des-
sus de la queue sont variées
dans leur milieu de rouffâtre &
de brun, & bordées d'un mar-
ron-pourpré mêlé d'une légère
teinte de verd-doré. Les plu-
mes de la partie inférieure du
dos & celles du croupion sont
échancrées en cœur par le bout;
& les couvertures du dessus de
la queue semblent finir en es-
pece de filets. Le bas ventre,
les jambes & les couvertures
du dessous de la queue sont d'un
rouffâtre mêlé de brun. Les pe-
tites couvertures des ailes sont
variées de brun & de blanc-
rouffâtre: les grandes sont des
mêmes couleurs dans leur mi-
lieu, ensuite elles sont d'un
gris tirant sur le fauve; & les
plus grandes sont bordées de

chaque côté de marron-pourpré. Les grandes plumes de l'aile & celles de l'aile bâtarde sont d'un gris-brun varié de bandes transversales, de blanc-roussâtre : les moyennes sont d'un brun tirant sur le fauve, variées aussi de bandes transversales, d'un blanc-roussâtre. La queue est composée de dix-huit plumes : les deux du milieu sont dans leur milieu, & selon leur longueur, d'un gris-olivâtre, varié de bandes transversales, noires, & leurs bords sont d'un marron-pourpré, mais plus clair que celui du croupion : celle qui les suit de chaque côté est des mêmes couleurs, excepté son bord intérieur, qui au lieu d'être d'un marron-pourpré, est brun : les quatre suivantes de chaque côté sont variées de gris-olivâtre & de brun, & rayées transversalement de noir, & leur bord extérieur est d'un marron-pourpré : les trois plus extérieures de chaque côté sont variées de brun & de roussâtre, & ont aussi leur bord extérieur d'un marron-pourpré. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui n'a que trois pouces de longueur. L'iris des yeux est

concolores, in reliquis ex griseo ad fulvum inclinant; maximarum tamen utrinque marginibus castaneo-purpureis. Ala notha & majores remiges griseo-fuscae, tenuisque transversis, albo-rufescentibus variegatae: remiges minores ex fusco ad fulvum inclinant, & tenuis transversis, albo-rufescentibus quoque variegantur. Octodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae sunt in medio, & secundum ipsarum longitudinem, griseo-olivaceae, tenuis transversis, nigris variae, marginibus castaneo-purpureis, sed quàm in uropygio dilutius: rectrix utrinque sequens concolor, excepto margine interiore fusco, non verò castaneo-purpureo: quatuor utrinque sequentes rectrices fusco & griseo-olivaceo variegatae & nigro transversim striatae, marginibus exterioribus castaneo-purpureis: tres utrinque extremae fusco & rufescente variae, marginibus quoque exterioribus castaneo-purpureis. Rectrices binæ intermediae lateralibus multò sunt longiores; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad extremam usque brevissimam, & tres pollices

pollices longitudine non superantem. Oculorum irides flavæ. Rostrum corneum : pedes , unguisque griseofusci. In parte utriusque pedis posteriore calcar extat breve & acutissimum. Hæc est maris descriptio.

Fœmina magnitudine paululum ei cedit. Ab illo etiam discrepat colore per universum corpus ex fusco, griseo, rufescente & nigricante variegato. Rectrices, sicut & in mare, taniis transversis, nigris sunt striatæ. Oculorum ambitus, quàm in mare strietior, plumis destituitur, & papillis carnosis, coccineis obducitur. Habitant in sylvis. *Ex musæo Realmuriano.*

Hujus speciei varietates sunt

jaune. Le bec est d'une couleur de corne : les pieds & les ongles sont gris-bruns. A la partie postérieure de chaque pied est un ergot court, mais très-pointu. Ceci est la description du mâle.

La femelle est un peu plus petite que lui. Elle en diffère aussi par sa couleur, qui est variée par tout le corps de brun, de gris, de roussâtre & de noirâtre. Les plumes de sa queue sont rayées de bandes transversales, noires, comme celles du mâle. Elle n'a qu'un petit espace, autour des yeux, dénué de plumes, & couvert de petits mammelons charnus, d'un assez beau rouge. On les trouve dans les bois. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Les variétés de cette espece sont

**** A. LE FAISAN PANACHÉ.**

Voyez le mâle Pl. XXV. Fig. 3.

Phasianus varius.

Phasianus varius. Frisch. hujus icon accurata Tab. 124.

Les Allemands l'appellent BUNTE FASAN. Frisch.

Crassitie & magnitudine præcedentem adæquat ; ab illo verò differt colore albo, maculis *Phasianorum vulga-*

Il est de la même grandeur que le précédent ; mais il en diffère par sa couleur, qui est blanche, & variée de taches

formées des mêmes couleurs que celles des *Faisans ordinaires*. Du cabinet de M. de Reaumur, à qui il a été donné par Madame de Puisieux.

rium coloribus imbutis vario. Ex museo Realmuriano, in quem à D. de Puisieux missus est.

* * B. LE FAISAN BLANC.

Phasianus albus.

Il diffère du précédent en ce qu'il est d'un beau blanc par tout le corps. Il a seulement quelques taches, mais très-petites, d'un noir-violet vers le col, & quelques-unes rousses sur les plumes scapulaires. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

A præcedente differt colore in toto corpore albo. Maculis tamen nonnullis, sed minimis, nigro-violaceis versùs collum variegatur; & pennæ scapulares maculis quibusdam rufis notantur. Ex museo D. Aubry.

C. LE FAISAN BASTARD.

Phasianus hybridus.

Phasianus hybridus. Frisch. maris icon satis accurata Tab. 125. Les Allemands l'appellent FASAN HUNERN. Frisch.

Il est un peu plus petit que les précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds un pouce. La tête, la gorge, le col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un cendré très-foncé & presque noir. Il y a quelques petites taches blanches sur le sommet de la tête. Les yeux sont entourés de petits mammelons charnus, d'un très-beau rouge. La partie

Præcedentibus paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & unum pollicem æquat. Caput, guttur, collum, pectus & venter supremus ex saturatè cinereo nigricant. Vertex capitis maculis quibusdam minimis donatur albis. Papillæ carnosæ, coccineæ oculos ambiunt. Dorsum superior pars rufa, ex fusco

& albicante varia. Pars dorsi inferior, uropygium & rectrices caudæ superiores ex cinereo nigricant, sed quàm in capite & collo paulò dilutius, tæniisque latis, transversis, nigris ad latera variegantur. Venter imus, crura & rectrices caudæ inferiores ex dilutè fusco, cinereo & nigricante varia. Alarum rectrices rufo, albicante & nigricante variegatæ. Remiges majores dilutè fuscæ sunt: minores in latere exteriori albescent, paucò rufo admixto; in latere verò interiori nigricant, marginibus rufis. Rectrices in medio nigrae, marginibus albis. Rostrum, pedesque grisei; ungues nigricantes.

& blanches vers leurs bords. Le bec & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres.

2. LE FAISAN DES ANTILLES.

Phasianus superne griseo-fuscus; collo & pectore splendide cœruleis, rectricibus nigris PHASIANUS ANTILLARUM.

Phasianus Insularum Antillarum D. du Tertre. *Raj. Syn. Avi.* pag. 56. Faisan. Du Tertre. *Hist. des Antil.* Tom. II. pag. 255.

Caponem crassitie æmulatur; cruribus tamen donatur longioribus. Collum collo *Galli* longius; cauda non

Il est de la grosseur d'un *Chapon*, mais plus haut monté. Il a le col plus long que celui d'un *Coy*. Sa queue n'est pas

fort longue. Les plumes du col & de la poitrine sont d'un beau bleu brillant, & ont autant d'éclat que celles du *Paon*. Le dos & le croupion sont d'un gris-brun; & les plumes de la queue sont noires. On la trouve aux *Iles Antilles*.

magnâ longitudine prædita. Collum & pectus pennis vestiuntur cœruleis, pennarum *Pavonis* instar splendoribus. Dorsum & uropygium sunt griseo-fusca; rectrices nigrae. Habitat in *Antillis Insulis*.

3. LE FAISAN DE LA GUIANE.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 2.

Phasianus fuscus, superne ad olivaceum, infernè ad rufum vergens; rectricibus binis intermediis fuscis ad olivaceum inclinantibus, sequentibus nigricantibus, exterioribus rufis PHASIANUS GUIANENSIS.

Columbæ adfinis. *Moehr. Avi. Gen.* 103.

Avis Mormot *Brasilienfis*, coloris spadicei. *Seb. Tom. I. pag.* 103. *hujus icon minimè accurata Tab. LXVII. Fig. 2.*

Poule sauvage, ou *Gallina sylvestris* caudâ longiori vulgò *Katrakas-Katrakas*. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 285. (ed. 1725.)

Les Sauvages l'appellent KATRAKAS-KATRAKAS. *Feuillée.*

Il est un peu plus gros qu'une *Perdrix rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusqu'au-delà des yeux, a un pouce six lignes de long; sa queue sept pouces; son pied deux pouces quatre lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux

Craffitie Perdiciem rubram paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & sex pollices explet, & ad extremos ungues sexdecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, ultra oculos protensos, octodecim lineas longum est; cauda septem pollices; pes duos pollices & quatuor lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue

duos pollices : laterales paulò sunt breviores ; & posticus decem linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput saturatè fuscum. Collum, dorsum, uropygium, alarum rectrices & caudam superne tegentes pennæ ex fusco ad olivaceum inclinant. Pectus, venter, latera & crura ex fusco ad rufum vergunt. Caudæ rectrices inferiores castaneæ. Remiges & binæ rectrices intermediæ dorso concolores, ex fusco scilicet ad olivaceum inclinantes : rectrices utrinque sequentes nigricantes : exteriores rufæ. Rostrum griseo-album. Pedes nigricantes : ungues fusci. Habitat in *Brasilia* & *Guiania*, unde in *museum Realmurianum* missus est.

pouces : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a que dix lignes de longueur. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête est d'un brun foncé. Le col, le dos, le croupion, les couvertures des aîles, & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur l'olivâtre. La poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un brun tirant sur le roux. Les couvertures du dessous de la queue sont d'une couleur de marron. Les plumes des aîles & les deux du milieu de la queue sont de la même couleur que le dos, sçavoir d'un brun tirant sur l'olivâtre : celles qui les suivent de chaque côté sont noirâtres : & les plus extérieures sont rousses. Le bec est gris-blanc. Les pieds sont noirâtres ; & les ongles bruns. On le trouve au *Bresil* & dans la *Guiane*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur*.

** 4. LE FAISAN DORÉ DE LA CHINE.

Phasianus cristatus ; superne flavo-aureus, infernè coccineus ; collo superiore viridi-aureo, nigro transversim striato ; rectricibus lateralibus castaneo & nigro obliquè striatis. (*Mas*).
Phasianus cristatus ; superne fusco-rufescens, infernè fusco-flavescens ; rectricibus fusco-rufescentibus. (*Fœmina*). . . .
 PHASIANUS AUREUS SINENSIS.

Phasianus cristâ flavâ pectore coccineo. *Linn. systh. nat. ed. 6. Gen. 69, sp. 2.*

Phasianus cristâ flavâ pectore coccineo, remigibus secundariis cœruleis. *Linn. Amenit. Acad. Vol. I. pag. 562. hujus icon non satis accurata Tab. 1.*

Phasianus sanguineus. *Klein. Avi. pag. 114. N^o. 3.*

Phaïsan rouge de la Chine. *Alb. Tom. III. pag. 15; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 36.*

Phaïsan Belles-couleurs de la Chine. *Edwards. Tom. II. pag. LXVIII. & LXIX; avec des figures exactes, du mâle Pl. 68, & de la femelle Pl. 69.*

Les Anglois l'appellent CHINA-PHEASANT. *Alb.*

Il est moins gros que notre Faisan. La longueur du mâle depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue vingt-trois pouces; son pied deux pouces huit lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que huit lignes de longueur. Il a à la partie postérieure du pied un petit ergot long de trois lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne passent pas l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes assez longues, d'un beau jaune ou couleur d'or, qu'il redresse quelquefois en forme de hupe.

Phasiano nostrati crassitie cedit. Maris longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes novem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues quindécim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim cum semilinis longum; cauda unum pedem & undecim pollices; pes duos pollices cum octo lineis; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices: laterales paulò sunt breviores; & posticus octo lineas longitudine non superat. In parte pedis posteriore calcari donatur tres lineas longo. Alæ complicatæ caudæ exortum non excedunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ fati longæ, splendide flavæ aut aureæ; quas pennas quandoque cristæ in modum

erigit Avis. Capitis latera infra oculos, aut genæ carnea, nudæ, aut raris pennis oblitæ. Pennæ partem capitis posteriorem aut occipitium cooperientes longæ sunt, apice quasi quadratim abscissæ, aurantio splendenti colore imbutæ, & nigro transversim striatæ. Pennas istas Avis erigere potest sicuti solent Galli in prælio: pennæ autem istæ incumbentes ad mediam usque colli longitudinem extenduntur. Quæ partem colli superiorem tegunt splendide viridiaureæ, apicis margine nigro. Ferè quadratim abscissæ videntur: attamen ipsarum apices maximi circuli arcum referunt. Dum incedit Avis, pennæ istæ supra dorsum gliscunt, & pennarum colli *Galinacei* motus æmulantur. Dorsum & uropygium splendide flava aut aurea, cum aliqua in parte dorsi superiore coccinei coloris mixtura. Caudæ tectrices superiores eodem aureo colore tinguntur, apicibus coccineis. Guttur, pars inferior & latera colli, pectus, venter, latera & caudæ tectrices inferiores splendide coccineæ. Crura fusca. Alarum tectrices castaneo & fusco

Les côtés de la tête au-dessous des yeux, ou les joues sont de couleur de chair, nues, ou clair-semées de plumes. Les plumes du derrière de la tête ou de l'occiput sont longues, coupées quarrément par le bout, d'un très-bel orangé, & rayées transversalement de noir. L'Oiseau peut redresser ces plumes comme *nos Cogs* font les leurs quand ils se battent; & lorsqu'elles retombent, elles s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur du col. La partie supérieure du col est couverte de plumes d'un beau verd-doré & terminées par un petit bord noir. Elles sont presque coupées quarrément; cependant leur bout fait un arc d'un très-grand cercle. Ces plumes, lorsque l'Oiseau marche, glissent fort loin par-dessus le dos, & ont les mêmes mouvemens que les plumes du col du *Cog*. Le dos & le croupion sont d'un très-beau jaune ou couleur d'or, mêlé d'un peu de rouge vif à la partie supérieure du dos. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur d'or & terminées de rouge vif. La gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'une belle

couleur d'écarlatte. Les jambes sont brunes. Les couvertures de l'aile sont variées de marron & de brun, les grandes étant rayées transversalement de cette dernière couleur. Les plumes scapulaires sont d'un bleu foncé, changeant en un violet très-éclatant. Les grandes plumes de l'aile sont brunes & marquées de taches roussâtres; leur bord extérieur est de cette dernière couleur: les moyennes sont du côté extérieur d'un marron varié de taches brunes, & du côté intérieur elles sont brunes, variées de taches de marron. Les plumes de la queue sont variées de marron & de noir: les deux du milieu étant noires & variées de taches de marron; & les latérales étant rayées obliquement de marron & de noir; de façon que les rayes noires du côté extérieur forment un angle avec les rayes de la même couleur du côté intérieur: & ainsi des autres. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les autres; & les latérales vont toutes en diminuant de longueur jusqu'à la plus extérieure, qui est très-courte. Au-dessus des plumes de la queue sortent d'autres plumes longues & étroites, d'une belle couleur d'écarlatte, & dont la tige est

variegantur, majoribus fusco transversim striatis. Scapulares pennæ saturatè cœruleæ, in violaceum splendidissimum colorem mutantur. Remiges majores fuscæ, maculis rufescentibus notatæ, oris ipsarum exterioribus etiam rufescentibus: remiges minores in latere exteriori castaneæ, maculis fuscis variæ, in latere verò interiori fuscæ, maculis castaneis notatæ. Rectrices castaneo & nigro variegantur: duabus scilicet intermediis nigris, maculis castaneis variegatis; laterilibus verò castaneo & nigro obliquè striatis; ita tamen ut tæniæ nigræ, in latere exteriori positæ, cum tæniis nigris, in latere interiori sitis, angulum efforment: & sic de cæteris. Rectrices binæ intermediæ cæteris sunt longiores; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad extimam usque brevissimam. Supra rectrices aliæ extant pennæ longæ & strictiores, splendide coccineæ, scapis flavis donatæ. Pennarum istarum longiores, quæ quidem intermediæ, mediam ferè caudæ longitudinem attingunt: laterales verò eodem quo rectrices laterales modo longitudine

tudine minuuntur. Oculorum irides splendide flavæ. Rostrum dilute flavum, ipsius apice flavo saturatiore tincto. Pedes, unguisque flavi.

L'iris des yeux est d'un jaune éclatant. Le bec est d'un jaune clair, mais un peu plus foncé vers le bout. Les pieds & les ongles sont jaunes.

Fœmina mari paululum magnitudine cedit. Ab illo quoque multum colore discrepat. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, alarum tectrices & caudam superne tegentes pennæ ex fusco ad rufum inclinant. Quæ capitis verticem cooperiunt cæteris sunt longiores, & cristam quodammodo efformant. Colli pars inferior, pectus, venter & latera ex dilute fusco flavescunt, maculisque fuscis variegantur. Remiges, rectricesque pennæ dorso colores. Alarum margines, versum articulum carpo humano respondentem, albescent. Rectrices binæ intermediae, ut in *mare*, cæteris sunt longiores; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad extimam usque brevissimam. Oculorum irides ex avellaneo colore flavescunt.

jaune. Les plus longues, qui sont celles du milieu, s'étendent presque jusqu'à la moitié de la longueur de la queue: & les latérales vont en diminuant de longueur comme les plumes latérales de la queue.

La *femelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Elle en diffère aussi beaucoup par sa couleur. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur le roux: les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres, & forment une espèce de hupe. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les côtés sont d'un brun clair & jaunâtre, varié de taches brunes. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur que le dos. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est blanchâtre. Les deux plumes du milieu de la queue sont, comme dans le *mâle*, plus longues que les autres; & les latérales vont en décroissant jusqu'à la plus extérieure, qui est très-courte. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette jau-

nâtre. Le bec & les pieds sont Rostrum , pedesque flavi.
jaunes.

On le trouve à la Chine , Habitat in Sinenſi regione,
d'où il a été apporté à M. de unde in muſeum Realmuria-
Reaumur par M. Godeheu. num à D. Godeheu allatus eſt.

** 5. LE FAISAN BLANC DE LA CHINE.

Phasianus criſtatus ; ſuperne albus, lineis nigris circumferentiæ
pennarum parallelis varius, infernè nigro-purpuraſcens ; rec-
tricibus lateralibus albis , nigro obliquè ſtriatis (*Mas*).

Phasianus criſtatus , ſuperne fulco-rufeſcens, infernè ſordidè
albus , tæniis tranſverſis nigris varius ; gutture albicante ;
reſtrictibus lateralibus ſordidè albis, nigro tranſverſim ſtria-
tis (*Fœmina*) PHASIANUS ALBUS SINENSIS.

Phasianus Sinenſis , albus , capite nigris pennis dependentibus. *Klein.*
Avi. pag. 114. N°. 4.

Phaiſan blanc de la Chine. *Alb. Tom. III. pag. 15 ; avec une figure peu*
exaëte & mal coloriée Pl. 37.

Phaiſan de la Chine noir & blanc. *Edwards. Tom. II. pag. LXVI ; avec*
des figures exaëtes du mâle & de la femelle Pl. 66.

Les Anglois l'appellent WHITE CHINA-PHEASANT. *Alb.*

Il eſt plus gros que notre *Fai-*
ſan. La longueur du mâle de-
puis le bout du bec juſqu'à ce-
lui de la queue eſt de deux pieds
ſept pouces , & juſqu'à celui
des ongles d'un pied huit pou-
ces ſix lignes. Son bec depuis
ſon bout juſqu'aux coins de la
bouche a un pouce cinq lignes
de long ; ſa queue dix-ſept pou-
ces ; ſon pied trois pouces cinq
lignes ; & le milieu des trois
doigts antérieurs, joint avec
l'ongle , deux pouces cinq li-
gnes ; les latéraux ſont un peu

Crasſitie Phasianum noſ-
tratem antecellit. Maris lon-
gitude ab apice roſtri ad cau-
dam extremam duos pedes
& ſeptem pollices æquat , &
ad extremos ungues unum
pedem octo pollices & ſex
lineas. Roſtrum ab ipſius api-
ce ad oris angulos unum pol-
licem & quinque lineas lon-
gum ; cauda ſeptemdecim
pollices ; pes tres pollices
cum quinque lineis ; & trium
digitorum anticorum me-
dius cum ungue duos polli-

ces & quinque lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus undecim linearum longitudinem non excedit. In parte pedis posteriore calcari donatur septem lineas longo. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non extenduntur. Cutis nuda coccinea , rarissimis pilis obsita , capitis latera sive genas cooperit. Cutis autem ista utrinque supra oculos cornuum in modum erigitur , retrorsum in acumen evadit , infraque genas paululum dependet. Pennæ longæ, nigræ, ad purpureum vergentes , supra collum dependentes , capitis verticem tegunt , & cristam quodammodò efficiunt. Superior pars & latera colli , dorsum , uropygium , alarum tectrices & pennæ caudam superne regentes albæ ; quæque autem penna tribus quatuorve donatur lineis nigris , concentricis , & circumferentiæ pennarum parallelis. Guttur , colli pars inferior , pectus , venter , latera , crura & caudæ tectrices inferiores ex nigro ad purpureum inclinant. Remiges , rectricesque pennæ albæ , nigro obliquè striatæ , exceptis tamen binis rectri-

plus courts ; & celui de derrière n'a qu'onze lignes de longueur. Il a à la partie postérieure du pied un ergot long de sept lignes. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas au-delà de l'origine de la queue. Les côtés de la tête ou les joues sont couvertes d'une peau nue , d'un rouge vif , sur laquelle cependant sont quelques poils très-clair-semés. Cette peau s'élève de chaque côté au-dessus des yeux en forme de cornes , s'étend en arrière en pointe , & pend un peu au-dessous des joues. Le sommet de la tête est couvert de longues plumes noires , ayant un lustre de pourpre , qui pendent au-dessus du col & forment une espèce de hupe. La partie supérieure & les côtés du col , le dos , le croupion , les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont blanches , chaque plume étant variée de trois ou quatre lignes noires , concentriques , & parallèles à la circonférence de la plume. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un noir ayant un lustre de pourpre. Les plumes des aîles & celles de la queue sont blanches , & rayées

obliquement de noir, excepté les deux du milieu de la queue, qui sont tout-à-fait blanches. Celles-ci sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur jusqu'à la plus extérieure, qui est très-courte. L'iris des yeux est jaune. Le bec est aussi jaune, mais un peu rembruni à son bout. Les pieds sont d'un rouge vif; & les ergots sont blancs.

La *féfelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Elle en diffère aussi beaucoup par sa couleur. Ses yeux sont entourés d'une peau rouge, comme dans le *mâle*, mais beaucoup moins étendue. Le sommet de la tête est couvert de plumes d'un brun obscur, pendants un peu sur le col, & formant une espèce de huppe. La gorge & le bas des joues sont blanchâtres. Le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur le roux. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale, mêlé confusément de brun, & varié de bandes transversales, noires. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres: les moyennes sont de la couleur du dos; & les plus proches du corps sont parsemées de blanc.

cibus intermediis albis, absque ulla nigri mixtura: quæ binæ rectrices intermediæ lateralibus sunt longiores; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad extimam usque brevissimam. Oculorum irides luteæ. Rostrum quoque luteum, ipsius apice obscuriore. Pedes coccinei; calcaria alba.

Fœmina mari paululum magnitudine cedit. Ab illo quoque multum colore differt. Cutis coccinea, quàm in mare multò minùs extensa, oculos ambit. Verticem capitis cooperiunt pennæ obscurè fusæ, supra collum paulum dependentes, & cristam quodammodò efformantes. Guttur & genarum pars infima albescunt. Collum, pectus, dorsum, uropygium, alarum tectrices & pennæ caudam superne tegentes ex fusco ad rufum inclinant. Venter, latera, crura & caudæ tectrices inferiores sordidè albæ, cum aliqua fusci mixtura, tæniis transversis, nigris variegantur. Remiges majores nigricantes: minores dorso concolores; corpori proximis albo respersis. Rectrices binæ intermediæ ex fusco ad

rum vergentes : laterales sordidè albæ, cum aliqua fusci mixtura, nigro obliquè striatæ. Rectrices binæ intermedia cæteris longiores sunt; laterales verò sensim longitudine minuuntur ad extimam usque brevissimam. Oculorum irides & rostrum ex fusco flavescunt. Pedes rubri.

Habitat in *Sinenfi regione*, unde in *museum Realmurianum* à *D. Godeheu* allatus est.

Les deux plumes du milieu de la queue sont d'un brun tirant sur le roux : les latérales sont d'un blanc sale, mêlé confusément de brun, & rayé obliquement de noir. Les deux du milieu sont plus longues que les autres ; & les latérales vont en décroissant jusqu'à la plus extérieure, qui est très-courte. L'iris des yeux est d'un brun-jaunâtre, ainsi que le bec. Les pieds sont rouges.

On le trouve à *la Chine*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Godeheu*.

** 6. LE FAISAN COURONNÉ DES INDES.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 1.

Phasianus cristatus; cinereo-cœruleus; rectricibus alarum apice castaneo-purpureis, majoribus quibusdam exterius albis; rectricibus apice cinereis . . . PHASIANUS CRISTATUS INDICUS.

On l'appelle à l'Isle de Banda KROON-VOOGEL.

Crassitie *Pavonem* ferè æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & tres pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos pollices longum; caudæ decem

Il est presque aussi gros qu'un *Paon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long; sa queue dix pouces; son pied

trois pouces six lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , deux pouces deux lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière n'a qu'un pouce de longueur. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ à la moitié de la longueur de la queue. La tête , le col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré-bleu. La tête est ornée d'une belle hupe de la même couleur , longue de quatre pouces neuf lignes , & dont les plumes sont décomposées ; c'est-à-dire , que les barbes de chaque plume sont séparées les unes des autres. Le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un cendré foncé , mêlé d'un peu de marron-pourpré à la partie supérieure du dos & aux plumes scapulaires. Les petites couvertures des aîles sont du même cendré foncé , & terminées de marron-pourpré : les grandes les plus proches du corps sont cendrées du côté intérieur , blanches du côté extérieur , & leur bout est d'un marron-pourpré : cette dernière couleur occupe sur chaque plume plus d'espace du

pollices ; pes tres pollices cum sex lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & totidem lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus unius pollicis longitudinem non excedit. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput , collum , pectus , venter , latera , crura & caudæ tectrices inferiores sunt cinereo - cœruleæ. Corolla concolor , quatuor pollices & novem lineas longa , pen nis conflata decompositis , id est , quarum pinnulæ inter se nullo modo connectuntur , caput exornat. Dorsum , uropygium , caudæ tectrices superiores & scapulares pennæ saturatè cinereæ , cum aliqua in parte dorsi superiore & scapularibus pennis castaneo-purpurei mixtura. Alarum tectrices minores sunt quoque saturatè cinereæ , apicibus castaneo - purpureis : majores corpori proximiores interiùs cinereæ , exteriùs albæ , apicibus castaneo-purpureo colore tinctis : qui color in uniuscujusque pennæ latere exteriore majus quàm in latere interiore spatium occupat. Tectrices alarum ma-

jores à corpore remotiores
interiùs cinereæ , exteriùs
verò & apice castaneo-pur-
pureæ. Remiges ex saturatè
cinereo-cœruleo nigricant.
Rectrices pennæ remigibus
concolores , apicibus cine-
reo dilutiorè tinctis. In utro-
que capitis latere macula
adeft oblonga, nigra, in qua
oculus fitus eft. Rostrum,
pedes, unguësque nigricant.
Habitat in *Insula Banda*,
unde missus ad *Arausicanum*
Principem, qui *D. de Reau-*
mur dono dedit.

envoyé au *Prince d'Orange*, qui en a fait présent à *M. de*
Reaumur.

** 7. LE PAON.

Voyez le mâle Pl. XXVII.

Phasianus cristatus; superne viridi-aureus in cupri puri colo-
rem mutans, marginibus pennarum nigris, infernè nigri-
cans, viridi-aureo admixto; collo & pectore viridibus in
cœruleum mutantibus, auro admixto; duabus utrinque tæ-
niis in capite albis; tectricibus caudæ superioribus maculâ
præditis in medio nigrâ, dein viridi in violaceum & cœ-
ruleum mutante, marginibus aureis in cupri puri colorem
mutantibus (*Mas*).

Phasianus cristatus; fuscus ad cinereum vergens; collo &
pectore viridibus, apicibus pennarum in pectore albis;
duabus utrinque tæniis in capite albis (*Fœmina*). . . .
PAVO.

Pavo caudâ longâ, plumis uropygii pulcherrimis. *Browne. Nat. Hist.*
of Jamaic. pag. 470.

Pavo caudâ longâ. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 65. sp. 1.*

- Faun. Suec. Linn. N°.* 163.
Pavo longicaudus. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XII. sp. 1. (Mas).
Pavo brevicaudus. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XII. sp. 2. (femina).
Pavo. Gefn. Avi. pag. 656, in qua maris icon minùs accurata.
Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 1. icones non satis accuratæ, maris pag. 9, & femina pag. 10.
Jonst. Avi. pag. 37. maris duæ icones non satis accuratæ, & femina icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXII.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 302. N°. XXIII.
Willugh. Ornith. pag. 112. maris icon non satis accurata Tab. XXVII.
Raj. Syn. Avi. pag. 51. N°. A. 2.
Raj. Syn. Avi. pag. 183. N°. 18.
Charlet. Exer. pag. 80. N°. I.
Charlet. Onomazt. pag. 72. N°. I.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.
Mus. Worm. pag. 297.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 325.
Moehr. Avi. Gen. 45.
Klein. Avi. pag. 112. Lit. B.
Frisch. maris icon non satis accurata Tab. 118.
Pavo; Pavus. Gefn. icon. Avi. pag. 55, in qua maris icon minùs accurata.
Pavo, seu Pavus; Avis medica Varroni; Junonia Avis Ovidio. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 303.
Paon. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 233; avec une mauvaise figure du mâle pag. 234.
Bel. Portr. d'Ois. pag. 55 b, dans laquelle est la même figure.
Les Hébreux l'appellent TUK. Gefn. Aldrov.
Les Arabes, TAVAS. Gefn. Aldrov.
Les Grecs, Ταῦς Bel. Gefn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Worm. Schwenck. Ταῦς. Aldrov. Ταῦν. Aldrov. Worm. Schwenck.
Les Grecs modernes, Παῦν. Aldrov. Schwenck. Περσικὸν ὄρνειον; Μινδικὸν ὄρνειον. Schwenck.
Les Espagnols, PAVON. Gefn.
Les Catalans, PAGO. Barr.
Les Italiens, le mâle, PAVON; PAVONE; PAGONE. Bel. Gefn. & la femelle PAVONESSA. Gefn.
Les Allemands, le mâle, PFAW. Gefn. Schwenck. PFAU. Frisch. PAW. Schwenck. & la femelle, PFAEWIN. Gefn. Schwenck.
Les Saxons, PAGELUN. Gefn.
Les Illyriens, PAW. Gefn.
Les Polonois, PAW. Rzac.
Les Flamands, PAUW. Gefn.
Les Hollandois, PAAFUEL. Worm.
Les Suédois, PAOFUGEL. Linn.

Gallo-pavonem semestrem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & octo pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes & undecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & decem lineas longum est; cauda unum pedem & septem pollices; pes quatuor pollices cum decem lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & septem lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus septemdecim linearum longitudinem non antecellit. Alæ complicatæ ad quinque circiter pollicum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. *Pavones*, mares præcipuè, ab omnibus aliis Avibus maximè distinguuntur rectricibus caudæ superioribus, quàm rectrices ipsæ multò longioribus. *Pavonis nostratis* longiores caudæ rectrices, quæ quidem sunt intermediae, quatuor pedes & totidem pollices longitudine adæquant: laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad exti-

Il est environ de la grosseur d'un *Dindon* de six mois. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes de long; sa queue un pied sept pouces; son pied quatre pouces dix lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces sept lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière n'a que dix-sept lignes de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à environ cinq pouces au-delà de l'origine de la queue. Les *Paons*, & sur-tout les mâles, ont une singularité, qui les distingue de tous les autres Oiseaux: c'est la longueur des couvertures du dessus de la queue, qui est beaucoup plus considérable que celle des plumes de la queue même. Les plus grandes de celles de *notre Paon*, & qui occupent le milieu, ont quatre pieds quatre pouces de long: les latérales vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Elles

sont placées en plusieurs rangs, & couchées les unes sur les autres : & celles du milieu de chaque rang sont toujours les plus longues. La tête, la gorge, le col & la poitrine sont d'un verd brillant, mêlé d'un lustre d'or & changeant en un bleu éclatant. De chaque côté de la tête sont deux longues taches blanches, dont l'une passe par-dessus l'œil, & l'autre, qui est plus courte & beaucoup plus large, passe par-dessous. Sur le sommet de la tête est une huppe composée de vingt-quatre petites plumes, longues de deux pouces, dont les tiges sont blanchâtres. Ces plumes sont garnies depuis leur origine jusque vers leur bout de barbes très-rare, noirâtres & détachées les unes des autres : leur bout au contraire est conformé comme les plumes ordinaires, & du même verd-doré que la tête. Le dos & le croupion sont couverts de plumes d'un verd-doré très-éclatant & changeant en une couleur de *cuivre de rosette*, & bordées d'un noir de velours. Ces plumes par leur arrangement imitent des écailles. Les couvertures du dessus de la queue ont leur tige blanche, garnie depuis leur origine jusque vers leur bout de longues barbes, détachées les unes des

mam usque brevissimam. Secundum plures ordines collocantur, atque aliæ aliis incumbunt: quæ verò in unoquoque ordine medium occupant locum, cæteras semper longitudine superant. Caput, guttur, collum & pectus virore perlustrantur splendenti, cœruleo splendidissimo colore variante, auro etiam admixto. In utroque capitis latere binæ extant taniæ longitudinales, albæ, quarum una supra oculum, altera verò, brevior quidem & multo crassior, infra oculum sita est. In capitis vertice cristâ donatur viginti quatuor conflatâ plumulis, duos pollices longis, scapis albicantibus præditis. Plumulæ autem istæ ab exortu versùs apicem usque pinnulis rarissimis, nigricantibus, nullo modo inter se connexis, oblitæ sunt: in apice verò pennas vulgares æmulantur, eodemque imbuuntur viridi-aureo, quo caput tingitur. Pennæ viridi-aureæ splendidissimæ, *cupri puri* colore variantes, marginibus donatæ nigris, holoserici instar villosi splendentibus, & squammatim quasi positæ, dorsum vestiunt, sicut & uropygium. Tectrices caudæ superiores

scapos habent albos , ab exortu versùs apicem usque pinnulis obritos longissimis , nullo modo inter se connexis , & viridi-aureo splendenti , in *cupri puri* colorem mutante , imbutis : in apice verò pinnulæ inter se connectuntur , pulcherrimumque præbent spectaculum. Maximâ donantur maculâ (*oculus vocatâ*) , in medio nigrâ , holoserici instar villosi splendente , versùs pennæ exortum cordatim emarginatâ , dein viridi , violaceo & cœruleo coloribus splendidissimis variante , marginibus tandem auro variatim imbutis & in *cupri puri* colorem mutantibus. Longiores quædam istarum tectricum pulcherrimâ illâ destituuntur maculâ , & apice quasi quadratim abscissæ videntur. Venter & latera nigricant , pauco viridi-aureo admixto. Crura sunt dilutè fulva. Tectrices caudæ inferiores pennæ griseo-fuscæ : quæ alas subtus cooperiunt , nigricantes. Alarum tectrices minimæ & scapulares pennæ ex fulvo & nigricante variegantur , cum aliqua viridi-aurei & *cupri puri* coloris mixtura , sed tantum in autres , d'un verd-doré éclatant & changeant en une couleur de *cuivre de rosette* : à leur bout les barbes sont réunies & font un effet admirable. Elles sont marquées d'une grande tache (qu'on a appelé *œil*) , dont le centre est d'un noir de velours , échancré en cœur , (l'échancrure étant tournée vers l'origine de la plume) , entouré d'un cercle d'un verd changeant en violet & en bleu très-éclatants : ce cercle est entouré lui-même de deux autres , d'une couleur d'or , mais de différentes nuances , & changeants aussi en couleur de *cuivre de rosette*. Quelques-unes des plus longues de ces plumes n'ont pas cette belle tache , & paroissent comme coupées quarrément par le bout. Le ventre & les côtés sont noirâtres , & mêlés d'un peu de verd-doré. Les jambes sont d'un fauve clair. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-brun : celles du dessous de l'aîle sont noirâtres. Les petites couvertures du dessus de l'aîle & les plumes scapulaires sont variées de fauve & de noirâtre , avec une légère teinte de verd-doré & de couleur de *cuivre de rosette* sur les petites couvertures des aîles seulement : les moyen-

nes sont d'un bleu foncé, changeant en verd-doré : les grandes les plus proches du corps sont noirâtres, & mêlées d'un peu de verd-doré : & les grandes les plus éloignées du corps, ainsi que l'aile bâtarde, sont rouffes. L'aile a vingt-quatre plumes : les dix premières sont rouffes, la dixième ayant quelques taches noirâtres sur son côté extérieur : la onzième est d'un noirâtre, mêlé d'un peu de verd-doré du côté extérieur, & son côté intérieur est roux, & varié de taches noirâtres : les neuf suivantes sont noirâtres, avec un peu de verd-doré sur leur côté extérieur seulement : enfin les quatre les plus proches du corps sont variées des mêmes couleurs que les plumes scapulaires. La queue est composée de dix-huit plumes d'un gris-brun, variées du côté extérieur & sur leur bord intérieur de taches d'un gris tirant sur le roux. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont un peu en diminuant par degrés. L'iris des yeux est jaune. Le bec est blanchâtre. Les pieds & les ongles sont gris. Le mâle a à la partie postérieure de chaque pied un ergot long de neuf lignes, très-gros & finissant en une pointe

teetricibus alarum minimis : alarum teettrices mediæ sunt saturatè cœruleæ, viridi-aureo colore variantes : majores corpori finitimæ nigricantes, cum paucò viridi-aureo admixto : majores verò à corpore remotiores, sicut & ala notha, rufæ. In utraque ala viginti quatuor sunt remiges : decem primores sunt rufæ, decimâ maculis quibusdam nigricantibus in latere exteriori donatâ : undecima in latere exteriori nigricans, cum aliqua viridi-aurei mixtura, in latere verò interiori rufa, maculis nigricantibus varia : novem sequentes nigricantes, paucò viridi-aureo admixto in latere exteriori tantùm : quatuor denique corpori viciniore scapularibus pennis concolores. Cauda constat octodecim rectricibus griseo-fuscis, in latere exteriori & interiori margine maculis griseis ad rufum inclinantibus variegatis. Rectrices binæ intermediae longiores sunt ; laterales verò gradatim paululùm longitudine minuuntur. Oculorum irides flavæ. Rostrum albacat. Pedes, unguesque grisei. Mas in utriusque pedis

parte posteriore calcari donatur novem lineas longo, crassissimo & in aciem acutum desinente. *Ex museo Realmuriano.*

Fœmina crassitie paululum *mari* cedit. Ipsius tectrices caudæ superiores quàm in *mare* multò sunt breviores; rectrices enim eas longitudine multum antecellunt. A *mare* colore etiam discrepat. Per universum corpus, dorsum scilicet, uropygium, ventrem, latera, crura, tectrices caudæ superiores & inferiores, alas superne & infernè tegentes pennas, remiges & rectrices, ex fusco ad cinereum vergit. Capitis vertex & crista eodem imbuuntur colore, quibusdam tamen maculis exiguis, velut punctis virescentibus & splendentibus, interfertis. Binæ maculæ illæ candidæ, in utroque capitis latere sitæ, quas etiam in *mare* annotavimus, in *fœmina* longè sunt majores. Guttur albicat. Colli pennæ virides: quæ pectus vestiunt concolores, sed in extremitatibus albæ. Oculorum irides plumbeæ. Rostrum, pedes, unguisque grisei.

Hujus speciei varietates sunt

aiguë. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

La *femelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Elle a les couvertures du dessus de sa queue beaucoup plus courtes; puisqu'elles ne sont pas à beaucoup près aussi longues que les plumes de la queue. Elle en diffère aussi par sa couleur. Tout son corps, sçavoir le dos, le croupion, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des aîles, les plumes des aîles & celles de la queue, est d'un brun tirant sur le cendré. Le sommet de la tête & la huppe sont de la même couleur, variée de quelques petites taches, qui sont comme autant de petits points verts & brillants. Les deux taches blanches, qu'elle a de chaque côté de la tête, sont beaucoup plus grandes que dans le *mâle*. La gorge est blanche. Les plumes du col sont vertes: celles qui couvrent la poitrine, sont vertes & terminées de blanc. L'iris des yeux est couleur de plomb. Le bec, les pieds & les ongles sont gris.

Les variétés de cette espèce sont

A. LE PAON PANACHÉ.

Pavo varius.

Pavo varius. *Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 119.*
Les Allemands l'appellent BUNTE PFAU. Frisch.

Il ne diffère du précédent	Præcedenti similis est; ab
que parce qu'il a les joues, la	illo tantum differt genis,
gorge, le haut du ventre & les	gutturæ, supremo ventre,
couvertures des ailes blanches.	alarumque tectricibus albis.

** B. LE PAON BLANC.

Pavo albus.

Pavo albus. *Gesn. Avi. pag. 657.**Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 31. maris icon minùs accurata pag. 32.**Jonst. Avi. pag. 39. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIII.**Charlet. Exer. pag. 80. N^o. 1.**Charlet. Onomast. pag. 72. N^o. 1.**Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 120.*Pavo albus Gesneri. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XII. sp. 3.*Pavo colore albo. *Raj. Syn. Avi. pag. 52. N^o. A. 2.*Pavo candidus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 327.*

Les Allemands l'appellent WEISSER PFAU. Schwenck. WEISSE PFAU.
Frisch.

Les Anglois, WHITE PEA-COCK. Charlet.

Celui-ci diffère des précédens par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Les taches, qui sont au bout des couvertures du dessus de la queue, quoiqu'elles soient de la même couleur, paroissent cependant un peu, & cela parce qu'elles sont formées de différentes nuances de blanc. Du cabinet de M. de Reaumur.

A præcedentibus discrepat colore in toto corpore albo. Macula sive oculi, quibus tectrices caudæ superiores apice præditæ sunt, quamquam ipsæ sint in toto albæ, attamen paululum apparent, quia variis efformantur albedinis gradibus. Ex museo Realmuriano.

8. LE PAON DU JAPON.

Phasianus cristatus ; superne cœruleo & viridi varius , infernè leucophæus nigris maculis insignitus (*Mas*), infernè niger (*fœmina*) ; cristâ spicæ æmulâ ; tectricibus caudæ superioribus maculâ præditis in medio aureâ , dein cœruleâ , marginibus viridibus PAVO JAPONENSIS.

Pavo Japonensis. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 35. icones non satis accurate , maris pag. 33 , & fœminæ pag. 34.*

Jonst. Avi. pag. 39. maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuatae Tab. XXIII.

Charlet. Exer. pag. 80. N°. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 72. N°. 2.

Les Anglois l'appellent JAPAN PEA-COCK. Charlet.

Pavonem nostratem magnitudine circiter æquat. Vertex capitis & collum superius virescunt , & maculis cœruleis , seu punctis , quæ pariter in medio exiguas lineas albas , deorsum descendentes , habent , resperguntur. Cristam in capite gestat quatuor ferme digitos longam , partim viridem partim cœruleam , figurâ spicæ non omnino dissimilem. Pectus & dorsum pennis vestiuntur colore variantibus ; pectoris enim pennæ ex cœruleo , viridi & aureo ; dorsi verò ex cœruleo & viridi tantum tinguntur. Venter , latera & crura leucophæa , nigrisque insignita maculis , quarum quæ in ventre sunt , lineis do-

Il est à peu près de la grandeur de *notre Paon*. Le sommet de la tête & la partie supérieure du col sont d'un verd semé de petites taches , ou de points bleus , qui ont dans leur milieu de petites lignes longitudinales , blanches. Sur le sommet de la tête est une huppe longue d'environ quatre pouces , en partie verte & en partie bleue , & dont la figure représente assez bien un épi. Les plumes qui couvrent la poitrine & le dos , sont de couleurs changeantes ; celles de la poitrine sont variées de bleu , de verd & d'or ; & celles du dos de bleu & de verd seulement. Le ventre , les côtés & les jambes sont cendrées , & marquées de taches noires , dont celles qui sont sur

le ventre, sont variées de lignes blanches. Les couvertures des ailes sont des mêmes couleurs que le dos; mais les plumes vertes ne sont pas aussi apparentes, au contraire les bleues sont plus grandes & plus brillantes. Les petites plumes de l'aile sont de la même couleur que les couvertures: les grandes sont vertes dans leur milieu, & rayées transversalement de lignes noires; ensuite elles sont jaunâtres, & rayées aussi transversalement de lignes noires; & leurs extrémités sont tout-à-fait noires. Les couvertures du dessus de la queue ne sont pas en aussi grand nombre que dans *notre Paon*: elles sont beaucoup plus longues que les plumes de la queue, d'un brun tirant sur le marron; & leurs tiges sont d'un beau blanc. Vers le bout de chacune d'elles il y a une tache plus grande que celles de *notre Paon*, qui est dorée dans son milieu, ensuite bleue, & dont les bords sont verts. Le tour des yeux est rouge: les yeux sont noirs; & leur iris est jaune. Le bec est plus long & plus menu que celui de *notre Paon*, & cendré. Les pieds sont cendrés.

La femelle est plus petite que le mâle. Elle en diffère aussi en ce qu'elle a le ventre tout-à-fait noir, & les couvertures du dessus de la queue beaucoup

nantur albis. Alarum tectrices ejusdem sunt cum dorso coloris; sed pennæ virides non ita apparent, cœruleæ verò majores sunt & lucidiores. Remiges minores alarum tectricibus concolores: majores autem in medio virides, ubi lineis nigris, transversis notantur; deinde subluteæ, similiter nigris lineis transversis notatæ; in extremitatibus denique nigrae. Caudæ tectrices superiores quàm in *nostrate* rariores, tectricibus multò longiores, colore fusco ad castaneum vergente, scapo candidissimo: & maculae versùs apicem tectricum extant quàm in *nostrate* majores, in medio aureæ, dein cœruleæ, marginibus viridibus. Oculorum ambitus ruber: oculi nigri; eorumque irides luteæ. Rostrum cinereum, sed quàm in *nostrate* longius & tenuius. Pedes leucophæi.

Fœmina mare minor est: ab eo etiam discrepat in eo quod ventrem habeat prorsus nigrum, tectrices caudæ superiores multò breviores, &

& rectrices virides, marginibus cœruleis, scapis albis. plus courtes. Les plumes de sa queue sont vertes, bordées de bleu, & leurs tiges sont blanches.

Habitant in *Japonia*.

On les trouve au *Japon*.

9. LE PAON DE LA CHINE.

Phasianus cristatus; obscurè fuscus, superne fusco dilutiorè punctulatus, infernè nigro transversim striatus; maculis in dorso superiore splendide purpureis, cœruleo, viridi & cupri-aureo colore variantibus; tectricibus caudæ superioribus maculis duabus concoloribus præditis (*Mas*).

Phasianus cristatus; obscurè fuscus, dorso inferiore fusco dilutiorè punctulatus; maculis in dorso superiore obscurè cœruleis; tectricibus caudæ superioribus maculis duabus concoloribus præditis (*Fœmina*) . . . , *PAYO SINENSIS*.

Phasianus Pavoneus. *Klein. Avi. pag. 114. N^o. 5. (mas)*,

Phasianus fuscus. *Klein. Avi. pag. 114. N^o. 6. (fœmina)*.

Paon-Phaisan de la Chine. *Edwards. Tom. II. pag. LXVII. & LXIX;*
avec des figures exactes, du mâle Pl. 67, & de la femelle Pl. 69.

Phasianum nostratem magnitudine superat. Verticem capitis tegunt pennæ obscurè fuscæ, cristæ in modum erectæ; ipsarum apicibus paululùm antrosum reflexis. Rostrum inter & oculos cutis est lutea, nuda, raris tantummodo pilis nigris obsita. Latera capitis albescent. Collum splendide fuscum, fusco obscuriorè transversim striatum. Pars dorsi superior, scapulares pennæ, alarumque tectrices obscurè fuscæ, fusco dilutiorè & flavescente

Il est plus grand que notre *Faisan*. Les plumes du sommet de la tête sont d'un brun obscur: elles se redressent en forme de hupe, & leurs bouts sont un peu recourbés en avant. Entre le bec & les yeux est un petit espace jaune, dénué de plumes, & seulement clair-semé de poils noirs. Les côtés de la tête sont blancs. Le col est d'un brun vif, rayé transversalement d'un brun terni & obscur. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures des ailes sont d'un brun

obscur , pointillé d'un brun clair & jaunâtre ; chaque plume ayant vers son bout une tache ronde , d'un pourpre éclatant & changeant en bleu , en verd & en cuivre doré , environnée chacune d'un cercle noir. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un brun tout parsemé de petits points d'un brun plus clair. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun obscur , rayé transversalement de noir. Les grandes plumes des aîles sont d'un brun très-foncé ou noirâtres : les moyennes sont des mêmes couleurs que les couvertures des aîles , ayant aussi les mêmes taches de pourpre , &c. Les couvertures du dessus de la queue sont beaucoup plus longues que la queue même , d'un brun assez foncé , parsemé de petits points d'un brun plus clair : & chaque plume a vers son bout deux taches ovales , sçavoir une de chaque côté , variées des mêmes couleurs que celles du dos & des aîles , & entourées d'un cercle noir , lequel est lui-même entouré d'un cercle d'un orangé obscur. Celles de ces couvertures qui occupent le milieu , sont plus longues que les latérales , qui vont toutes en dimi-

quasi punctulata ; quæque autem penna versùs apicem maculâ donatur rotundâ , splendide purpureâ , & cœruleo , viridi & cupri-aureo colore variante ; circulo nigro unamquamque maculam ambiente. Dorsi pars inferior & uropygium fuscis vestiuntur pennis , punctulis dilutiùs fuscis aspersis. Pectus , venter , latera , crura & caudæ tectrices inferiores obscurè fusca , nigro transversim striata. Remiges majores saturatè fusco aut nigricante imbuuntur colore : minores verò alarum tectricibus concolores , iisdemque maculis purpureis notata. Tectrices caudæ superiores , rectricibus multò longiores , sunt saturatè fusca , punctulis dilutiùs fuscis aspersa : & quæque penna versùs apicem binis donatur maculis ovalibus , utrinque unâ , iisdem ac dorsi & alarum macula coloribus variegatis , circulo nigro similiter circumdatis ; altero circulo obscurè aurantio circum nigrum ambiente. Tectrices illæ intermediae longiores ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur. Oculorum irides luteæ. Rostrum fuscum , si tamen excipias

mandibulam superiorem à naribus ad apicem usque rubram. Pedes, unguisque sordide fusci. Mas in utroque pede binis donatur calcariibus, longiore versùs mediam pedis longitudinem sito, breviorè verò infra & versùs tres quartas partes posito.

Fœmina tertiâ magnitudinis parte *marî* cedit. Ab eo quoque coloribus paululùm discrepat. Caput, collum, pectus, venter, latera, crura & caudæ tectrices inferiores obscurè fuscæ. Pars dorsi superior, scapulares pennæ, alarumque tectrices etiam obscurè fuscæ; & quæque penna versùs apicem maculâ donatur rotundâ, obscurè cœruleâ; circulo sordide aurantio eam ambiente. Dorsi pars inferior & uropygium, pennis vestiuntur obscurè fuscis, punctulis dilutiùs fuscis aspersis. Remiges majores saturatè fuscæ aut nigricantes: minores alarum tectricibus concolores, iisdemque versùs apicem maculis cœruleis, circulo sordide aurantio pariter circumdatis, notatæ. Tectrices caudæ superiores uropygii pennis concolores;

nuant par degrés. L'iris des yeux est jaune. Le bec est brun, excepté le demi-bec supérieur, qui est rouge depuis les narines jusqu'à son bout. Les pieds & les ongles sont d'un brun terni. Le mâle a à chaque pied deux ergots, le plus long placé vers la moitié de la longueur du pied, & l'autre au-dessous vers les trois quarts.

La *femelle* est d'un tiers plus petite que le *mâle*. Elle en diffère aussi un peu par ses couleurs. La tête, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun obscur. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures des ailes sont de la même couleur, chaque plume ayant vers son bout une tache ronde, d'un bleu obscur, entourée d'un cercle d'un orangé terni. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un brun obscur, parsemé de petits points d'un brun plus clair. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun foncé ou noirâtres: les moyennes sont de la même couleur que les couvertures des ailes, & ont vers leur bout les mêmes taches bleues, entourées de même d'un cercle d'un orangé terni. Les couvertures du

dessus de la queue sont de la même couleur que celles du croupion, & ont chacune vers leur bout deux taches ovales, sçavoir une de chaque côté, d'un bleu sombre & obscur. L'iris des yeux est jaune. Le bec & les pieds sont noirâtres.

On les trouve à la Chine.

& quæque penna versùs apicem binis donatur maculis ovalibus, utrinque unâ, obscurè cœruleis. Oculorum irides flavæ. Rostrum, pedesque nigricantes.

Habitant in Sinenfi regione.

10. LE PAON DU TIBET.

Voyez le mâle Pl. XXVIII. A. Fig. 2.

Phasianus cinereus lineolis nigricantibus varius, superne maculis minutissimis albicantibus aspersus; maculis in dorso superiore splendide cœruleis, violaceo & aureo colore variantibus; tectricibus caudæ superioribus maculis quatuor concoloribus præditis . . . PAVO TIBETANUS.

Les Chinois l'appellent CHIN-TCHIEN-KHI.

Je n'ai jamais vu cette espèce de Paon. Je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait sur l'Oiseau vivant par M. Poivre.

Il est à peu près de la grosseur de la Peintade. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds un pouce six lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue huit

Hanc Pavonis speciem videre nondum mihi contigit. Ipsius descriptionem desumpsi ex icone ad vivum depicta à D. Poivre; & sic eam æri inculptam esse curavi.

Crassitie Meleagridem circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes unum pollicem & sex lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes & unum pollicem. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem li-

neus longum est; cauda octo pollices; pes tres pollices cum sex lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices: laterales paulò sunt breviores; & posticus unum pollicem longitudine non superat. Mas in parte utriusque pedis posteriore duobus donatur calcaribus, superiore brevior. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non extenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crura & caudæ tectrices inferiores cinereæ, lineolis nigricantibus variæ. Dorsum, uropygium, alarum tectrices & scapulares pennæ etiam cinereæ, lineolis nigricantibus variæ, maculisque minutissimis albicantibus aspersæ; cum insuper majusculis maculis rotundis, splendide cœruleis, violaceo & aureo colore variantibus, in parte dorsi superiore, scapularibus pennis & tectricibus alarum disseminatis. Remiges, tectricesque caudæ superiores pennæ eodem imbuuntur colore cinereo, lineolis nigricantibus vario: & quæque remix penna in medio versùs apicem duabus donatur maculis majusculis, rotundis, splendide cœruleis, viola-

pouces; son pied trois pouces six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a qu'un pouce de longueur. Le mâle a à la partie postérieure de chaque pied deux ergots, dont le supérieur est le plus petit. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris varié de petites lignes noirâtres. La partie inférieure du dos & le croupion sont de la même couleur, & parsemées de très-petites taches blanchâtres. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures des ailes sont aussi d'un gris varié de petites lignes noirâtres, parsemé de très-petites taches blanchâtres, & de grandes taches rondes, d'un bleu éclatant, & changeant en violet & en or. Les plumes de l'aile & les couvertures du dessus de la queue sont du même gris, varié de petites lignes noirâtres: & chaque plume de l'aile a vers son bout & dans son milieu deux grandes taches rondes, du même bleu que celles

des couvertures des ailes, & qui changent de même en violet & en or, placées l'une au-dessus de l'autre : & chaque couverture du dessus de la queue a quatre taches pareilles, sçavoir deux de chaque côté, placées aussi l'une au-dessus de l'autre. Celles de ces couvertures qui occupent le milieu, sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure, qui est la plus courte. L'iris des yeux est jaune. Le bec est cendré. Les pieds sont gris ; & les ongles noirâtres. On le trouve dans le *Royaume du Tibet*.

ceo quoque & aureo colore variantibus, unâ supra alteram positâ : & unaquæque caudæ tectrix quatuor prædita est maculis concoloribus, binis scilicet utrinque, unâ etiam supra alteram positâ. Tectrices illæ intermediae longiores ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad extimam usque breviorē. Oculorum irides flavæ. Rostrum cinereum. Pedes grisei : unguesque nigricantes. Habitat in *Tibeti Regno*.

II. LE HOCCO DU BRÉSIL.

Phasianus niger ; ventre fusco ; pennis verticis apice sursum reflexis & crispis CRAX BRASILIENSIS.

Phasianus niger cristatus, rostro cinnabarino. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.*

^{140.}

Crax niger, cristâ totâ atrâ, rostro cinnabarino. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XVI. sp. 3.*

Crax niger, corollâ atrâ, rostro rubro. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 66. sp. 3.*

Alector Mitu, vel Mutu. *Klein. Avi. pag. III. N°. 3.*

Mutu. *Pison. Hist. nat. pag. 80, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Mitu vel Mutu Brasiliensibus dicta. *Marcgr. Hist. Br. pag. 194, in qua icon minùs accurata.*

Jonst. Avi. pag. 133. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.

Mitu vel Mutu Brasiliensium Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 114. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 52. N°. 4.

Les Guianois l'appellent HOCCO DE PARA. *Barr.*

Crassitie Gallum domesticum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & septem pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & tres pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sesquipollicem longum; collum sex pollices; corpus à collo ad uropygium usque decem pollices; cauda unum pedem; pes quatuor pollices; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue tres circiter pollices; laterales paulò sunt breviores; posticus verò omnium brevissimus. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Per universum corpus nigris vestitur pennis, exceptis ventre & tectricibus caudæ inferioribus fuscis. Tenuiores sunt pennæ ad collum, caput, & in pectore, & holosericum villosum nigrum pulchritudine æquant. In summo capite habet pennas negras, complicatas in planissimam quasi mitellam, quas irascens, aut etiam aliàs, in cristam erigit. Caudam semper in latum movet, eamque explicat. Oculos habet

Il est plus gros qu'un *Cog*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds trois pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce & demi de long; son col six pouces; son corps depuis l'origine du col jusqu'au croupion dix pouces; sa queue douze pouces; son pied quatre pouces; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, environ trois pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noires, si l'on en excepte le ventre & les couvertures du dessous de la queue, qui sont brunes. Celles qui couvrent la tête, le col & la poitrine sont plus petites que les autres, & d'un aussi beau noir que celui du velours. Les plumes du sommet de la tête sont noires & frisées, & forment une espece de coëffure: & lorsque l'Oiseau se met en colere, ou même en d'autres momens, il les redresse en ma-

niere de hupe. Il remue continuellement la queue en l'étendant de côté & d'autre. Ses yeux sont grands & noirs. Il a, comme les Poules, derrière les oreilles une tache d'une peau blanche. Son bec est d'une belle couleur de chair, excepté son bout, qui est blanchâtre. Il se prive aisément. On le trouve

magnos, nigros; & ponè aures maculam cutaceam albescentem, ut *Gallina*. Rostrum coloris est egregii incarnati; versùs apicem tamen albicat. Mansuescit facile. Habitat in *Brasilia* & *Guiana*,

au *Brésil*, & dans toute la *Guiane*.

** 12. LE HOCCO DE LA GUIANE.

Voyez Pl. XXIX.

Phasianus niger; imo ventre albo; pennis verticis apice sursum reflexis & crispis *CRAX GUIANENSIS*.

Phasianus niger, atrâ cristâ eleganter complicatâ. *Barr. Hist. Fr. Eq.* pag. 140.

Crax niger, punctulatus, cristâ totâ atrâ eleganter complicatâ, rostro croceo. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XVI. sp. 2.*

Crax niger punctulatus, corollâ atrâ, rostro fulvo. *Linn. Systh. nat.* ed. 6. *Gen. 66. sp. 2.*

Crax niger, iride subfusco croceo, ventre albido. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 470.*

Crax. Moehr. Avi. Gen. 46.

Gallus Americanus. Frisch. hujus icon accurata Tab. 121.

Gallus Indicus. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 302. N°. XXV. hujus icon satis accurata Tab. 260.

Alector Curassaus. Klein. Avi. pag. 111. N°. 3.

Mutú-poranga. Pison. Hist. nat. pag. 80, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Mituporanga Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 195, in qua icon minùs accurata.

Jonst. Avi. pag. 133. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.

Mituporanga Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 115. capitis icon minimè accurata Tab. XXVIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 52. N°. 6.

Mitu, vel Mutu alia species, Mituporanga Brasiliensibus Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 183. N°. 19.

Avis montana. Euf. Nieremb. pag. 231.

Jonst. Avi. pag. 122.

Tepetototl. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 35. cap. CI.

Moyton, seu Mouton. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 615.

Jonst. Avi. pag. 125.

Cocq-Indien. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. pag. 223; avec une figure assez exacte Pl. 33.

Les Allemands l'appellent POES, ou AMERICANISCHE HAHN. Frisch.

Les Anglois, CURAÇOA-BIRD. Browne.

Les Guianois, HOCO DE CAYENNE. Barr.

Les Brasiiliens, MITUPORANGA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Mexiquains, TEPETOTOTL; TECUOCHOLLI. Fern. Nieremb. Jonst.

On l'appelle à la Jamaïque QUIRIZAO. Sloane. Raj. CURASSO. Sloane.

En Afrique, ANO. Hist. de l'Acad.

Gallo-Pavonem semestrem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duorum est pedum & decem pollicum, & ad extremos ungues duorum pedum & quinque pollicum. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & novem lineas longitudine æquat; cauda duodecim pollices; pes quatuor pollices cum sex lineis; & trium digitorum anteriorum medius cum ungues tres pollices: laterales paulò sunt breviores; & posticus unius pollicis & octo linearum longitudinem non excedit. Alarum extensarum extremitates duorum pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. In

Il est environ de la grosseur d'un *Dindon* de six mois. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de longueur; sa queue un pied; son pied quatre pouces six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a qu'un pouce huit lignes de long. Il a deux pieds six pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un très-beau noir, excepté le bas ventre, les ouvertures du dessous de la queue

& la partie postérieure des jambes, qui sont blanches. Quelques-uns ont la poitrine, le ventre, les jambes & quelques-unes des couvertures du dessus des ailes variées de petites bandes transversales, blanches. Les plumes du dessus de la tête & celles du dessus du col jusque vers la moitié de sa longueur sont longues & étroites, & leur bout est recourbé vers le haut, ce qui les fait paroître frisées. Lorsque l'Oiseau les redresse, elles forment une belle hupe. Ses yeux sont noirs. Le bec est à son bout d'un cendré clair dans quelques-uns, & noir dans d'autres; & depuis la partie antérieure des narines jusqu'à sa base, il est couvert d'une peau rougeâtre, qui s'étend même de chaque côté jusqu'au-delà des yeux. Les pieds & les ongles sont d'un cendré-bleuâtre. On le trouve dans la *Guiane*, au *Brésil* & à la *Jamaïque*. J'en ai vu un au cabinet du Roi, & l'autre dans celui de Madame de Bandeville.

universo corpore pennis vestitur nigris, splendentibus, exceptis imo ventre, testricibus caudæ inferioribus & parte crurum posteriore albis. In quibusdam pectus, venter, crura & alarum quædam testrices superiores exiguis tenuis transversis, albis variegantur. Pennæ verticem capitis & collum superius mediam versùs longitudinem usque regentes longæ sunt & strictiores, ipsarum apicibus sursum reflexis, unde crispæ apparent. Pennas istas cristæ elegantis in modum erigit Avis. Oculi sunt nigri. Rostrum apice quibusdam dilutè cinereum, aliis nigrum; & à parte narium anteriore ab basin usque cute rubescente, utrinque ultra oculos extensâ, cooperatum. Pedes, unguesque ex cinereo cœrulescunt. Habitat in *Guiana*, *Brasilia* & *Jamaicensi Insula*. Unus ex museo Regio, & alter ex museo D. de Bandeville.

13. LE HOCCO DE CURASSOW.

Phasianus niger, imo ventre albo (*Mas*); obscurè fuscus, supremo ventre albo (*Fœmina*); cristâ ex albo & nigro varia; tuberculo ad basin rostri rotundo, luteo.

CRAX CURASSOUS.

Phasianus niger, cristâ ex albo & nigro variâ eleganter convolutâ. Barr. *Hist. Fr. Eq.* pag. 132.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre II.* 301

Crax niger, cristâ ex albo & nigro variâ, eleganter convolutâ. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XVI. sp. 1.*

Crax niger, corollâ albo nigroque variâ. *Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 66. sp. 1.*

Gallus alius Indicus. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 332, in qua hujus icon minus accurata.

Willugh. Ornith. pag. 110.

Gallus Indicus alter. Jonst. Avi. pag. 58.

Gallus Indicus alius Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 115.

Raj. Syn. Avi. pag. 52. N°. 7.

Klein. Avi. pag. 111. N°. 3.

Gallina Indica. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 333, in qua hujus icon minimè accurata. Willugh. Ornith. pag. 110.

Gallina Indica prima. Jonst. Avi. pag. 58. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 30.

Mutù. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 557.

Jonst. Avi. pag. 125.

Phaisan de Carasow. Alb. Tom. II. pag. 22; avec des figures peu exactes, du mâle Pl. 31, & de la femelle Pl. 32.

Les Guianois l'appellent HOCO DES AMAZONES. Barr.

Les Indiens de Curassow, TECUECHOLI MOUNTAIN-BIRD. Alb.

Les Anglois appellent le mâle CARASSOW-COCK; & la femelle CARASSOW-HEN. Alb.

Crassitie Gallo-Pavonem ferè adæquat. Pennæ nigræ universum corpus vestiunt, si tamen excipias imum ventrem & rectrices caudæ inferiores albas. Tænia transversa concolor crus utrumque cingit. Pennæ caput & collum vestientes holoserici villosi nigri splendorem æmulantur. Vertex capitis pennis præditus est cæteris longioribus, albo terminatis, quarum apices sursum reflectuntur, unde crispæ apparent. Eas quandoque cristæ elegantis in modum erigit

Il est presque aussi grand qu'un *Dindon*. Tout son corps est couvert de plumes noires, excepté le bas ventre & les couvertures du dessous de la queue, qui sont blanches. Il y a sur chaque jambe une bande transversale, de la même couleur. Le noir des plumes de la tête & du col est foncé comme celui du velours. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres, & terminées de blanc. Leur bout est recourbé vers le haut, ce qui les fait paroître frisées. Lorsque l'animal les redresse, elles

Rrij

forment une belle hupe. Le tour des yeux est blanc. Les yeux sont noirs, & l'iris en est rouge. Il a à la b  se du demi-bec sup  rieur un tubercule rond & dur, de la grosseur d'une Cerise, & d'un beau jaune. Son bec est jaune    son origine & le bout en est cendr  . Les pieds sont d'un ferrugineux p  le.

La *Femelle* diff  re du *m  le* par sa couleur. La t  te & la partie sup  rieure du col sont noires. La hupe, qui est de la m  me couleur, est travers  e par une large bande blanche. Quelques plumes du col sont aussi termin  es de blanc. La partie inf  rieure du col, la poitrine, le dos & les a  les sont d'un brun sombre. Le haut du ventre est couvert de plumes blanches, dont quelques-unes sont termin  es de noir. Le bas ventre, les couvertures du dessous de la queue & les jambes sont d'un brun p  le & jaun  tre. La queue est noire, & ray  e de quatre larges bandes transversales, blanches. Le tubercule, qu'elle a au-dessus du bec, est jaune. Le bec & les pieds sont cendr  s.

On les trouve dans la *Guiane*; & sur-tout    *Cura  ssow*.

Avis. Oculorum ambitus albus. Oculi nigri, eorumque irides rubr  . Ad basin mandibul   superioris tuberculum extat rotundum, durum, luteum, magnitudine Cerasi. Rostrum in exortu luteum, apice cinereum. Pedes pallid   ferruginei.

F  mina    mare oolore discrepat. Caput & collum superius nigricant. Crista concolor lat   t  ni   transvers  , alb   donatur. Qu  dam colli penn   apicibus albis pr  dit   sunt. Pars colli inferior, pectus, dorsum & al   obscur   fusc  . Ventris partem supremam vestiunt penn   alb  , quibusdam apice nigris. Imus venter, tectrices caud   inferiores & crura ex pallid   fusco flavescunt. Cauda nigra, quatuor t  niis latis, transversis, albis striata. Tuberculum ad basin mandibul   superioris luteum. Rostrum, pedesque cinerei.

Habitant in *Guiana*, & pr  sertim in *Cura  ssoa*.

14. LE HOCO DU MEXIQUE.

Phasianus niger ad subc  eruleum vergens (Mas); fuscus (f  -

mina) ; tuberculo ad basin rostri pyriformi, cœruleo

CRAX MEXICANUS.

Gallina alia Indica. *Aldrov. Avi. Tom. II. icones non satis accurata* ;
maris pag. 334, & femina pag. 335.

Willugh. Ornith. pag. 110.

Gallina Indica altera. *Jonst. Avi. pag. 58.*

Gallina Indica tertia, Numidica dicta. *Jonst. Avi. pag. 58. femina*
icon ab Aldrovando mutuata Tab. 30, sub titulo, Gallus Indicus.

Pauxi vocata Avis. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 56. cap. CCXXII.*

Pauxi. *Euf. Nieremb. pag. 233.*

Jonst. Avi. pag. 123.

Willugh. Ornith. pag. 305.

Pauxi Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag. 114.*

Raj. Syn. Avi. pag. 52. N°. 5.

Klein. Avi. pag. 111. N°. 3.

Les Mexiquains l'appellent PAUXI. *Fern.*

Gallum Gallinaceum magnitudine paululum antecellit. Per universum corpus vestitur pennis nigris, splendentibus & ad subcœruleum vergentibus. Podex & tectrices caudæ inferiores candicant. Tuberculum ad basin rostri in fronte gerit magnum, durum, pyriforme, coloris cœrulei, qualis esse solet lapis *Turquoise* vocatus. Rostrum rubicundum. Pedes ejusdem ferè coloris, sed pallidioris multò, & in postica parte ad cœruleum vergentis. Ungues atrii.

Fœmina à *mare* discrepat colore. Ubi enim mas niger ibi fœmina fusca ; in cæteris mari similis. Habitant in *Mexico*.

Il est un peu plus grand qu'un *Coq*. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir brillant & tirant sur le bleuâtre, excepté l'anus & les couvertures du dessous de la queue, qui sont blanches. Il porte sur le front à la bête du demi-bec supérieur un tubercule gros & dur, de la figure d'une poire, & d'un bleu de *Turquoise*. Le bec est rouge. Les pieds sont presque de la même couleur, mais beaucoup plus pâle, & tirant sur le bleu à la partie postérieure du pied. Les ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle par sa couleur. Elle est brune partout où le mâle est noir ; quant au reste elle ressemble au mâle. On les trouve au *Mexique*.

15. LE HOCCO BRUN DU MEXIQUE.

Phasianus fulvus ad fuscum inclinans ; pectore candido-luteo ;
 alis & caudâ candido & pallenti maculatis ; cristâ in capite
 pennis candido-pallidis , subtus nigris , conflata
 CRAX FUSCUS MEXICANUS.

Hoatzin , seu Avis similem nomini edens vocem. *Hernand. Hist. Mex.*
 pag. 320.

Hoactzin. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 25. cap. L.*

Euf. Nieremb. pag. 220.

Jonst. Avi. pag. 119.

Willugh. Ornith. pag. 300.

Raj. Syn. Avi. pag. 163.

Charlet. Exer. pag. 117. N°. X.

Charlet. Onomazt. pag. 113. N°. X.

Il est presque aussi grand
 qu'un *Dindon* femelle. Il porte
 sur la tête une hupe composée
 de plumes d'un blanc tirant sur
 le jaunâtre en-dessus, & noires
 en-dessous. Les côtés de la tête,
 la partie supérieure du col
 & le dos sont d'un fauve tirant
 sur le brun. La poitrine est d'un
 blanc tirant sur le jaune. Les
 ailes & la queue sont variées
 de blanc & de jaunâtre, & cela
 par taches de la largeur d'un
 pouce. Les pieds sont bruns ;
 & les ongles noirs. Il se nour-
 rit de serpens. On le trouve
 au *Mexique*, & sur-tout dans
 ses plus chaudes contrées. Il
 perche sur les arbres qui se trou-
 vent le long des rivières.

Magnitudine *Gallo-Pavo-*
nem *fœminam* ferè adæquat.
 Cristam in capite gestat con-
 cinnatam è pennis ex can-
 dido in pallidum colorem
 vergentibus, subtus verò ni-
 gris. Capitis latera, collum
 superius & dorsum fulva in
 fuscum colorem inclinantia.
 Pectus candidum ad luteum
 inclinans. Alæ, caudaque
 maculatæ per intervalla pol-
 licis colore candido & pal-
 lenti. Pedes fusci sunt ; un-
 gues nigri. Vescitur angui-
 bus. Habitat in *Mexico*, il-
 liusque calidas regiones fre-
 quentat. Arboribus juxta flu-
 mina consitis insidet.

16. LE HOCCO DU PÉROU.

Phasianus fulvus; collo supremo & capite saturatè cinereis;
 cristâ in capite pennis albis, apice nigris, conflatâ . . .
 CRAX PERUVIANUS.

Albini Gallina. *Klein. Avi. pag. 112. N°. 4.*

Poule rouge du Pérou. *Alb. Tom. III. pag. 16; avec une figure mauvaise
 & mal colorée Pl. 40.*

Les Anglois l'appellent RED PERUVIAN HEN. Alb.

An Coxolitli, quam Phasianum patrium vocant? *Fern. Hist. Nov. Hisp.
 pag. 23. cap. XL.*

An Coxolitli Hernandezii? *Raj. Syn. Avi. pag. 57.*

Les Mexiquains l'appellent COXOLITLI. Fern.

Magnitudine Gallo-Pavonem ferè adæquat. Cristam in capite gestat pennis albis, apice nigris, conflatam; eamque erigere aut retrorsum inclinare potest. Caput & collum supremum sunt saturatè cinerea. In imo collo & reliquo corpore pennis vestitur fulvis. Oculi sunt nigri; eorumque irides rubræ. Rostrum saturatè cinereum. Pedes nigri. Habitat in Peruvia.

Il est presque aussi grand qu'un *Dindon*. La tête & le haut du col sont d'un cendré foncé; & de plus la tête est ornée d'une hupe de plumes blanches, terminées de noir. L'Oiseau peut élever ou baisser cette hupe à volonté. Le bas du col, ainsi que tout le reste du corps, est couvert de plumes fauves. Les yeux sont noirs; & leur iris est rouge. Le bec est d'un cendré foncé. Les pieds sont noirs. On le trouve au Pérou.







Designé et Gravé par Martinet.

1. Caille des Philippines.

2. Caille hupée du Mexique.


3. Faisan Panaché.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Faisan couronné des Indes.

2. Faisan de la Guiane



Designé et Gravé par Martinet

Paon.



Desiné et Gravé par Martinet.

1. Perdrix de la Chine . 2 . Paon du Tibet.



Designé et Gravé par Mortinet

Hoëco de la Guiane



ORDO III.

A V E S

ORDRE III.

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus usque ad exortum, aut circiter, discretis: cruribus ad calcaneum usque plumosis: & rostro brevi, adunco donatæ.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: & le bec court & crochu.

OMNES hujus Ordinis Aves rapaces sunt & carnivoræ. Caput habent grande; linguam latam, crassam, carneam, humanæ similem; crura valida & musculosa, ad prædam feriendam & dejiciendam; rostrum & ungues aduncos, validos, acutos, ad eam retinendam & dilaniandam comparatos. Insigni visûs acumine polent, ad prædam nimirum dispiciendam. Inediam diutissime tolerant; quod pro victûs ratione iis necessarium est, cum præda, quoties

TOUS les Oiseaux de cet Ordre sont carnassiers, & vivent du gibier qu'ils attrapent. Ils ont la tête grosse; la langue large, épaisse, charnue, & assez semblable à celle de l'homme; les jambes fortes & musculenses, & propres à frapper & renverser leur proie; le bec & les ongles forts, crochus & aigus, propres à la saisir & la déchirer. Ils ont la vue très-perçante, afin de découvrir plus aisément leur proie. Ils sont en état de soutenir une très-longue diète: ce qui, vu leur façon de vivre, leur de-

vient absolument nécessaire ; car le gibier ne se présente pas toujours toutes les fois qu'ils ont appetit.

Il est très-difficile de connoître & de distinguer entr'elles les différentes especes des Oiseaux de cet Ordre : car leurs couleurs varient tant , soit à raison du sexe , soit à raison de leur âge , que non-seulement la même espece , mais même le même individu , observé en différens temps , paroît , même à quelqu'un qui observe scrupuleusement , être plusieurs especes très-différentes entr'elles. Aussi n'osé-je me promettre de ne m'être pas souvent trompé. Il faudroit , pour que cela n'arrivât pas , pouvoir observer ces Oiseaux en différens temps & dans tout le cours de leur vie : ce qui est le plus souvent impraticable.

Parmi les Oiseaux de cet Ordre les uns ont la bête du bec couverte d'une peau nue : & les autres l'ont couverte de plumes tournées en-devant. Nous les diviserons en deux sections : dans la première seront ceux dont la bête du bec est couverte d'une peau nue (*voyez Pl. V. Fig. 7*) , comme l'*Epervier* , l'*Aigle* , le *Vautour* : & dans la seconde ceux dont la bête du bec est couverte de plumes

esuriunt , non semper sit parata.

Perquam difficile dignoscuntur & à se invicem distinguuntur variæ Avium hujus Ordinis species : tanto pere enim coloribus mutant , sive ratione sexûs , sive ratione ætatis , ut non solum una eademque species , sed & unum idemque individuum , variis temporibus observatum , etiam attentè intuiti , plures species à se invicem discrepantes appareat. Non mirum ergo si in errorem sæpius inciderim ; ad quem vitandum necessarium foret Aves istas variis temporibus & per totum vitæ cursum observare ; quod sæpius impossibile fit.

Hujus Ordinis Avium aliæ basin habent rostri cute nudâ tectam : aliæ basin rostri plumis antrorsum incumben tibus coopertam. In duas igitur sectiones dividuntur : prima continet eas quarum basis rostri cute nudâ tegitur (*vide Tab. V. Fig. 7*) , ut *Accipiter* , *Aquila* , *Vultur* : & secunda illas quarum basis rostri plumis antrorsum incumbentibus cooperta est

(*vide Tab. V. Fig. 8*), ut *tournées en-devant* (*voyez Pl. V. Fig. 8*), comme le *Hibou*, le *Chat-huant*.

SECTIO I.

SECTION I.

Eæ quarum basis rostri cute nudâ tegitur.

Ceux dont la b  se du bec est couverte d'une peau nue.

IN illa sectione tria continentur genera Avium. Aliæ rostro gaudent ab exortu adunco, ut *Accipiter*: aliæ rostro primum recto, dein adunco; inter quas aliæ capite sunt plumoso, ut *Aquila*: aliæ capite vel nudo, vel lanugine tantum prædito, ut *Vultur*.

CETTE section contient trois genres d'Oiseaux. Dans les uns la courbure du bec commence d  s son origine, comme l'*Epervier*: & dans les autres elle commence    quelque distance de son origine. Parmi ces derniers les uns ont la t  te couverte de plumes, comme l'*Aigle*: les autres ont la t  te ou nue, ou seulement couverte de duvet, comme le *Vautour*.

Omnes hujus sectionis Aves sunt *Diurnæ*. Ipsarum digitus trium anticorum extimus medio rudimento membranæ, ad primum usque articulum extenso, connectitur; & digiti istius extimi unguis minimus est.

Tous les Oiseaux de cette section sont *Diurnes*. Ils ont tous l'ext  rieur des trois doigts ant  rieurs joint avec celui du milieu par un petit commencement de membrane, qui s'  tend jusqu'   la premiere articulation; & l'ongle de ce doigt ext  rieur est le plus court de tous.

Supra cutem nudam sive membranam, basin rostri cooperientem, nares collocantur.

Les narines sont plac  es dans la peau nue ou membrane, qui couvre la b  se du bec.

Le genre de l'Epervier.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de mem-
branes; trois devant, un der-
rière; tous séparés environ
jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plu-
mes jusqu'au talon:

Le bec court & crochu, dont
la bête est couverte d'une
peau nue; & dont la cour-
bure commence dès son ori-
gine.

Les *femelles* des Oiseaux de
ce genre sont plus grandes que
leurs *mâles*. Elles sont aussi
mieux faites, plus fortes &
plus courageuses. Pour cette
raison on appelle les mâles
Tiercelets; parce qu'ils sont
d'environ un tiers plus petits
que leurs femelles.

Genus Accipitrinum.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis
destituti; tres scilicet an-
tici, posticus unus; om-
nes circiter usque ad exor-
tum discreti:

Crura ad calcaneum usque
plumosa:

Rostrum breve, ab exortu
aduncum; ad basin cute
nudâ tectum.

Hujus generis Avium *fæ-
minæ* maribus corporis mole
sunt majores, formâ specio-
siores, viribus fortiores, in-
dole generosiores; qua de
causa mares *Tercellini*, quasi
tertiarii, dicti sunt, quia
fœminis tertiâ circiter ma-
gnitudinis parte sunt infe-
riores.

** I. L'EPERVIER.

*Accipiter superne fuscus, oris pennarum rufescentibus, in-
fernè albus (Mas), albo-rufescens (Fœmina), taniis tran-
sversis & lanceolatis fuscis, rufo admixto, varius; rectri-
cibus griseo-fuscis, taniis fuscis transversim striatis . . .*
ACCIPITER.

Accipiter minor. Gesn. Avi. pag. 52, in qua icon minimè accurata.
*Accipiter minor; Nisus Recentiorum. Gesn. icon. Avi. pag. 7, in qua
eadem icon.*

Accipiter fringillarius. *Gesn. Avi. pag. 51.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 189.

Jonst. Avi. pag. 10. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VIII. & insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. XI, sub titulo, Accipiter minor.

Charlet. Exer. pag. 72. N°. 3.

Charlet. Onomazt. pag. 64. N°. 3.

Accipiter fringillarius, seu *Recentiorum Nifus*. *Willugh. Ornith. pag. 51. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. V.*

Accipiter fringillarius, seu *Nifus*. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.*

Accipiter fringillarius, seu *Accipiter minor*; *Nifus Recentiorum*. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 268.*

Accipiter fringillarius Alberti, *Gazæ*; *Accipiter minor Gesneri*; *Nifus Junii & aliorum Recentiorum*. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 353.*

Accipiter Merularius. *Charlet. Exer. pag. 72. N°. 8.*

Charlet. Onomazt. pag. 65. N°. 8.

Fringillarius Accipiter. *Raj. Syn. Avi. pag. 18. N°. A. 2.*

Fringillarius Accipiter, vulgò *Nifus dictus*. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 344. icones non satis accurate maris & fœminæ pag. 346 & 347.*

Sparverius, vel *Nifus Recentiorum*. *Gesn. Avi. pag. 51.*

Nifus sagittatus, sive *Accipiter fringillarius*. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 91. (fœmina).*

Nifus sagittatus alter. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 92. (fœmina).*

Nifus striatus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 90. (Mas).*

Moschetus. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 15.*

Falco cerâ viridi; *pedibus flavis*; *pectore albo undulis transversis fuscis*; *caudâ fuscâ fasciis nigricantibus*. *Faun. Suec. Linn. N°. 68.*

Falco fringillarius. *Klein. Avi. pag. 53. N°. 23.*

Espervier. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 121; avec une mauvaise figure pag. 122.*

Espervier, *Esparvier*. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 19 b, dans laquelle est la même figure.*

Epervier. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 146.*

Alb. Tom. I. pag. 6; avec une figure mal coloriée de la femelle Pl. 5.

Alb. Tom. III. pag. 2; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 4.

Les François appellent le mâle EMOUCHET ou MOUCHET. *Bel.*

Les Egyptiens, le mâle, BAYDACH. *Gesn.*

Les Grecs l'appellent Σπιζις; Σπιζιας ιέρπας. *Bel. Aldrov. Schwenck. Jonst. Σπιζις. Schwenck.*

Les Grecs modernes, ξωτρί. Gesn. Aldrov. Jonst.

Les Espagnols, le mâle, FRANCELLO. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens, SPARVIERO. *Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. SPARAVIERO. Bel.*

Gesn. Aldrov. SPARAVERO ; SPARAVIER. Gesn. Aldrov. LOYETTA. Gesn.

Les Allemands , SPERBER. Gesn. Aldrov. Schwenck. Frisch. Rzac. SPERWER. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. Ils appellent le mâle SPRINTZ ; SPRINTZEL ; SPRINTZLE SPRINTZLING. Gesn. Aldrov. Schwenck.

Les Frisons , WICKEL. Gesn.

Les Flamands , le mâle , MUSCHET. Gesn. Aldrov.

Les Polonois , SOKOL. Gesn. KROGULEC. Rzac.

Les Suédois , SPARFHOK ; SPARFHOEK. Linn.

Les Anglois , SPARROW-HAWK. Willugh. Charlet. Sibbald. Raj. Alb. Browne. SPARHAUK. Gesn. MUSCET. Charlet.

Il est à peu près de la grosseur d'un Pigeon. La longueur de la femelle depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue six pouces six lignes ; son pied deux pouces deux lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a deux pieds deux pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue sont brunes, & les bords de chaque plume sont roussâ-

Crassitie ad *Columbam* accedit. *Fœminæ* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices explet, & ad extremos unguis duodecim pollices. Rostrum ab unco ad oris angulos decem lineas longum est ; cauda sex pollices & totidem lineas ; pes duos pollices cum duabus lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus adhuc brevior. Majorum remigum extremitates, alis expansis, duorum pedum & totidem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, alarum tectrices, scapulares penna, quæque caudam superne tegunt fusca, oris

uniuscujusque pennæ rufescentibus. Maculæ quædam albæ occipitium variegant. Guttur albicat, tæniisque longitudinalibus, fuscis variegatur. Colli pars inferior, pectus, venter, latera, crura, alarumque tectrices inferiores sunt ex albo rufescentes, & tæniis striatæ transversis, fuscis, quibus aliquid rufi admiscetur: quæque autem tænia mucrone in medio donatur secundum pennæ scapum descendente. Maculæ verò, quibus pennæ pectus, partem colli inferiorem & alas subtus tegentes, notantur, sunt quasi lanceolatæ. Tectrices caudæ inferiores fordidè albæ, maculisque quibusdam fuscis, sed rarissimis, obsitæ. Remiges fusæ, in latere interiore tantum tæniis transversis, fusco saturatiore tinctis, striatæ; oris etiam interioribus rufescentibus. Remix extrema sive prima brevissima: quarta verò longissima. Sex primarum remigum pinnulæ exteriores sunt serræ instar dentatæ: à tertia verò remige ad sextam inclusive pinnulæ exteriores subito cæteris breviores fiunt, eo in loco, in quo minores remiges desinunt. Rectrices sunt griseo-

tres. L'occiput est varié de quelques taches blanches. La gorge est blanchâtre, & variée de taches longitudinales, brunes. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de l'aîle sont d'un blanc-roussâtre, rayé de bandes transversales, brunes, mêlées de roux, & qui ont dans leur milieu chacune une petite pointe, qui descend le long de la tige de la plume. Les taches qui sont au bout des plumes de la poitrine & de la partie inférieure du col, & au bout des couvertures du dessous des aîles, ont à peu près la figure d'un fer de lance. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale, & variées de quelques taches brunes, mais très-rares. Les plumes de l'aîle sont brunes, & rayées du côté intérieur seulement de bandes transversales, d'un brun plus foncé; & leur bord intérieur est roussâtre. La plume la plus extérieure de l'aîle ou la première est très-courte: la quatrième est la plus longue. Les barbes extérieures des six premières forment une dentelure pareille à celle d'une scie: & depuis la troisième jusqu'à la sixième inclusivement les barbes extérieures deviennent tout à coup

beaucoup plus courtes que les autres, & cela à l'endroit où finissent les moyennes plumes. Les plumes de la queue sont d'un gris-brun, rayé de larges bandes transversales, brunes. L'iris des yeux est jaune. La peau nue, ou membrane, qui couvre la bête du bec, est d'un jaune-verd. Le bec est bleuâtre, & son crochet est noir. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

Le mâle est beaucoup moins gros que la femelle. Il en diffère encore un peu par sa couleur. Il a beaucoup moins de roux: & le blanc du dessous du corps n'est point mêlé de roussâtre. Le bord intérieur des plumes de l'aile est blanchâtre. Le reste est comme dans la femelle; cependant le brun du dos est moins foncé, & tire un peu sur le cendré. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Une variété de cette espèce est

fusca, latis tæniis fuscis transversim striata. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, ex flavo viridescit. Rostrum cœrulescit, unco nigricante. Pedes sunt flavi; ungues nigri.

Mas crassitie femina multo cedit. Ab illa quoque paululum colore discrepat. Multo minus rufi admixtum habet: neque albo partium corporis inferiorum rufescens admiscetur. Remigum margines interiores albicant. In reliquis femina similis; attamen in dorso fusco dilutius tingitur, & ad cinereum paululum inclinatur. Ex museo Realmuriano.

Hujus speciei varietas est

A. L'EPERVIER TACHETÉ.

Accipiter maculatus.

Falco manibus aureis, rostro nigricante. *Klein. Avi. pag. 53. N°. 25.*

Il est à peu près de la grandeur du précédent. Il a deux pieds deux pouces de vol. Le dos est couleur de terre, variée de taches blanches, mais très-rare. Tout le dessous du corps

Præcedentem magnitudine circiter adæquat. Alis expansis, extremitates remigum majorum duorum pedum & totidem pollicum intervallo distant. Dorsum terreum

reum est, albis maculis, sed raris, varium. Totum corpus inferius similibus coloribus densè squammatum. Ala infernè, caudaque subtus zonis albis latis, & terreis angustis variæ; cauda verò superne colore terreo imbuta, zonis quatuor nigris varia. Oculorum irides aureæ. Membrana basin rostri cooperiens flava. Pedes fati longi, sicut & digiti, aurei.

est varié des mêmes couleurs, rangées comme par écailles, très-proches les unes des autres. Le dessous des ailes & celui de la queue sont variés de larges bandes transversales, blanches, & de bandes étroites couleur, de terre; le dessus de la queue est de cette dernière couleur, variée de quatre bandes transversales, noires. L'iris des yeux est couleur d'or. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est jaune. Les pieds, qui sont assez longs, sont couleur d'or, ainsi que les doigts.

** 2. LE PETIT ÉPERVIER.

Voyez Pl. XXX. Fig. 1.

Accipiter superne fuscus rufo variegatus, infernè albus fusco-rufescente transversim striatus; rectricibus fuscis fusco saturatiore transversim striatis ACCIPITER MINOR.

Æsaloni paululum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos septem lineas longum; cauda quinque pollices & sex lineas; pes unum pollicem & decem lineas; & trium digitorum antico-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que l'*Emerillon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de onze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue cinq pouces six lignes; son pied un pouce dix lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle,

un pouce cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion & le dessus des aîles sont couverts de plumes brunes , terminées de roux. Il y a aussi un peu de blanc derrière la tête. La gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes blanches , ayant chacune vers leur bout une tache d'un brun-roussâtre. Les plumes qui couvrent la poitrine , le ventre , les côtés & les jambes , sont de même blanches , & rayées transversalement de brun-roussâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches : celles du dessous de l'aîle sont d'un blanc sale & jaunâtre , & marquées de taches brunes. Les plumes de l'aîle sont brunes , & leur côté intérieur est rayé transversalement de bandes d'un brun plus foncé. Celles de la queue sont aussi brunes , & rayées de même transversalement de six bandes d'un brun plus foncé : ces bandes sont sur les deux côtés de chaque plume , excepté le côté extérieur de la plus extérieure de chaque côté.

rum medius cum ungue septemdecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ultra mediam caudæ longitudinem paululùm protenduntur. Partes capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , alæque superne tegunt pennæ fuscæ , rufo terminatæ. Capitis pars posterior sive occiput paucò albo notatur. Guttur & collum inferius pennis obducuntur albis , maculâ fusco-rufescente versus apicem donatis. Quæ pectus , ventrem , latera & crura vestiunt , similiter albæ , tæniis fusco-rufescentibus transversim striatæ. Caudæ rectrices inferiores alben : quæ alas subtus cooperiunt , ex fordidè albo flavescunt , maculisque fuscis notantur. Remiges sunt fuscæ , & in latere interiore fusco saturatiore transversim striatæ. Rectrices quoque fuscæ , tæniis sex saturatiùs fuscis similiter transversim striatæ : quæ teniæ uniuscujusque rectricis utrumque latus variegant , excepto tamen rectricis utrinque extimæ latere exteriori. Rostrum , unguis nigris ; pedes sunt lutei. A *Melita Insula* à D.

*Godeheu in museum Realmu-
rianum missus est.*

Le bec & les ongles sont noi-
râtres ; & les pieds sont jaunes.
Il a été envoyé de l'Isle de Malte
à M. de Reaumur par M. Go-
deheu.

Alius extat in museo D.
Aubry, quem eandem spe-
ciem existimo. A suprà des-
cripto tamen differt in eo
quod rectrices taniis qua-
tuor tantum saturatè fuscis
sint variegatæ, & maculas
habeat in pectore quasi lan-
ceolatas.

M. l'Abbé Aubry en conserve
un dans son cabinet, qui me
paroît être de cette espece. Il
en diffère cependant en ce qu'il
n'a que quatre bandes d'un brun
foncé sur les plumes de la
queue, & que les taches de sa
poitrine ont à peu près la figure
d'un fer de lance.

** 3. L'AUTOUR.

Accipiter superne fuscus, infernè albus, taniis transversis lan-
ceolatis fuscis varius; rectricibus fuscis, fusco saturatiore
transversim striatis, apicis margine albo ASTUR.

Accipiter, vel Accipiter major; Firmico & Recentioribus Astur. *Gesn.
icon. Avi. pag. 7, in qua icon minùs accurata.*

Accipiter. *Gesn. Avi. pag. 3. icon eadem pag. 4.*

*Jonst. Avi. pag. 8. hujus icon non satis accurata Tab. VII. & insuper
altera icon à Gesnero mutuata Tab. XI, sub titulo, Accipiter major.*

Accipiter stellaris. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 184.*

Accipiter stellaris Ornithologis; Asterias Alberto magno; aliis Astur.
Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 268.

Accipiter palumbarius. *Gesn. Avi. pag. 51.*

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 342. hujus icon non satis accurata pag. 343.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 188.

Jonst. Avi. pag. 10. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VIII.

*Willugh. Ornith. pag. 51. hujus icon non satis accurata Tab. III. &
insuper altera icon ab Aldrovando mutuata Tab. V.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Accipiter palumbarius Aldrovandi & aliorum. *Raj. Syn. Avi. pag. 18.
Nº. 1.*

Accipiter palumbarius, seu falco columbarius. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol.
pag. 353.*

Accipiter palumbarius; Phasianophonus; Columbicide. *Charlet. Exer.
pag. 72. Nº. 2.*

- Charlet. *Onomazt.* pag. 64. N°. 2.
 Asterias. Aldrov. *Avi.* Tom. I. pag. 336. *hujus icones minùs accuratæ* pag. 340 & 341.
 Asterias, Astur. Charlet. *Exer.* pag. 71. N°. 1.
 Charlet. *Onomazt.* pag. 64. N°. 1.
 Asterias, qui & Astur aliis. Jonst. *Avi.* pag. 10. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VIII.*
 Falco rostro nigro; pedibus luteis; corpore supra fusco, subtus albido-cinereo, maculis transversis. *Faun. Suec. Linn.* N°. 62.
 Falco palumbarius. Klein. *Avi.* pag. 50. N°. 11.
 Falco sagittatus. Frisch. *maris icon accurata Tab.* 82.
 Falco. Frisch. *fæminæ icon accurata Tab.* 81.
 Gyrfalco. Linn. *Systh. nat. ed. 6. Gen.* 36. *sp.* 10.
 Autour. Bel. *Hist. nat. des Ois.* pag. 112; dans laquelle il y a une mauvaise figure.
 Bel. *Portr. d'Ois.* pag. 17 b, dans laquelle est la même figure.
 Alb. Tom. II. pag. 5; avec une figure mal coloriée Pl. 8.
 Ἐπὶ τοῖς ἑβραίοις Eberi & Peuceri. Schwenck.
 Tauben-Falck Eberi & Peuceri. Schwenck.
 Les Hébreux l'appellent NEZ. Gesn.
 Les Chaldéens, NABA. Gesn.
 Les Arabes, BASI. Gesn.
 Les Grecs, Ἀσπίς. Aldrov. Ἰεράξ. Gesn. Jonst. Ἰεράξ ἀσπίδος. Bel. Schwenck.
 Ἰεράξ φασιότινος; Ἰεράξ φασιότινος; Ἰεράξ φασιότινος; Ἰεράξ φασιότινος. Schwenck. Φασιότινος. Gesn. Aldrov. Jonst. Φασιότινος. Aldrov. Φασιότινος; Φασιότινος. Aldrov. Jonst.
 Les Macédoniens, Παράς. Jonst.
 Les Toscans, Ἀρακός. & d'autres, Μέρκινος; Κερκός. Jonst. Βαρκός. Gesn. Jonst.
 Les Perses, MAR AN BAS. Gesn.
 Les Espagnols, HALCÓN. Gesn.
 Les Italiens, ASTORE. Aldrov. ASTURO. Bel. ASTUR. & le mâle, TERZOLO. Gesn.
 Les Allemands, HABICH; HABCH. Gesn. HABICHT. Gesn. Schwenck. GROSSER HABICHT. Schwenck. GROSSE GEFFELTE FALCK; GROSSE GESPERBERT-FALCK. Frisch. TAUBEN-FALCK. Gesn. Aldrov. TAUBEN-FALCKE. Rzac. Ils appellent le mâle HAECHLE. Gesn. HABICHT TERCELLIN. La femelle, ADELICHER HABICHT. Le jeune, KLEIN HABICHT: lorsqu'il est instruit, ABGERICHTER HABICHT. Schwenck.
 Les Fauconniers Allemands appellent la femelle VOLL HABICHT. Schwenck.
 Les Silésiens, STOCK AHR. Schwenck.
 Les Flamands, HAFKIN. Gesn.
 Les Illyriens, GESTRAB. Gesn.
 Les Polonois, JASTRAB; JASTRAB WIELKI; JASTRAB GOLEBIOW.

Rzac. ZASTRZAMP. Gefn.

Les Anglois, HAWKE, ou HOBIE. Gefn. STAR-HAWK, ou EGRET. Charlet.

GOS-HAWK. Willugh. Charlet. Sibbald. Raj. Klein. Alb. Ils appellent le mâle TERCELL. Sibbald.

Les François appellent le mâle TIERCELET. Bel.

Fœmina Caponem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues octodecim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sexdecim cum semi lineas longum est; cauda decem pollices & quatuor lineas; pes duos pollices cum novem lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & septem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus anticorum intimum longitudine adæquat; intimus autem extimo paulò longior. Alæ complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes attingunt, nec ultra protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, alarum rectrices pennæ superiores, quæque caudam superne cooperiunt, sunt fuscæ, cum paucò albo in occipitio mixto. Genæ sunt ex fusco & albicante striatæ. Guttur, pars colli inferior, pectus, ven-

La femelle est à peu près de la grosseur d'un *Chapon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes & demie de longueur; sa queue dix pouces quatre lignes; son pied deux pouces neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant, lequel est lui-même un peu plus long que l'extérieur. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes. Il y a un peu de blanc mêlé à l'occiput. Les joues sont rayées de brun & de blanchâtre. La gorge, la partie inférieure du

col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les ouvertures du dessous de l'aîle sont blanches, & rayées de bandes transversales, brunes, qui ont chacune à leur milieu une petite pointe, qui s'étend selon la longueur de la tige de chaque plume, & qui leur donne assez de ressemblance avec un fer de lance. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les plumes de l'aîle sont brunes, & leur côté intérieur est rayé de bandes transversales, d'un brun plus foncé, entre lesquelles sont semées de petites taches blanches. La première des plumes de l'aîle est très-courte; & la quatrième est la plus longue de toutes. Les barbes intérieures de la première & de la seconde, les barbes intérieures & extérieures de la troisième & de la quatrième; & les barbes extérieures de la cinquième & de la sixième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela à l'endroit où finissent les moyennes plumes. Celles de la queue sont brunes, & rayées de larges bandes transversales, d'un brun plus foncé, entre lesquelles sont semées, du côté intérieur seulement, de petites

ter, latera, crura & rectrices alarum inferiores albæ, tæniis transversis, fuscis variæ: quæque autem tænia in medio mucrone donatur, secundum uniuscujusque pennæ scapum extenso, unde lanceolatæ apparent. Pennæ caudam subtus tegentes alben. Remiges sunt fuscæ, tæniis transversis, saturatiùs fuscis in latere interiore striatæ; inter quas tænias exiguæ maculæ asperguntur albæ. Prima remix penna brevissima; quarta verò omnium longissima. Primæ & secundæ remigum pinnulæ interiores, pinnulæ exteriores & interiores tertiæ & quartæ, & pinnulæ interiores quintæ & sextæ fiunt subitò cæteris multò breviores eo in loco quo remiges minores sive secundariæ desinunt. Rectrices pennæ fuscæ, latis tæniis transversis, saturatiùs fuscis striatæ, inter quas tænias, in latere interiore tantum, exiguæ maculæ disseminantur albæ. Quæque etiam rectrix in apice margine albo donatur. Oculorum irides flavæ. Cutis nuda sive membrana basin rostri cooperiens, flavo-viridis. Rostrum, un-

guesque nigri ; pedes lutescentes. Le bout de chacune de ces plumes est terminé par un petit bord blanc.

L'iris des yeux est jaune. La membrane qui couvre la base du bec, est d'un jaune-verd. Le bec & les ongles sont noirs ; & les pieds jaunes.

Mas à fœmina non discrepat nisi magnitudine, quâ ei cedit, & pedibus minùs validis. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem septem pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque quatuordecim lineas longum est ; cauda novem pollices cum tribus lineis ; pes duos pollices & novem lineas ; & trium digitorum anticorum mediùs cum ungue duos pollices & totidem lineas. In reliquis fœminæ similis. Ex museo Realmuriano.

Le mâle ne diffère de la femelle qu'en ce qu'il est plus petit, & en ce qu'il a les pattes moins fortes. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long ; sa queue neuf pouces trois lignes ; son pied deux pouces neuf lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces deux lignes. Du reste il ressemble à la femelle. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 4. LE FAUCON.

Accipiter fuscus, oris pennarum rufescentibus ; rectricibus fuscis fusco saturatiore transversim striatis FALCO.

Falco. Gesn. Avi. pag. 58.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 429.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 258.

Jonst. Avi. pag. 15. hujus icon satis accurata Tab. XII, & alia icon minùs accurata Tab. XIII.

Charlet. Exer. pag. 73. N°. IV.

Charlet. Onomazt. pag. 65. N°. IV.

Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 200.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 279.

Rzac. Auth. Hist. nat. Pol. pag. 377.

Moehr. Avi. Gen. 42.

Falco apud Firmicum, Suidam & Recentiores. Gesn. icon. Avi. pag. 110.

Accipiter fuscus. Frisch. hujus icon satis accurata. Tab. 74.

Faucon. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 115 ; avec une figure passable pag. 117.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 18 a , dans laquelle est la même figure.

Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 146.

Les Grecs l'appellent Φαλαφόνος ιεραξ. Bel. Φαλκων. Aldrov. Schwenck.

Φαλκωνος. Aldrov.

Les Espagnols, HALKON. Aldrov.

Les Italiens, FALCON. Bel. Gesn. Aldrov. FALCONE. Gesn. Aldrov.

Les Allemands, FALCK. Gesn. Aldrov. Rzac. FALCKE; FALCKET. Schwenck.

SCHWARTZ BRAUNE FALCK. Frisch.

Les Flamands, VALKE. Gesn. VALCK. Aldrov.

Les Illyriens, SOKOL. Gesn. Aldrov.

Les Polonois, SOKOL. Rzac.

Les Anglois, FALCON. Charlet.

Il est de la grosseur d'une moyenne Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles aussi de dix-huit pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a environ un pouce de long ; sa queue cinq pouces trois lignes ; son pied deux pouces trois lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant, lequel est lui-même un peu plus long que l'extérieur. Il a trois pieds cinq pouces de vol ; & ses ailes ,

Craffitie Gallinam medio-crem adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & sex pollices explet, & ad extremos ungues totidem. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque unum circiter pollicem longum est ; cauda quinque pollices cum tribus lineis ; pes duos pollices & tres lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum interiorem longitudine adæquat, qui interior exteriorem paululum longitudine antecellit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum

rum distantia est trium pedum & quinque pollicum; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, alarum rectrices pennæ, quæque caudam superne tegunt, fuscæ sunt, oris uniuscujusque pennæ rufescentibus, sed strictius. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & caudæ rectrices inferiores concolores, oris pennarum rufescentibus quàm in dorso multò latioribus. Guttur fordidè albicat: & pars colli superior maculis quibusdam rufescentibus notatur. Alarum rectrices inferiores ex griseo fuscescunt. Remiges pennæ fuscæ, tæniis transversis, rufescentibus in latere interiore striatæ, oris exterioribus quoque rufescentibus. Cauda constat duodecim rectricibus fuscis, fusco saturatiore transversim striatis. Oculorum irides luteæ: cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, concolor. Rostrum ex cinereo coerulescit, excepto unco nigro. Pedes sunt flavi ad viride inclinantes; ungues verò nigricantes. *Ex museo Realmuriano.*

lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes, chaque plume étant bordée d'une bande roussâtre, fort étroite. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, & chaque plume est bordée de même d'une bande roussâtre, mais beaucoup plus large. La gorge est d'un blanc sale: & il y a quelques taches roussâtres sur la partie supérieure du col. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un gris-brun. Les plumes des aîles sont brunes: leur bord extérieur est roussâtre; & leur côté intérieur est rayé de bandes transversales, de la même couleur. La queue est composée de douze plumes brunes, rayées transversalement de bandes d'un brun plus obscur. L'iris des yeux est jaune, ainsi que la membrane, qui couvre la bête du bec. Le bec est d'un cendré-bleuâtre, excepté son crochet, qui est noir. Les pieds sont d'un jaune tirant sur le verd; & les ongles presque noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Les variétés de cette espece
sont

Hujus speciei varietates
sunt

** A. LE FAUCON SORS.

Falco hornotinus.

C'est le *jeune* de cette espece. Il est d'un brun moins foncé ou tirant un peu sur le cendré. Du reste il ressemble assez au précédent. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Hujus speciei hic *junior* est. Fusco dilutior aut ad cinereum paululum vergente tingitur. In reliquis præcedenti similis. *Ex museo Realmuriano.*

** B. LE FAUCON HAGARD, OU BOSSU.

Falco gibbosus.

Falco gibbosus. Gesn. Avi. pag. 72.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 484.

Jonst. Avi. pag. 18.

Willugh. Ornith. pag. 46.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Raj. Syn. Avi. pag. 14. N°. 6.

Falco gibbosus albus. Charlet. Exer. pag. 73. N°. 7.

Charlet. Onomast. pag. 66. N°. 7.

Les Allemands l'appellent HAGER-FALCK, ou HOGER-FALCK. Gesn.

Aldrov. Willugh.

Les Anglois, HAGGARD FALCON. Willugh. Raj.

Celui-ci est le vieux de la même espece. Lorsqu'il est avancé en âge, il contourne son col de façon qu'il est comme caché entre ses épaules, ce qui le fait paroître beaucoup plus court : de sorte qu'à peine la tête paroît-elle au-dessus des ailes, lorsqu'elles sont pliées : & alors il semble être *bossu* ; c'est pourquoi on lui en a donné

Hic jam ad senectutem provectus est. Tunc collum contorquet, illudque inter scapulas quasi abscondit, & sic fit brevius. Ob quam colli brevitatem caput vix apparet ante juga alarum, dum eas supra latera dorsi componit, ita ut gibbum gestare videatur ; unde *gibbosus* nomen. Caput ei magnum est

proportione reliqui corporis. Rostrum perbreve & rotundum. Alæ prælongæ & valde exsertæ. Cauda brevis. Pedes habet longiusculos, nodosos in articulis digitorum, præcipuè ad interiorem plantæ pedis partem. Oculi flammei sunt & ardentes. *Ex museo Realmuriano.*

le nom. Sa tête est grosse à proportion du reste du corps. Son bec court & arrondi. Ses ailes longues & très-ouvertes. Sa queue courte. Ses pieds sont allongés, garnis de nœuds à chaque articulation des doigts, sur-tout dans le dessous de la plante du pied. Ses yeux sont enflammés & ardents. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

C. LE FAUCON A TESTE BLANCHE.

Falco leucocephalus.

Vultur subluteus, capite albo. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 75.*
Les Allemands l'appellent RAUH-FUSS-GEYER; GELB-BRAUNE GEYER.
Frisch.

Crassitie *Falconem nostratem* adæquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem septem pollices & sex lineas explet. Alæ complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Caput, guttur, collum & pectus alba sunt, exiguisque maculis longitudinalibus, fuscis varia. Dorsum, alarumque tectrices superiores fusco, rufescente, griseo & albicante variegantur. Ventrem & crura vestiunt pennæ griseæ, fuscis variegatæ maculis, quas rufescens cingit color. Pennæ crura vestientes ad exortum usque di-

Il est de la grosseur de notre *Faucon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces six lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & la poitrine sont blanches, & variées de petites taches longitudinales, brunes. Le dos & les couvertures du dessus des ailes sont variées de brun, de rouffâtre, de gris & de blanchâtre. Le ventre & les jambes sont couvertes de plumes grises, variées de taches brunes, & bordées de rouffâtre. Les plumes des jambes descendent jusqu'à

l'origine des doigts. L'iris des yeux est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est d'un jaune plus pâle. Le bec est cendré. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirâtres.

gitorum protenduntur. Oculorum irides flavæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, pallidius flava. Rostrum cinereum. Pedes lutei; ungues verò nigricantes.

* * D. LE FAUCON BLANC.

Falco albus.

Falco albus. *Gesn. Avi. pag. 73.*

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 485. hujus icon minimè accurata pag. 487.

Jonst. Avi. pag. 18.

Willugh. Ornith. pag. 46.

Raj. Syn. Avi. pag. 14. N°. 7.

Falco albus Willughbeyi. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 434.*

Falco albus, lactei coloris Griffonii. *Klein. Avi. pag. 49. N°. 6.*

Falco candidus, Moscoviticus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 259.*

Laniarius albus, sive Falco albus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 80.*

Les Allemands l'appellent WEISSER FALCKE; MOSCHOWITTERISCHE-FALCK. Schwenck. WEISSE FALCK; WEISSE GEYER. Frisch.

Les Anglois, WHITE-FALCON. Willugh. Raj.

Il a été ainsi nommé à cause de sa couleur. Tout son corps est d'un blanc de lait, varié de taches jaunes, qui cependant, si on ne les regardoit pas avec attention, paroîtroient elles-mêmes blanches. Les aîles sont d'un beau blanc, & sans taches. La queue est composée de douze plumes pareillement blanches, sur lesquelles sont semées des taches jaunes, excepté sur les deux du milieu, qui sont tout-à-fait blanches, & qui, lorsque la queue est

Sic à colore dictus est; corpore enim est toto coloris lactei, sed flavis variis maculis, quæ tamen nisi penitus introspicerentur, & ipsæ quoque albæ apparent. Alæ candidissimæ sunt, ac sine maculis. Caudam componunt rectrices duodecim, coloris pariter candidi, & flavis conspersæ maculis, quarum tamen apparentiam eripiunt rectrices binæ intermedix, quæ totæ sunt candidæ & immaculatæ.

Oculi sunt nigri ; eorum verò irides flavi, sicut & cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, quoque flava. Rostrum ex albo cœrulescit. Pedes, cæterorum Accipitrum more, lutei ; unguës nigricantes. Alii sunt omnino albi, absque maculis, apicibus tamen majorum remigum nigricantibus.

pliée, empêchent de voir les taches jaunes des latérales. Les yeux sont noirs ; & leur iris est jaune, ainsi que la peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec. Le bec est d'un blanc tirant sur le bleu. Les pieds sont jaunes, comme ceux de la plupart des Oiseaux de proie ; & les ongles sont noirâtres. Il y en a d'autres qui sont tout-à-fait blancs, & sans taches, excepté les bouts des grandes plumes des ailes, qui sont noirâtres.

Unus extat in museo D. Aubry in toto corpore albus, cujus tamen dorsum & alæ maculis fuscis variegantur. Rectrices quoque fusco transversim sunt striatæ.

M. l'Abbé Aubry en conserve un dans son cabinet, qui est tout blanc, excepté quelques taches brunes, qu'il a sur le dos & sur les ailes. Les plumes de la queue sont aussi rayées transversalement de brun.

E. LE FAUCON NOIR.

Falco niger.

Falco niger. Gesn. Avi. pag. 72. hujus icon minùs accurata pag. 58.

Gesn. icon. Avi. pag. 10, in qua eadem icon.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 258.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 463, hujus icon à Gesnero mutuata pag.

433.

Falco fuscus. Frisch. hujus icon accurata Tab. 83.

Aesala ; Falconum species. Jonst. Avi. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XIII.

Tlotli. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 49. cap. CLXXVI.

Tlotli, Falco columbarius Nebbi dictus. Raj. Syn. Avi. pag. 161.

Faucon noir. Edwards. Tom. I. pag. IV ; avec une bonne figure Pl. 4.

Les Allemands l'appellent KOL-FALCK, Gesn. KOHL-FALCKE. Schwenck.

SCHWARTZ BRAUNE HABIGT. *Frisch.*
Les Mexiquains, Tlotli. Fern.

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur de *notre Faucon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Sa tête est assez grosse à proportion de son corps. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont noirâtres ou d'un brun très-obscur. Les couvertures du dessus de la queue & celles du dessus des ailes sont de la même couleur, & ont leurs bords roussâtres. Il y a aussi un peu de cette dernière couleur mêlée à la partie supérieure du col. De chaque côté de la tête est une tache noire, qui commence aux coins de la bouche, & s'étend enenbas en forme de moustache; autour de laquelle il y a un petit mélange de blanc sale. Tout le dessous du corps, sçavoir la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue, est d'une couleur de terre brune, avec une tache noire au bout de chaque plume. Les couvertures du dessous des ailes sont noires,

Crassitie & magnitudine *Falconem nostratem* circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & decem pollices explet. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput proportionē corporis satis crassum. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium nigricant aut fusco saturatissimo tinguntur. Tectrices alarum superiores pennæ, quæque caudam superne tegunt, concolores, oris tamen rufescentibus. Aliquid rufescentis in parte colli superiore etiam admiscetur. In utroque capitis latere macula est nigra, ab oris angulis procedens, & deorsum tendens, mysticis instar; in cujus ambitu aliquid fordidè albi admixtum est. Totum corpus inferius, pars scilicet colli inferior, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores, terreo aut fusco colore tingitur, & unaquæque penna maculâ nigrâ in apice donatur. Alarum tectrices inferiores nigra, maculis albis, aliis rotundis, aliis irre-

gularibus, variegantur. Alarum margines, versùs articulum, qui carpo humano respondet, albert. Remiges & rectrices dorso concolores, taniis transversis, terreo colore tinctis, infernè tantùm striatæ. Cutis nuda, dilutè plumbea cingit oculos; quorum irides obscuro imbuuntur colore. Rostrum saturatè plumbeum, ad incarnatum colorem vergit: cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, concolor, attamen ad flavum magis inclinans. Pedes sunt saturatè plumbei aut plumbeo-viridescentes; versùs verò eum locum, quo pedes digitis connectuntur, magis ad flavum inclinant. Digitorum pars inferior rubescit; ungues verò sunt nigri.

& variées de taches blanches, dont les unes sont rondes, & les autres irrégulieres. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur que le dos, & rayées en-dessous seulement de bandes transversales, de couleur de terre. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un plombé clair: leur iris est d'une couleur obscure. Le bec est d'une couleur de plomb foncée, & qui tire un peu vers la couleur de chair: la peau nue ou membrane, qui en couvre la bête, est de la même couleur, mais un peu plus approchante du jaune. Les pieds sont d'une couleur de plomb foncée ou verdâtre, mais tirant plus sur le jaune vers l'endroit où le pied se joint avec les doigts. Le dessous des doigts est rougeâtre; & les ongles sont noirs.

F. LE FAUCON TACHETÉ.

Falco maculatus.

Faucon tacheté. *Edwards. Tom. I. pag. III; avec une bonne figure Pl. 3.*

Crassitie ad *Falconem nostratam* accedit. Capite donatur exiguo; collo brevi; pedibus mediæ longitudinis;

Il est à peu près de la grosseur de notre *Faucon*. Sa tête est assez petite; son col court; ses pieds de moyenne longueur;

la queue assez longue, ainsi que ses aîles, qui, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'à son bout. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & les petites couvertures du dessus des aîles sont brunes. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré obscur, varié de lignes transversales, noires. Il y a de chaque côté de la tête une grande tache longitudinale, noire, qui commence sous les yeux, & s'étend jusqu'à l'origine du col. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont blanches, & variées de taches brunes : celles de la partie inférieure du col sont petites & longitudinales ; celles de la poitrine, du ventre & des côtés sont en forme de croissants, mais plus déliés sur la poitrine & plus larges sur le ventre & les côtés ; & celles des jambes sont transversales, & ont chacune dans leur milieu une petite pointe, qui descend en-enbas, & qui leur donne assez bien la figure d'un fer de lance. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré clair, rayé transversalement de noirâtre. Celles du dessous des aîles sont brunâtres, & variées de taches rondes, blan-

caudâ satis longâ ; alis quoque longis, & dum compli-cantur, ad caudam ferè extremam protensis. Partes capitis & colli superiores, dorsum & tectrices alarum superiores minores sunt fuscæ. Uropygium, quæque caudam superne tegunt pennæ obscurè cinereæ, lineis transversis, nigris variæ. In utroque capitis latere majuscula est macula longitudinalis, nigra, infra oculos orta, & ad colli exortum usque protensa. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera & crura albeant, maculisque variegantur fuscis ; in parte colli inferiore exiguis & longitudinalibus ; in pectore, ventre & lateribus lunatis, sed strictius in pectore, latius verò in ventre & lateribus ; in cruribus tandem transversis, unaquæque in medio exiguo donatâ mucrone, deorsum tendente, unde lanceolata apparet. Caudæ tectrices inferiores sunt dilutè cinereæ, nigricante transversim striatæ. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ fuscescentes, maculisque rotundis, albis variæ. Margines alarum, versùs articulum carpo humano respondentem, albæ. Majores alarum

alarum tectrices & remiges fuscae, lineis transversis, nigricantibus variegatae. Rectrices superne concolores, inferne verò sunt dilute cinereae, tæniis striatae transversis, nigricantibus, sed quàm superne dilutioribus. Cutis nuda, plumbea oculos cingit : oculorum verò irides obscuro colore tinguntur. Membrana sive cutis nuda, basin rostri cooperiens, ex flavo viridescit. Rostrum plumbeum est. Oris anguli ex flavo ad aurantium inclinant. Pedes sunt splendide lutei ; ungues verò nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*.

ches. Le bord de l'aile vers le pli, qui répond à celui du poignet, est blanc. Les grandes couvertures & les plumes des ailes sont brunes, & variées de lignes transversales, noirâtres. Celles de la queue sont en-dessus de la même couleur, & en-dessous elles sont d'un cendré clair, & rayées transversalement d'un noirâtre plus clair que celui du dessus. Les yeux sont entourés d'une peau nue, de couleur de plomb : leur iris est d'une couleur obscure. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est d'un jaune-verdâtre. Le bec est d'une couleur de plomb. Les coins de la bouche sont d'un jaune tirant sur l'orangé. Les

pieds sont d'un jaune éclatant ; & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

G. LE FAUCON BRUN.

Falco fuscus.

Vultur Pygargus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 76.*
Les Allemands l'appellent BRAUN FAHLE GEYER. *Frisch.*

Craffitie ad *Gyr Falconem* accedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & septem pollices aequat. Alae complicatae caudam ferè extremam attingunt. Caput cinereum est, exiguis va-

Il approche de la grosseur du *Gerfault*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête est d'un gris varié de petites

taches longitudinales , d'un brun-ferrugineux , qui occupent le milieu de chaque plume. La partie supérieure du col , le dos & les couvertures du dessus des ailes sont brunes , le milieu de chaque plume étant d'une couleur plus foncée. Tout le dessous du corps , sçavoir la gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les jambes & les couvertures du dessous de la queue , est blanc , varié de taches brunes à la poitrine & aux jambes ; celles de la poitrine ont à peu près la figure d'un fer de pique. Les plumes des ailes sont d'un brun-ferrugineux ; & le bord extérieur des grandes est d'un blanc sale & roussâtre. Celles de la queue sont rayées de bandes transversales , alternativement d'un blanc-roussâtre , & d'un brun-ferrugineux. L'iris des yeux est jaune. La peau nue ou membrane , qui couvre la bête du bec , est d'un jaune plus pâle. Le bec est d'un cendré-noirâtre. Les pieds sont jaunes ; & les ongles noirs.

rium maculis longitudinalibus, fusco-ferrugineis, uniuscujusque pennæ medium occupantibus. Pars colli inferior , dorsum , alarumque teatrices superiores fuscae , quæque pennæ in medio fusco saturatiore tincta. Totum corpus inferius , guttur scilicet , pars colli inferior , pectus , venter , crura & caudæ teatrices inferiores , albet , pectore & cruribus maculis fuscis variegatis ; maculæ autem quibus pectus notatur , lanceolatae apparent. Remiges pennæ sunt fusco-ferrugineæ ; majorum autem oræ exteriores ex sordide albo rufescunt. Rectrices taniis transversis , alternatim albo-rufescentibus , & fusco-ferrugineis variegantur. Oculorum irides flavæ. Cutis nuda sive membrana , basin rostri cooperiens , pallidius flava. Rostrum ex cinereo nigricat. Pedes sunt flavi ; ungues verò nigri.

H. LE FAUCON ROUGE.

Falco rubeus.

Falco rubeus. Gefn. Avi. pag. 73.

Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 493.

Jonst. Avi. pag. 19.

Willugh. Ornith. pag. 47.

Charlet. Exer. pag. 73. N°. 10.

Charlet. Onomazt. pag. 66. N°. 10.

Falco rubeus Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. III. sp. 4.

Falco rubens. Raj. Syn. Avi. pag. 14. N°. 10.

Les Italiens l'appellent FALCONE ROSSO. Aldrov.

Les Allemands, Roter-FALCK. Gesn. Aldrov.

Les Flamands, Roode VALCK. Aldrov.

Les Anglois, Red-FALCON. Raj. FALCON WITH RED SPOTS. Charlet.

Rubeus dicitur hic Falco, non quod totus rubeat, sed quia guttæ sive maculæ in cæteris albæ, in hoc sunt rubræ & nigræ. Non tamen sunt interpositæ sicut in aliis, nec in dorso, neque in exteriore alarum parte; non enim apparet rubere nisi cum alas exerit. *Peregrino Falcone minor*; unguibus tamen, pedibusque & rostro fortis est.

Celui-ci est appelé Faucon rouge, non pas qu'il soit tout rouge, mais parce que les petites taches, qui sont blanches dans les autres, sont noires & rouges dans celui-ci. De plus elles ne sont pas placées, comme dans les autres, sur le dos ni sur la partie supérieure des ailes; car il ne paroît avoir de rouge que lorsque ses ailes sont ouvertes. Il est plus petit que le *Faucon Pèlerin*; & cependant il a le bec, les pieds & les ongles aussi forts.

I. LE FAUCON ROUGE DES INDES.

Falco ruber Indicus.

Falcones rubri Indici. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 494. horum icones satis accuratæ pag. 494 & 495.

Falcones rubri Indici Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 47. unius iconæ ab Aldrovando mutuata Tab. IX.

Raj. Syn. Avi. pag. 14. N°. 11.

Falco rubeus, & Falco aliter. Jonst. Avi. horum icones ab Aldrovando mutuata Tab. XII.

Fœmina major est capite, vertice lato ac ferè plano. Alæ longissimæ extremis api-

La femelle a une grosse tête, dont le sommet est large & aplati. Ses ailes sont très-longes
X x ij

gues, & lorsqu'elles sont pliées, leurs extrémités s'étendent bien au-delà de la moitié de la longueur de la queue : alors elles vont se croiser l'une & l'autre presque à l'extrémité du dos. La tête est d'un cendré tirant sur le brun. La partie supérieure du col, le dos, les couvertures du dessus des ailes & les plumes des ailes sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un fauve-rougeâtre. Dans le rouge de la gorge est une tache cendrée, oblongue, qui descend en enbas. Il y a aussi quelques petites taches de la même couleur, mais très-rare, sur la poitrine. Les côtés sont, comme le dos, d'un cendré tirant sur le brun. La queue est assez longue : chacune de ses plumes est variée de bandes en demi-cercle, alternativement noires, & cendrées : ces dernières sont plus larges que les précédentes. De l'angle extérieur de l'œil part de chaque côté de la tête une tache oblongue, d'un fauve-rougeâtre. La prunelle de l'œil est d'un beau noir ; & la membrane des cils est jaune. L'iris des

cibus ultra mediam longè caudam porriguntur, extremo ferè dorso sibi mutuò decussatim incumbentes. Color capitis cinereus est ad fuscum tendens, cujusmodi etiam est colli superioris, dorfi totius, alarum tectricum superiorum & remigum. Guttur, collum inferius, pectus universum, alarum tectrices inferiores, ventres quoque & uropygium, tectrices caudæ superiores & inferiores, nec non & crura ex fulvo rubescunt. Guttur tamen in hoc rubeo colore, maculâ oblongâ, cinereâ, quæ infernè desinit, distinguitur. Pectus quoque ejusdem coloris notulis raris respergitur. Latera, ut dorsum, colore cinereo-fusco tinguntur. Cauda oblonga : tectrices autem singulæ alternis spatiis, modò nigris hemicycli formâ angustioribus, modò cinereis amplioribus variant. Ab exteriori ac minori oculorum cantho utrinque macula oblonga, fulvo-rubescens ducitur. Oculi pupilla nigerrima : membrana ciliarum in ambitu lutea. Oculorum irides fuscae, obscuro colore infectæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens,

lutea. Rostrum admodum crassum, cinereum. Pedes crassi satis, robustique, lutei sunt : ungues nigri acutissimi.

yeux est brun, mêlé d'une couleur plus sombre. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est jaune. Le bec est fort épais & cendré. Les pieds sont gros, forts & jaunes; & les ongles sont noirs & très-aigus.

Mas tertiâ propè parte exilior est. Colorum varietate cum *fœmina* ferè convenit, & in iisdem partibus, nisi quod color rubeus in hoc saturatior sit & evidentior. A *fœmina* tamen discrepat in eo quod partes, quas in illa color cinereo-fuscus imbuat, quales sunt caput, collum superius, dorsum, rectrices alarum superiores & remiges superne, in hoc nigro prorsus tingantur colore. Guttur huic dilutius paulò rubet, colore ad cinereum nonnihil vergente; sed nullâ maculâ, ut in *fœmina*, insignitum est. Pennæ remiges interiores albescent, notis fuscis, frequentibus, transversim distinctæ: reliqua, nempe suprema alarum pars seu axillæ, ex saturatissimo fulvo rubent. Rectrices quoque subtus duplici macularum transversarum varietate, nempe albarum & cinerearum, quæ ad cœruleum in-

Le *mâle* est à peu près d'un tiers plus petit que la *femelle*. Il lui ressemble assez pour la variété des couleurs, si ce n'est que le rougeâtre est plus foncé & plus apparent dans le *mâle*. Il diffère cependant de la *femelle* en ce que les parties, qui sont en elle d'un cendré tirant sur le brun, telles que sont la tête, la partie supérieure du col, le dos, les couvertures du dessus des ailes & les plumes des ailes en-dessus, sont noires dans le *mâle*. Il a aussi la gorge d'un rouge un peu moins foncé, & qui tire un peu sur le cendré, mais sur lequel il n'y a point de tache, comme dans la *femelle*. Le côté intérieur des plumes des ailes est blanc, & rayé de bandes transversales, brunes, fort près les unes des autres: le reste, savoir le haut des ailes ou les aisselles, est d'un fauve très-foncé & rougeâtre. Le dessous des plumes de la queue est aussi varié de bandes transversales, alternativement blanches, &

d'un cendré tirant sur le bleu. Ses pieds sont d'un jaune plus clair que ceux de la *femelle*.

On les trouve aux *Indes Orientales*.

clinant, alternatim ornatae conspiciuntur. Pedes dilutior luteo colore tinguntur.

Habitant in *India Orientali*.

K. LE FAUCON D'ITALIE.

Falco Italicus.

Falco Italicus. Jonst. Avi. pag. 19.

Il a la tête aplatie ; le bec bleu , & plus petit que celui du *Faucon Pèlerin*. La tête & le col sont d'un jaune tirant sur le rouge , & varié de petites lignes ferrugineuses , fort étroites. La poitrine est jaune , variée de quelques taches ferrugineuses , mais en petite quantité. Les extrémités des ailes sont variées de taches rondes & blanches. Les pieds sont jaunes. On le trouve sur les montagnes du *Vicentin* , & sur celles des *Alpes* , qui séparent l'*Allemagne* de l'*Italie*.

Hic caput habet totum planum ; rostrum *Falconis Peregrini* rostro minus & cœruleum. Caput universum & collum flavo colore , ad rubrum vergente , & lineis tenuibus , ferrugineis distincto , tinguntur. Pectus flavum est , raris & ferrugineis maculis distinctum. Alarum extremitates maculis rotundis , albisque pictæ sunt. Pedes luteo colore imbuuntur. Habitat in montibus *Vincentinis* & *Alpibus* , qui *Germaniam* ab *Italia* dividunt.

** L. LE FAUCON D'ISLANDE.

Falco Islandicus.

Il est à peu près de la grosseur de l'*Autour*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de dix-huit pouces. Son bec depuis

Asturum crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem novem pollices & tres lineas explet , & ad extremos ungues octodecim pollices. Rostrum

ab ipsius unco ad oris angulos sexdecim lineas longum; cauda decem pollices; pes duos pollices cum novem lineis; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices & tres lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anteriorum intimum longitudine adæquat. Alis extensis, extremitates majorum remigum trium pedum decem pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè attingunt. Colore pennarum *Falconem nostratæ* æmulatur. Rostrum ex cinereo cœrulescit, excepto unco nigricante. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, & pedes concolores; ungues verò nigri.

Habitat in *Islandia*. In *museum Realmurianum* missus est à *D. Forget*.

son crochet jusqu'aux coins de la bouche à seize lignes de long; sa queue dix pouces; son pied deux pouces neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a trois pieds dix pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Il ressemble à notre *Faucon* par la couleur de son plumage. Son bec est d'un cendré-bleuâtre, excepté son crochet, qui tire sur le noir. L'iris des yeux, la membrane qui couvre la bête du bec, & les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

On le trouve en *Islande*. Il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Forget*.

M. LE SACRE.

Falco Sacer.

Falco Sacer. Gesn. Avi. pag. 65.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 467.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 259.

Jonst. Avi. pag. 16.

Willugh. Ornith. pag. 44.

Charlet. Exer. pag. 73. N°. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 65. N°. 2.

- Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 14.*
Raj. Syn. Avi. pag. 13. N°. 2.
Falco Sacer Willughbeyi, Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 48. N°. 2.
Falco Sacer; qui & Britannicus, Ælyus, Aeriphilus Avicennæ. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 280.
Quauhtotli. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 33. cap. XCII.
Sacre. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 108; avec une figure passable pag. 109.
Sacre, ou Sacret. Bel. Portr. d'Ois. pag. 16 b, dans laquelle est la même figure.
Les François l'appellent SACRE; & le mâle SACRET. Bel.
Les Italiens, SACRO. Bel.
Les Allemands, SACKER; SOCKER-FALCK. Gefn. Schwenck. Aldrov. STOCKER-FALCKE; STOS-FALCKE; KOEPPPEL. Schwenck. KUPPEL. Gefn. Aldrov.
Les Anglois, SACRE. Willugh. Sibbald. Raj. SAKER; TISH-FALCON. Charlet.
Les Mexiquains, QUAUHTOTLI. Fern.

Il est à peu près de la grosseur du *Gerfault*; car il tient le milieu entre les *Faucons* ordinaires & le *Gerfault*. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue, qui est assez longue. Sa tête est grosse & ronde; son bec assez court; son corps allongé; ses pieds & ses doigts courts. Le dos, la poitrine & les couvertures du dessus des aîles sont variées de taches brunes. Les jambes sont blanches du côté intérieur. La queue est variée de taches en demi-cercle, & dont la figure est à peu près celle d'un haricot ou d'un rein. Les uns ont le dos d'un roux tirant sur le cendré, & d'autres l'ont noirâtre. Les yeux sont grands & noirs. Le bec

Magnitudine corporis ad *Gyrfalconem* accedit; cæteris enim *Falconibus* major est, sed *Gyrfalconibus* minor. Cauda ipsius longa; alæ verò complicatæ extremam ferè caudam pertingunt. Caput habet magnum, rotundum; rostrum brevius; corpus longiusculum; pedum digitos & pedes breviores. Dorsum, pectus, alarumque tectrices superiores maculis variegantur fuscis. Crura interiùs albet. Cauda maculis semicircularibus, pha-seolorum figuram aut renum ferè referentibus, variegatur. Aliis dorsum ex rufo ad cinereum tendit, aliis nigrescit. Oculi sunt magni, nigri. Rostrum, pedes-
que

que colore cœruleo tinguntur. Ut *migratorius* habetur hic Falco. & les pieds sont bleus. On regarde ce Faucon comme *passager*.

5. LE FAUCON GENTIL.

Accipiter superne saturatè fuscus, apicibus pennarum ferrugineis, infernè flavesceus, maculis longitudinalibus fuscis variis; rectricibus fuscis, tæniis transversis nigricantibus variegatis FALCO GENTILIS.

Falco pedibus flavis; corpore cinereo, maculis fuscis; caudâ fasciis quatuor. *Faun. Suec. Linn. N° 60.*

Falco Gentilis. *Gesn. Avi. pag. 71.*

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 481.

Jonst. Avi. pag. 18.

Charlet. Exer. pag. 73. N° 5.

Charlet. Onomast. pag. 66. N° 5.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 14.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 3.

Falco Gentilis, id est, Nobilis dictus. *Willugh. Ornith. pag. 46.*

Raj. Syn. Avi. pag. 13. N° 5.

Falco Gentilis. i. e. Nobilis. *Klein. Avi. pag. 48. N° 3.*

Faucon Gentil. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 116.*

Faucon apprivoisé. *Alb. Tom. II. pag. 4; avec une figure mal coloriée Pl. 6.*

Les Suédois l'appellent FALCK. *Linn.*

Les Anglois, FALCON GENTLE. *Alb. TARSEL-GENTIL. Charlet. TERCELL-GENTLE. Sibbald.*

Falconi peregrino paululum crassitie & magnitudine cedit. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput vestiunt pennæ in medio nigræ, marginibus ferrugineis. Pars colli superior, dorsum, uropygium, tectrices alarum superiores, quæque caudam superne tegunt saturatè fusca, apici-

Il est un peu plus petit que le *Faucon pèlerin*. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Sa tête est couverte de plumes noires dans leur milieu, & dont les bords sont ferrugineux. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont

d'un brun foncé, & chaque plume est terminée de ferrugineux. La gorge est jaunâtre; & cette couleur s'étend de chaque côté du col vers le derrière de la tête, & forme une espèce de collier. Sur chaque joue est une bande noirâtre, qui commence aux coins de la bouche, & s'étend en-enbas vers la gorge. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les côtés sont jaunâtres, & variés de quelques taches longitudinales, brunes. Les jambes sont de la même couleur, & variées de même, mais les taches brunes sont plus étroites. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-jaunâtre, varié de lignes longitudinales, brunes, mais très-rare. Les plumes des ailes sont brunes du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un blanc varié de petits points tirant sur le cendré, & de cinq ou six bandes transversales, brunes. Les plumes de la queue sont brunes, & variées de cinq ou six larges bandes transversales, noirâtres. Les yeux sont grands & noirs; & leur iris est jaune. Le bec est épais, & d'une couleur de plomb bleuâtre. Les pieds sont courts & jaunes; & les ongles sont noirs & fort aigus.

bus pennarum ferrugineis. Guttur flavescens; qui color in utroque colli latere versum partem capitis posteriorem tendit, & torquem quodammodo efformat. Utraque gena taniâ donatur nigricante, ab angulis oris oritâ, & versum guttur deorsum tendente. Pars colli inferior, pectus, venter & latera flavescunt, & maculis quibusdam, longitudinalibus, fuscis variegantur. Crura eodem colore tinguntur, similibusque maculis fuscis, sed strictioribus, sunt variegata. Caudæ tectrices inferiores ex albo flavicantes, lineis longitudinalibus, fuscis, sed rarissimis, variæ. Remiges in latere exteriori fusca, in latere vero interiori alba, punctulis ad cinereum vergentibus variæ, quinque vel sex taniis transversis, fuscis notata. Rectrices fusca, quinque vel sex latis taniis transversis, nigricantibus variegata. Oculi magni sunt & nigri; ipsorum vero irides flavæ. Rostrum crassum, plumbeo-cœrulescens. Pedes flavi, breves; ungues vero nigri, acutissimi.

** 6. LE FAUCON PÉLERIN.

Accipiter superne cinereus, tæniis transversis cinereo-fuscis striatus, infernè albo-rufescens, tæniis transversis nigricantibus varius; rectricibus alternatim cinereo & nigricante transversim striatis, albo-rufescente terminatis
FALCO PEREGRINUS.

- Falco peregrinus. Gesn. Avi. pag. 70.*
Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 461. hujus icon satis accurata pag. 464.
Jonst. Avi. pag. 16. hujus duæ icones satis accuratæ Tab. XII, sub titulis,
Falco passager, & Falco Ocnentanus. & insuper alia icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIII.
Willugh. Ornith. pag. 43. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VIII.
Raj. Syn. Avi. pag. 13. N^o. 1.
Falco peregrinus Gesneri. Schwenck. Avi. Sil. pag. 258.
Falco peregrinus, Ardearius. Charlet. Exer. pag. 73. N^o. 1.
Charlet. Onomast. pag. 65. N^o. 1.
Faucon pèlerin. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 116.
Les Arabes l'appellent ALBASI. Aldrov.
Les Perses, MAR AN BAZ. Aldrov.
Les Italiens, PELEGRINO. Ils appellent le mâle TERZVOLO PELEGRINO. Gesn. Aldrov.
Les Allemands, WANDER-FALCK; GEMEINER-FALCK; FREMBDLING-FALCK. Schwenck.
Les Anglois, BLEW-BACKT FALCON. Charlet.

<i>Crassitie Falconem nostratem æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & sex pollices explet, & ad extremos ungues sexdecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda septem pollices; pes duos pollices; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos</i>	<i>Il est de la grosseur de notre Faucon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied six pouces, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue sept pouces; son pied deux pouces; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes: les</i>
---	---

Y y ij

latéraux n'ont que deux pouces de long ; & celui de derrière un pouce dix lignes. Il a trois pieds trois pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, touchent presque le bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un cendré-noirâtre. Tout le dessus du corps, sçavoir le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue, est cendré, & rayé transversalement de cendré-brun. Ces couleurs sont plus foncées sur les couvertures des aîles qu'ailleurs. La gorge est d'un blanc-roussâtre. La partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont de la même couleur, variée de petites lignes longitudinales, noirâtres, qui s'étendent selon la longueur de la tige de chaque plume. Le bas de la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont aussi d'un blanc-roussâtre, varié de bandes transversales, noirâtres. Les plumes des jambes sont très-longues & descendent presque jusqu'aux doigts. Les plumes des aîles sont noirâtres ; & leur côté intérieur est rayé de bandes transversales, roussâtres, ou d'un fauve

pollices & novem lineas : laterales duos pollices longitudine non excedunt ; & posticus unum pollicem & decem lineas non superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & totidem pollicum ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Caput & pars colli superior ex cinereo nigricant. Totum corpus superius, dorsum scilicet, uropygium, scapulares pennæ, alarum tectrices superiores, quæque caudam superne cooperiunt, cinereum, tæniisque transversis, cinereo-fuscis striatum : qui colores in tectricibus alarum superioribus fiunt saturatiores. Guttur ex albo rufescit. Pars colli inferior & pectus supremum concolores, lineolis longitudinalibus, nigricantibus, secundum uniuscujusque pennæ scapum extensis, variegantur. Pectus infimum, venter, latera, crura, superiores caudæ tectrices pennæ, & quæ caudam subtus cooperiunt, sunt quodque albo-rufescentes, tæniis transversis, nigricantibus variæ. Pennæ crura tegentes longissimæ, & ferè ad digitos usque protenduntur,

Remiges nigricant, taniis-
que transversis, rufescenti-
bus aut dilutè fulvis in la-
tere interiore variegantur.
Pinnulæ interiores primæ re-
migis versùs duas tertias ip-
sius longitudinis partes fiunt
subitò cæteris multò bre-
viores. Caudam componunt
duodecim rectrices, taniis
transversis, alternatim cine-
reis & nigricantibus striatæ,
& albo-rufescente termina-
tæ. Oculorum irides luteæ.
Cutis nuda sive membrana,
basin rostri cooperiens, etiam
lutea. Rostrum cœrulescit.
Pedes sunt flavi; ungues ni-
gricantes. *Migratorius est hic
Falco. Ex museo D. Aubry.*

Hujus speciei varietates
sunt

Les variétés de cette espece
sont

A. LE FAUCON DE BARBARIE.

Falco Tunetanus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 483,*

Jonst. Avi. pag. 18.

Willugh. Ornith. pag. 47.

Charlet. Exer. pag. 73. N^o. 6.

Charlet. Onomazt. pag. 66. N^o. 6.

Raj. Syn. Avi. pag. 14. N^o. 9.

Klein. Avi. pag. 48. N^o. 4.

Faucon de Barbarie. *Alb. Tom. III. pag. 1; avec une figure passable*
Pl. 2.

Faucon Tunicien, ou Punicien. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 117.*

Les Anglois l'appellent BARBARY-FALCON. *Willugh. Charlet. Raj. TUNIS-
FALCON. Willugh. Raj. FALCON FROM BARBARIE. Alb.*

Præcedenti paululùm ma-
gnitudine cedit. Capite do-

Il est un peu plus petit que
le précédent. Il a la tête grosse

& ronde. Bélon dit qu'il ressemble au *Lanier* par la grandeur & le plumage. On le trouve en *Barbarie*.

Albin en a donné un sous le même nom, dont voici la description. Ses ailes sont longues, & lorsqu'elles sont pliées, elles s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, ainsi que le dos, sont d'un cendré pâle & bleuâtre, varié de taches noires. Les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des ailes sont du même cendré, mais sans taches. La poitrine est d'un blanc-jaunâtre, mêlé d'une légère teinte de bleuâtre. Le haut du ventre est aussi d'un blanc-jaunâtre, mais sans mélange de bleu. Le bas-ventre & les jambes sont de la même couleur, & variées de taches longitudinales, noires. La troisième & la huitième des grandes couvertures du dessus de l'aile ont chacune une grande tache blanche. Les plumes des ailes sont noirâtres, & ont leur bord extérieur blanc. Celles de la queue sont d'un cendré-bleuâtre, & rayées de sept bandes transversales, brunes. Les yeux sont de différentes couleurs, qui forment des cer-

natur crasso & rotundo. Secundum *Bellonium* magnitudine & pennarum colore cum *Lanario* convenit. Habitat in *Barbaria*.

Albinus sub eodem titulo unum delineavit; hujus autem hæc est descriptio. Alis donatur longis; complicatæ enim caudam ferè extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsum, pallidè sunt cinereæ ad cœruleum vergentes, maculisque nigris variegantur. Scapulares pennæ, alarumque tectrices superiores minores eodem imbuuntur cinereo, sed maculis destituuntur. Pectus ex albo flavicat, cum aliqua cœrulefcentis mixtura. Venter supremus flavicat quoque ex albo, sed nullo cœrulefcente admixto. Venter imus & crura eodem colore tinguntur, & maculis longitudinalibus, nigris variegantur. Alarum tectricum superiorum majorum tertia & octava maculâ majusculâ albâ notantur. Remiges nigricant, oris exterioribus albis. Rectrices sunt cinereo-cœrulefcentes, septemque tæniis transversis, fuscis striatæ. Oculi versicolores, circulis donantur nigris & fuscis :

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 345

ipforumque irides flavent. Cutis nuda five membrana, basin rostri cooperiens, quoque flava. Rostrum, unguis-que nigri; pedes lutei. Les noirs & bruns : leur iris est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la b  se du bec, est de la m  me couleur. Le bec est noir, ainsi que les ongles; & les pieds sont jaunes.

B. LE FAUCON DE TARTARIE.

Falco Tartaricus.

Faucon de Tartarie ou Barbarie. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 146.*

Magnitudine <i>Falconem peregrinum</i> paululum antecellit. Ab illo etiam discrepat alis superne rufis, & digitis magis elongatis.	Il est un peu plus grand que le <i>Faucon pelerin</i> . Il en diff��re encore en ce que le dessus de ses ailes est roux; & que ses doigts sont plus allong��s.
--	--

** 7. LE FAUCON A COLLIER.

Accipiter superne cinereus, infern   albus, maculis transversis fuscis varius; rectricibus caud   superioribus albis, ferrugineo maculatis; rectricibus lateralibus nigricante transversim striatis. (Mas).

Accipiter superne obscur   ferrugineus, infern   albo-rufescens, maculis longitudinalibus fuscis varius; rectricibus caud   superioribus albis, ferrugineo maculatis; capite torque cincto; rectricibus lateralibus nigricante transversim striatis. (F  mina) FALCO TORQUATUS.

Falco plumbeus caud   tessellat  . Klein. Avi. pag. 52. N  . 22.

Pygargus Accipiter. Willugh. Ornith. pag. 40. hujus icon minim   accurata Tab. VII, sub titulo, Pygargus.

Raj. Syn. Avi. pag. 17. N  . A. 5.

Subbuteo. Gess. Avi. pag. 48.

Subbuteo Turneri; Accipiter Pygargus Willughbeyi. Rzac. Au  . Hist. nat. Pol. pag. 369.

Subbuteo; quibusdam Buteo albus. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Buteo albus. *Charlet. Exer. pag. 72. N^o. 11.*

Charlet. Onomazt. pag. 65. N^o. 11.

Perturbateur des Poules. *Alb. Tom. III. pag. 2 ; avec une figure passable de la femelle Pl. 3.*

Aigle à queue blanche. *Alb. Tom. II. pag. 3 ; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 5.*

Les Anglois l'appellent RING-TAIL. *Willugh. Charlet. Sibbald. Raj. Alb. Ils appellent le mâle, HEN-HARROW, ou HEN-HARRIER. Willugh. Raj.*

La longueur de la femelle depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue est d'un pied sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix-sept pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long ; sa queue neuf pouces six lignes ; son pied deux pouces neuf lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, vingt-deux lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière l'est encore davantage. Elle a trois pieds sept pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Au-dessus des narines & aux coins de la bouche il y a des especes de foyes noirâtres, qui sont tournées en-devant. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont d'un ferrugineux obscur : les bords des plumes du col sont roussâ-

A summo rostro ad extremam caudam commensurata *fœmina* unum pedem septem pollices & sex lineas longa est, & ad extremos ungues septemdecim pollices & sex lineas. Rostrî longitudo ab ipsius unco ad oris angulos unum pollicem & quatuor lineas æquat ; caudæ novem pollices cum sex lineis ; pedis duos pollices & novem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus brevissimus. Alis in contrarium extensis, extremitates majorum remigum trium pedum & septem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra tres quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Supra nares & ad angulum mandibulæ setæ nigricantes succrescunt antrosum reflexæ. Caput col-
lum

lum superius, dorsum & uropygium sunt obscurè ferruginea : colli tegetum margines rufescunt : & in vertice minus rufi habetur ; in occipite verò radices pennarum albeant. Sub oculis macula est candicans. Ab occipite infra aures ad guttur annulus seu torquis plumularum arrectarum, in medio fuscum, marginibus ex rufo albis, tanquam corona caput cingit. Tectrices caudæ superiores albæ sunt, in medio secundum scapum maculis longis, ferrugineis pictæ. Guttur fuscum seu obscurè ferrugineum, fimbriis pennarum rufescentibus. Collum inferius, pectus & venter ex albo rufescunt, tæniis longis, fuscis, per pennarum scapos dorsum tendentibus. Latera, crura & tectrices caudæ inferiores concolores & similiter maculatæ. Alarum tectrices superiores dorso concolores, minorum marginibus nonnihil rufescentibus. Quæ alas subtus cooperiunt ferrugineæ, marginibus albo-rufescentibus. Remiges in latere exteriori sunt dorso concolores, in interiori verò areolis transversis, alternatim albo-rufescentibus & nigri-

tres : les plumes du sommet de la tête ont moins de cette dernière couleur ; & celles de l'occiput sont blanches à leur origine. Il y a une tache blanchâtre sous chaque œil. La tête est entourée d'un anneau ou espèce de collier, composé de petites plumes hérissées, brunes dans leur milieu, & dont les bords sont d'un roux-blanchâtre : ce collier prend depuis l'occiput jusque sous la gorge, en passant sous les oreilles. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & ont chacune dans leur milieu une tache longitudinale, ferrugineuse, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les plumes de la gorge sont brunes ou d'un ferrugineux obscur, & leurs bords sont roussâtres. La partie inférieure du col, la poitrine & le ventre sont d'un blanc-roussâtre, varié de longues bandes brunes, qui descendent en-entrebâs selon la longueur de la tige de chaque plume. Les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, & tachées de même. Celles du dessus des ailes sont de la couleur du dos, & les bords des petites ont un peu de roussâtre. Les couvertures du dessous des ailes sont ferrugineuses, & leurs bords

font d'un blanc - rouffâtre. Les plumes des aîles font de la couleur du dos du côté extérieur ; & leur côté intérieur est varié de bandes transversales , alternativement noirâtres & d'un blanc rouffâtre. Les bandes les plus larges dans les grandes plumes font les blanches , & dans les petites ce sont les noirâtres. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu font de la couleur du dos , & rayées transversalement d'une couleur plus claire ; les latérales sont variées de bandes transversales , alternativement rouffes & noirâtres , & terminées de roux tirant sur le cendré. L'iris des yeux est jaune.

La peau nue ou membrane , qui couvre la bête du bec , est ferrugineuse. Le bec est noir. La langue & le palais sont noirâtres. Les pieds sont d'un jaune de safran ; & les ongles noirs.

Le mâle est plus petit que la femelle. Il en diffère encore beaucoup par sa couleur. La tête , le col , le dos & le croupion sont d'un fort joli cendré. Les plumes scapulaires sont de la même couleur : cependant les plus longues d'entr'elles tirent un peu sur le brun. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches , & tachées de ferrugineux. La poitrine est blanche , & variée de quelques taches transversales , brunes. Les couvertures du dessus des

canibus variegantur. In majoribus remigibus areolæ albæ majores sunt , in minoribus nigricantes. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ dorso concolores , colore dilutiore transversim striatæ. Lateralium rectricum apices rufocinerei , dein mutuò succedunt areæ rufæ & nigricantes. Oculorum irides flavæ. Cutis nuda sive membrana , basin rostri cooperiens , ferruginea. Rostrum nigrum. Lingua & palatum nigricant. Pedes crocei ; ungues verò nigri.

Mas fœminâ minor est ; non autem magnitudine tantum sed & colore plurimum ab illa differt. Caput , collum , dorsum & uropygium sunt perpulchrè cinerea. Penæ scapulares concolores ; attamen longiores nonnihil fufcescunt. Tectrices caudæ superiores albæ , ferrugineo maculatæ. Pectus album , maculis nonnullis transversis , fuscis notatum. Alarum tectrices superiores cinereæ ; inferiores albæ , scapis cor-

pori viciniorum nigricantibus : primus infuper ordo subalarium maculas fufcas, transverfas obtinet. Remiges majores nigræ, apicibus cinereis, fundis albis; minores verò in exteriore facie cinereæ, in interiore albefcunt. Rectrices binæ mediæ cinereæ; à mediis ad extimas color fenfim dilutior fit, & ad album vergit: omnes autem laterales maculis nigris, transverfis diftinguuntur. Pedes exiles. In reliquis cum *fœmina* ferè convenit.

le blanc: de plus toutes les latérales font variées de taches transverfales, noires. Les pieds font menus. Du refte il refemble à peu près à la *femelle*.

Fœmina ex museo D. de Bandeville.

aîles font cendrées; celles du deffous font blanches, & les tiges des plus proches du corps font noirâtres: le premier rang de ces plumes eft en outre varié de taches transverfales, brunes. Les grandes plumes des aîles font noires, & terminées de cendré, ayant auffi un peu de blanc à leur origine; les moyennes font cendrées du côté extérieur, & blanchâtres du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue font cendrées: depuis celles-là jufqu'aux plus extérieures, cette couleur s'éclaircit peu à peu & tire fur

M^{dc}. de Bandeville conferve la femelle dans fon Cabinet.

** 8. LE FAUCON DE ROCHE, OU ROCHIER.

Accipiter fuperne cinereus, fcapis pennarum nigricantibus, infernè rufefcens, maculis longitudinalibus fufcis varius; rectricibus cinereis, apice nigricantibus, albo terminatis; lateralibus nigricante transverfifim ftriatis LITHOFALCO.

Litho-Falco. Gefn. Avi. pag. 75.

Lithofalco. Raj. Syn. Avi. pag. 14. N^o. 8.

Lithofalco, five Efalus. Frifch. hujus icon fatis accurata Tab. 86.

Lithofalco, feu Falco Lapidarius. Willugh. Ornith. pag. 47.

Falco Lapidarius. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 491.

Jonft. Avi. pag. 19.

Falco Lapidarius; Lithofalco. Charlet. Exer. pag. 73. N^o. 8.

Charlet. Onomazt. pag. 66. N^o. 8.

Les Savoyards l'appellent ROCHIER. Aldrov.

Les Allemands, STEIN-FALCK. Gefz. Aldrov. Frisch.

Les Anglois, STONE-FALCON. Charlet.

Il est presqu'aussi gros que la *Crecerelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue cinq pouces trois lignes; son pied quinze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a que sept lignes & demie de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes cendrées, qui ont chacune une petite bande noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont aussi cendrées, & la tige de chaque plume est noirâtre. Il y a un peu de roussâtre mêlé aux plumes qui sont entre la narine & l'œil. La gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plu-

Crassitie ad Tinnunculum accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos octo lineas longum est; cauda quinque pollices cum tribus lineis; pes quindecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus septem cum semi linearum longitudinem non excedit. Alæ complicatæ circiter ad tres quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Pennæ cinereæ, taniâ exiguâ nigricante, secundum uniuscujusque pennæ scapum extensâ, donatæ, partem capitis superiorem vestiunt. Quæ dorsum & uropygium cooperiunt, alarum testrices superiores & quæ caudam superne tegunt, sunt quoque cinereæ, scapis nigricantibus. Pennis nares inter & oculos sitis, aliquid rufescentis admiscetur. Guttur & pars colli inferior pennis ves-

tiuntur albis, lineâ fuscâ, secundum scapi longitudinem extensâ, præditis. Pars colli superior, pectus, venter, latera, crura & caudæ rectrices inferiores rufescentes, maculis longitudinalibus, fuscis, secundum uniuscujusque pennæ scapum extensis, variâ. Remiges majores fuscæ, priore in utroque latere, sequentibus omnibus in latere interiore tantum albo transversim striatis: minores cinereæ, tæniis transversis, albis in latere interiore notatæ. Prima remigum multo brevior est secundâ, quæ omnium longissima. Versus apicem duarum istarum remigum pinnulæ ipsarum interiores fiunt subito cæteris multo breviores. Rectrices sunt cinereæ, in apice nigricantes, cujus apicis margines albescent: laterales autem nigricante transversim sunt striatæ, sed in latere interiore tantum; in latere verò exteriori exigua extat macula nigricans eo in loco, quo cinereus desinit color: binæ intermediae in utroque latere simili maculâ notantur. Oculorum irides luteæ: cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, pedesque concolores. Ros-

mes blanches, qui ont chacune une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La partie supérieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres, avec des taches longitudinales, brunes, qui s'étendent selon la longueur de la tige de chaque plume. Les grandes plumes de l'aîle sont brunes, & rayées transversalement de blanc du côté intérieur seulement, excepté la première, qui l'est des deux côtés: les moyennes sont cendrées, & leur côté intérieur est aussi rayé transversalement de blanc. La première des plumes de l'aîle est beaucoup plus courte que la seconde, qui est la plus longue de toutes. Vers le bout de chacune de ces deux plumes les barbes intérieures deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres. Les plumes de la queue sont cendrées; leur bout est noirâtre, & terminé de blanc: le côté intérieur de toutes les latérales est rayé transversalement de noirâtre; & il y a une petite tache de la même couleur sur leur côté extérieur vers l'endroit où se termine le cendré: les deux du milieu ont aussi une pareille tache sur chacun de leurs côtés.

L'iris des yeux, la peau nue qui couvre la bête du bec, & les pieds sont jaunes. Le bec est d'un cendré-bleu; & les ongles sont noirs. Il fait son nid dans les rochers; ce qui lui a fait donner le nom de *Faucon de Roche*. Du cabinet de M. de Reaumur.

trum ex cinereo cœrulescit; ungues verò sunt nigri. Inter rupes nidificat; unde *Litho-Falconis* nomen. Ex museo Realmuriano.

2. LE FAUCON DE MONTAGNE, OU MONTAGNER.

Accipiter superne fuscus aut cinereus; capite nigro; pectore maculis rotundis insignito . . . FALCO MONTANUS.

Falco montanus. Gesn. *Avi.* pag. 69.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 477.

Jonst. Avi. pag. 17.

Willugh. Ornith. pag. 45.

Charlet. Exer. pag. 73. N°. 4.

Charlet. Onomast. pag. 66. N°. 4.

Raj. Syn. Avi. pag. 13. N°. 4.

Rzac. Auth. Hist. nat. Pol. pag. 378.

Falco montanus Gesneri. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 258.*

Falco montanus, *montanarius* Aldrovandi, *Schwenckfeldii*, *Willughbeyi*. *Klein. Avi. pag. 52. N°. 20.*

Falco Pyrenæus nigricans. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. III. sp. 1.*

Cybindus; *Accipiter nocturnus* Plinii, *Eberi* & *Peuceri*. *Schwenck. Klein.*

Les Italiens l'appellent MONTANARO. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, BIRG-FALCK. *Gesn. Aldrov. BERG-FALCK. Schwenck.*

Rzac. BIRCK-FALCK. Schwenck. STEIN-FALCK. Rzac.

Les Polonois, SOKOL GORNY. *Rzac.*

Les Anglois, MOUNTAIN-FALCON. *Charlet. Raj.*

Celui-ci pourroit bien n'être qu'une variété du *Faucon de roche*. Il n'est pas si gros que le *Faucon pèlerin*. Il n'a ni les aîles, ni la queue aussi longues. Il a la tête ronde, & dont le sommet est un peu pointu,

An *Litho-Falconis* varietas? *Falconi peregrino* crassitie cedit. Alas habet non ita longas; caudam item brevior. Caput rotundum, vertice fastigiatum seu leniter elevatum ac nigrum, co-

ronulâ quâdam cinericeâ cinctum. In fronte autem non longè à rostro plumulæ quâdam exiles ac tenuissimæ, veluti capillares, eminent, quæ quidem exiguo numero in nigris conspiciuntur. Pars colli superior, dorsum, uropygium & latera majori ex parte plumis vestiuntur fuscis. Habent eorum aliqui in parte dorsi inferiore & uropygio lineas quasdam albicantes aut rubescentes, deorsum vergentes : alii etiam purè cinericeas in dorso gerunt pennas. Guttur & pars colli inferior nonnihil candescunt, maculisque asperguntur majusculis, ferrugineis quandoque, nonnunquam rubeis, aliquando nigricantibus ; & aliis præterea minutioribus notulis distinguuntur. Pectus eodem colore imbuitur, & versùs inferiora maculis quibusdam concoloribus exornatum est. Quibusdam verò guttur, collum inferius & pectus nigris plumis vestiuntur. Crura interiora nigrescunt. Rectrices sunt cineræ, apicibus nigris, albo terminatis. Rostrium habet breve ac crassum & nigrum ; narium foramina angusta ; oculos similiter exi-

mais peu élevé, noir & entouré d'une espece de couronne cendrée, sur le front & assez près de la bête du bec s'élevent quelques petites plumes très-déliées, qui ressemblent assez à des cheveux, & qui se trouvent mêlées, mais en petit nombre, avec les plumes noires du sommet de la tête. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les côtés sont presque tout couverts de plumes brunes. Quelques-uns ont la partie inférieure du dos & le croupion variés de quelques lignes blanchâtres ou rougeâtres, qui tendent vers le bas : d'autres ont le dos tout-à-fait cendré. La gorge & la partie inférieure du col tirent un peu vers le blanc, & sont semées d'assez grandes taches ou ferrugineuses, ou rougeâtres, ou même quelquefois noirâtres, parmi lesquelles se trouvent encore d'autres taches, mais beaucoup plus petites. La poitrine est de la même couleur, & variée vers le bas de quelques taches pareilles aux précédentes. Quelques-uns aussi ont la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine tout-à-fait noires. La partie intérieure des jambes est noirâtre. Les plumes de la queue sont cendrées, mais leur bout est noir & terminé de

blanc. Le bec est court, épais & noir; l'ouverture des narines fort étroite. Les yeux sont petits. Les pieds sont le plus souvent couleur de safran: quelques-uns cependant les ont d'un jaune de paille. Ils sont plus petits que ceux du *Faucon pelerin*. Les doigts sont grands & charnus; & les ongles très-noirs. Cet Oiseau après la mue a la tête noire; la partie supérieure du col & les petites couvertures du dessus des ailes noirâtres; & la partie inférieure du dos, vers le croupion, d'un cendré-bleuâtre. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont blanches dans quelques-uns; dans d'autres d'un rougeâtre obscur; & dans d'autres noirâtres: mais tous sont variés de taches rondes dans ces endroits. Les jambes sont couvertes de plumes brunes. La queue est assez courte & noire. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est d'un jaune de safran. Les ferres sont fortes. Il est à remarquer que plus cet Oiseau a mué de fois, plus la partie inférieure de son col blanchit, & est variée de plus petites taches; & le dos & les côtés deviennent d'un cendré-bleuâtre plus foncé.

Une variété de cette espece est

guos; pedes plerumque croceos: quibusdam tamen ex flavo paleari pallescunt. Pedes sunt quàm *Falconi peregrino* minores; digiti magni & carnosissimi; ungues nigerrimi. Mutati verò caput habent nigrum. Colli superior pars, alarumque tectrices superiores minores nigrescunt. Pars dorsi inferior versùs uropygium cinereo-cœrulescente tingitur. Guttur, collum inferius & pectus candent; in quibusdam verò obscurè rubescere conspiciuntur; in aliis nigricant: in omnibus autem maculis rotundis insigniuntur. Crura pennis vestiuntur fuscis. Cauda breviuscula est & nigra. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, crocea. Pedes validi. Advertendum verò quantò sapius pennas veteres exuerit, tantò collum inferius obtinere candidius, maculasque in illo evadere minores, & pennas illas, quæ dorsum ac latera tegunt, cinereo-cœrulescente intensius tingi.

Hujus speciei varietas est

A. LE FAUCON DE MONTAGNE CENDRÉ.

Falco montanus cinereus.

Falconis montani secundum genus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 479. hujus icon satis accurata pag. 480.

Falco montanus secundus Aldrovandi. Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. IX.

Falco montanus. Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIII.

Falco mixtus, montanus, cœruleus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 260.

Falco mixtus Schwenckfeldii. Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 378.

Les Allemands l'appellent ZWITTER-FALCK. Rzac. ZWITTER-FALCKE ; LIECHT-BLAVER BLAU-FUSZ ; ASCHERFARBENER BERG-FALCKE ; & quelques-uns, SPRINTZ-BLAW-FUSZ. Schwenck.

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & novem pollices æquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum & duorum pollicum. Rostrum breve est ; pedes graciles & longi ; cauda novem pollices longa. Alæ complicatæ ad mediam ferè caudam extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, alarum tectrices superiores & quæ caudam superne tegunt pennæ cineræ ad cœruleum vergentes, tectricibus alarum dilutioribus, dorso obscuriore, capite, collo & gutture dilutiùs obscuriùsve pro diversa partium ad lucem obversione. Pectus, venter,

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces. Il a quatre pieds deux pouces de vol. Son bec est court ; ses pieds sont grêles & allongés. Sa queue a neuf pouces de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré tirant sur le bleu ; cette couleur est plus claire sur les couvertures des aîles, & plus foncée sur le dos ; celle de la tête, de la gorge & du col paroît tantôt plus & tantôt moins foncée selon les différens jours auxquels elle est exposée. La poitrine, le ventre,

les côtés, les jambes & les ouvertures du dessous de la queue sont d'un blanc de neige. Les six premières plumes de l'aîle sont noires : toutes les autres sont cendrées, & terminées de noir ; & dans leur milieu elles ont une tache blanche, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La queue est composée de douze plumes, dont les huit du milieu sont d'un cendré clair ; & les quatre extérieures, savoir deux de chaque côté, sont blanches : & toutes sont marquées des deux côtés de taches triangulaires, brunes, placées auprès de leur tige. Sa tête est grosse, & son col fort épais ; son corps est menu & allongé. Au-dessus des yeux vers l'origine du bec s'élèvent de petites plumes semblables à des poils. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est d'un jaune, qui blanchit vers les yeux. La prunelle de l'œil est d'un noir tirant sur le bleu : le tour des yeux & leur iris sont jaunes. Le bec est noir. Les pieds sont jaunes ; & les ongles noirs & très-pointus.

latera, crura & caudæ rectrices inferiores nivei sunt candoris. Remiges sex primores nigrae sunt : sequentes omnes cinerae, in extremitatibus tantum nigrae, mediotenus secundum scapi longitudinem albae. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum octo intermediae dilute cinerae sunt ; exteriores quatuor, utroque latere binæ, candidæ ; omnes autem ad scapum utrinque maculis triangularibus, fuscis insigniuntur. Capite donatur & collo crassis ; corpore admodum gracili. Supra oculos juxta rostrum pennulae, ut pili, rigent. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea est, sed juxta oculos albet. Oculi pupilla ex nigro coerulea ; oculorum ambitus & irides luteae. Rostrum nigrum. Pedes lutei ; ungues verò nigri, acutissimi.

10. LE FAUCON DE LA BAYE DE HUDSON.

Accipiter superne cinereo-fuscus, infernè ex albo & saturatè fusco varius ; primâ remige exteriùs albicante maculatâ ; rectricibus subtus cinereis, albo transversim striatis ; pedibus cinereo-coerulescentibus.... FALCO Freti HUDSONIS.

Buze cendrée. *Edwards. Tom. II. pag. LIII ; avec une figure exacte Pl. 53.*

Craffitie Gallinam medio-crem circiter æquat. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices longum est. Alæ sunt acutissimæ ; complicatæ verò caudam extremam attingunt. Caput, guttur, partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ candidæ, maculæ saturatè fuscæ in medio donatæ : maculæ autem istæ in pectore majores sunt quàm in capite. Linea fusca, ab oris angulis orta, utrinque infra oculos propendit. Pars colli superior, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarumque tectrices superiores sunt cineræ ad fuscum vergentes : qui color in medio uniuscujusque pennæ saturatior est, marginibus sensim atque sensim dilutioribus. Caudæ tectrices superiores eodem imbuuntur cinereo ad fuscum vergente, & griseo transversim sunt striatæ. Pennæ saturatè fuscæ, maculis rotundis aut ovalibus, albis variegatæ, ventrem & latera vestiunt. Crura tegentes alben, maculisque longitudinalibus, fuscis, irregularibus varie-

Il est à peu près de la grosseur d'une *Poule moyenne*. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long. Ses ailes sont très-pointues ; & lorsqu'elles sont pliées, elles s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes blanches, qui ont chacune dans leur milieu une tache d'un brun foncé. Ces taches sont plus grandes sur la poitrine que sur la tête. Des coins de la bouche descend de chaque côté, sous les yeux, une ligne brune. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré tirant sur le brun : cette couleur est plus foncée vers le milieu de chaque plume, & les bords deviennent graduellement plus clairs. Les couvertures du dessus de la queue sont du même cendré tirant sur le brun, & rayées transversalement de gris. Le ventre & les côtés sont couverts de plumes d'un brun foncé, variées de taches blanches, rondes ou ovales. Celles qui couvrent les jam-

bes sont blanches, avec des taches longitudinales, brunes, assez irrégulières. Les couvertures du dessous de la queue sont rayées transversalement de blanc & de noir. Celles du dessous des aîles sont d'un brun sombre, marqué de taches blanches. Les plumes des aîles sont de la même couleur que le dos du côté extérieur, & leur côté intérieur est cendré. Les barbes extérieures de la première sont tachetées de blanchâtre; & les barbes intérieures des douze premières sont variées de blanc, cette couleur formant avec le cendré des espèces de dentelures, qui s'engrangent l'une dans l'autre. Les plumes de la queue sont en-dessus d'un cendré tirant sur le brun & rayé transversalement de gris, & en-dessous elles sont cendrées & variées de bandes transversales, blanches. Les plumes des jambes sont longues, & couvrent les pieds jusqu'à la moitié de leur longueur. L'iris des yeux est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est bleuâtre. Le bec est de la même couleur. Les pieds sont d'un cendré-bleuâtre; & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Baye de Hudson*, où il fait la chasse aux *Gelinotes blanches*.

gantur. Caudæ rectrices inferiores ex albo & nigro transversim sunt striatæ. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ obscurè fuscæ, maculis albis variæ. Remiges in latere exteriori dorso concolores, in latere verò interiori cinereæ. Primæ remigis pinnulæ exteriores albicantè maculatæ; & duodecim primarum remigum pinnulæ interiores albo variæ, albore & cinereo inter se quodammodo denticulatis. Rectrices superne sunt cinereæ ad fuscum vergentes & griseo transversim striatæ, subtus verò cinereæ, tæniis transversis, albis variæ. Crurum pennæ longiores sunt, & ad mediam usque pedis longitudinem extenduntur. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, cœrulescit. Rostrum eodem colore tingitur. Pedes sunt cinereo - cœrulescentes; ungues verò nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*. *Lagopodibus* infesta Avis.

II. LE FAUCON ÉTOILÉ.

Accipiter superne nigricans , maculis stellas referentibus res-
persus , internè ex albo & nigro varius ; pedibus cœruleis
 FALCO STELLARIS.

Accipiter leporarius , seu Accipiter cyanopus. Rzac. Hist. nat. Pol.
pag. 268.

Accipiter cyanopus seu Falco Hyacinthinus Alberti magni. Rzac. Aut.
Hist. nat. Pol. pag. 352.

Accipiter stellaris Eberi & Peuceri. Schwenck.

Falco cyanopus. Gesn. Avi. pag. 74 , in qua icon minùs accurata.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 495.

Jonst. Avi. pag. 19.

Falco cyanopos. Charlet. Exer. pag. 73. N°. II.

Charlet. Onomast. pag. 66. N°. II.

Falco cyanopus Schwenckfeldii , Jonstoni , Willughbeyi. Klein. Avi.
pag. 52. N°. 18.

Cyanopus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 256.

Avis phœbea. Schwenck.

Asp. Arist. Peuceri. Schwenck.

Les Italiens l'appellent ZAFIRO. Gesn. Aldrov.

Les Allemands , BLA-FUSZ. Gesn. Aldrov. BLAW-FUSZ. Schwenck. BLAU-
HABICHT. Rzac.

Les Illyriens , RAROH. Gesn. Aldrov.

Les Polonois , RAROG ; RAROG POLAK ; RAROG KRZECZOT. Rzac.

Les Anglois , BLEW-LEGGED FALCON. Charlet.

Falconi peregrino magni-
tudine æqualis & figurâ simi-
lis est. Alas tamen habet bre-
viores , & caudam aliquantul-
ùm longiorem ; corpus quo-
que oblongius. Dorsum ,
alarumque tectrices superio-
res nigricant , & maculis
quibusdam , stellas referen-
tibus , resperguntur. Totum
corpus internè ex albo & ni-
gro variegatur. Remiges &

Il ressemble au Faucon péle-
 rin pour la taille & la figure. Il
 a cependant les aîles plus cour-
 tes que lui , & la queue un peu
 plus longue : son corps est aussi
 plus allongé. Le dos & les cou-
 vertures du dessus des aîles
 sont noirâtres , & parsemées de
 quelques taches en forme d'é-
 toiles. Tout le dessous du corps
 est varié de noir & de blanc.
 Les plumes des aîles & celles

de la queue sont noirâtres. Les yeux sont très-brillants ; leur iris est couleur d'or ; & leur prunelle est noire. Les pieds sont grands & gros , & d'un bleu d'azur. Il fait son nid sur les arbres les plus élevés des montagnes.

rectrices nigricant. Oculi pellucidi sunt ; ipforum irides aureæ ; pupilla nigra. Pedes magni sunt ac crassi, cœrulei seu azurini. Arboribus excelsis montium nidificat.

12. LE FAUCON HUPE DES INDES.

Accipiter cirratus ; superne nigricans , infernè ex albo & nigro transversim striatus ; collo fulvo ; rectricibus areolis alternatim cinereis & nigris transversim striatis *FALCO INDICUS CRISTATUS*.

Falco Indicus cirratus. Willugh. Ornith. pag. 48.
Raj. Syn. Avi. pag. 14. N^o. 12.

Il est presque aussi gros que l'*Autour*. Sa tête est aplatie : le plumage en est noir , & orné d'une hupe de la même couleur , fourchue , & qui pend en-arrière de l'occiput. Le col est fauve. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes , celles du dessus & du dessous de la queue & les jambes sont noirâtres. La poitrine & le ventre sont variés de lignes transversales , très-brillantes , alternativement blanches & noires. Les grandes plumes des ailes sont noirâtres : les moyennes sont de la même couleur , mais leurs bords sont blanchâtres. Les plumes de la queue sont rayées

Magnitudine ad *Asturem* accedit. Caput ei planum est , nigrum , cirratum , cristâ quoque nigrâ , bifidâ , ab occipite retro dependente. Collum fulvum. Dorsum , uropygium , scapulares pennæ , quæ alas superne tegunt , caudæ rectrices superiores & inferiores & crura nigricant. Pectus & venter lineis transversis , perquam lucidis & pulchris , alternatim albis & nigris variegantur. Remiges majores nigricant : minores eodem imbuuntur colore , fimbriis ipsarum albicantibus. Rectrices areolis alternatim cinereis & nigris transversim sunt

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 361

striatæ. Pedes plumis vestiuntur ad digitos usque. Oculorum irides flavent. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum obscurè cœruleum & propemodum nigrum, præcipuè versùs apicem. Digiti lutei; ungues verò nigerriimi. Habitat in India Orientali.

de bandes transversales, alternativement noires & cendrées. Les pieds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine des doigts. L'iris des yeux est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est de la même couleur. Le bec est d'un bleu sombre & presque noir, sur-tout vers son bout. Les doigts sont jaunes; & les ongles d'un fort beau noir. On le trouve aux *Indes Orientales*.

13. LE FAUCON DES ANTILLES.

Accipiter in toto corpore fuscus FALCO ANTILLARUM.

Mansfeny. Raj. Syn. Avi. pag. 19. N°. 1.

Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 252.

On l'appelle aux Antilles MANSFENY. Du Tertre.

Magnitudine *Falconem nostratem* non multum antecellit; sed pedibus, unguibusque duplo majoribus & validioribus donatur. In toto corpore fuscus est. Venatur *Turdos, Cinclos, Columbas & Turtures. Serpentibus quoque & Lacertis* victitat. In *Antillarum Insulis* habitat.

Il n'est guères plus gros que notre *Faucon*; mais il a les serres deux fois plus grandes & plus fortes. Il est brun par tout le corps. Il fait la chasse aux *Grives*, aux *Alouettes-de-mer*, aux *Pigeons & Tourterelles*. Il vit aussi de *Serpens* & de *Lezards*. On le trouve aux *Isles Antilles*.

14. LE FAUCON PESCHEUR DES ANTILLES.

Accipiter fuscus; capitis vertice nigro; ventre albo

FALCO PISCATOR ANTILLARUM.

Pêcheur. Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 253.

Raj. Syn. Avi. pag. 19. N°. 2.

Il est de la grosseur du précédent ; mais il a les serres un peu plus petites. Il est brun par tout le corps , excepté les plumes du sommet de la tête , qui sont noires , & celles du ventre , qui sont blanches. Il se nourrit uniquement de *Poiss-sons*. On le trouve aux *Iles Antilles*.

Præcedentem crassitie adæquat ; sed pedibus , unguibusque paulò minoribus præditus est. Per universum corpus fuscescit , exceptis capit-
tis vertice nigro , & ventre albo. *Piscibus* tantum victi-
tat. Habitat in *Antillarum Insulis*.

15. LE FAUCON PESCHEUR DE LA CAROLINE.

Accipiter superne saturatè fuscus , infernè albus ; vertice fusco , albo variegato ; pedibus pallidè cœruleis
FALCO PISCATOR CAROLINIENSIS.

Falco piscator Cyanopus. *Klein. Avi. pag. 52. N° 19.*

Faucon Pescheur. *Catesb. Tom. I. pag. 2 ; avec une figure exacte Pl. 1.*
Les Anglois l'appellent FISHING-HAWK. Catesb.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Autour* ; mais il a le corps plus allongé. Il a cinq pieds cinq pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Le sommet de la tête est brun , avec un mélange de plumes blanches. Il y a de chaque côté du col une bande brune , qui commence au-dessous de l'œil , & qui s'étend jusque sur le dos. Tout le dessus du corps , savoir le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les ouvertures du dessus des aîles , & celles du dessus de la queue ,

Crassitie *Asturem* adæquat ; corpus tamen habet oblongius. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum & totidem pollicum ; alæ verò complicatæ ultra caudam extremam paululùm extenduntur. Vertex capitis fuscescit , plumis albis admixtis. In utroque colli latere tænia est fusca , infra oculos orta , & ad dorsum usque protensa. Totum corpus superius , dorsum scilicet , uropygium , scapulares pennæ , quæ alas superne tegunt & tectrices caudæ superiores , saturatè fuscescit.

fufcefcit. Guttur, collum, pectus, ventrem, latera & crura veftiunt pennæ albæ: tectrices caudæ inferiores concolores. Remiges & rectrices, ficut dorfum, faturatè fufcæ. Pennæ crura tegentes admodum breves funt, & cuti arctè adhærent. Oculorum irides flavent. Cutis nuda five membrana, bafin roftri cooperiens, cœrulea; roftrum verò nigrum. Pedes funt pallidè cœrulei: ungues nigri, omnes longitudine ferè æquales, extra aliorum *Falconum* modum. *Pifcibus* tantum victitat. Habitat in fluviorum oftiiis & parvulis Fretis maritimis. eft d'un brun foncé. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du deffous de la queue font blanches. Les plumes des aîles & celles de la queue font du même brun que celui du dos. Les plumes des jambes font courtes, & s'appliquent étroitement fur la peau. L'iris des yeux eft jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la bafe du bec, eft bleue; & le bec eft noir. Les pieds font d'un bleu pâle; & les ongles font noirs, & tous prefque d'une égale grandeur, ce qui ne fe trouve pas dans les autres efpeces de *Faucons*. Il ne fe nourrit que de *Poiffons*. On le trouve vers l'embouchure des rivières, & fur les petites Bayes de la mer.

16. LE LANIER.

Accipiter fupernè fufco-ferrugineus, infernè albus, maculis longitudinalibus nigris variis; taniâ fupra oculos albâ; alis maculis rotundis albis fubtus variegatis; pedibus cœruleis LANARIUS.

Falco pedibus roftroque cœruleis, maculis albis nigrisque longitudinalibus. *Faun. Suec. Linn. N°. 61.*

Falco Lanarius, crudelis. *Klein. Avi. pag. 48. N°. 5.*

Lanarius. *Gefn. Avi. pag. 76.*

Willugh. Ornith. pag. 48.

Raj. Syn. Avi. pag. 15. N°. 13.

Linn. Syft. nat. ed. 6. Gen. 36. fp. 9.

Lanarius Gallorum. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 488.*

Jonft. Avi. pag. 18.

Lanier. *Bel. Hift. nat. des Oif. pag. 123.*

Petit Lanier. *Alb. Tom. II. pag. 4; avec une figure mal coloriée Pl. 7.*

Les François appellent le mâle LANERET. Bel. Aldrov.

Les Italiens l'appellent LANIERO. Gesn. Aldrov. Ils appellent le mâle

TERZOLO LANIERO. Gesn.

Les Savoyards, LANOY. Gesn.

Les Allemands, LANETE; SWEMERE: & d'autres, SCHMEYMER. Gesn.

Les Anglois, LANNAR. Ils appellent le mâle, LANNERET. Willugh. Raj-Alb.

Il est un peu plus petit que le *Faucon gentil*. Il a le col court & épais, le bec court & la queue assez longue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures des ailes & celles du dessous de la queue sont d'un brun ferrugineux & sans taches, ou s'il s'en trouve quelques-unes, elles sont fort petites, rondes & blanches. Au-dessus de chaque œil est une bande blanche: ces deux bandes se réunissent sur le front, & entourent le devant de la tête. Tout le dessous du corps, sçavoir la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue, est blanc, & varié de taches longitudinales, noires, qui s'étendent le long des bords de chaque plume. Les grandes plumes de l'aile sont noires: les moyennes sont de la couleur du dos: mais lorsque les ailes sont étendues, & qu'on les regarde par-dessous, elles paroîs-

Falconi gentili paululum crassitie cedit. Collum habet breve & crassum, rostrum breve, & caudam longiusculam. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarum tectrices, quæque caudam superne tegunt sunt fusco-ferrugineæ & immaculatæ, aut si quædam sint maculæ, admodum exiguæ sunt, rotundæ, candidæ. Supra utrumque oculum tænia est alba, quæ binæ tæniæ in fronte inter se connectuntur, & partem capitis anteriorem cingunt. In universo corpore inferiore, gutture scilicet, inferiore colli parte, pectore, ventre, lateribus, cruribus & tectricibus caudæ inferioribus, albet, & maculis variegatur longitudinalibus, nigris, secundum uniuscujusque pennæ fimbrias extensis. Remiges majores nigrae: minores dorso concolores; alæ verò extensæ, si subtus inspiciantur, maculis rotundis, albis

asperſæ apparent. Oculi ſunt patuli ; ipſorumque irides flavæ. Cutis nuda ſive membrana, baſin roſtrici cooperiens, lutea. Roſtrum, pedesque cœrulei ; ungues verò nigri. Pedibus donatur brevioribus quàm reliquæ hujus generis Aves.

Mas ſæminâ minor eſt ; colore verò pennarum cum ea ferè convenit. In arboribus ſylvarum altioribus & rupibus excelsis nidificat.

ſent toutes parſemées de taches blanches & rondes. Les yeux ſont grands ; & leur iris eſt jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la bâſe du bec, eſt de la même couleur. Le bec & les pieds ſont bleus ; & les ongles noirs. Ses pieds ſont plus courts que ceux des autres eſpeces de ce genre.

Le mâle eſt plus petit que la femelle ; mais il lui reſſemble aſſez par la couleur de ſon plumage. Il fait ſon nid ſur les grands arbres des forêts & ſur les rochers élevés.

** 17. LE LANIER CENDRÉ.

Accipiter cinereus ; ventre albo , pennis in medio rufo notatis ; rectricibus lateralibus interiùs fulco tranſverſim ſtriat. LANARIUS CINEREUS.

Laniarius cinereus , ſive *Falco cinereo-albus*. *Friſch. hujus icon accurata Tab. 79.*

Pygargus , Genus alterum *Bellonii. Jonſt. Avi. pag. 4.*

Pygargi tertium genus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 208.

Autre Oiſeau *St. Martin. Bel. Hiſt. nat. des Oif. pag. 104.*

Faucon bleu. *Edwards. Glanur. pag. 33. Chap. XV ; avec une figure exacte Pl. 225.*

Les Allemands l'appellent GRAU WEISSE GEYER ; GRAU WEISSE FALCK. *Friſch.*

Les Anglois , BLUE HAWK. *Edwards.*

Crasſitie *Lanarium* circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem quinque pollices & ſex lineas explet , & ad extremos ungues

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Lanier*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dixſept pouces ſix lignes , & juſqu'à celui des ongles de douze

pouces six lignes. Son bec depuis le crochet jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; sa queue neuf pouces ; son pied deux pouces six lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures des aîles, & la poitrine sont cendrées, avec quelques taches brunes sur les petites couvertures de l'aîle. Les plumes qui couvrent le ventre, les côtés, les jambes & le dessous de la queue sont blanches, & marquées de roux dans leur milieu. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les moyennes sont cendrées, & rayées transversalement de noirâtre, & leurs barbes intérieures sont terminées de blanc. Les deux plumes du milieu de la queue sont d'un cendré-brun : les trois latérales qui les suivent de chaque côté sont cendrées, & leurs barbes intérieures sont marquées de bandes transversales, brunes : & les deux plus extérieures de chaque côté ont leurs barbes extérieures d'un cendré clair,

duodecim pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos undecim lineas longum est ; cauda novem pollices ; pes duos pollices & sex lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, collum, dorsum, uropygium, alarum tectrices & pectus cinerascunt, minoribus alarum tectricibus maculis quibusdam fuscis variegatis. Pennæ ventrem, latera & crura tegentes, tectricesque caudæ inferiores albæ, in medio rufæ notatæ. Remiges majores nigrae sunt : minores cinerae, nigricante transversim striatæ, pinnulis interioribus albo terminatis. Rectrices binæ intermediae ex cinereo fuscescunt : laterales tres utrinque sequentes sunt cinerae, taniis transversis, fuscis in latere interiore variegatæ : binæ utrinque extremae in latere exteriori dilutè cinerae, in interiore verò albæ, taniis transversis, fusco-rufescentibus notatæ. Rostrum ex cinereo coerulescit. Pedes

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 367

sunt lutei; ungues verò nigri. *Ex museo Realmuriano.* & les intérieures blanches & marquées de bandes transversales, d'un brun-roux. Le bec est d'un cendré-bleu. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Hujus speciei Aves, à *Frischio* & *Edwardo* descriptæ & pictæ, ab ista discrepant pectore & uropygio albis, & pennis ventrem, latera & crura tegentibus, sicut & tectricibus caudæ inferioribus, maculis rufis destitutis.

Avis ab *Edwardo* descriptæ remiges majores apicibus donantur albis.

Ceux de *Frisch* & d'*Edwards* différent de celui que je viens de décrire, en ce qu'ils ont la poitrine & le croupion blancs, & que les plumes du ventre, des côtés & des jambes, & les couvertures du dessous de la queue ne sont pas marquées de roux.

Celui d'*Edwards* a les grandes plumes de l'aîle terminées de blanc.

18. LE LANIER BLANC.

Accipiter superne ex cinereo-albo ad subfuscum vergens, infernè ex cinereo albicans; maculâ rostrum inter & oculos nigrâ; remigibus nigricantibus LANARIUS ALBICANS.

Lanarius. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 380. hujus icones non satis accuratæ pag. 381 & 382.*

Jonst. Avi. pag. 12. hujus icones ab Aldrovando mutuatæ Tab. IX.

Milvus albus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 304.*

Milvus albus *Schwenckfeldii*, seu *Milvus major candicans*; *Lanarius albus Aldrovandi.* *Rzac. Auç. Hist. nat. Pol. pag. 395.*

Milvus albicans. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.*

Les Italiens l'appellent LANIERO. *Aldrov.*

Les Allemands, SWEMERE; SCHWEIMMEN; & quelques-uns, LANETE. *Aldrov. WEISSER HEUNER AHR. Schwenck. Rzac. GRAVER MEUSE AHR. Schwenck.*

Les Polonois, KANIA BIALA. *Rzac.*

Duorum descriptiones exhibet *Aldrovandus*; isti autem non nisi varietates mihi

Aldrovande en décrit deux; qui ne me paroissent être autre chose qu'une variété l'un de

l'autre. Le premier tient le milieu pour la grandeur entre l'*E-pervier* & l'*Autour*. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est d'un pied sept pouces six lignes. Il a le sommet de la tête large ; la tête grosse & le col fort épais. Son bec a un pouce d'épaisseur. Son pied est mince & très-délié, & a environ huit pouces de longueur depuis le talon jusqu'aux ongles. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce de distance du bout de la queue. La tête, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & le croupion sont gris-blancs. Il y a une tache noire de chaque côté de la tête entre le bec & le grand angle de l'œil. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-blanc, qui tire sur le brunâtre. Les plumes des aîles sont tout-à-fait brunes, & même presque noires. Ses aîles sont très-pointues & assez longues. Les plumes de la queue sont en-dessus de la couleur du dos, & en-dessous elles sont d'un gris-blanc. La prunelle de l'œil est noire, & l'iris en est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête

videntur. Primus magnitudine *Accipitrem* inter & *As-turem* medium locum obtinet. A summo capite ad extremam caudam unius pedis & septem cum semi pollicum longitudinem explet. Capitis vertice est lato ; capite, colloque crassis. Rostrum crassitie pollicem æquat. Pes valdè gracilis est, & à calcaneo ad ungues usque octo circiter pollices longus. Alæ complicatæ ad caudæ extremitatem, excepto tantum unius pollicis intervallo, protenduntur. Caput, collum, pectus, venter, latera, crura, caudæ tectrices inferiores & uropygium ex cinereo albicant. Rostrum inter & oculi cantum majorem macula est nigra. Dorsum, scapulares pennæ, alarumque tectrices superiores ex cinereo-albo ad subfuscum vergunt. Remiges prorsus fuscescunt, ac penè nigre sunt. Alas habet admodum acutas, oblongas. Rectrices superne dorso colores, infernè ex cinereo albicantes. Pupilla oculorum nigra, ipsorum verò irides flavæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum ni-

grum, sicut & ungues; pedes verò lutei.

Secundus ab apice rostri ad caudæ extremitatem usque duos pedes & unum pollicem longus est. Caput & totum dorsum colore sunt fusco, cui nonnihil leucophæi admixtum est. Uropygium totum candicat. Alarum tectrices superiores leucophææ. Pectus quoque leucophæum. Venter, latera, crura & caudæ tectrices inferiores concolores, maculis longitudinalibus, ferrugineis distinctæ. Remiges tres extremæ ferrugineæ, parte tamen interiore albæ sunt: tres sequentes omnino nigra, in extremitatibus aliquantulum albicant: à septima ad duodecimam usque inclusivè albicant; ex istis autem primæ quatuor fusco, reliquæ duæ atro colore transversim maculantur: decima-tertia & decima-quarta castanæ: decima-quinta & decima-sexta concolores, sed atro colore transversim notatæ: tres denique corpori finitimæ castanæ. Duodecim rectricibus cauda constat: tres utrinque extimæ albæ, ma-

du bec, est de cette dernière couleur. Le bec & les ongles sont noirs; & les pieds jaunes.

Le second a deux pieds un pouce de longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue. La tête & tout le dos sont d'un brun mêlé d'un peu de gris. Le croupion est blanc. Les couvertures du dessus des ailes sont grises, ainsi que la poitrine. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, variée de taches longitudinales, ferrugineuses. Les trois premières plumes de l'aile sont ferrugineuses, excepté leur côté intérieur, qui est blanc: les trois suivantes sont noires & terminées d'un peu de blanc. Les six autres, sçavoir depuis la septième jusqu'à la douzième inclusivement, sont blanches; mais les quatre premières de celles-ci sont variées de taches transversales, brunes, & les deux autres de taches transversales, noires: les treizième & quatorzième sont marron: la quinzième & la seizième sont de la même couleur, & rayées transversalement de noir: enfin les trois plus proches du corps sont marron. La queue est composée de douze plumes: les

trois plus extérieures de chaque côté sont blanches, & variées de taches d'un ferrugineux clair : la quatrième est marquée de taches noires : la cinquième est variée de brun & de ferrugineux : & les deux du milieu sont grises. L'iris des yeux est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est de la même couleur. Le bec est noir. Les pieds sont jaunes ; & les ongles noirs, longs & très-crochus.

culis ferrugineis, dilutis insignita : quarta nigro maculata : quinta fusco & ferrugineo distincta : binæ tandem intermediæ leucophææ. Oculorum irides luteæ sunt. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, quoque lutea. Rostrum nigrum. Pedes flavi ; ungues verò nigri, longi, admodum recurvi.

** 19. LE GERFAULT.

Voyez Pl. XXX. Fig. 2.

Accipiter albus, maculis fuscis superne varius ; rectricibus albis, lateralibus exterius fusco maculatis ; rostro pedibusque ex dilutè cinereo cœrulescentibus GYRFALCO.

Gyrfalco. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 471. hujus icon satis accurata pag. 473.*

Jonst. Avi. pag. 17. hujus icon non satis accurata Tab. XIII ; & insuper alia icon à Bellonio mutuata Tab. IV, sub titulo, Morphnos Bellonii.

Willugh. Ornith. pag. 44. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VIII.

Charlet. Exer. pag. 73. N°. 3.

Charlet. Onomast. pag. 65. N°. 3.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 14.

Raj. Syn. Avi. pag. 13. N°. 3.

Gyrfalco Aldrovandi ; Gyrofalco Alberti ; Hierofalco Jovii & Miechovitæ. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 382.*

Hierofalcho. *Gesn. Avi. pag. 67.*

Hierofalco Paulo Jovio ; Gyrofalco Alberto. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 299.*

Falco medius. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 259.*

Falco rapax. *Klein. Avi. pag. 48. N°. 1.*

Morphnos

Morphnos Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 212, in qua icon à Belonio mutuata.*

Gerfault. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 94; avec une figure peu exacte pag. 95.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 12 b, dans laquelle est la même figure.

Faucon d'Islande. *Anderf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 80.*

Les Italiens l'appellent ZERIFALCO. *Gesn. GIROFALCO; GIRIFALCO. Aldrov. GIRFALCO; AGUILASTRO. Bel.*

Les Allemands, GROSSER-FALCK; GIER-FALCK. *Gesn. Aldrov. GER-FALCK. Gesn. Schwenck. Aldrov. GYR-FALCK. Rzac. REGER-FALCK; MITTEL-FALCKE. Schwenck.*

Les Silésiens, GIER-FALCK. *Schwenck.*

Les Polonois, BYALAZOR. *Gesn. Aldrov. BIALAZOR. Rzac.*

Les Moscovites, KRETZET. *Gesn. Aldrov. KICZOT. Rzac.*

Les Anglois, GYR-FALCON. *Charlet. GER-FALCON. Sibbald. JER-FALCON: ils appellent le mâle, JERKIN. Willugh. Raj.*

*Astur*em crassitie circiter æquat. Ipsi^{us} longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem & octo pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda novem pollices; pes duos pollices & totidem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partem

Il est à peu près de la grosseur de l'*Autour*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; la queue neuf pouces; son pied deux pouces deux lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a quatre pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un blanc-jau-

nâtre, & qui ont chacune une ligne brune, fort étroite, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont blanches, & variées de taches brunes, excepté les grandes couvertures des aîles, qui sont variées de taches d'un brun-noirâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches & sans taches, excepté le ventre & la partie extérieure des jambes, où il y a quelques taches brunes, mais très-petites & très-rare. Les couvertures du dessous des aîles sont aussi blanches: les plus grandes sont terminées de brun; & quelques-unes des petites ont vers leur bout une petite ligne longitudinale, brune, très-étroite. Les plumes des aîles sont blanches, & variées, du côté extérieur seulement, de taches d'un brun-noirâtre: chacune des grandes plumes a cependant vers son bout une grande tache noirâtre, qui s'étend sur le côté intérieur comme sur l'extérieur. La queue est composée de douze plumes blanches; & les côtés intérieur &

capitis superiorem vestiunt pennæ albo-flavescentes, lineolâ strictissimâ, fuscâ, secundum scapi longitudinem extensâ, præditæ. Pars colli superior, dorsum, uropygium, rectrices alarum superiores & pennæ caudam superne regentes albescent, maculisque fuscis variegantur, si tamen excipias majores alarum rectrices, quas maculæ fusco-nigricantes variegant. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & caudæ rectrices inferiores albæ, immaculatæ, exceptis tamen ventre & exteriori crurum parte, maculis quibusdam fuscis, sed perexiguïs & rarissimis, variis. Alarum rectrices inferiores quoque albæ sunt: majores verò fusco-terminantur; & minorum quædam lineolâ longitudinali, fuscâ, strictissimâ versus apicem donantur. Remiges albæ, in latere exteriori tantum maculis fusco-nigricantibus variæ: majores tamen remiges majusculâ maculâ nigricante, in latere interiori, sicut in exteriori, extensâ, versus apicem notantur. Cauda constat duodecim rectricibus albis: binæ intermediae in latere inte-

LES OISEAUX, *Classe III, Ordre III.* 733

riore & latere exteriore, laterales verò in latere exteriore tantum maculis fuscis variegantur. Oculorum ambitus cœruleus : ipsorum irides concolores. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, ex dilutè cinereo cœrulescit. Rostrum eodem colore tingitur, excepto unco plumbeo, ad nigrum paululum vergente. Pedes sunt ex dilutè cinereo cœrulescentes ; ungues verò plumbei. Habitat in *Islandia*, variisque septentrionalibus regionibus. Ex museo D. Aubry.

extérieur des deux du milieu & le côté extérieur seulement de toutes les latérales sont variés de taches brunes. Le tour des yeux est bleu, ainsi que l'iris. La membrane, qui couvre la bête du bec, est d'un cendré clair & bleuâtre. Le bec est de la même couleur, excepté son crochet, qui est d'un plombé tirant un peu sur le noir. Les pieds sont d'un cendré clair & bleuâtre ; & les ongles plombés. On le trouve en *Islande* & dans différens pays du nord. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

Hujus speciei varietas est

Une variété de cette espece est

** A. LE GERFAULT D'ISLANDE.

Voyez Pl. XXXI.

Gyrfalco Islandicus.

Craffitie præcedentem adæquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsis unco ad oris angulos octodecim lineas longum est ; cauda octo pollices & novem lineas ; pes duos polli-

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long ; sa queue huit pouces neuf lignes ; son pied deux pouces cinq lignes ; & le milieu des

trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces quatre lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a trois pieds onze pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La tête est couverte de plumes brunes, bordées de chaque côté de blanc-roussâtre. Celles qui couvrent les parties supérieures du col & du dos, & les couvertures du dessus des aîles sont brunes, & variées des deux côtés de petites taches transversales, blanchâtres. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré-brun, rayé transversalement de gris-blanc. La gorge est d'un blanc sale & roussâtre. La partie inférieure du col est de la même couleur, & chaque plume a dans son milieu une bande brune, qui s'étend selon la longueur de sa tige. La poitrine, le ventre & les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & variées de taches noirâtres. Les côtés & les jambes sont rayées transversalement de blanc & de noirâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches,

ces cum quinque lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & quatuor lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & undecim pollicum ; alæ verò complicatæ paulò ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput vestiunt pennæ fuscæ, utroque margine albo-rufescente. Quæ partes colli & dorsi superiores cooperiunt, alarumque superiores teatrices fuscæ sunt, & in utroque latere exiguis maculis transversis, albidis variegantur. Pars dorsi inferior, uropygium & teatrices caudæ superiores ex cinereo fuscescunt, & tæniis transversis, cinereo-albis sunt striatæ. Guttur ex sordidè albo rufescit. Pars colli inferior concolor, unaquæque tamen penna in medio tæniâ fuscâ, secundùm scapi longitudinem extensâ, donatur. Pectus, venter & teatrices alarum inferiores alben, maculisque nigricantibus variegantur. Latera & crura ex albo & nigricante transversim sunt striata. Teatrices

caudæ inferiores albæ, tæniis transversis, fuscis variæ. Remiges majores fuscæ, tæniis transversis, ex albo- & fusco variis, in latere interiore tantum striatæ: remiges minores & scapulares pennæ ex fusco ad cinereum inclinant, tæniisque transversis, cinereo-albis variegantur. Duodecim rectricibus cauda constat; quæ rectrices sunt cinereo-fuscæ, tæniisque transversis, cinereo-albis, minutissimis maculis fuscis variis, striatæ: quæque etiam rectrix in albescentem colorem desinit. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, cœrulescit. Rostrum cinereo-cœrulescens, excepto unco nigricante. Pedes flavi; ungues verò nigri. Habitat in Islandia. Ex museo D. de Bandeville.

& variées de bandes transversales, brunes. Les grandes plumes des ailes sont brunes, & rayées du côté intérieur seulement de bandes transversales, variées de blanc & de brun: les moyennes & les plumes scapulaires sont d'un brun tirant sur le cendré, & rayées transversalement de gris-blanc. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun, rayées de bandes transversales, d'un gris-blanc, varié de très-petites taches brunes: & chaque plume est terminée de blanchâtre. L'iris des yeux est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est bleuâtre. Le bec est d'un cendré-bleuâtre, excepté son crochet, qui est noirâtre. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs. On le trouve en Islande. Du cabinet de Madame de Bandeville.

** 20. LE HOBREAU.

Accipiter superne fuscus, infernè albus, maculis longitudinalibus fuscis variis; imo ventre, cruribusque rufis; rectricibus griseo-fuscis, lateralibus interiùs rufo transversim striatis DENDRO-FALCO.

Falco pedibus, cerâ, palpebrisque flavis, capite fusco, nuchâ albâ, abdomine albicante maculis oblongis. *Faun. Suec. Linn. N°. 64.*
Falco ad rufum inclinans. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. III. sp. 2.*
Falco arborarius. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 491.*

- Jonst. Avi. pag. 19. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. X, sub titulo, Dendro-Falcus.*
Charlet. Exer. pag. 73. N°. 9.
Charlet. Onomazt. pag. 66. N°. 9.
Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 378.
Falco arborarius Alberto ; Dendro-Falcus Gesnero. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 280.
Dendro-Falcus. Gesn. Avi. pag. 75, in qua icon non satis accurata. Gesn. icon. Avi. pag. 11, in qua eadem icon.
Dendro-Falco. Raj. Syn. Avi. pag. 14. N°. 8.
Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 11.
Dendro-Falco, sive Falco arborarius. Willugh. Ornith. pag. 47.
Dendro-Falco, sive Smerlus. Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 87.
Subbuteo. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 373. hujus icon minimè accurata pag. 374.
Willugh. Ornith. pag. 49. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VII.
Subbuteo, sive Hypotriorchis. Jonst. Avi. pag. 12. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. IX.
Charlet. Exer. pag. 72. N°. 10.
Charlet. Onomazt. pag. 65. N°. 10.
Subbuteo Bellonii & Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 15. N°. A. 14.
Hobereau. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 118 ; avec une mauvaise figure pag. 119.
Bel. Portr. d'Ois. pag. 18 b, dans laquelle est la même figure.
Hobereau. Alb. Tom. I. pag. 7 ; avec une figure mal coloriée Pl. 6.
Les Grecs l'appellent ἰεραετης. Bel. Aldrov. ἰεραετης. Bel. Willugh.
Les Catalans, FALCO ; TAGAROT ; XUIGUER. Barr.
Les Boulonnois, BARELLO. Aldrov.
Les Allemands, BAUM-FALCK. Gesn. Aldrov. Rzac. Frisch. Ils appellent le mâle, BAUM-FAELCKLE. Gesn. Aldrov.
Les Polonois, SOKOL DRZEWNY. Rzac.
Les Anglois, HOBBY. Willugh. Raj. Alb. TREE FALCON ; LESSER BUZZARD. Charlet.

Il est à peu près de la grosseur de l'Épervier. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bou-

Crassitie Accipitrem circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duodecim est pollicum, & ad extremos ungues decem pollicum & trium linearum. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos novem

lineas longum est; cauda quatuor pollices cum novem lineis; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Alæ complicatæ paululùm ultra caudam extremam protrahuntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes sunt fuscæ. In utroque capitis latere exigua est tænia sordidè alba, in exortu rostri orta, & supra oculos ducta; & infra oculos macula est longitudinalis, fusca. In parte colli superiore aliquid albi admiscetur. Guttur & pars colli inferior albicant. Pectus, venter supremus & latera eodem imbuuntur colore, & maculis variegantur longitudinalibus, fuscis, latiusculis, uniuscujusque pennæ medium occupantibus. Venter imus, crura & tectrices caudæ inferiores rufæ. Pennæ alas infernè regentes albæ, maculis fuscis variæ. Remiges sunt fuscæ, in latere interiore tæniis transversis, rufis variegatæ. Rectrices griseo-fuscæ, laterali-

che a neuf lignes de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied quatorze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est encore davantage. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont brunes. Il y a de chaque côté de la tête une petite bande d'un blanc sale, qui commence à l'origine du bec, & passe par-dessus les yeux; & au-dessous des yeux est une tache longitudinale, brune. Il y a aussi un peu de blanc à la partie supérieure du col. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont de la même couleur, avec des taches longitudinales, brunes, assez larges, & qui occupent le milieu de chaque plume. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont rouffes. Les couvertures du dessous de l'aile sont blanches, & variées de taches brunes. Les plumes de l'aile sont brunes; &

leur côté intérieur est rayé de bandes transversales, rouffes. Celles de la queue sont d'un gris-brun; & toutes les latérales ont de même leur côté intérieur rayé transversalement de roux. L'iris des yeux & les pieds sont jaunes. Le bec est bleuâtre; & les ongles sont noirs. Il fait son nid dans les arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

bus omnibus interiùs rufo transversim striatis. Oculorum irides luteæ. Pedes concolores. Rostrum cœrulefcens; ungues verò nigri. Arboribus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

21. L'EPERVIER DE LA CAROLINE.

Accipiter superne fuscus, infernè albus, fusco admixto; remigibus interiùs rubescence maculatis; rectricibus taniis quatuor transversis, albis præditis ACCIPITER CAROLINIENSIS.

Falco Caroliniensis Palumbarius. *Klein. Avi. pag. 51. N°. 17.*

Epervier à Pigeons. *Catesb. Tom. I. pag. 3; avec une figure exacte Pl. 3.*

Les Anglois l'appellent PIGEON-HAWK. *Catesb.*

Il a le corps plus mince que l'*Epervier ordinaire*. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont brunes. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches, & mêlées de quelques plumes brunes. Les jambes sont couvertes de longues plumes blanches, mêlées d'une légère teinte de rouge, & variées de ta-

Corpore donatur graciliori quàm *Accipiter vulgaris*. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ alas superne cooperiunt, tectricesque caudæ superiores fusca sunt. Guttur, colli inferior pars, pectus, venter, latera & tectrices caudæ inferiores albæ, pennis quibusdam fuscis admixtis. Crura vestiunt pennæ longiores, albæ, aliquâ rubedinis tincturâ mixtæ, maculisque longitudinalibus, fuscis variæ.

Pennæ

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 379

Pennæ autem istæ ad exortum usque digitorum, excepto sex linearum intervallo, protenduntur. Remiges sunt fuscæ, majusculis maculis rubescentibus in latere interiore variæ. Rectrices quoque fuscæ, tæniis quatuor transversis, albis præditæ. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, concolor. Rostrum in exortu albicat, versùs unum nigricat. Pedes sunt flavi. Habitat in *Carolina*.

ches longitudinales, brunes. Ces plumes s'étendent jusqu'à un demi-pouce de l'origine des doigts. Les plumes des ailes sont brunes, & leur côté intérieur est varié de grandes taches rougeâtres. Celles de la queue sont aussi brunes, & rayées de quatre bandes transversales, blanches. L'iris des yeux est jaune, ainsi que la peau nue ou membrane, qui couvrent la base du bec. Le bec est blanchâtre à son origine, & noir vers son crochet. Les pieds sont jaunes. On le trouve à *la Caroline*.

** 22. L'EPERVIER DES ALOUETTES.

Accipiter superne rufus, fusco transversim striatus, infernè rufescens, maculis longitudinalibus fuscis variis; rectricibus griseo-rufescentibus fusco transversim striatis, apice nigricantibus, albo terminatis ACCIPITER ALAUDARIUS.

Accipiter Nifus, Alaudarius. Charlet. Exer. pag. 72. N° 7.

Charlet. Onomast. pag. 64. N° 7.

Falco varius, pictus, Alaudarum. Klein. Avi. pag. 49. N° 9.

Falco rufus. Frisch. hujus icon accurata Tab. 88.

Falco murorum, ruderum, turrium. Klein. Avi. pag. 49. N° 8.

Falconellus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 261.

Falconellus feriens, seu Falco parvus Schwenckfeldii. Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 378.

Les Allemands l'appellent MAUSE-FALCK. Frisch. KLEINER-FALCK. Rzac.

KLEINER-FALCKE; STOS-FAELCKLIN; LERCH-FAELCKLIN. Schwenck.

Les Polonois, KOBUS; KOBIEC. Rzac.

Les Anglois, HOBBY. Charlet.

Crassitie Accipitrem circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad extremita-

Il est à peu près de la grosseur de l'*Épervier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à

celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de longueur; sa queue six pouces neuf lignes; son pied un pouce six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont rousses, chaque plume ayant une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de sa tige. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont rousses, & rayées transversalement de brun. Les couvertures du dessus de la queue sont cendrées, & leur tige est noirâtre. La gorge est roussâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont couverts de plumes roussâtres, qui ont chacune une bande longitudinale, brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le bas-ventre & les jambes sont aussi roussâtres, avec quelques petites taches

tem caudæ quatuordecim pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipso unco ad oris angulos decem lineas longum est; cauda sex pollices & novem lineas; pes unum pollicem & sex lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ultra tres quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Partes capitis & colli superiores pennis vestiuntur rufis, omnibus lineâ fuscâ, secundum scapi longitudinem extensâ, donatis. Dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarumque tectrices superiores rufæ, fusco transversim striatæ. Superiores caudæ tectrices cinereæ, scapis nigricantibus. Guttur rufescit. Pennæ rufescentes, taniâ longitudinali, fuscâ, secundum scapi longitudinem extensâ, præditæ partem colli inferiorem, pectus, ventrem supremum & latera vestiunt. Venter imus & crura quoque rufescunt, & quibusdam exiguis maculis fuscis, sed rarissimis, variegantur. Tectrices caudæ

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 381

inferiores sunt albo-rufescentes & immaculatæ: quæ alas subtus cooperiunt pennæ concolores, maculis fuscis variæ. Remiges majores fuscæ sunt, oris exterioribus albo-rufescentibus, & latere interiore tæniis primum rufis, deinde versùs margines albis, transversim striatò: minores tæniis transversis, alternatim fuscis & rufis, variegantur. Remix prima secundâ multò brevior est; secunda autem omnium longissima. Prioris remigis pinnulæ interiores versùs extremitatem pennæ, & eodem ab exortu pennæ intervallo pinnulæ exteriores secundæ fiunt subitò cæteris multò breviores. Rectrices sunt griseo-rufescentes, fusco transversim striatæ; apice donantur nigricante, in album desinente. Oculorum irides flavescent. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, cœrulescit. Rostrum cinereum. Pedes flavi; ungues verò nigri.

brunes, mais très-rares. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre & sans taches: celles du dessous de l'aile sont de la même couleur, & variées de taches brunes. Les grandes plumes de l'aile sont brunes; leur bord extérieur est d'un blanc-roussâtre, & leur côté intérieur est rayé transversalement de bandes d'abord rousses, & ensuite blanches: les moyennes sont variées de bandes transversales, alternativement brunes & rousses. La première des plumes de l'aile est beaucoup plus courte que la seconde, qui est la plus longue de toutes. Les barbes intérieures de cette première plume vers son bout, & vis-à-vis les barbes extérieures de la seconde deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres. Les plumes de la queue sont d'un gris-roussâtre, rayé transversalement de brun; leur bout est noirâtre & terminé de blanc. L'iris des yeux est jaunâtre. La membrane, qui couvre la bête du bec, est bleuâtre. Le bec est cendré. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

Mas à fœmina discrepat gutture rufo saturatiore tincto. *Ex museo Realmuriano.*

Le mâle diffère de la femelle en ce que sa gorge est plus roussie. *Du cabinet de M. de Realmur.*

** 23. L'EMERILLON.

Accipiter superne rufo-vinaceus, nigro transversim striatus; infernè rufescens ad vinaceum inclinans, maculis longitudinalibus nigricantibus varius; rectricibus rufo-vinaceis, nigro transversim striatis, taniâ apicis latiore . . .
ÆSALON.

Accipiter Æsalon. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.*

Accipiter Æsalo. *Charlet. Exer. pag. 72. N°. 5.*

Charlet. Onomazt. pag. 64. N°. 5.

Æsalon. *Gesn. Avi. pag. 44, in qua icon minùs accurata.*

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 354.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 427. hujus icon minimè accurata pag. 428.

Æsalon Aristotelis. *Gesn. icon. Avi. pag. 11, in qua icon minùs accurata.*

Æsalon Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 50. hujus icon satis accurata Tab. III.*

Æsalon Bellonii & Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 15. N°. 15.*

Æsalon, vel Æsalo Junii, Turneri; Merillus Isidori; Falconellus.

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 354.

Æsalon, vel Æsalo Plinio; Merillus Alberto magno; Smerillus Gesnero; Falconellus; Ismerlus. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 268.*

Æsalo. *Jonst. Avi. pag. 11. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. X. & in super altera icon à Gesnero mutuata Tab. XIII, sub titulo, Mirle. Smirlin.*

Falco Æsalon. *Klein. Avi. pag. 50. N°. 10.*

Leius *Accipiter*, Bellonii.

Smerillus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 348.*

Smerillus Schwenckfeldii; Æsalo Gesneri & Aldrovandi; Ismerlus Crescentii; Merillus Isidori; Æsalon Alberti; Smerla. *Rzac. Auçt.*

Hist. nat. Pol. pag. 420.

Smerillus; Smerla; Smerlus; Merlina; Ismerlus; Merillo; Meristio, Recentioribus. *Gesn.*

Smerillus Turnero. *Jonst. Charlet.*

Mirle Alberto. *Jonst. Charlet.*

Cenehris. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 89.*

Esmerillon. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 120.*

Esmerillon; Emerillon. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 19 a, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.*

Les Grecs l'appellent Αἰσαλον. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Charlet. Αἰσας; Αἰσος ἰσαζ.* *Bel.*

Les Italiens, SMERLO; SMERIGLIO. *Bel. Gesn. Aldrov.*

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 383

Les Allemands, MIRLE. *Gefn. Aldrov.* MYRLE; SMYRLE. *Schwenck. Rzac.* SMIRLE. *Gefn. Aldrov. Rzac.* SMIRLIN. *Gefn. SMYRLIN. Schwenck.* SMIRLEIN; SMYRLEIN. *Rzac.* KLEINSTE ROTHE-FALCK. *Frisch.*

Les Savoyards, ESMEREILLON. *Gefn.*

Les Polonois, DRZEMLIK. *Rzac.*

Les Anglois, MERLIN. *Willugh. Charlet. Sibbald. Raj.* Ils appellent le mâle JACK. *Sibbald.*

Craffitie Merulam non multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda sex pollices cum duabus lineis; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & unius pollicis intervallo distant; alæ verò complicatæ paululum ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ rufo-vinaceæ, lineâ nigrâ, secundùm scapi longitudinem ductâ, præditæ. Pars colli superior, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ alas

Il n'est guères plus gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue six pouces deux lignes; son pied quatorze lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est encore davantage. Il a vingt-cinq pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un roux-vineux, qui ont chacune une ligne noire, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un roux-

vineux , rayé transversalement de noir. Les joues & la gorge sont d'un blanc - roussâtre. De chaque côté de la tête s'étend une bande noirâtre , qui part de dessous les yeux , & descend vers la gorge. La partie inférieure du col , la poitrine , le haut du ventre & les côtés sont d'un roussâtre tirant sur le vineux , avec une bande longitudinale , noirâtre , qui occupe le milieu de chaque plume selon la longueur de sa tige. Le bas-ventre , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roussâtre clair & sans taches. Les couvertures du dessous de l'aîle sont de la même couleur , mais encore plus claire , & ont chacune une ligne longitudinale , noirâtre , qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres & terminées de roux - vineux ; leur côté intérieur est aussi varié de taches transversales , d'un roux - vineux , qui s'éclaircit peu à peu en approchant vers les bords de la plume : les moyennes sont de la même couleur que leurs couvertures , & rayées , comme elles , transversalement de noir. Les barbes intérieures de la première des plumes de l'aîle & les barbes extérieures de la seconde , vers le bout de cha-

superne tegunt & tectrices caudæ superiores sunt rufo-vinaceæ , nigro transversim striatæ. Genæ & guttur ex albo rufescunt. In utroque capitis latere tænia extenditur nigricans , infra oculos orta , & versus guttur producta. Colli pars inferior , pectus , venter supremus & latera ex rufescente ad vinaceum inclinant , tæniâ longitudinali , nigricante , uniuscujusque pennæ medium secundum scapi longitudinem occupante. Venter imus , crura & tectrices caudæ inferiores dilutè rufescentes & immaculatæ. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ concolores , sed tamen dilutiùs ; lineâ longitudinali , nigricante , secundum scapi longitudinem extensâ , donantur. Remiges majores nigricant , apicibus rufo-vinaceis ; & in latere interiore maculis variegantur transversis , rufo-vinaceis , quæ maculæ sensim atque sensim , versus pennæ margines procedendo , dilutiores fiunt : minores tectricibus alarum superioribus concolores , & similiter nigro transversim striatæ. Prioris remigis pinnulæ interiores & pinnulæ exteriores secundæ , versus

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 385

utriusque pennæ extremitatem, fiunt subito cæteris multò breviores. Remix secunda reliquas omnes longitudine superat. Cauda constat duodecim rectricibus rufo-vinaceis, nigro transversim striatis; tania autem transversa, nigra, versùs uniuscujusque pennæ extremitatem sita, cæteris taniis multò latior est. Rectrices binæ intermediæ lateralibus paulò sunt longiores; laterales verò gradatim fiunt breviores. Oculorum irides avellaneæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum cœrulescens, excepto unco nigricante. Pedes flavi; ungues verò nigricantes. *Ex museo Realmuriano.*

cune de ces deux plumes, deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres. La seconde plume de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un roux-vineux, rayé transversalement de noir. La bande transversale, noire, qui est vers le bout de chaque plume, est beaucoup plus large que les autres. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés. L'iris des yeux est couleur de noisette. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est jaune. Le bec est bleuâtre, excepté son crochet, qui est noirâtre. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirâtres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

24. L'EMERILLON DES ANTILLES.

Accipiter superne rufus, maculis nigris varius, infernè albus, maculis longitudinalibus nigris notatus *ÆSALON ANTILLARUM.*

Esmerillon Gri-gry. *Raj. Syn. Avi. pag. 19. N°. 3.*
Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 253.
Les Habitans des Isles Antilles l'appellent GRI-GRY. Du Tertre.

Crassitie *Turdum* non multum antecellit. Totum corpus superius rufum est, maculis nigris varium; corpus

Il n'est guères plus gros qu'une *Grive*. Tout le dessus du corps est roux, & varié de taches noires; & le dessous est

blanc ; varié aussi de taches longitudinales , noires. Il se nourrit de petits *Lézards* & de *Sauterelles* : & quelquefois il fait la chasse aux petits *Poulets* nouvellement éclos. On le trouve aux *Isles Antilles*.

Je doute que ce soit une espèce différente de notre *Emerillon*.

verò inferius album ; maculis longitudinalibus , nigris notatum. *Lacertulis* & *Locustis* victitat : *Pullos Galinaceos* recenter exclusos quandoque insidiatur. Habitat in *Antillis Insulis*.

An ab *Æsalone* nostrate specie differat prorsus dubito.

** 25. L'EMERILLON DE LA CAROLINE.

Voyez la femelle Pl. XXXII. Fig. 1.

Accipiter superne rufo-vinaceus , nigro transversim striatus ; capite cinereo-coerulescente ; vertice rufo-vinaceo ; rectricibus alarum superioribus cinereo-coerulescentibus (mas) rufo-vinaceis (fœmina) , nigro transversim striatis ; rectricibus rufo-vinaceis , nigro terminatis (mas) nigro transversim striatis (fœmina) ÆSALON CAROLINIENSIS.

Falco minor rufescens , undulatum miscellus. Browne. Nat. Hist. of Jamaica. pag. 471.

Falco vertice vel rubro vel luteo. Klein. Avi. pag. 51. N°. 16.

Petit Epervier. Catesb. Tom. I. pag. 5 ; avec une figure exacte du mâle Pl. 5.

Petit Epervier , ou Accipiter minor , pullivorax. Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 248 (ed. 1725). (C'est la femelle , ou du moins une variété).

Les Anglois l'appellent LITTLE-HAWK. Catesb.

Le mâle approche de la grosseur de notre *Emerillon*. La tête est d'un cendré tirant sur le bleu , excepté son sommet , qui est d'un roux-vineux. Les joues , la gorge & la partie inférieure du col sont blanches , avec une légère teinte de vi-

Mas ad Æsalonis nostratis crassitiem accedit. Caput ex cinereo coerulescit , excepto vertice rufo-vinaceo. Genæ , guttur & pars colli inferior albet , cum aliqua vinacei mixtura. Septem maculæ nigræ partem capitis posteriorem

posteriorem cingunt. Collum superius & dorsum sunt rufo-vinacea, nigro transversim striata. Pectus & venter eodem imbuuntur colore, sed splendidiore, & absque ulla alterius coloris mixtura. Alarum tectrices superiores sunt cinereo-cœrulescentes, nigro transversim striatæ. Remiges majores saturatè fuscæ: minores tectricibus alarum superioribus concolores, & simili modo nigro transversim striatæ. Rectrices sunt rufo-vinacæ, nigro terminatæ. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, concolor. Pedes quoque lutei.

Fœmina crassitie marem non multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque octo lineas longum est; cauda quatuor pollices & decem lineas; pes sexdecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas:

Tome I.

neux. Le derrière de la tête est entouré de sept taches noires. La partie supérieure du col & le dos sont d'un roux-vineux, rayé transversalement de noir. La poitrine & le ventre sont d'un roux-vineux plus éclatant & sans rayures. Les couvertures du dessus des aîles sont d'un cendré-bleu, rayé transversalement de noir. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun foncé: les moyennes sont de la même couleur que les couvertures, & rayées aussi transversalement de noir. Les plumes de la queue sont d'un roux-vineux, & terminées de noir. L'iris des yeux est jaune, ainsi que la peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec. Les pieds sont de la même couleur.

La femelle n'est guères plus grosse que le mâle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces quatre lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue quatre pouces dix lignes; son pied seize lignes & demie; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes: les latéraux sont un peu plus courts;

E e e

& celui de derriere est le plus court de tous. Elle a un pied huit pouces trois lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Elle diffère aussi du *mâle* par ses couleurs. La tête est d'un cendré tirant sur le bleu , excepté son sommet , qui est d'un roux-vineux. Le derriere de la tête est entouré de sept taches noirâtres. La partie supérieure du col , le dos , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un roux-vineux , rayé transversalement de noir. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roux-vineux & sans taches. Les joues & la gorge sont d'un blanc sale & roussâtre. La partie inférieure du col , la poitrine & les côtés sont couverts de plumes d'un blanc sale & roussâtre , & qui ont chacune une bande longitudinale , d'un roux-vineux , qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les couvertures du dessous de l'aile sont de la même couleur. Le ventre , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres , & leur côté intérieur est varié de taches transversales , d'un roux-

laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alis expansis , extremitates majorum remigum viginti pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Coloribus etiam à *mare* discrepat. Caput habet cinereo - cœrulescens , excepto vertice rufo-vinaceo. Capitis pars posterior septem maculis nigricantibus cingitur. Pars colli superior , dorsum , scapulares pennæ , alarumque tectrices superiores sunt rufo-vinaceæ , nigro transversim striatæ. Uropygium & pennæ caudam superne tegentes quoque rufo-vinaceæ , sed immaculatæ. Genæ & guttur ex fordidè albo rufescunt. Pars colli inferior , pectus & latera eodem colore tinguntur ; quæque autem penna taniâ donatur longitudinali , rufo-vinaceâ , secundùm scapi longitudinem extensâ. Alarum tectrices inferiores concolores. Venter , crura & pennæ caudam subtus tegentes fordidè albicant. Remiges majores nigricant , & in latere interiore maculis variegantur transversis , rufo-vinaceis ,

quæ maculæ sensim atque sensim, versùs pennæ margines procedendo, dilutiones fiunt : minores rectricibus alarum superioribus concolores, & simili modo nigro transversim striatæ. Prioris remigis pinnulæ interiores, versùs pennæ extremitatem, fiunt subito cæteris multò breviores. Rectrices sunt rufo-vinacæ, per totam longitudinem nigro transversim striatæ. Binæ autem intermediæ laterales paululùm longitudine excedunt; laterales verò gradatim fiunt breviores. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, concolor. Rostrum, pedesque flavi; ungues verò nigricantes.

vineux, qui s'éclaircit en approchant des bords de la plume : les moyennes sont de la même couleur que les couvertures du dessus des ailes, & rayées, comme elles, transversalement de noir. Les barbes intérieures de la première des plumes de l'aile deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers le bout de la plume. Les plumes de la queue sont d'un roux-vineux, rayé transversalement de noir dans toute leur longueur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes un peu en diminuant par degrés. L'iris des yeux est jaune, ainsi que la peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec. Le bec & les pieds sont de la même couleur; & les ongles sont noirâtres.

Habitat in *Virginia*, *Carolina* & *S. Dominici Insula*, unde fœmina in museum *Realmurianum* missa est à *D. Chervain*.

On le trouve à la *Virginie*, à la *Caroline* & à *S. Domingue*, d'où la femelle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

** 26. L'ÉMERILLON DE S. DOMINGUE.

Voyez la femelle Pl. XXXII. Fig. 2.

Accipiter superne rufo-vinaceus, nigro maculatus, infernè sordidè albus, nigris maculis variis; capite cinereo; rectricibus octo (mas) decem (fœmina) intermediis castaneis,

E e e ij

apice nigris, albicante terminatis ÆSALON
DOMINICENSIS.

Il est à peu près de la longueur d'un *Merle*. La longueur de la *femelle* depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied seize lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Elle a un pied huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un cendré foncé, & qui ont chacune dans leur milieu une petite ligne noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les côtés de la tête ou les joues sont variées de blanchâtre & de cendré. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un roux-yineux, varié,

Craffitie *Merulam* circiter æquat. *Fœminæ* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos octo lineas longum; cauda quatuor pollices & novem lineas; pes sexdecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Ab extremo ad extremum alarum expansarum distantia est unius pedis & octo pollicum; alæ verò complicatæ paululum ultra tres quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Pennæ saturatè cinereæ, lineolæ nigricante, secundùm scapi longitudinem extensâ, præditæ partem capitis superiorem vestiunt. Capitis latera sive genæ albicante & cinereo variegantur. Pars collis superior, dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores & scapulares pennæ sunt rufo-vinaceæ, parte dorsi superiore & scapulari-

bus pennis tantum maculis nigris, versus uniuscujusque pennæ extremitatem sitis, variegatis. Guttur & pars colli inferior ex albicante ad vinaceum paululum vergunt. Pectus, ventrem supremum & latera vestiunt pennæ sordide albæ, maculis variegatæ nigris, ovalibus, versus ipsarum apices collocatis. Venter imus, crura, pennæ caudam subtus tegentes, alarumque minores tectrices inferiores albescent : majores concolores, quibusdam maculis nigris variæ. Alarum tectrices superiores minimæ saturatè cineræ : mediæ concolores, sed versus ipsarum apices maculæ dominantur nigræ : majores à corpore remotiores in latere exteriori sunt saturatè cineræ, in latere verò interiore ex albo & nigro transversim variegantur : majores tandem corpori finitimæ ab exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque nigræ, in reliqua longitudine cineræ, & insuper in latere interiore albo variæ, quæ albedo intra nigrum & cinereum dentatim collocatur. Remiges majores nigræ, apicis marginibus albicantibus, & in latere in-

sur la partie supérieure du dos & les plumes scapulaires seulement, de taches noires, placées vers le bout de chaque plume. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc châtre tirant un peu sur le vineux. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un blanc sale, varié de taches noires, ovales, placées vers le bout de chaque plume. Le bas-ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des ailes sont blanches : les grandes sont de la même couleur, & variées de quelques taches noires. Les petites couvertures du dessus de l'aile sont d'un cendré foncé ; les moyennes sont de la même couleur, & ont chacune vers leur bout une tache noire : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré foncé du côté extérieur, & leur côté intérieur est varié transversalement de blanc & de noir : les grandes les plus proches du corps sont noires depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur & cendrées vers le bout, & leur côté intérieur est varié de blanc, qui s'enraine dans le noir & le cendré en forme de dents. Les grandes plumes de l'aile sont noires, &

bordées de blanchâtre à leur bout, & leur côté intérieur est varié de blanc, qui s'engraine de même dans le noir en forme de dents : le bord extérieur de la première est aussi blanchâtre : les moyennes sont des mêmes couleurs que les grandes couvertures de l'aile les plus proches du corps. La queue est composée de douze plumes : les huit du milieu sont marron ; leur bout est noir, & terminé de blanchâtre : celle qui les suit de chaque côté est de la même couleur, excepté la partie de son côté extérieur la plus proche du noir, qui est blanche, & marquée d'une tache noire : la plus extérieure du côté gauche est blanche du côté extérieur & à son bout, & le côté intérieur est marron, & marqué vers le bout d'une tache transversale, noire : la plus extérieure du côté droit est blanche, & variée du côté intérieur de cinq taches noires & d'une tache oblique, marron, placée entre les deux taches noires, les plus proches du bout de la plume. L'iris des yeux est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est de la même couleur. Le bec est jaune à son origine, & noirâtre à son bout. Les pieds sont jaunes ; & les ongles noirâtres.

teriore albo variegantur, albedine intra nigrum, ut supra, dentatim collocatâ : prioris remigis oræ exteriores quoque albicant : minores remiges iisdem tinguntur coloribus & eodem modo quo majores alarum tectrices corpori viciniore. Duodecim rectricibus cauda constat : octo intermediæ castaneæ, apice nigræ, albicante terminatæ : rectrix utrinque sequens concolor, exceptâ tamen lateris exterioris parte nigro finitimâ, quæ alba est & nigrâ maculâ notatur : extima sinistra in latere exteriori & apice alba, in latere verò interiori castanea & maculâ transversâ, nigrâ versùs apicem notata : extima denique dextra in toto alba est, excepto tamen latere interiori maculis quinque variegato nigris & alterâ maculâ obliquâ, castaneâ, duas inter maculas nigras, apici pennæ finitimas, collocatâ. Oculorum irides luteæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, concolor. Rostrum in exortu flavum, apice nigricans. Pedes quoque flavi ; ungues verò nigricantes.

Mas crassitie paululùm *fœmina* cedit. Ab ea etiam coloribus nonnihil discrepat. Maculæ nigræ dorsum, pen- nas scapulares, pectus, ven- trem & latera variegantes in multò minori sunt numero quàm in *fœmina*. Guttur & pars colli inferior multò magis ad vinaceum vergunt. Rectrices decem interme- diæ sunt castaneæ, apice ni- græ, albicante terminatæ : utrinque extima in latere ex- teriore & apice alba, in la- tere verò interiore castanea & maculâ transversâ, nigrâ versùs apicem notata. In re- liquis cum *fœmina* convenit. Habitat in *S. Dominici In- sula*, unde in *musæum Reaumurianum* missi sunt à *D. Chervain*.

Le mâle est un peu plus pe- tit que la femelle. Il en diffère aussi un peu par ses couleurs. Il a beaucoup moins de taches noires sur le dos & les plu- mes scapulaires que n'en a la femelle, ainsi que sur la poitri- ne, le ventre & les côtés. La gorge & la partie inférieure du col tirent beaucoup plus sur le vineux. Les dix plumes du mi- lieu de la queue sont marron ; leur bout est noir, & terminé de blanchâtre : la plus exté- rieure de chaque côté est blan- che du côté extérieur & à son bout, & le côté intérieur est marron, & marqué vers le bout d'une tache transversale, noire. Du reste il ressemble à sa fe- melle. On les trouve à *S. Do- mingue*, d'où ils ont été en- voyés à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

** 27. LA CRESSERELLE.

Accipiter superne rufo-vinaceus, nigricante maculatus, in- fernè ex rufescente ad vinaceum vergens, maculis nigrican- tibus varius; capite cinereo (maculis nigricantibus vario in *fœmina*); rectricibus cinereis, apice nigris, albo ter- minatis TINNUNCULUS.

Falco pedibus cerâque flavis; dorso rufescente; pectore maculis longi- tudinalibus fuscis; caudâ rotundâ. *Faun. Suec. Linn. N°. 67.*

Falco Cenchris. *Klein. Avi. pag. 49. N°. 7.*

Falco Cenchridis mas. *Klein. Avi. pag. 53. N°. 14.*

An *Falco* aureus, capite plumbeo, rotundo; pictus nigris maculis sa- gittariis ? *Klein. Avi. pag. 52. N°. 21.*

- Tinnunculus. *Jonst. Avi. pag. 11. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. X; & insuper maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuatae Tab. VIII. Charlet. Exer. pag. 72. N^o. 6. Charlet. Onomazt. pag. 64. N^o. 6. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15. Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 14.*
- Tinnunculus Accipiter. *Gesn. Avi. pag. 54, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Tinnunculus Columellæ & Plinio; Cenchris. *Gesn. icon Avi. pag. 8, in qua eadem icon.*
- Tinnunculus Plinio; Cenchris Dalecampio. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 296.*
- Tinnunculus, seu Cenchris. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 356. icones minus accuratae, maris pag. 358, fœminæ pag. 359; & insuper altera fœminæ icon pessima pag. 360. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 294. N^o. II. Raj. Syn. Avi. pag. 180. N^o. 2.*
- Tinnunculus, seu Cenchris Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 50. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. V. Raj. Syn. Avi. pag. 16. N^o. 16.*
- Tinnunculus verus. *Frisch. fœminæ icon accurata Tab. 84.*
- Tinnunculus alter, seu Laniarius rufus. *Frisch. maris icon non satis accurata Tab. 85.*
- Tristunculus Gazæ. *Jonst. Charlet.*
- Milyus minor rubeus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 304.*
- Crefferelle. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 124; avec une figure très-peu exacte pag. 125.*
- Cercelle; Quercerelle; Crefferelle. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 20 a, dans laquelle est la même figure.*
- Crécerelle. *Alb. Tom. I. pag. 8; avec une figure mal coloriée de la femelle Pl. 7.*
- Coc de Windhover. *Alb. Tom. III. pag. 3; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 5.*
- Les Grecs l'appellent Κερχρς. *Bel. Κερχρς. Bel. Aldrov. Schwenck. Willugh.*
- Les Espagnols, CERNICALO, ou ZERNICALO. *Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens, CANIBELLO. *Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet. TRISTINCULO. Bel. Gesn. Aldrov. TRISTARELLO. Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet. GAVINELLO. Gesn. Aldrov. Jonst. FOUTIVENTO. Bel. Aldrov.*
- Les Allemands, WANNEN-VAHER. *Rzac. WANNEN-WAEHER; WAND-WAEHER. Gesn. Aldrov. Schwenck. WANNT-WEHEN; WIEG-WEHEN. Gesn. Aldrov. ROETEL-WEIH; LACH-WEIHE. Schwenck. Ils appellent le mâle ROTHE-FALCK; & la femelle ROTHEL GEYER. Frisch.*
- Les Silésiens, ROETEL-WEIB. *Schwenck.*
- Les Saxons, STEIN-GALL; STEIN-SCHMATZ. *Gesn.*

Les Polonois, PUSTOLKA. Rzac.

Les Suédois, KYRKIO-FALCK; TORN-FALCK. Linn.

Les Anglois, KESTREL. Alb. KESTRELL; STANNELL; STONE-GALL. Willugh. Raj. STANCHEL. Sibbald. WINDHOVER. Willugh. Raj. Alb. WIND-VANNER. Charlet.

Les Anglois Septentrionaux, STEYN-GALL. Gefn. Aldrov.

Les Anglois Méridionaux, KISTREL; KASTREL. Gefn. Aldrov.

Les Anglois de la Jamaïque, SMALL HAWK. Sloane.

On l'appelle à Narbonne, SIRICACH. Gefn. Aldrov.

Mas crassitie paululum
Accipitri cedit. Ipsi-
tudo ab apice rostri ad cau-
dam extremam quatuorde-
cim pollices aëquat, & ad
extremos ungues decem pol-
lices & tres lineas. Rostrum
ab ipsius unco ad oris angu-
los usque novem cum semi
lineas longum est; cauda sex
pollices & novem lineas;
pes octodecim lineas; &
trium digitorum anticorum
medius cum ungue trede-
cim lineas: laterales paulò
sunt breviores; posticus om-
nium brevissimus. Alis ex-
tensis, extremitates majo-
rum remigum duorum pe-
dum & quinque pollicum
intervallo distant; alæ verò
complicatæ ultra tres quar-
tas longitudinis caudæ par-
tes protenduntur. Caput &
partem colli superiorem ve-
stiunt pennæ cineræ. Tec-
trices caudæ superiores con-
colores. Pars dorsi superior,
scapulares pennæ, alarum-

Tome I.

Le mâle est un peu plus petit
que l'*Epervier*. Sa longueur de-
puis le bout du bec jusqu'à ce-
lui de la queue est de quatorze
pouces, & jusqu'à celui des
ongles de dix pouces trois li-
gnes. Son bec depuis son cro-
chet jusqu'aux coins de la bou-
che a neuf lignes & demie de
long; sa queue six pouces neuf
lignes; son pied un pouce six
lignes; & le milieu des trois
doigts antérieurs, joint avec
l'ongle, treize lignes: les laté-
raux sont un peu plus courts;
& celui de derrière l'est encore
davantage. Il a deux pieds cinq
pouces de vol; & ses aîles,
lorsqu'elles sont pliées, s'éten-
dent au-delà des trois quarts
de la longueur de la queue. La
tête, la partie supérieure du
col & les couvertures du des-
sus de la queue sont cendrées.
La partie supérieure du dos,
les plumes scapulaires & les
couvertures du dessus des aîles
sont d'un roux tirant sur le vi-
neux, chaque plume ayant vers

Fff

son bout une tache noirâtre. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un cendré tirant sur le vineux. La gorge est roussâtre & sans taches. La partie inférieure du col & la poitrine sont de la même couleur, mais chaque plume a une ligne noirâtre, qui s'étend selon la longueur de sa tige. Le haut du ventre & les côtés sont d'un roussâtre tirant sur le vineux, chaque plume ayant vers son bout une tache ovale, noirâtre. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont du même roussâtre tirant sur le vineux, mais sans taches. Les plumes qui couvrent le dessous de l'aîle, sont blanches, & ont chacune vers leur bout une tache noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle & les premières des moyennes sont brunes, & ont leur bord extérieur blanchâtre; & leur côté intérieur est rayé transversalement de blanc: les autres moyennes plumes de l'aîle sont brunes, mêlées de roux tirant sur le vineux, & rayées transversalement de blanc du côté intérieur seulement: elles ont d'autant plus de ce roux-vineux, qu'elles sont plus proches du corps. La première des plumes de l'aîle est beaucoup plus

que testrices superiores rufo-vinaceæ, quâque pennâ versùs apicem maculâ nigricante notatâ. Pars dorsi inferior & uropygium ex cinereo ad vinaceum inclinant. Guttur rufescens, immaculatum. Pars colli inferior & pectus eodem colore tinguntur, unaquæque tamen penna lineâ nigricante, secundùm scapi longitudinem ductâ, donatur. Venter supremus & latera penis vestiuntur ex rufescente ad vinaceum vergentibus, & maculâ ovali, nigricante versùs apicem præditis. Imus venter, crura & testrices caudæ inferiores ex rufescente quoque ad vinaceum inclinant, sed absque maculis. Alarum inferiores testrices albæ, maculâ nigricante versùs extremitatem notatæ. Remiges majores & ex minoribus priores sunt fuscæ, oris exterioribus albicantibus, & latere interiore albo transversim striato: ex minoribus reliquæ fuscæ, rufo-vinaceo admixto, latere interiore albo quoque transversim striato: eò magis istæ remiges rufo-vinaceo tinguntur, quò corpori sunt viciniore. Remix prima secundâ multò brevior est;

secunda verò omnium longissima. Prioris remigis pinnulæ interiores versùs pennæ extremitatem, & eâdem ab exortu pennæ distantia pinnulæ exteriores secunda fiunt subito cæteris multò breviores. Rectrices sunt per totam longitudinem cineræ, excepto apice nigro, albo terminato. Binæ intermediae reliquas longitudine superant; laterales verò sensim atque sensim fiunt breviores. Oculorum irides flavescentes. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum cinereum. Pedes flavi; ungues verò nigri.

Fœmina crassitie & magnitudine *marem* antecellit. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt: cauda autem septem pollices longa. A *mare* etiam discrepat coloribus pallidioribus, pennis caput & partem colli superiorem tegentibus lineolâ nigricante, secundùm scapi longitudinem extensâ, præditis, & parte dorsi inferiore & uropygio maculis nigricantibus variegatis.

courte que la seconde, qui est la plus longue de toutes. Les barbes intérieures de cette première plume vers son bout, & vis-à-vis, les barbes extérieures de la seconde deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres. Les plumes de la queue sont cendrées, & leur bout est noir & terminé de blanc. Les deux du milieu sont les plus longues; les latérales vont un peu en diminuant. L'iris des yeux est jaunâtre. La membrane, qui couvre la bête du bec, est jaune. Le bec est cendré. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

La *femelle* est plus grande & plus grosse que le *mâle*. Elle a deux pieds six pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue, qui a sept pouces de long. Elle en diffère encore en ce que ses couleurs ne sont pas si vives, que les plumes qui couvrent la tête & la partie supérieure du col ont chacune une petite ligne noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & que la partie inférieure du dos & le croupion sont variés de taches noirâtres. Le reste est comme dans le *mâle*. *Du ca-*

binet de Monsieur de Reaumur. In reliquis cum mare convenit. *Ex museo Realmuriano.*

** 28. LE GROS BUSARD.

Accipiter superne fuscus, oris pennarum rufescentibus, infernè rufescens, maculis ovalibus fuscis variis; rectricibus fuscis, fusco saturatiore transversim striatis CIRCUS MAJOR.

Milvus sive Astur. Frisch. hujus icon accurata Tab. 72.

Les Allemands l'appellent HUNER-HABIGT; HUNER-GEYER. Frisch.

Il est de la même grosseur que la *Busse*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; sa queue dix pouces; son pied trois pouces; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes: l'intérieur est un peu plus court; l'extérieur est le plus court de tous; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes brunes dans leur milieu, & dont les deux côtés sont roussâtres.

Crassitie cum *Buteone* convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices æquat, & ad extremos ungues novemdecim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & sex lineas longum est; cauda decem pollices; pes tres pollices; & trium digitorum anteriorum medius cum ungueduos pollices cum tribus lineis: intimus paulò brevior est; extimus omnium brevissimus; posticus verò anteriorum intimum longitudine adæquat. Alæ complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Pennæ in medio fuscae, in utroque latere rufescentes caput & partem colli superiorem vestiunt. Quæ dorsum & uropygium coope-

riunt, scapulares pennæ, alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes quoque fuscæ, oris rufescentibus. Guttur, pars colli inferior & pectus peninis vestiuntur rufescentibus, maculis longitudinalibus, fuscis variegatis, quæ maculæ in mucronem desinunt, & uniuscujusque pennæ medium occupant. Venter, latera, crura, alarumque tectrices inferiores sunt in quibusdam rufescentes & immaculatæ, in aliis verò rufescentes, maculis longitudinalibus, fuscis variæ; sed maculæ istæ scapi pennæ latitudinem non multum excedunt, exceptâ ipsarum extremitate, in qua latiores fiunt, & maculam efficiunt ovalem, pediculo quasi affixam. Maculæ istæ, latera variegantes, sunt perexiguæ. Tectrices caudæ inferiores rufescentes & immaculatæ. Remiges majores sunt fuscæ, in latere exteriori & apice fusco saturatiore transversim striatæ, in latere verò interiori tæniis transversis, alternatim fuscis & rufescentibus, variæ, exiguis maculis fuscis supra tæniis rufescentes disseminatis; minores fuscæ, fusco

Celles qui couvrent le dos & le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont aussi brunes & bordées de rouffâtre. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont rouffâtres, & variées de taches longitudinales, brunes, qui se terminent en pointe, & qui occupent le milieu de chaque plume. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de l'aîle sont dans les uns rouffâtres & sans taches, & dans d'autres rouffâtres, & variées de taches longitudinales, brunes, mais qui n'occupent presque que la largeur de la tige de la plume, excepté vers le bout, où elles s'élargissent, & forment une tache ovale, qui paroît attachée à un pédicule. Ces taches sont très-petites sur les côtés. Les couvertures du dessous de la queue sont rouffâtres, & sans taches. Les grandes plumes de l'aîle sont brunes, & rayées transversalement d'un brun plus foncé à leur côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est varié de bandes transversales, alternativement brunes & rouffâtres; sur les bandes rouffâtres sont semées de petites taches brunes: les moyennes sont bru-

nes, & rayées transversalement d'un brun plus foncé ; quelques-unes ayant un peu de roussâtre du côté intérieur dans les bandes les plus claires. Les plumes de la queue sont aussi brunes, & variées de larges bandes transversales, d'un brun plus foncé. L'iris des yeux est d'un jaune tirant sur le safran. La membrane, qui couvre la bête du bec, & les pieds sont jaunes. Le bec & les ongles noirâtres. *Du cabinet de M. de Reaumur, à qui il a été envoyé de Malthe par M. Godeheu de Riville. Un autre du cabinet de Madame de Bandeville.*

Une variété de cette espece est

A. LE BUSARD VARIÉ.

Circus varius.

Accipiter stellarius, sive guttatus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 73. Les Allemands l'appellent HUNER-HABIGT ; HUNER-GEYER. Frisch.*

Il est un peu plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Il ressemble assez au précédent par la couleur de son plumage : il en diffère cependant par celle de ses aîles, qui est beaucoup

saturatiore transversim striatæ, cum aliqua in quibusdam rufescentis mixtura in dilutioribus tæniis lateris interioris tantum. Rectrices quoque fuscæ, latis tæniis transversis, saturatiùs fuscis variegatæ. Oculorum irides ex flavo ad croceum colorem vergunt. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Pedes concolores. Rostrum, unguesque nigricant. *Ex museo Realmuriano, in quem à Melita insula missus est à D. Godeheu de Riville. Alius ex museo D. de Bandeville.*

Hujus speciei varietas est

Crassitie paululùm precedenti cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & octo pollices æquat. Alæ complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Colore pennarum cum precedente satis bene convenit : ab illo tamen differt alis multò magis variegatis. Tectrices alarum supe-

riores cinereo maculantur; plus variée. Les couvertures & remiges minores à media supérieures sont tachées de circiter longitudine versùs cendré; & les moyennes plumes de l'aîle sont blanches de extremitatem usque albert; puis environ la moitié de leur extremitas verò nigricat. longueur jusque vers leur bout, Unaquæque etiam remix minor qui est noirâtre. Chaque plume maculâ donatur nigricante, in pinnulis exterioribus collocatâ; quæ maculæ, alis complicatis, taniâ transverse, nigricantem simul efficiunt. ensemble une bande transverse, BA
le, noirâtre.

**** 29. LE BUSARD DE MARAIS.**

Accipiter fusco-ferrugineus, rufescente varius; rectricibus subtùs griseis; tribus extimis interiùs rufo maculatis . . .

CIRCUS PALUSTRIS.

- Accipiter Circus.* Charlet. *Exer. pag.* 72. N^o. 4.
Charlet. *Onomazt. pag.* 64. N^o. 4.
Circus Accipiter. Gesn. *Avi. pag.* 49.
Circus. Aldrov. *Avi. Tom. I. pag.* 351.
Jonst. *Avi. pag.* 10.
Milvus æruginosus. Aldrov. *Avi. Tom. I. pag.* 396. *hujus icon minùs accurata pag.* 395.
Linn. *Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 8.*
Milvus æruginosus Aldrovandi. Willugh. *Ornith. pag.* 42. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VII.*
Raj. *Syn. Avi. pag.* 17. N^o. A. 4.
Rzac. *Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 395.
Milvus palustris. Charlet. *Exer. pag.* 73. N^o. 16.
Charlet. *Onomazt. pag.* 65. N^o. 16.
Sibbald. *Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 15.
Lanius Milvus. Jonst. *Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XI.*
Falco sive Milvus æruginosus Aldrovandi. Klein. *Avi. pag.* 51. N^o. 15.
Falco palustris. Schwenck. *Avi. Sil. pag.* 261.
Falco palustris, seu Falco littoralis. Rzac. *Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 378.
Falco cerâ luteo-viridi; pedibus luteis; corpore ferrugineo, vertice fulvo. Faun. Suec. Linn. N^o. 63.

Vultur fuscus, sive Laniarius. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 77.*
 Buzard de marais. *Alb. Tom. I. pag. 4; avec une figure mal coloriée Pl. 3.*
 Faux-Perdrieux. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 114.*
 Les Grecs l'appellent *Κίρκος*. *Bel. Gesn. Aldrov. Charlet. i'p'ñ nípnos. Gesn. Jonsst.*

Les Allemands, *WASSER-FALCK. Rzac. SCHWARTZ - BRAUNE FISCH-GEYER. Frisch.*

Les Silésiens, *ROHR-FALCK. Schwenck.*

Les Polonois, *SOKOL WODNY. Rzac.*

Les Suédois, *HOENS-TJUF. Linn.*

Les Anglois, *MOOR-BUZZARD. Willugh. Raj. Alb. CRYER; FEN-KITE, ou FROG-KITE. Charlet. BOG-GLED. Sibbald.*

Il est à peu près de la grosseur de l'Autour femelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue dix pouces; son pied trois pouces quatre lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que ces derniers. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes roussâtres, qui ont chacune une petite ligne d'un brun-ferrugineux, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La

Ad *Asturis* *fœminæ* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octodecim pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos sexdecim lineas longum est; cauda decem pollices; pes tres pollices & quatuor lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices: laterales paulo sunt breviores; & posticus longitudine laterales adæquat. Ala complicata ultra tres quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Pennæ rufescentes, lineolâ fusco-ferrugineâ, secundum scapi longitudinem ductâ, prædita, partem capitis superiorem vestiunt. Colli pars superior & pectus variegantur ex fusco-

fusco-ferrugineo & rufescente, lineolis vario, ut in capite, fusco-ferrugineis, secundum uniuscujusque pennæ scapi longitudinem ductis. Pars colli inferior, dorfi pars superior, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores sunt fusco-ferrugineæ. Pars dorfi inferior, uropygium, tectrices caudæ superiores & pennæ alas subtus tegentes ex fusco-ferrugineo & rufo variegatæ. Alarum superiores tectrices minores plumis partem capitis superiorem tegentibus concolores: majores verò fusco-ferrugineæ, cum aliqua rufi mixtura. Remiges saturatè fusco-ferrugineæ & immaculatæ. Rectrices sunt subtus griseæ, superne verò fusco-ferrugineæ; & tres infuper utrinque extimæ exiguis quibusdam maculis rufis, præsertim in latere interiore, variegantur. Maculæ autem rufæ, hujus speciei corpus variantes, diverso modo disseminantur in variis individuis. Oculorum irides crocæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, ex flavo ad viride inclinat. Rostrum, unguisque nigri; pedes verò lutei. In

Tome I.

partie supérieure du col & la poitrine sont variées de brun-ferrugineux & de roussâtre, marqué, comme dessus la tête, de petites lignes d'un brun-ferrugineux, qui s'étendent selon la longueur de la tige de chaque plume. La partie inférieure du col, la partie supérieure du dos, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-ferrugineux. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles du dessous de l'aile sont variées de brun-ferrugineux & de roux. Les petites couvertures du dessus de l'aile sont de la même couleur que les plumes du dessus de la tête: les grandes sont d'un brun-ferrugineux, mêlé d'un peu de roux. Les plumes de l'aile sont d'un brun-ferrugineux, foncé & sans taches. Celles de la queue sont grises en-dessous, & en-dessus elles sont d'un brun-ferrugineux; & les trois plus extérieures de chaque côté ont quelques petites taches rousses, sur-tout du côté intérieur. Les taches rousses répandues sur tout le corps sont différemment distribuées dans différens individus. L'iris des yeux est couleur de safran. La mem-

G g g

brane, qui couvre la bête du bec, est d'un jaune tirant sur le verd. Le bec & les ongles sont noirs; & les pieds jaunes. Il fait son nid dans les marais. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 30. LE BUSARD ROUX.

Accipiter rufus, maculis longitudinalibus fuscis variis; dorso & uropygio fuscis; rectricibus cinereis *CIRCUS RUFUS.*

Vultur, sive *Laniarius medius*. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 78.*
Les Allemands l'appellent FISCH-GEYER; BRAND-GEYER. Frisch.

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces. Son bec depuis le crochet jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue neuf pouces; son pied deux pouces neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a quatre pieds de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les plumes qui couvrent la tête, le col & la poitrine, & les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un roux clair,

Craffitie præcedentem adæquat. *Ipsius* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & octo pollices explet, & ad extremos ungues sexdecim pollices. *Rostrum* ab ipsius unco ad oris angulos usque quindecim lineas longum est; *cauda* novem pollices; *pes* duos pollices cum novem lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices: laterales paulò sunt breviores; *posticus* omnium brevissimus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum; *alæ* verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. *Pennæ*, *caput*, *collum* & *pectus* vestientes, sicut

& superiores alarum tectrices minores, sunt dilute rufæ, maculæ fuscæ, secundum scapi longitudinem ductæ, in medio notatæ. Quæ ventrem & latera cooperiunt, & tectrices caudæ inferiores rufo saturatiore tinguntur, & maculæ fuscæ, secundum scapi longitudinem extensæ, quoque variegantur. Crura rufæ, immaculata. Dorsum, uropygium, scapulares pennæ & superiores alarum tectrices majores fuscæ. Alarum tectrices inferiores albæ. Remiges majores nigre : minores cinereæ, exceptis tribus corpori vicinioribus, fuscis. Rectrices omnes cinereæ. Oculorum irides croceæ. Rostrum, unguisque nigri; pedes verò lutei. *Ex museo Realmuriano, in quem missus est ab Aurelia à D. Salerne.*

& marquées dans leur milieu d'une tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent le ventre & les côtés, & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux plus foncé, & marquées de même d'une tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les jambes sont tout-à-fait rousses. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les grandes couvertures du dessus des aîles sont brunes. Les couvertures du dessous de l'aile sont blanches. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont cendrées, excepté les trois plus proches du corps, qui sont brunes. Toutes celles de la queue sont cendrées. L'iris des yeux est couleur de safran. Le bec & les ongles sont noirs; & les pieds jaunes. *M. Salerne* en a envoyé un d'Orléans à *M. de Reaumur.*

31. LE BUSARD DU BRÉSIL.

Accipiter rufus, albis & flavis punctulis varius; reatricibus ex albo & fusco variegatis CIRCUS BRASILIENSIS.

Milvus Brasiliensis, Caracara dictus. Raj. Syn. Avi. pag. 17. N°. 6.

Milvus Brasiliensis, Caracara dictus, Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 42. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. IX.

Caracara. Pison. Hist. nat. pag. 82, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Caracara Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 211, in qua icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 144. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 61.
Les Portugais l'appellent GAVIAON. Pison. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.
Les Brâsiliens, CARACARA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est de la grandeur du *Milan royal*. Sa queue a neuf pouces de long. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, sont longues de quatorze pouces; elles ne s'étendent cependant pas tout-à-fait jusqu'au bout de la queue. Tout le corps est couvert de plumes rousses, variées de petits points blancs & jaunes. Quelques-uns ont la poitrine blanche, ainsi que le ventre. Les plumes de la queue sont variées de blanc & de brun. Le tour des yeux est jaune; & leur iris est couleur d'or. Le bec est d'une grandeur médiocre, & noir. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs, très-aigus & assez longs. C'est un grand mangeur de *Poules*. On le trouve au *Brésil*.

Magnitudine adæquat *Milvum regalem*. Caudam habet novem pollices longam. Alæ complicatæ quatuordecim pollices longæ sunt; attamen nondum ad extremitatem caudæ pertinent. In universo corpore color pennarum totus est rufus, cum albis & flavis punctulis. In quibusdam pectus & venter albet. Rectrices ex albo & fusco variegantur. Oculorum irides aureæ; ipsorum verò ambitus flavus. Rostrum mediocriter magnum, nigrum. Pedes lutei; ungues verò nigri, acutissimi & longi. Avis est *Gallinis* valdè infesta. Habitat in *Brasilia*.

** 32. LA BUSE.

Accipiter fusco-ferrugineus; pectore & ventre ex albo & fusco-ferrugineo variis; rectricibus fuscis, fusco saturatiore transversim striatis, apice albo-rufescentibus . . . Buteo.

Accipiter Buteo. Schwenck. Avi. Sil. pag. 187.

Buteo. Gesn. Avi. pag. 45. hujus icon non satis accurata pag. 46.

Jonst. Avi. pag. 11. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VII;
& insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. XI.

Charlet. Exer. pag. 72. N°. 9.

Charlet. Onomazi. pag. 65. N°. 9.

Buteo, Triorches. Gesn. icon. Avi. pag. 9, in qua icon non satis accurata;

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 407

Buteo, seu Triorchis. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 362. hujus icones minus accuratæ pag. 365 & 370.*

Buteo Triorchis. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 12.*

Buteo vulgaris. *Willugh. Ornith. pag. 38. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VI.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Buteo vulgaris, sive Triorches. *Raj. Syn. Avi. pag. 16. N°. 1.*

Buteo vulgaris Willughbeyi. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 369.*

Buteus & Butherius Alberto. *Gesn.*

Falco cerâ pedibusque luteis, dorso fusco, pectore pallido maculis longitudinalibus fuscis. *Faun. Suec. Linn. N°. 65.*

Falco, Buteo vulgaris, Autorum. *Klein. Avi. pag. 50. N°. 12.*

Lanarius & Villanus apud Recentiores. *Gesn.*

Pernopterus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 218. hujus icon pessima pag. 220.*

Buse ou Busard. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 100; avec une très-mauvaise figure pag. 101.*

Buse ou Busard, ou Cassard. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 14 a, dans laquelle est la même figure.*

Buzard. *Alb. Tom. I. pag. 1; avec une figure mal coloriée Pl. 1.*

Les Grecs l'appellent Τριόρχης. *Charlet. Ισαξ τριόρχης. Schwenck.*

Les Italiens, POYANA; BUCCIARIO; LANIERO; BUZZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens, aux environs du Lac majeur, AIETA. *Gesn. Aldrov.*

Les Savoyards, BOUSAT; BOSE; LANOY. *Gesn.*

Les Allemands, BUSZ-HART; BUSZ-AHRN; BUSZ-HEN; BUSANT; BUSE. *Gesn. Aldrov. BUS-HARD; BUS-AHR; ROHR-AHR; MEUSZ-AHR.*

Schwenck. MAEUSE-HABICHT. Rzac.

Les Bas Allemands, BROBUREN. *Gesn. Aldrov.*

Les Silésiens, FISCH-KNECHT; FISCH-AHR. *Schwenck.*

Les Saxons, RUTTELWY ou RUTTELWEYH. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, JASTRZAB MYSSY. *Rzac.*

Les Uplandois, QUID-FOGEL ou QWID-FOGEL. *Linn.*

Les Anglois, BUZZARD. *Willugh. Charlet. Sibbald. COMMON BUZZARD; PUTTOCK. Alb.*

Crassitie *Milvum regalem* paululum antecellit. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad
caudam extremam unum pe-
dem octo pollices & sex li-
neas explet, & ad extremos
ungues septemdecim polli-
ces cum sex lineis. Rostrum

Elle est un peu plus grosse
que le *Milan royal*. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est
d'un pied huit pouces six li-
gnes, & jusqu'à celui des on-
gles d'un pied cinq pouces six
lignes. Son bec depuis son cro-

chet jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long ; sa queue huit pouces trois lignes ; son pied deux pouces neuf lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce dix lignes ; l'intérieur est un peu plus court ; l'extérieur l'est encore davantage ; & celui de derrière est un peu plus long que ce dernier. Elle a quatre pieds quatre pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent à un pouce au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête , le col , le dos , le croupion , les côtés , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun-ferrugineux. Les côtés de la tête & la gorge sont couverts de plumes blanches , qui ont chacune une tache brune , qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent la poitrine & le ventre sont variées de blanc & de brun-ferrugineux. Les jambes & les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun-ferrugineux , mêlé d'un peu de roux. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre , varié de quelques rayes transversales , d'un ferrugineux clair. Les grandes plumes de l'aîle depuis leur origine jusque

ab ipsius unco ad oris angulos octodecim lineas longum est ; cauda octo pollices & tres lineas ; pes duos pollices cum novem lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas ; intimus paulò brevior est ; extimus adhuc brevior ; & posticus extimum longitudine paululùm superat. Alis extensis , extremitates majorum remigum quatuor pedum & totidem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudæ extremitatem protenduntur. Capitis pars superior , collum , dorsum , uropygium , latera , tectrices alarum superiores & pennæ caudam superne tegentes sunt fusco-ferrugineæ. Pennæ candidæ , maculâ fuscâ , secundùm scapi longitudinem ductâ , notatæ , capitis latera & guttur vestiunt. Quæ pectus & ventrem cooperiunt , ex albo & fusco-ferrugineo variantur. Crura , alarumque tectrices inferiores fusco-ferrugineæ , cum aliqua rufi mixtura. Pennæ caudam subtus tegentes albo-rufescentes , quibusdam tæniis transversis , dilutè ferrugineis va-

riegatæ. Remiges majores ab exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque sunt in latere exteriori fuscæ, in latere verò interiori albæ, fusco transversim striatæ; in reliqua longitudine nigræ: minores in latere exteriori & apice fusco-ferrugineæ, in latere autem interiori albo & fusco transversim striatæ. Remix prior brevissima est; quarta omnium longissima. Primæ remigis pinnulæ interiores, pinnulæ exteriores & interiores secundæ, tertiæ & quartæ, & pinnulæ exteriores quintæ, versùs uniuscujusque pennæ extremitatem, fiunt subito cæteris multò breviores. Rectrices sunt infernè griseæ, superne verò fuscæ, fusco saturatiore transversim striatæ, apicibus albo-rufescentibus. Oculorum irides pallidè flavæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Pedes concolores. Rostrum plumbeum; ungues verò nigri. *Ex museo Realmuriano.*

vers les deux tiers de leur longueur sont brunes du côté extérieur, & du côté intérieur elles sont blanches, & rayées transversalement de brun; le reste de leur longueur est noirâtre: les moyennes sont d'un brun-ferrugineux du côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est rayé transversalement de brun & de blanc. La première des plumes de l'aile est très-courte; la quatrième est la plus longue de toutes. Les barbes intérieures de la première, les barbes extérieures & intérieures de la seconde, de la troisième & de la quatrième, & les barbes extérieures de la cinquième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers le bout de chaque plume. Les plumes de la queue sont grises en-dessous, & en-dessus elles sont brunes, rayées transversalement d'un brun plus foncé, & terminées de blanc-roussâtre. L'iris des yeux est d'un jaune pâle. La peau nue, qui couvre la base du bec, & les pieds sont jaunes. Le bec est plombé; & les ongles sont noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 33. LA BONDRÉE.

Accipiter superne fuscus , internè ex albo & fusco varius ; cerâ nigrâ ; rectricibus fuscis , fusco saturatiore transversim striatis , apice albo - rufescentibus , lateralibus tæniis albis interius variegatis BUTEO APIVORUS.

Falco pedibus seminudis flavis ; cerâ nigrâ ; capite cinereo ; caudæ faciâ cinereâ , apice albo. *Faun. Suec. Linn. N^o. 66.*

Buteo apivorus. *Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 13.*

Buteo apivorus , seu vespivorus. *Willugh. Ornith. pag. 39. hujus icon satis accurata Tab. III.*

Raj. Syn. Avi. pag. 16. N^o. 2.

Buteo apivorus , seu vespivorus Willughbeyi. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 369.*

Rubetarius Accipiter , *Bellonii.*

Goiran ou Bondrée. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 101 ; avec une figure peu exacte pag. 102.*

Goiran ; Bondrée. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 14 b , dans laquelle est la même figure.*

Bondrée , seu Goiran. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 366. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 367.*

Jonst. Avi. pag. 12. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. VII.

Bondrée. *Alb. Tom. I. pag. 3 ; avec une figure mal coloriée Pl. 2.*

Les Grecs l'appellent Φρυολόκος ; Φρυολοκος ἰσκιζ. *Bel.*

Les Allemands , MAUS-FALCKE. *Rzac.*

Les Suédois , SLAG-HOEK ou SLAG-HOK. *Linn.*

Les Anglois , HONEY-BUZZARD. *Willugh. Raj. Alb.*

Elle est aussi grosse que la Buse. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces , & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; sa queue neuf pouces trois lignes ; son pied un pouce dix lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs,

Crassitie cum Buteone venit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & decem pollices æquat , & ad extremos ungues octodecim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque quindecim lineas longum ; cauda novem pollices & tres lineas ; pes unum pollicem cum decem lineis ; & trium digitorum

digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & totidem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus adhuc brevior. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum & duorum pollicum ; alæ verò complicatæ ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum & uropygium pennis vestiuntur fuscis : alarum tectrices superiores & inferiores & penna caudam superne tegentes concolores : quæ omnes plumæ in exortu albescent ; pennis tamen aliæ aliis incumbentibus , non apparet albedo. Guttur, partem colli inferiorem , pectus , ventrem & latera vestiunt pennæ in exortu albæ , scapulis fuscis , in extremitate verò fuscae. Crura & tectrices caudæ inferiores albescent , latissime tæniis transversis , fuscis variegantur. Remiges majores ab exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes sunt in latere exteriori fuscae , in latere verò interiori albæ , latis , sed raris , tæniis transversis , fuscis striatæ ; in reliqua longitudine nigricantes : minores in la-

joint avec l'ongle , deux pouces deux lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a quatre pieds deux pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus & du dessous des ailes & celles du dessus de la queue sont brunes : toutes ces plumes sont cependant blanches à leur origine ; mais cette couleur ne paroît point , lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre & les côtés sont couverts de plumes blanches à leur origine , ayant leur tige brune , & ensuite terminées de brun. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches , & variées de larges bandes transversales , brunes. Les grandes plumes de l'aile depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur sont brunes du côté extérieur , & du côté intérieur elles sont blanches , & rayées de bandes transversales , brunes , larges & rares ; le reste de leur longueur est noirâtre : les moyennes sont brunes du côté exté-

rieur & à leur bout, & leur côté intérieur est rayé transversalement de brun & de blanc. La première des plumes de l'aile est très-courte; & la troisième est la plus longue de toutes. Les barbes intérieures de la première, les barbes extérieures & intérieures de la seconde, de la troisième & de la quatrième, & les barbes extérieures de la cinquième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers le bout de chaque plume. La queue est composée de douze plumes blanches à leur origine: & dans le reste de leur longueur elles sont grises en-dessous, & leur bout est d'un brun foncé; & en-dessus elles sont brunes, rayées de larges bandes transversales, d'un brun plus foncé, & terminées de blanc-roussâtre: les latérales sont de plus variées du côté intérieur de larges bandes blanches, semées de taches brunes. L'iris des yeux est d'un jaune tirant sur le safran. La membrane, qui couvre la base du bec, est noire. Le bec est noirâtre. Les pieds sont jaunes; & les ongles bruns & peu crochus. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tere exteriori & apice fusca, in latere autem interiori fusco & albo transversim striata. Remix prima brevissima; tertia omnium longissima. Primæ remigis pinnulæ interiores, pinnulæ exteriores & interiores secundæ, tertiæ & quartæ, & pinnulæ exteriores quintæ, versus uniuscujusque pennæ extremitatem, fiunt subito cæteris multò breviores. Duodecim rectricibus cauda constat: omnes in exortu albescent; in reliqua longitudine sunt infernè griseæ, apicibus saturatè fuscis, superne verò fusca, latis tæniis transversis, saturatiùs fuscis striata, apicibus albo-rufescentibus: laterales insuper interiùs variegantur latis tæniis albis, maculis fuscis aspersis. Oculorum irides ex flavo ad croceum colorem inclinant. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, nigra. Rostrum nigricans. Pedes flavi; ungues verò fusci & parùm adunci. *Ex museo Realmuriano.*

34. LE MILAN NOIR.

Accipiter superne fuscus, inferne albicans; capite, collo & uropygio albicantibus; remigibus majoribus nigris . . .
MILVUS NIGER.

Milvus. Charlet. Exer. pag. 72. N°. 14.

Charlet. Onomazt. pag. 65. N°. 14.

Milvus ætoliæ. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 394.

Milvus niger. Schwenck. Avi. Sil. pag. 304.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Milvus niger, seu Milvus fuscus Schwenckfeldii. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 395.

Milvus, primum genus. Jonst. Avi. pag. 13.

Milan noir. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 131.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 22 a, dans laquelle il y a une figure peu exacte. Les Grecs l'appellent Ἰετῖνος αἰτόλιος. Bel. Aldrov. Schwenck. Jonst. Ἰετῖς; Ἰετῖνος. Charlet.

Les Italiens, NIBIO NERO. Bel.

Les Allemands, MEUSE-AHR; SCHWIMMER. Schwenck.

Les Hollandois, KUKEN-DIEFF. Aldrov.

Les Anglois, BLACK GLED. Sibbald. FORKED-TAYL'D KITE; FORKED-TAYL'D GLEAD. Charlet.

Les Angle-Saxons, GLIDA. Charlet.

Magnitudine *Astur* adæquat. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crura, uropygium & caudæ testrices superiores & inferiores albicant. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ concolores. Dorsum, scapulares pennæ, alarumque testrices superiores fuscæ sunt. Majores remiges nigre: minores dorso concolores. Cauda superne fusca est, inferne albicans. Crurum pennæ longiores sunt,

Il est de la grandeur d'un *Autour*. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, le croupion & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont blanchâtres. Celles du dessous des ailes sont de la même couleur. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont brunes. Les grandes plumes de l'aile sont noires. Les moyennes sont de la même couleur que le dos. La queue est brune en-dessus,

Hhh ij

& blanchâtre en-dessous. Les plumes des jambes sont fort longues, & s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur du pied. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est jaune. Le bec & les ongles sont noirs. Les pieds sont jaunes, & fort menus. Il vit de *Rats*, qu'il attrape dans les champs; il mange aussi les *Sauterelles* & les *Petits* des Oiseaux, qui sont encore hors d'état de voler.

& ad mediam pedis longitudinem usque protenduntur. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum nigrum. Pedes lutei & graciles valdè; ungues verò nigri. *Mures* in agris inquit; *Locustas* & *Pullos* Avium, volandi adhuc impotentes, rapit.

** 35. LE MILAN ROYAL.

Voyez Pl. XXXIII.

Accipiter subtus rufus, fusco secundum pennarum scapos longitudinaliter maculatus; caudâ forcipatâ
MILVUS REGALIS.

- Milvus. Gesn. Avi. pag. 609. hujus icon pessima pag. 610.*
Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 392. hujus icon non satis accurata pag. 368.
Jonst. Avi. pag. 13. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XI.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.
Raj. Syn. Avi. pag. 17. N^o. A. 6.
Milvus vulgaris. Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 7.
Milvus vulgaris caudâ forcipatâ. Willugh. Ornith. pag. 41. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VI.
Milvus regalis. Schwenck. Avi. Sil. pag. 302.
Charlet. Exer. pag. 72. N^o. 15.
Charlet. Onomazt. pag. 65. N^o. 15.
Milvus regalis, seu Accipiter ignavus; Fur Pullorum Schwenckfeldii.
Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 394.
Milvus rubeus, Accipiter lævis, Fur Pullorum. Schwenckfeldii.
Milvus secundus Ulyssis Aldrovandi. Schwenck.
Milvus; Milvius. Gesn. icon. Avi. pag. 8, in qua icon pessima.
Milvus, seu Milvius. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 287.
Milvus. Bell. Obs. pag. 19.
Accipiter rubetarius Turneri. Schwenck.

Accipiter ignavus feu *Lanarius rubeus* Alberti. *Schwenck.*

Falco cerâ flavâ; *caudâ forcipatâ*, corpore ferrugineo, capite albidior.

Faun. Suec. Linn. N°. 59.

Falco caudâ forcipatâ. Klein. Avi. pag. 51. N°. 13.

Falco albicans. Barr. Ornith. Class. III. Gen. III. sp. 3.

Ἰεραξ φρυκτολογος Eberi & Peuceri. *Schwenck.*

Milan royal. Alb. Tom. I. pag. 5; avec une figure mal coloriée *Pl. 4.*

Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 129; avec une figure très-peu exacte *pag. 130.*

Milan; *Huau*; *Escoufle. Bel. Portr. d'Ois. pag. 21 b*, dans laquelle est la même figure.

Les Hébreux l'appellent *ДААН. Gesn. Aldrov.*

Les Chaldéens, *TARAPHITHA. Gesn. Aldrov.*

Les Arabes, *ZEDA. Gesn. SEDA. Aldrov.*

Les Grecs, *Ἰκτίς. Bel. Gesn. Ἰκτίς. Schwenck. Willugh. Ἰκτίς. Bel. Gesn.*

Willugh. Ἰκτίς. Aldrov. Jonst. Willugh. Ἰκτίς. Aldrov. Schwenck.

Ἰκτίς ἰκτίς. Adrov. Ἀππ; Δ'ππ. Schwenck.

Les Grecs modernes, *Δικαδαρος. Bell.*

Les Candiots, *Ἀρπετος. Aldrov. Jonst.*

Les Perses, *MAR AN TIH. Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, *MILANO. Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, *MILA. Barr.*

Les Italiens, *MILVIO*; *NICHIO*; *NIBIO. Bel. Gesn. Aldrov. NIGGO. Bel.*

Gesn. POYANA. Aldrov.

Les Allemands, *WY*; *WEYE*; *WEIHER. Gesn. WEIHE*; *GRIMMER*;

SCHWEMMER. Schwenck. HEUNER-GEYER; *STOSZ-VOGEL. Rzac.*

Les Silésiens, *HEUNER-AHR. Gesn. Schwenck. HEUNER-DIEB. Gesn.*

Schwenck. Rzac. HAW-AHR. Schwenck.

Les Saxons, *RUTTEL-WY* ou *ROTEL-WY. Aldrov.*

Les Illyriens, *LUNIAK. Gesn.*

Les Polonois, *KANIA. Rzac.*

Les Hollandois, *WOU*; *WOWE. Aldrov.*

Les Flamands, *WUWE. Gesn. WAU. Aldrov.*

Les Suédois, *GLADA. Linn.*

Les Anglois, *KITE*; *GLEAD. Willugh. Raj. LONG-WINGED KITE*;

PUTTOCK. Charlet. FORKED-TAIL KITE; *FORKED-TAIL GLED. Sibbald.*

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos unum pollicem & septem lineas lon-

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de

long ; sa queue douze pouces ; son pied un pouce onze lignes ; & le milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , a aussi un pouce onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatre pieds huit pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La gorge , la tête & la partie du col qui en est la plus voisine , sont d'un gris-blanc , marqué de taches brunes , qui s'étendent selon la longueur de la tige de chaque plume , qui sont dans ces parties longues & étroites. La partie du col la plus proche du corps , les petites couvertures du dessus de l'aîle , la poitrine , le ventre , les côtés & les couvertures du dessous de l'aîle sont rouffes , & marquées de taches brunes , qui s'étendent de même selon la longueur de la tige de chaque plume. Les jambes & les plumes qui recouvrent la queue en-dessus & en-dessous sont d'un roux plus clair , & n'ont de brun que leur tige. Les plumes du dos sont brunes , & ont leurs bords d'un blanc sale ou rouffâtre. Les grandes couvertures du dessus de l'aîle & les plus longues des

gum est ; cauda duodecim pollices ; pes unum pollicem cum undecim lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine donatur : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum expansarum distantia est quatuor pedum & octo pollicum ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput , guttur & pars colli capiti finitima ex cinereo albert , maculisque variegantur fuscis , secundùm uniuscujusque pennæ scapum ductis : pennæ autem istæ longiores sunt & strictiores. Pars colli corpori vicinior , superiores alarum tectrices minores , pectus , venter , latera , alarumque tectrices inferiores rufæ , & maculis notatæ fuscis , secundùm uniuscujusque pennæ scapum extensis. Crura & tectrices caudæ superiores & inferiores rufo dilutior tinguntur , scapis tantùm fuscis. Dorsum vestiunt pennæ fuscæ , oris sordidè albis aut albo-rufescentibus. Superiores alarum tectrices majores & scapulares longiores fusco , rufo & albo

variegantur : album autem partem pennæ intimam semper occupat. Priores quinque majores remiges sunt nigrae : sex sequentes fuscaë , pinnulis interioribus albo terminatis : quæ istas sequuntur nigricant , & in latere interiore colore obscuriore sunt transversim striatæ : corpori tandem viciniore ex rufo , fusco & albo variegantur. Caudam habet forcipatam ; rectrices enini binæ intermediae omnium brevissimæ ; laterales verò gradatim longiores fiunt , ad utrinque extimam usque longissimam. Omnes sunt rufæ , latere exteriori extimæ & duarum utrinque extimarum apicibus nigricantibus exceptis : omnes quoque albicante terminantur : omnes etiam , binis intermediis exceptis , in latere interiore sunt nigricante transversim striatæ. Cutis nuda sive membrana , basin rostri cooperiens , lutea. Rostrum corneum , apice nigricans. Pedes flavi ; ungues verò nigri. *Ex museo Reaumuriano.*

scapulaires sont variées de brun , de roux & de blanc : cette dernière couleur est toujours du côté intérieur de la plume. Les cinq premières grandes plumes de l'aile sont noires : les six suivantes sont brunes , & ont leurs barbes intérieures terminées de blanc : les autres sont noirâtres , & leur côté intérieur est rayé transversalement d'une couleur plus foncée : enfin les plus proches du corps sont variées de roux , de brun & de blanc. La queue est fourchue , les deux plumes du milieu étant les plus courtes , & toutes les latérales augmentant toujours en longueur , jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus longue. Elles sont rousses , excepté le côté extérieur de la plus extérieure , & le bout des deux plus extérieures de chaque côté , qui sont noirâtres ; toutes sont terminées de blanchâtre : toutes aussi , excepté les deux du milieu , ont leur côté intérieur rayé transversalement de noirâtre. La peau nue ou membrane , qui couvre la base du bec , est jaune. Le bec est de couleur de corne , & noirâtre vers le bout. Les pieds sont jaunes ; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

36. LE MILAN DE LA CAROLINE.

Accipiter superne saturatè purpurascens , infernè albus ; capite & collo albis ; remigibus , rectricibusque purpurascensibus , viridi mixtis ; caudâ forcipatâ MILVUS CAROLINIENSIS.

Falco Peruvianus , caudâ furcatâ. *Klein. Avi. pag. 51. N°. 14.*

Epervier à queue d'Hirondelle. *Catesb. Tom. I. pag. 4 ; avec une figure exacte Pl. 4.*

Les Anglois l'appellent SWALLOW-TAIL HAWK. *Catesb.*


Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Milan royal*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds, & jusqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces. Sa queue a treize pouces de long, & est très-fourchue ; car la plus extérieure des plumes de chaque côté est plus longue de huit pouces que les deux du milieu ; & toutes les autres vont en diminuant par degrés jusqu'à ces deux dernières, qui n'ont que cinq pouces de long. Il a quatre pieds de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Le dos & les couvertures du dessus des ailes sont d'un pour-

Milvo regali paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos circiter pedes æquat, & ad extremos unguis unum pedem & quinque pollices. Cauda tredecim pollices longa est, & maximè forcipata ; rectrix enim utrinque extrema rectrices binas intermedias octo pollicum longitudine superat ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad intermedias usque binas, quinque tantum pollices longas. Alis extensis, extremitates majorum remigum quatuor pedum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crura & caudæ rectrices inferiores albescent.



Designé et Gravé par Martinet


1. Petit Epervier. — 2. Gersault.





Martinet del. et Sculp.

Gerfault d'Islande.





Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Emerillon de la Caroline, femelle.

2. Emerillon de St. Domingue, femelle.



Dessiné et Gravé par Martinet.

Milan.

albes. Dorsum, alarumque
rectrices superiores saturatè
purpurascunt. Uropygium &
rectrices caudæ superiores
eodem imbuuntur colore,
sed ad subfuscum inclinante,
cum aliqua viridis mixtura.
Remiges & rectrices sunt
saturatè purpurascences,
paucò viridi admixto. Ocu-
lorum irides rubræ. Rostrum
nigrum. Viçtitat *Insectis*,
quæ supra arbores & sepes
volando rapit. Habitat æs-
tate in *Carolina*.

pre foncé. Le croupion & les
couvertures du dessus de la
queue sont de la même cou-
leur, mais un peu brunâtre,
& mêlée d'une légère teinte de
verd. Les plumes des ailes &
celles de la queue sont d'un
pourpre foncé, mêlé aussi d'une
légère teinte de verd. L'iris des
yeux est rouge. Le bec est noir.
Il vit d'*Insectes*, qu'il attrape
en volant sur les arbres & les
buissons. On le trouve pen-
dant l'été à *la Caroline*.

IX.

Genus Aquilinum.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis
destituti; tres scilicet an-
tici, posticus unus; om-
nes circiter usque ad exor-
tum discreti:

Crura ad calcaneum usque
plumosa:

Rostrum breve, primùm
rectum, dein aduncum;
ad basin cute nudâ tec-
tum:

Caput plumosum.

IX.

Le genre de l'Aigle.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de mem-
branes; trois devant, un der-
rière; tous séparés environ
jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plu-
mes jusqu'au talon:

Le bec court & crochu; dont
la bête est couverte d'une
peau nue; & dont la cour-
bure commence à quelque
distance de son origine:

La tête couverte de plumes.

** I. L' AIGLE.

Aquila fusca; capite & collo superiore ad rufum inclinanti-
bus; rectricibus albis, apice nigricantibus, duabus utrinque

extimis exterius cinereis ; pedibus pennis fusco-rufescentibus vestitis AQUILA.

Aquila. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 17.*

Jonst. Avi. pag. 1.

Charlet. Exer. pag. 70. N°. 1.

Charlet. Onomazt. pag. 62. N°. 1.

Mus. Worm. pag. 292.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 270.

Moehr. Avi. Gen. 43.

Aquila simpliciter. *Klein. Avi. pag. 41. N°. 3.*

Aquila Alpina saxatilis. *Gaz. Rup. Best. hujus icon accurata Tab. 16.*

Aquila fulva, seu Chrysaëtos, caudâ annulo albo cinctâ. *Raj. Syn. Avi. pag. 6. N°. 2.*

Chrysaëtos, caudâ annulo albo cinctâ. *Willugh. Ornith. pag. 28.*

Aigle. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 89 ; avec une figure exacte Pl. 49.*

Aigle à queue blanche. *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. pag. 54 ; avec une figure exacte Pl. 2.*

Aigle à la queue blanche. *Edwards. Tom. I. pag. 1 ; avec une figure exacte Pl. 1.*

Les Hébreux l'appellent NESER ; ALCHAL ; GAGILA ; AAKEB. *Aldrov.*

Les Arabes, ALNESER ; ZUMAC. *Aldrov.*

Les Grecs, Αἰetos. *Aldrov. Jonst. Willugh. Αἰτες. Aldrov. Willugh. Αἰβητος. Aldrov. Jonst.*

Les Macédoniens, Παγαός. *Aldrov. Jonst. Αἰγίονος ; Αργιποφ. Jonst.*

Les Cypriots, Αγος. *Aldrov. Jonst. Ἰβινος. Jonst.*

Les Espagnols, AGUILA CONOCIDA. *Aldrov.*

Les Allemands, ADLER. *Aldrov. Rzac.*

Les Bas Allemands, ARN ; ARENT. *Aldrov.*

Les Tongres, AAR. *Aldrov.*

Les Suisses, ADLER. *Aldrov.*

Les Illyriens, OZEL ; ORZIS. *Aldrov.*

Les Polonois, ORZEL. *Rzac.*

Les Anglois, EAGLE. *Aldrov. Willugh.*

Il est plus gros qu'un Dindon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds neuf pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a

Crassitie Gallo-pavonem superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes æquat, & ad extremos ungues duos pedes novem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque

duos pollices & quatuor lineas longum est; cauda duodecim pollices; pes quatuor pollices; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & totidem lineas: intimus paulò brevior est; extimus omnium brevissimus; posticus verò anticorum intimum longitudine nonnihil antecellit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pedum & octo pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Pennæ strictæ & acutæ, ex fusco ad rufum inclinantes, partes capitis & colli superiores vestiunt. Quæ dorsum, uropygium, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura in latere tantum exteriore obtegunt, fuscæ, in exortu tamen albæ; quæ albedo, pennis aliis aliis incumbens nullo modo apparet. Alarum tetrices & pennæ caudam superne & infernè tegentes concolores. Pennæ crura in latere interiore vestientes ex fusco ad rufum vergunt. Primores quinque remiges per totam longitudinem nigricant: reliquæ omnes concolores, excepto latere inte-

deux pouces quatre lignes de long; sa queue douze pouces; son pied quatre pouces; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes: l'intérieur est un peu plus court; l'extérieur est le plus court de tous; & celui de derrière est un peu plus long que l'intérieur de ceux de devant. Il a sept pieds huit pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes étroites & pointues, d'un brun tirant sur le roux. Le dos, le croupion, les couvertures des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes du côté extérieur seulement sont couvertes de plumes brunes, qui sont cependant blanches à leur origine; mais cette couleur ne paroît pas lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres. Celles qui couvrent le côté intérieur des jambes, sont d'un brun tirant sur le roux. Les cinq premières plumes de l'aile sont noirâtres dans toute leur longueur: toutes les autres sont de la même couleur, excepté leur côté intérieur, qui

est blanc depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur. Les barbes intérieures des cinq premières plumes de l'aîle & les barbes extérieures de la seconde, de la troisième, de la quatrième & de la cinquième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers l'endroit où finissent les moyennes plumes. Celles de la queue sont blanches depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de leur longueur, & le reste est noirâtre : cependant le côté extérieur des deux plus extérieures de chaque côté est cendré. L'espace entre le bec & l'œil est dégarni de plumes. L'iris des yeux est couleur de noisette. La peau nue, qui couvre la bête du bec, est jaune. Le bec est d'une couleur de corne bleuâtre. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un brun-roussâtre. Les doigts sont jaunes ; & les ongles noirs. Il habite les hautes montagnes, & fait son nid dans les rochers. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

riore ab exortu pennæ ad mediam circiter longitudinem albo. Primarum quinque remigum pinnulæ interiores, & secundæ, tertiæ, quartæ & quintæ pinnulæ exteriores fiunt subito cæteris multò breviores eum versus locum, in quo minores remiges desinunt. Rectrices ab exortu ad duas tertias longitudinis partes usque albe, in reliqua longitudine nigricant, exceptis duabus utrinque extimis exterioribus cinereis. Spatium rostrum inter & oculos contentum pennis nudum est. Oculorum irides avellanæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum ex corneo colore cœrulescit. Pennæ fusco-rufescentes pedes vestiunt ad exortum usque digitorum. Digiti sunt flavi ; ungues verò nigri. In montibus excelsis habitat, & in rupibus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

**** 2. L'AIGLE A TESTE BLANCHE.**

Aquila fusca ; capite, collo, rectricibusque albis ; pedibus pennis fuscis in suprema parte vestitis AQUILA LEUCOCEPHALOS.

Aigle à tête blanche. *Catesb. Tom. I. pag. 1 ; avec une figure exacte*

Pl. I.

Les Anglois l'appellent BALD EAGLE. Catesb.

Crassitie Aquilam vulgarem antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres pedes & totidem pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes decem pollices cum totidem lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos tres pollices longum; cauda duodecim pollices; pes duos pollices cum novem lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & septem lineas: intimus paulò brevior est; extimus omnium brevissimus; posticus verò anticorum intimi longitudinem adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo circiter pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Caput & majorem colli partem vestiunt pennæ albæ, longæ & strictiores. Collum in reliqua longitudine, dorsum, uropygium, remiges alarum, ipsarumque tectrices, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ superiores fuscescunt. Tectrices caudæ infe-

Il est plus gros que l'*Aigle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds dix pouces dix lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; sa queue douze pouces; son pied deux pouces neuf lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces sept lignes: l'intérieur est un peu plus court; l'extérieur est le plus court de tous; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a environ huit pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête & la plus grande partie du col sont couvertes de plumes blanches, longues & étroites. Le reste du col, le dos, le croupion, les plumes des aîles & leurs couvertures, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus de la queue sont brunes. Celles du dessous de la queue & les plumes de la queue sont

blanches. Les barbes intérieures des cinq premières plumes de l'aile & les barbes extérieures de la seconde, de la troisième, de la quatrième & de la cinquième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers l'endroit où finissent les moyennes plumes. L'iris des yeux est blanc. La peau nue, qui couvre la bête du bec, est jaune, ainsi que le bec. La partie du pied, qui est la plus proche de la jambe, est couverte de plumes brunes : le reste du pied & les doigts sont jaunes ; & les ongles noirs. On le trouve en *Europe* & dans l'*Amérique Septentrionale*. Du cabinet de M. de *Reaumur*.

riores & rectrices albes. Primarum quinque remigum pinnulæ interiores, & secundæ, tertiæ, quartæ & quintæ pinnulæ exteriores fiunt subito cæteris multò breviores eum versùs locum, in quo minores remiges desinunt. Oculorum irides candidæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum quoque luteum. Pedes in parte cruribus finitima sive suprema pennis vestiuntur fuscis ; in parte infima lutei sunt : digiti concolores ; ungues verò nigri. Habitat in *Europa* & *America Septentrionali*. Ex museo *Realmuriano*.

3. L'AIGLE BLANC.

Aquila in toto corpore candida AQUILA ALBA.

Aquila alba, sive Cygnea. Gesn. Avi. pag. 199.

Jonst. Avi. pag. 6.

Charlet. Exer. pag. 71. N°. 9.

Charlet. Onomast. pag. 63. N°. 9.

Aquila alba Cygnea. Klein. Avi. pag. 42. N°. 7.

Aquila alba seu Cycnea. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 231.

Aquila alba, seu Aquila Cygnea Aldrovandi. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 362.

Aquila alba. Euf. Nieremb. pag. 234.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 299.

Aigle toute blanche. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 89.

Les Allemands l'appellent WEISSER ADLER. Rzac.

Les Polonois, ORZEL BIALY. Rzac.

Les Anglois, WHITE EAGLE. Charlet.

Aquilam auream magnitudine circiter æquat. In univ-
erso corpore alba est, seu
nivei candoris. Habitat in
Alpibus & *rupibus* circa
Rhenum.

Il est à peu près de la gran-
deur de l'*Aigle doré*. Il est par
tout le corps d'un blanc de
neige. On le trouve sur les
Alpes & sur les rochers des
bords du *Rhin*.

4. L'AIGLE TACHETÉ.

Aquila obscurè ferruginea; alis subtus & cruribus albis maculis aspersis; tectricibus caudæ inferioribus albis; rectricibus in exortu & apice albis; pedibus pennis obscurè ferrugineis, albo maculatis, vestitis AQUILA NÆVIA.

Aquila nævia. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 219.*

Aquila Clanga. *Klein. Avi. pag. 41. N°. 6.*

Morphno congener. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 214. hujus icon non satis accurata pag. 215.*

Jonst. Avi. pag. 4. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. V.

Morphno congener *Aldrovandi*. *Willugh. Ornith. pag. 32. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. II.*

Raj. Syn. Avi. pag. 7. N°. 7.

Charlet. Exer. pag. 70. N°. 6.

Charlet. Onomazt. pag. 63. N°. 6.

Buteo. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 71.*

Les Allemands l'appellent STEIN-ADLER; GAUSE-AAR. *Frisch. ROETLICHTER MEUSE AHR. Schwenck.*

Les Anglois, KOUGH-FOOTED EAGLE. *Charlet.*

Galli fat magni crassitie est & corpulentia. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad cau-
dam extremam duos pedes
septem pollices & sex lineas
æquat, & ad extrêmos un-
gues duos pedes & quinque
pollices. Rostrum ab ipsius
unco ad oris angulos duos
pollices longum est; cauda
duodecim pollices. Alis ex-

Il est de la grosseur & de la
grandeur d'un Coq d'une bonne
taille. Sa longueur depuis le
bout du bec jusqu'à celui de la
queue est de deux pieds sept
pouces six lignes, & jusqu'à
celui des ongles de deux pieds
cinq pouces. Son bec depuis
son crochet jusqu'aux coins de
la bouche a deux pouces de
long; & sa queue douze pou-

ces. Il a quatre pieds de vol. Il est presque par tout le corps d'un ferrugineux obscur. La gorge est cependant d'un blanc sombre. Le dessous des ailes est marqueté de plusieurs taches ovales, blanches, semées çà & là. Les jambes & les pieds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine des doigts, & variés de pareilles taches blanches. Les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres. Les plumes des ailes sont d'un ferrugineux obscur, rayées transversalement de brun, & terminées de blanchâtre. Celles de la queue sont blanches à leur origine & à leur bout; & dans le reste de leur longueur elles sont d'un ferrugineux obscur, varié de larges taches transversales, brunes. La prunelle de l'œil est noire; & l'iris en est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est aussi jaune. Les doigts sont de la même couleur: ils sont couverts d'écailles à leur origine, & de tablettes vers leur extrémité, sçavoir auprès des ongles. Les ongles sont noirs & très-aigus. Il se nourrit principalement de *Rats*. On le trouve en *Europe*.

tensis, extremitates majorum remigum quatuor pedum intervallo distant. In universo ferè corpore obscurè ferrugineo colore tingitur. Guttur tamen obscurè albet. Alæ subtus maculis multis, ovalibus, albis, hinc inde sparsis, insigniuntur. Crura & pedes pennis vestiuntur ad principium digitorum usque, & albis similiter notis sunt aspersa. Rectrices caudæ inferiores albicant. Remiges sunt obscurè ferrugineæ, tæniis fuscis transversim striatæ, apicibus albicantibus. Rectrices in exortu & apice albet; in reliqua longitudine obscurè ferrugineo tinguntur, & maculis latiusculis, fuscis transversim notantur. Oculorum pupilla nigra: eorum verò irides flavæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Digni flavi, in exortu squamis, versùs extremitatem, prope scilicet ungues, tabellis integuntur. Ungues nigri, acutissimi. *Muribus* præcipuè vivit. Habitat in *Europa*.

5. L'AIGLE A QUEUE BLANCHE.

Aquila obscure ferruginea; capite albo, scapis pennarum nigris; uropygio nigricante; rectricibus unâ medietate nigris, alterâ medietate albis; pedibus nudis . . . AQUILA ALBICILLA.

Aquila Pygargus. *Klein. Avi. pag. 40. N^o. 2.*

Pygargus. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 6.*

Pygargus, seu Albicilla, quibusdam Hinnularia. *Willugh. Ornith. pag. 31.*

Pygargus; Albicilla Gazæ; quibusdam Hinnularia. *Raj. Syn. Avi. pag. 7. N^o. 5.*

Falco cerâ flavâ, rectricibus albis, versùs apices nigris. *Faun. Succ. Linn. N^o. 58.*

Les Anglois l'appellent FAWN-KILLING-EAGLE. *Klein.*

Crassitie Gallo-pavoni ferè æqualis est. Ipsi longitudo ab apice rostri ad extremam caudam duos pedes & novem pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes & quinque pollices. Rostrum ab ipsius unco ad angulos oris commensuratum tres pollices longitudine æquat; cauda undecim pollices & sex lineas; pes tres pollices cum sex lineis; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine antecellit. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò

Il est presque aussi gros qu'un Dindon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds cinq pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de longueur; sa queue onze pouces six lignes; son pied trois pouces six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est plus long que ces derniers. Il a six pieds onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'au bout de la queue. La tête est couverte de plumes

blanches, étroites & pointues, & dont les tiges sont noires. L'espace contenu entre les yeux & les narines, est dégarni de plumes, & à leur place est un duvet terminé par des filets, qui imitent des poils. La partie supérieure du col tire un peu sur le roux, & les plumes qui la couvrent, sont fort étroites. Le dos, les plumes scapulaires, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un ferrugineux obscur. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Celles du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos, mais les bords des plus petites tirent un peu sur le cendré. La première des plumes de l'aile ou la plus extérieure est plus courte que la seconde de trois pouces six lignes; la seconde est plus courte que la troisième de six lignes seulement; la troisième & la quatrième sont les plus longues. Toutes les plumes de l'aile sont noirâtres. La queue est composée de douze plumes noires depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, le reste est blanc. Quelques Oiseaux de cette espèce ont au

complicata ad ultimam caudam non extenduntur. Caput albicat; plumæ autem quibus vestitur, stridiores sunt & acutæ, scapisque donantur nigris. Spatio oculos inter & nares plumæ sunt nullæ, sed earum loco setulæ in exortu lanuginosæ. Colli pars suprema nonnihil rufescit; collum autem angustioribus pennis vestitum est. Colli pars infima, dorsum, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura & caudæ rectrices inferiores, quæque alas infernè tegunt pennæ coloris sunt obscurè ferruginei. Uropygium & rectrices caudæ superiores nigricant. Alarum rectrices superiores dorso concolores, minimarum tamen extremis fimbriis nonnihil cinerascens. Remix prima sive extrema tribus pollicibus & sex lineis brevior est quàm secunda; secunda sex lineis brevior quàm tertia; tertia & quarta longissimæ. Remiges autem omnes nigricant. Cauda constat duodecim rectricibus ab exortu ad mediam usque longitudinem nigris; alterâ medietate albis. Quædam hujus speciei Aves rectricibus donantur ab exortu ad medietatem usque al-

bis, à medietate ad extremitatem nigris. Rectrices binæ intermediæ lateralibus gradatim sunt longiores. Mandibulæ superioris adunca pars ultra inferiorem ad pollicis prope spatium propendit. Oculorum irides in quibusdam pallidè avellaneæ, in aliis rubeæ, in alteris flavæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum quoque luteum. Pedes concolores; ungues verò nigri. Habitat in *Europa*.

contraire les plumes de la queue blanches depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, & noires depuis leur moitié jusqu'à l'extrémité. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés. Le crochet du demi-bec supérieur passe le demi-bec inférieur de près d'un pouce. L'iris des yeux est dans quelques-uns d'une couleur de noisette pâle, dans d'autres rouge, & dans d'autres jaune. La peau nue ou

membrane, qui couvre la bête du bec, est jaune. Le bec & les pieds sont de la même couleur; & les ongles sont noirs. On le trouve en *Europe*.

6. LE PETIT AIGLE A QUEUE BLANCHE.

Aquila superne obscurè ferruginea, infernè ex ferrugineo & subnigro varia; capite & collo è cinereo dilutè castaneis, apicibus pennarum nigricantibus; rectricibus albis; pedibus nudis AQUILA ALBICILLA MINOR.

Aquila Pygargus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 70.*

Aquila Pygargus Plinii; Albicilla Gazæ; Hinnularia Roberti Constantini. *Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 361.*

Pygargus. *Gesn. Avi. pag. 205.*

Aldrov. Avi. Tom. I pag. 205. hujus icon minimè accurata pag. 206.

Jonst. Avi. pag. 4. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. III.

Pygargus Aldrovandi *Willugh. Ornith. pag. 31.*

Pygargus Hinnularia. *Charlet Exer. pag. 70. N° 4.*

Charlet Onomast. pag. 65. N° 4.

Pygargus Hinnularius *Sibbald. Scot illustr. Part. II. Lib. III. pag. 14.*

Les Grecs l'appellent Πύγαργος. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, BRAUN-FAHLE ADLER. *Frisch.*

Les Anglois, ERNE. *Gesn. Charlet. Sibbald. FAWN - KILLING - EAGLE.*

Charlet.

Il est d'une grandeur médiocre, & n'est guères plus gros qu'un *gros Coq*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds deux pouces. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes d'un cendré tirant sur le marron clair, & un peu noirâtres par le bout. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un ferrugineux obscur & presque noir. La poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont variées de ferrugineux & de noirâtre, cette dernière couleur occupant le milieu de chaque plume. Les couvertures du dessous des ailes & les plumes des ailes sont d'un ferrugineux obscur & presque noir. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches, excepté deux d'entr'elles, qui sont terminées de noir. Les plumes de la queue sont blanches dans toute leur longueur. La prunelle de l'œil est d'un très-beau noir, & l'iris en est jaune. La peau nue ou membrane, qui couvre la base du bec, est aussi jaune. Le bec est de la même couleur. Les pieds sont d'un jaune vif; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Europe*.

Magnitudine est mediocri, quantâ ferè est *Gallus majusculus*. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & totidem pollices explet. Caput, guttur & collum totum vestiunt pennæ è cinereo dilutè castaneæ, apicibus tamen magis nigricantes. Dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarumque tectrices superiores sunt obscurè ferrugineæ ac subnigræ. Pectus, venter, latera & crura pennis integuntur ex ferrugineo & subnigro variis, subnigro medium pennarum occupante. Alarum tectrices inferiores, sicut & remiges, obscurè ferrugineæ & ferè nigricantes. Tectrices caudæ superiores albæ: duæ tamen ex istis extremo nigræ sunt. Rectrices in tota longitudine albicant. Oculi pupilla nigerrima est; eorumque irides luteæ. Rostrum quoque totum luteum, sicut & cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, etiam lutea. Pedes intensè flavi; ungues verò nigricantes. Habitat in *Europa*.

**** 7. L'AIGLE DORÉ.**

Aquila fusco-ferruginea; capite & collo superiore rufo-ferrugineis; rectricibus sordide albis, tæniis obliquis fusco-ferrugineis variis; pedibus pennis fusco-ferrugineis vestitis.
 . . . **CHRYSAËTOS, SEU AQUILA AUREA.**

Aquila Pyrenaica, maxima, cristata, pennis castaneis, limbo luteo.
Barr. Ornith. Class. III. Gen. IV. sp. 1.

Aquila. Gesn. icon Avi. pag. 3, in qua hujus icon à Bellonio mutuata.

Aquila Germana. Gesn. Avi. pag. 168, in qua eadem icon.

Aquila Gefneri. Jonst. Avi. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. I.

Aquila stellaris, Bellonii.

Aquila regalis. Schwenck. Avi. Sil. pag. 214.

Aquila Chrysaëtos. Klein. Avi. pag. 40. N^o. 1.

Aquila Chrysaëtos à Græcis dicta; Latinis *Aquila* quasi aurea, seu fulva. *Rzac. Anct. Hist. nat. Pol. pag. 359.*

Chrysaëtos. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 110. hujus icon satis accurata pag. 111; alia icon à Bellonio mutuata pag. 114; & insuper altera icon etiam à Bellonio mutuata pag. 115.

Jonst. Avi. pag. 2. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. I; & insuper altera icon à Bellonio mutuata Tab. V.

Charlet. Exer. pag. 70. N^o. 1.

Charlet. Onomast. pag. 62. N^o. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 14.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 4.

Chrysaëtos Aldrovandi; id est, *Aquila fulva*, seu aurea. *Willugh. Ornith. pag. 27. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. I.*

Raj. Syn. Avi. pag. 6. N^o. 1.

Falco cerâ luteâ; pedibus lanatis; corpore rufo. *Faun. Suec. Linn. N^o. 56.*

Αετός χρυσός, Aristoteli. Schwenck. Charlet.

Grand Aigle royal. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 89; avec une figure très-peu exacte pag. 91.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 11 a, dans laquelle est la même figure.

Aigle. Bel. Portr. d'Ois. pag. 12 a, dans laquelle est une figure passable.

Alb. Tom. II. pag. 1; avec une figure mal coloriée Pl. 1.

Les Hébreux l'appellent NESER. Gesn. Aldrov.

Les Chaldéens, NISRA. Gesn. Aldrov.

Les Arabes, NESER; ACHAL; GAGILA. Gesn. Aldrov. ZUMMACH; AUKEB.

Aldrov. HAUKEB. Gesn.

Les Syriens, NAPAN. Aldrov.

- Les Grecs*, Χρυσαιός *Bel. Schwenck* Χρυσαιός γυναικ. *Bel.* Α'ιτός; Α'ιτός.
Gesn. Aldrov. Α'ιβητες. *Aldrov.*
Les Macédoniens, Βραος. *Aldrov.*
Les Cypriots, Αγορ. *Gesn. Aldrov.*
Les Perses, AN SI MUGER. *Gesn. Aldrov.*
Les Espagnols, AGUILA. *Gesn. Aldrov.*
Les Catalans, AGUILA; ALIGA CORONADA. *Barr.*
Les Italiens, AQUILA; AGUGLIA. *Gesn. Aldrov.* AGUISTA; AGUILO.
Bel. Ils appellent le mâle TERZOLO D'AQUILA. *Gesn.*
Les Allemands, ADLER. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac.* ADELER. *Schwenck.*
ADERAL. Aldrov. ARN; ART. *Gesn.*
Les Tongres, AAR ou AR. *Gesn. Aldrov.*
Les Suisses, ADLER. *Gesn.*
Les Flamands, ARENT ou ARNT. *Gesn. Aldrov.*
Les Illyriens, OREL ou ORZIL. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, ORZEL PRZEDNI. *Rzac. Klein.*
Les Suédois, ORN. *Linn.*
Les Anglois, EAGLE. *Gesn. Aldrov.* GOLDEN EAGLE. *Willugh. Charles.*
Alb.

Il est un peu plus gros que l'Aigle ordinaire. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds huit pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces deux lignes de long; sa queue douze pouces; son pied trois pouces dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces dix lignes: l'intérieur est un peu plus court; l'extérieur est le plus court de tous; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jus-

Aquilam vulgarem crassitie nonnihil superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes æquat, & ad extremos unguis duos pedes & octo pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & totidem lineas longum est; cauda duodecim pollices; pes tres pollices & decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & decem lineas; intimus paulò brevior est; extimus omnium brevissimus; posticus autem anticorum intimum longitudine adæquat. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt.

gunt. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ stridiores, rufo-ferrugineæ. Dorsum, uropygium, alarum tectrices, pennæ caudam superne tegentes, guttur, pars colli inferior, pectus, venter & latera sunt fusco-ferruginea. Crura & tectrices caudæ inferiores rufo-ferrugineæ. Remiges omnes nigricant; minores tamen in latere interiore tæniis variegantur transversis, albidis, maculis nigricantibus aspersis. Primæ remigis pinnulæ interiores, pinnulæ interiores & exteriores secundæ & tertiæ, & pinnulæ exteriores quartæ fiunt subito cæteris multò breviores, eum versùs locum, quo minores remiges desinunt. Rectrices ab exortu ad duas tertias longitudinis partes usque sordidè albicant, maculisque variegantur fusco-ferrugineis, & tæniis obliquis, concoloribus sunt striatæ: in reliqua longitudine sunt fusco-ferrugineæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum ex corneo colore cœrulescit. Pedes ad exortum usque digitorum vestiunt pennæ rufo-ferrugineæ. Digi-
giti flavescentes; ungues

qu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes étroites, d'un roux-ferrugineux. Le dos, le croupion, les couvertures des aîles, celles du dessus de la queue, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les côtés sont d'un brun-ferrugineux. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux-ferrugineux. Toutes les plumes de l'aîle sont noirâtres; & les moyennes sont variées du côté intérieur de bandes transversales, blanchâtres, semées de taches noirâtres. Les barbes intérieures de la première des plumes de l'aîle, les barbes intérieures & extérieures de la seconde & de la troisième, & les barbes extérieures de la quatrième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers l'endroit où finissent les moyennes plumes. Celles de la queue sont depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de leur longueur d'un blanc sale, varié de taches d'un brun-ferrugineux, & rayées de bandes obliques, de la même couleur: le reste de leur longueur est d'un brun-ferrugineux. La membrane, qui couvre la base du bec, est jaune. Le bec est

d'une couleur de corne bleuâtre. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un roux-ferrugineux. Les doigts sont jaunâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve en Europe. Il est fréquent en Allemagne. Du cabinet de M. de Reaumur.

** 8. L'AIGLE NOIR.

Aquila nigricans; capite & collo superiore rufo mixtis; rectricibus prima medietate albis, nigricante maculatis, alterâ medietate nigricantibus; pedibus pennis sordidè albis vestitis MELANÆTUS, SEU AQUILA NIGRA.

Aquila valeria, sive *Melanæetus Raji*, Willughbeyi. *Klein. Avi. pag. 41. N^o. 4.*

Aquila Melanætus. Frisch. hujus icon accurata Tab. 69.

Aquila nigra. Schwenck. Avi. Sil. pag. 218.

Aquila nigra Schwenckfeldii; *Melanætus*, seu *Valeria Aldrovandi*; *Aquila leporaria aliorum. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 363.*

Aquila valeria Gazæ; *Aquila minor*; *Melanætus Willughbeyi. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 364.*

Melanætus, seu *Valeria Aquila. Gefn. Avi. pag. 203.*

Melanætus, seu *Aquila valeria. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 197. hujus due icones non satis accuratæ pag. 199 & 200; & insuper altera icon à Bellonio mutuata pag. 201.*

Melanaetus, seu *Aquila valeria. Willugh. Ornith. pag. 30. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. II.*

Melanætos, seu *Aquila valeria. Raj. Syn. Avi. pag. 7. N^o. 4.*

Melanætos. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 14.

Melanætos. Jonst. Avi. pag. 3. hujus due icones ab Aldrovando mutuata Tab. III; & insuper altera icon à Bellonio mutuata Tab. II, sub titulo, Aquila.

Charlet. Exer. pag. 70. N^o. 3.

Charlet. Onomast. pag. 62. N^o. III.

Hiperionis Avis aliorum. Charlet. Jonst.

Aigle noir. Alb. Tom. II. pag. 2; avec une figure peu exacte Pl. 2.

Aigle noire. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 92; avec une figure très-peu exacte pag. 93.

Petite Aigle noire. Bel. Portr. d'Ois. pag. 11 b, dans laquelle est la même figure.

Les

- Les Grecs l'appellent* Μελαίναετος. *Bel.* Μελαναιέτις. *Gesn.* Schwenck. Μελαίναετις.
Bel. Aldrov. Λαγωφίνος. *Bel.* Aldrov. Jonst. Αετος λαγωφίνος. Schwenck.
 Λαγωφίνος. Schwenck. Jonst. Charlet.
Les Espagnols, AGUGLIA NIGRA. *Aldrov.*
Les Italiens, AGUILA NERA; AGUISTA NERA. *Bel.*
Les Allemands, SCHWARTZER ADLER; KLEINER ADLER. *Rzac.*
 SCHWARTZER ADELER; HAZEN-GEYER; HASEN-AHR. Schwenck.
 SCHWARTZ-BRAUNE ADLER. *Frisch.*
Les Siléfiens, SCHWARTZER AHR. Schwenck.
Les Polonois, ORZEL CZARNY; ORZEL MNICYSZY; ORLIK. *Rzac.*
Les Anglois, BLACK EAGLE. *Willugh.* Charlet. *Alb.*

Aquila vulgari paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & decem pollices aëquat, & ad extremos ungues duos pedes & septem pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & quinque lineas longum est; cauda duodecim pollices; pes quatuor pollices; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & totidem lineas: intimus paulò brevior est; extimus omnium brevissimus; posticus autem anticorum intimum longitudine adæquat. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores pennis vestiuntur strictioribus, nigricantibus, cum paucò rufo admixto. Dorsum, uropygium, alarum tectrices, pen-

Il est un peu moins gros que l'*Aigle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds sept pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces cinq lignes de long; sa queue douze pouces; son pied quatre pouces; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes: l'intérieur est un peu plus court; l'extérieur est le plus court de tous; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes étroites, noirâtres, & mêlées d'un peu de roux. Le dos, le croupion, les couvertures des aîles, celles

du dessus de la queue, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les côtés sont noirâtres : toutes les plumes sont cependant blanches à leur origine ; mais cette couleur ne paroît pas, lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres. Les jambes sont brunes. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches, & terminées de brun. Les deux premières plumes de l'aile sont noirâtres ; toutes les autres sont de la même couleur, excepté leur côté intérieur, qui est blanc & semé de taches noirâtres depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur. Les barbes intérieures de la première des plumes de l'aile, les barbes intérieures & extérieures de la seconde, de la troisième, de la quatrième & de la cinquième, & les barbes extérieures de la sixième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers l'endroit où finissent les moyennes plumes. Celles de la queue sont blanches & semées de taches noirâtres depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur ; l'autre moitié est noirâtre. L'iris des yeux est couleur de noisette. La membrane, qui couvre la base du bec, est

næ caudam superne tegentes, guttur, pars colli inferior, pectus, venter & latera nigricant : attamen unaquæque penna in exortu alba est ; albedo autem, pennis aliæ aliis incumbentibus, nullomodo apparet. Crura fusca sunt. Tectrices caudæ inferiores albescent, & fusco terminantur. Priores duæ remiges nigricantes : reliquæ omnes concolores, excepto tamen latere interiore ab exortu remigis ad mediam circiter longitudinem usque albo & maculis nigricantibus asperso. Primæ remigis pinnulæ interiores, pinnulæ interiores & exteriores secundæ, tertiæ, quartæ & quintæ, & pinnulæ exteriores sextæ fiunt subito cæteris multò breviores, eum versùs locum, quo desinunt minores remiges. Rectrices ab exortu ad mediam longitudinem usque albæ sunt & maculis nigricantibus aspersæ ; alterâ medietate nigricantes. Oculorum irides avellanæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, rubescit. Rostrum ex corneo colore ad cœruleum vergit. Pennæ sordidè albæ pedes vestiunt ad exortum usque

digitorum. Digiti autem sunt flavi; ungues verò nigricantes. Habitat in *Europa*. *Ex museo Realmuriano.* Le bec est d'une couleur de corne tirant sur le bleu. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un blanc sale. Les doigts sont jaunes; & les ongles plombés. On le trouve en *Europe*. *Du cabinet de Monsieur de Reaumur.*

9. LE GRAND AIGLE DE MER.

Aquila subalbo, fusco & ferrugineo varia; ventre albedo, maculis ferrugineis notato; tectricibus caudæ superioribus albicantibus, nigro maculatis; rectricibus extremitate nigris; pedibus in parte suprema pennis fusco-ferrugineis vestitis AQUILA OSSIFRAGA.

Aquila Ossifraga. Schwenck. Avi. Sil. pag. 220.

Aquila Ossifraga Aldrovandi. Klein. Avi. pag. 41. N°. 5.

Aquila Ossifraga Aldrovandi; Aquila barbata Plinii; Harpe Oppiani.

Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 363.

Ossifraga. Gesn. Avi. pag. 203.

Bell. Obs. pag. 138.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 222. hujus duæ icones pessimæ pag. 225 & 228.

Charlet. Exer. pag. 71. N°. 8.

Charlet. Onomazt. pag. 63. N°. 8.

Ossifraga & Ossifragus. Jonst. Avi. pag. 5. hujus duæ icones ab Aldrovando mutuata Tab. IV. & V & insuper alia icon non satis accurata Tab. II, sub titulo, Haliaetus.

Haliaetus. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 14.

Haliaetus, seu Ossifraga. Raj. Syn. Avi. pag. 7. N°. 3.

Haliaetus; id est, Aquila marina. Willugh. Ornith. pag. 29. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. I.

Harpe. Gesn. Avi. pag. 542.

Harpa. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 408.

Nisus Veterum, Willugh.

Immussulus aliorum. Charlet.

Ossifragus, ou Espece de Vautour. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 97; avec une très-mauvaise figure pag. 98.

Aigle barbue, ou quelque Espece de Vautour. Bel. Portr. d'Ois. pag. 13 b, dans laquelle est la même figure.

Orfraie ou Ossifrague. Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 140.

Les Hébreux l'appellent RACHAM. Gefn. Aldrov. RAHAM. Aldrov.

Les Arabes, BELEZ. Gefn. Aldrov.

Les Grecs, ΦΩΙΣ. Bel. ΦΩΝΙΣ. Aldrov. Schwenck. Jonst. Φωνή. Schwenck. Jonst. Φων. Charlet.

Les Perses, HAMONI. Gefn. Aldrov.

Les Espagnols, QUENTRANTABUESSOS; CHEBALOS. Aldrov.

Les Italiens, ANGUISTA BARBATA. Bel. AQUILASTRO. Aldrov.

Les Allemands, GROSSER HASEN-AHR. Schwenck.

Les Silésiens, SKAST. Schwenck.

Les Habitans des montagnes de Suisse, BEIN-BRECHER. Gefn. Aldrov. Schwenck. Rzac. STEIN-BREUCHEL. Gefn.

Les Polonois, ORZEL LOMIGNAT. Rzac Klein.

Les Anglois, SEA-EAGLE. Willugh. Sibbald. Klein. OSPREY. Willugh.

Raj. Charlet. Sibbald. Klein. BONE-BREAKER. Charlet.

Il est presque aussi gros que l'Aigle doré. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds quatre pouces six lignes, & depuis le bout du bec jusqu'à celui des ongles il a la même longueur. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long; sa queue douze pouces; son pied cinq pouces six lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que ces derniers. Il a six pieds neuf pouces de vol. La tête & le col sont couverts de plumes longues & étroites. Sous la gorge pendent de petites plumes semblables à des poils: il y a aussi de pareilles plumes de chaque côté de la

Ad Chrysaëti sive Aquilæ aureæ crassitriem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes quatuor pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues eandem mensuram explet. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque quatuor pollices longum est; cauda duodecim pollices; pes quinque pollices cum sex lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices: laterales paulò sunt breviores; posticus verò laterales longitudine adæquat. Alis in contrarium expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & novem pollicum intervallo distant. Caput & collum totum oblongis plumis & angustis obducuntur. In gut-

ture plumulæ tenues, pilorum æmulæ, propendent: quin & oculos inter & nares utrinque plumulæ similes villorum instar rigent. Pennæ singulæ, totum corpus vestientes, triplici colore variant, subalbo scilicet, fusco & ferrugineo. Superiores tamen caudæ rectrices ferè totæ albicant, paucò nigrore conspersæ, & nisi in extremis nigricant. Venter albidus maculis latiusculis, ferrugineis notatur. Crura & pedes ad mediam usque longitudinem obteguntur plumulis oblongis, fuscis, aliquantulum fulvescentibus, seu potiùs ferrugineis. Remiges pennæ ferè ex toto fuscæ sunt, nonnihil ad castaneum vergentes. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ promiscuè notis albis conspersæ, majori ex parte fuscæ sunt, in extremitate tantum nigræ: laterales in latere exteriori fuscæ, in interiori verò albæ, extremitatibus quoque nigris. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, lutea. Rostrum admodum aduncum, ex corneo colore fuscum, nonnihil ad subcœruleum obscurum accedens. Pars pedum

tête entre les yeux & les nari-
nes. Tout le corps est couvert
de plumes variées de trois cou-
leurs, sçavoir de blanchâtre,
de brun & de ferrugineux. Les
couvertures du dessus de la
queue sont cependant presque
toutes blanches, & semées
d'un peu de noir; leurs extré-
mités seulement sont noirâtres.
Le ventre est blanchâtre, &
varié de taches ferrugineuses,
assez larges. Les jambes & les
pieds, jusqu'à la moitié de leur
longueur seulement, sont cou-
verts de petites plumes oblon-
gues, d'un brun tirant un peu
sur le fauve, ou plutôt sur le
ferrugineux. Les plumes des
aîles sont d'un brun tirant un
peu sur le marron. La queue
est composée de douze plumes:
les deux du milieu sont brunes
dans la plus grande partie de
leur longueur, & noires seule-
ment à leur extrémité; le tout
est semé confusément de taches
blanches: les latérales sont bru-
nes du côté extérieur, blan-
ches du côté intérieur, & ter-
minées aussi de noir. La peau
nue ou membrane, qui couvre
la bête du bec, est jaune. Le
bec est fort crochu, d'une
couleur de corne brune, mais
tirant un peu sur le bleuâtre
obscur. La partie des pieds qui
est dégarée de plumes, & les

doigts sont d'un jaune vif. Les ongles sont d'un beau noir, très-crochus, & formant un demi-cercle. On le trouve en Europe.

infima, quæque plumis destituitur, unà cum digitis, intenso luteo tincta est. Ungues nigerrimi, valdè adunci, ita ut semicirculum representent. Habitat in Europa.

** 10. L'AIGLE DE MER.

Voyez Pl. XXXIV.

Aquila superne fusca, infernè alba; occipitio candido; rectricibus lateralibus interiùs albo transversim striatis; pedibus nudis HALIÆTUS, SEU AQUILA MARINA.

Aquila anataria, quam & Clangam, seu Plangam, & Percnum & Morphnum appellant. *Gesn. Avi. pag. 196. hujus icon non satis accurata pag. 197.*

Aquila anataria, Clanga, Planga, Percnus, Morphnus. *Gesn. icon. Avi. pag. 6, in qua eadem icon.*

Aquila Morphnus, seu Clanga Aldrovandi; Aquila anataria Ornithologi; Planga, Planca aliorum. *Rzac. Auç. Hist. nat. Pol. pag. 362.*

Aquila marina. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 216.*

Aquila Pyrenaica, leucophæa, maculis castanei diluti coloris varia. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. IV. sp. 2.*

Halixetus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 187. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 188; & insuper altera icon minimè accurata pag. 190.*

Bell. Obs. pag. 138.

Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 575.

Jonst. Avi. pag. 3.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 5.

Halixetus; Aquila marina. *Charlet. Exer. pag. 70. N°. 2.*

Charlet. Onomazt. pag. 62. N°. 2.

Halixetus, seu Aquila marina; Aquila Piscium. *Rzac. Auç. Hist. nat. Pol. pag. 383.*

Halixetus, seu Halixetus; Aquila marina; Aquila Piscium; Corvus piscator. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 283.*

Halixetus, seu Aquila marina. *Gesn. Avi. pag. 804. hujus icon pessima pag. 805.*

Halixetus, id est, Aquila marina. *Gesn. icon. Avi. pag. 129, in qua eadem icon.*

Gesn. Avi. pag. 201.

- Morphnos, seu Clanga. Aldrov. *Avi. Tom. I. pag. 209. hujus icon à Gefnero mutuata pag. 211.*
- Morphnos, seu Clanga, Anataria etiam dicta. Willugh. *Ornith. pag. 32. hujus icon à Gefnero mutuata Tab. VI, sub titulo, Balbuzardus Anglorum.*
- Morphnos Gefneri & Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 7. N°. 6.*
- Morphnos. *Jonst. Avi. pag. 4. hujus icon à Gefnero mutuata Tab. II, sub titulo, Anataria, seu Morphnos.*
- Charlet. Exer. pag. 70. N°. 5.*
- Charlet. Onomazt. pag. 63. N°. 5.*
- Balbuzardus. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.*
- Balbuzardus Anglorum. *Willugh. Ornith. pag. 37.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 16. N°. 3.*
- Falco pedibus cerâque cœruleis; corpore supra fusco; capite albo. *Faun. Suec. Linn. N°. 57.*
- Orfraye, ou Aigle de mer. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 96, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*
- Bel. Portr. d'Ois. pag. 13 a, dans laquelle est la même figure.*
- Aigle marine. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 140.*
- Aigle canardière. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 139.*
- Les Bourguignons l'appellent CROT PESCHEROT. *Gesn. Aldrov.*
- Les Hébreux, ASNIJA. *Gesn.*
- Les Grecs, Ἀλιαιτος. *Bel. Aldrov. Ἀλιαιτος. Bel. Gesn. Ἀλιαιτος. Schwenck. Μίγρονος; Πλάγγος; Κλάγγος; Περκνος. Aldrov. Jonst. Charlet. Νητοφονος. Aldrov. Jonst.*
- Les Turcs, SCHAHAU. *Gesn. SCHAHAU. Aldrov.*
- Les Italiens, ANGUISTA PIOMBINA. *Bel. Gesn. Aldrov. AQUILASTRO. Gesn.*
- Les Savoyards, AYGLE DE MER. *Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, FISCH-ADLER. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. FISCH-ARN. Gesn. FISCHER; MASSWY. Gesn. Aldrov. MEER-ADLER. Schwenck. Jonst. ROHR-FALCKE. Schwenck. & quelques-uns, SOFER. Gesn. SOKER. Aldrov.*
- Les Allemands, qui habitent les bords de la mer, VISHAERN. *Gesn. VISA-RENT. Aldrov.*
- Les Allemands auprès du Lac de Constance, ENTENSTOESSEL. *Gesn. Aldrov.*
- Les Silésiens, FISCH-AHR. *Schwenck.*
- Les Illyriens, OSTRZISS. *Gesn. Aldrov. OSTRYZ. Rzac.*
- Les Polonois, ORZEL MORSKI; OSORIA. *Rzac.*
- Les Suédois, FISK-OERN; FISKTIUS; BLAOFOT. *Linn.*
- Les Anglois, BALD-BUZZARD. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. & quelques-uns, SEA-EAGLE. Raj. Charlet. FOWL-KILLING EAGLE. Charlet.*

Il est de la petite espece. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long; sa queue neuf pouces; son pied deux pouces trois lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes: l'extérieur est un peu plus court; l'intérieur l'est encore davantage; & celui de derriere est le plus court de tous. Il a cinq pieds trois pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Les plumes qui couvrent le sommet de la tête, sont brunes dans leur milieu & blanches vers leurs bords. Le derriere de la tête, la gorge & le col sont blancs, avec quelques lignes longitudinales, brunes sous la gorge, & une grande tache de la même couleur à la partie supérieure du col. Il y a aussi de chaque côté du col une large bande brune, qui s'étend selon sa longueur, en commençant derriere les yeux. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont brunes. La poitrine

Hæc est Aquilæ species minor. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices æquat, & ad extremos ungues novemdecim pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque octodecim lineas longum est; cauda novem pollices; pes duos pollices cum tribus lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas: extimus paulò brevior est; intimus adhuc brevior; posticus omnium brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ paulò ultra caudam extremam extenduntur. Verticem capitis vestientes pennæ sunt in medio fuscæ, & circa oras albescentes. Posterior capitis pars sive occipitium, guttur & collum alba sunt, maculis quibusdam, longitudinalibus, fuscis sub gutture mixtis, & collo superiore majusculâ maculâ fuscâ donato. In utroque colli latere lata extat tænia fusca, post oculos orta, & secundum colli longitudinem ducta. Dorsum, uropygium, scapulares

scapularès pennæ , alarum-
que tectrices superiores sunt
fuscæ. Pectus in quibusdam
albicat , in aliis ex fusco ad
rufum vergit. Venter , late-
ra , crura & tectrices caudæ
inferiores albæ. Alas subtus
tegentes pennæ fusco & albo
variegatæ. Remiges majores
ex fusco nigricant ; minores
verò fuscæ sunt : omnium
autem latus interius ab exor-
tu pennæ ad mediam circi-
ter longitudinè usque tæ-
niis transversis , albis varie-
gatur. Rectrices fuscæ : binæ
intermediæ unicolores ; la-
terales verò in latere inte-
riore albo sunt transversim
striatæ. Minutissimæ squamæ
rotundæ , cinereo-cœrulef-
centes pedes , digitosque
vestiunt. Rostrum ungue-
que nigri. Habitat circa flu-
vios & stagna. Una in *mu-
seum Realmurianum* missa est
ab *illustrissimo Sylvaneden-
si Episcopo*.

est blanche dans quelques-uns ,
& d'un brun tirant sur le roux
dans d'autres. Le ventre , les
côtés , les jambes & les cou-
vertures du dessous de la queue
sont blanches. Les couvertures
du dessous de l'aile sont variées
de brun & de blanc. Les gran-
des plumes de l'aile sont d'un
brun-noirâtre ; les moyennes
sont brunes : & toutes depuis
leur origine jusque vers la moi-
tié de leur longueur ont leur
côté intérieur rayé transver-
salement de blanc. Celles de la
queue sont brunes , & toutes ,
excepté les deux du milieu , qui
sont d'une seule couleur , ont
leur côté intérieur rayé trans-
versalement de blanc. Les pieds
& les doigts sont couverts de pe-
tites écailles rondes , d'un gris-
bleuâtre. Le bec & les ongles
sont noirs. On le trouve sur les
rivieres & les étangs. Il y en a
un dans le *cabinet de M. de
Reaumur* , qui lui a été envoyé
par *M. l'Evêque de Sens*.

** II. LE JEAN-LE-BLANC.

Aquila superne griseo-fusca , infernè alba , fusco-rufescente
maculata ; reatricibus exterius & apice fuscis , interius
albis , fusco transversim striatis ; pedibus nudis
PYGARGUS.

Pygargus , primum genus Bellonii. *Jonst. Avi. pag. 4. hujus icon à
Bellonio mutuata Tab. II, sub titulo , Pygargus.*

Pygargi secundum genus. *Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 208, in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*

Jean le Blanc, ou Oiseau St. Martin. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 103; avec une assez bonne figure pag. 104.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 15, dans laquelle est la même figure.

Il est presque aussi gros que l'*Aigle noir*; mais il est beaucoup moins grand. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces deux lignes de long; sa queue dix pouces; son pied trois pouces trois lignes; & le milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces sept lignes: l'intérieur est un peu plus court; l'extérieur l'est encore davantage; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à un pouce au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un gris-brun. Le tour des yeux est noir. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, les côtés, le haut du ventre & les couvertures du dessous de l'aile sont blanches, & variées de quelques taches

Ad Melanæti crassitiem accedit; magnitudine autem multò inferior est. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues unum pedem & decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos pollices & totidem lineas longum est; cauda decem pollices; pes tres pollices cum totidem lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & septem lineas; intimus paulò brevior est; extimus adhuc brevior; posticus verò omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ griseo-fuscæ. Tectrices alarum superiores & pennæ caudam superne regentes concolores. Oculorum ambitus niger. Guttur, pars colli inferior, pectus, latera, venter supremus, alarumque tectrices

inferiores albes, & maculis quibusdam rarissimis, fusco-rufescentibus variegantur. Maculae autem guttur & partem colli inferiorem variegantes, secundum pennae scapi longitudinem extenduntur. Venter imus, crura & rectrices caudae inferiores albae, immaculatae. Remiges majores inferne candidae, exceptis tamen primorum quatuor remigum apicibus nigricantibus, superne vero in latere exteriori & apice nigricantes, in latere interiore albae: minores superne fuscae in latere exteriori & apice tantum; in latere vero interiore & inferne in utroque latere albae, fusco transversim striatae. Rectrices remigibus minoribus concolores. Oculorum irides flavae. Rostrum, unguisque cinerei; pedes vero flavicantes. In *Gallia* frequens. In *museum Real-murianum* missus à *D. Salerne*.

d'un brun-roussâtre, mais très-rare. Celles qui sont à la gorge & à la partie inférieure du col s'étendent selon la longueur de la tige de la plume. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches & sans taches. Les grandes plumes de l'aile sont blanches en-dessous, excepté le bout des quatre premières, qui est noirâtre, & en-dessus elles sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout, & blanches du côté intérieur: les moyennes sont brunes en-dessus du côté extérieur & à leur bout; & leur côté intérieur, ainsi que tout le dessous, est blanc, & rayé transversalement de brun. Les plumes de la queue sont de la même couleur que les moyennes de l'aile. L'iris des yeux est jaune. Le bec & les ongles sont cendrés; & les pieds jaunâtres. Il est commun en *France*. Du cabinet de *M. de Reaumur*, à qui il a été envoyé par *M. Salerne*.

12. L'AIGLE DU BRÉSIL.

Aquila ex fusco & nigricante varia, cinereo in alis admixto; rectricibus albis, in extremitate nigricantibus, albo terminatis; pedibus nudis. AQUILA BRASILIENSIS.

Urubitinga Brasiliensis. Marcgr. Hist. Br. pag. 1214, in qua hujus icon pessima. Jonst. Avi. pag. 146, hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 61.

Urubitinga Brasiliensibus, Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 32.*

Raj. Syn. Avi. pag. 8. N°. 9.

Les Brasiliens l'appellent URUBITINGA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est à peu près de la grosseur d'une Oye de six mois. Son bec est épais ; & sa tête grosse. Sa queue a neuf pouces de long. Tout son corps est couvert de plumes brunes & noirâtres ; avec quelque mélange de cendré sur les ailes. Les plumes de la queue sont blanches depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de leur longueur ; le reste est noirâtre, & terminé de blanc. Ses yeux sont grands. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est jaunâtre. Le bec & les ongles sont noirs ; & les pieds jaunes. On le trouve au Brésil.

Ad *Anseris semestris* crassitiem accedit. Rostrum habet crassum ; caput grande ; caudam novem pollices longam. In toto corpore vestitur pennis fuscis & nigricantibus ; per alas tamen quasi cinereus miscetur. Rectrices ab exortu ad duas tertias longitudinis partes usque albescent, in reliqua longitudine nigricant, & rursus albo terminantur. Oculi magni sunt. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, flavescit. Rostrum nigrum est. Pedes lutei ; ungues verò nigri. Habitat in *Brasilia*.

13. L'AIGLE HUPÉ DU BRÉSIL.

Aquila cristata ; superne fusco & nigro varia, infernè alba, nigro maculata ; collo superiore fulvo ; rectricibus fuscis, oris albicantibus ; pedibus pennis albis, nigro maculatis, vestitis *AQUILA BRASILIENSIS CRISTATA.*

Aquila cristata. Euf. Nieremb. pag. 217.

Willugh. Ornith. pag. 299.

Aquila Brasiliensis cristata, Urutaurana indigenis dicta, Marcgravii.

Raj. Syn. Avi. pag. 7. N°. 8.

Urutaurana Brasiliensibus, & Urutavi cuquichu caririri. Marcgr. Hist.

Br. pag. 203. hujus icon pessima pag. 204.

Jonst. Avi. pag. 139. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

Urutaurana Brasiliensium Marcgravio ; Aquila Brasiliensis cristata.

Willugh. Ornith. pag. 32. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. IV.

Urutaurana. *Klein. Avi. pag. 42. N^o. 8.*

Falco maximus subcinereus cristatus. *Browne. nat. Hist. of Jamaic. pag. 471.*

Yzquauhli. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 34. cap. C.*

Raj. Syn. Avi. pag. 161.

Itzquauhli. *Jonst. Avi. pag. 153.*

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent ORONOOKO-EAGLE. Browne.

Les Brasiliens, URUTAUANA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Mexiquains, YZQUAUHTLI. Nieremb. Fern. Willugh.

Magnitudine & crassitie cum *Aquila vulgari* convenit. Caput ipsius superius compressum est seu planum, in cujus summitate duas habet pennas nigras, duos circiter pollices longas, cum duabus parvulis ad latus quodlibet : illas autem ad libitum in altum surrigit, atque iterum componit. Alæ complicatæ ultra exortum caudæ non multum protenduntur. Pennæ fuscae, quarum oræ subflavescent, caput superius obtegunt. Collum in parte superiore & ad latera fulvis vestitur pennis. Dorsum fusco & nigro variegatur. Guttur & collum inferius alba sunt, ita tamen ut albedo ad latera pennis nigris sit variegata. Pectus, venter, crura & pedes ad digitorum principium usque pennis vestiuntur albis, quibus nigra squamatim admixtae sunt. Alarum rectrices superiores fusci sunt co-

Il est de la même grandeur & de la même grosseur que l'*Aigle ordinaire*. La partie supérieure de la tête est comprimée ou applatie. Sur le sommet de la tête sont deux plumes noires, longues d'environ deux pouces, & accompagnées de deux autres plumes plus petites, placées à chacun de leurs côtés : l'Oiseau peut redresser ou coucher ces plumes selon sa volonté. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas beaucoup au-delà de l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes brunes, dont les bords tirent un peu sur le jaunâtre. Celles qui couvrent la partie supérieure & les côtés du col, sont fauves. Le dos est varié de brun & de noir. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches ; & cette couleur est variée de quelques plumes noires sur les côtés. La poitrine, le ventre, les jambes & même les pieds jusqu'à

l'origine des doigts sont couverts de plumes blanches, mêlées de plumes noires, posées comme des écailles. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun mêlé d'une couleur plus obscure, & leurs bords sont blanchâtres. Les plumes des ailes sont brunes, & rayées transversalement de noir. Celles de la queue sont de la même couleur que les couvertures du dessus des ailes, & ont pareillement leurs bords blanchâtres. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est couleur d'or.

La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est jaune. Le bec est noir. Les pieds sont jaunes; & les ongles bruns. On le trouve au *Bresil*.

14. L'AIGLE HUPÉ D'AFRIQUE.

Aquila cristata; superne saturatè fusca ad nigrum vergens, marginibus pennarum dilutè fuscis, infernè alba maculis orbiculatis nigris varia; pectore rufo; rectricibus superne saturatè griseis, taniis transversis nigris striatis; pedibus pennis albis, maculis orbiculatis nigris variis, vestitis.

AQUILA AFRICANA CRISTATA.

Aigle huppé. *Edwards. Glanur. pag. 31. Chap. XIV; avec une figure exacte Pl. 224.*

Les Anglois l'appellent *CROWNED EAGLE. Edwards.*

Il est environ d'un tiers plus petit que nos plus grands *Aigles*; mais il paroît, comme eux, fort & hardi. Le synciput, les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont couver-

loris cum umbra mixti, oris uniuscujusque pennæ albicantibus. Remiges sunt fusca & taniis transversis, nigris variegata. Rectrices tetricibus alarum superioribus concolores, atque oras habent albicantes. Oculorum pupilla nigra; ipsorumque irides aureæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, flava. Rostrum nigrum. Pedes lutei; ungues verò fusci. Habitat in *Brazilia*.

Magnitudine maximis nostratibus *Aquilis* tertiâ circiter parte cedit: attamen non minùs ac illæ valida & generosa videtur. Pennæ candidæ, minutis maculis nigris

asperæ, sinciput, genas, guttur & partem colli inferioriorem vestiunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarum tectrices & caudam superne tegentes sunt saturatè fuscæ ad nigrum vergentes, uniuscujusque pennæ marginibus dilutè fuscis, exceptis tamen minorum alarum tectricum oris albis. Margines alarum, versùs articulum carpo humano respondentem, albescent. Pectus rufum, latis tæniis transversis, nigris ad latera varium. Ventrem, caudam subtus, crura & pedes ad digitorum principium usque cooperiunt pennæ albæ, maculis orbiculatis, nigris variæ. Remiges alarum fusco tinguntur saturatiore quàm ipsarum tectrices, & oris donantur exterioribus dilutè fuscis. Rectrices superne sunt saturatè griseæ, tæniis transversis, nigris variæ; infernè verò griseo modò saturatiùs, modò dilutiùs transversim striatæ. In summo capite pennæ extant cæteris longiores, quas Avis in altum surrigit, unde crista efficitur. Oculorum irides ex aurantio ad rubedinem vergunt. Rostrum

tes de plumes blanches, parsemées de petites taches noires. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé tirant sur le noir, & les bords de chaque plume sont d'un brun clair, excepté ceux des plus petites couvertures des ailes, qui sont blancs. Le bord de l'aile, au pli qui répond à celui du poignet, est de cette dernière couleur. La poitrine est rousse, & variée sur ses côtés de larges bandes transversales, noires. Le ventre, le dessous de la queue, les jambes & les pieds jusqu'à l'origine des doigts sont couverts de plumes blanches, variées de taches rondes, noires. Les plumes des ailes sont d'un brun plus foncé que leurs couvertures, & ont aussi leur bord extérieur d'un brun clair. Celles de la queue sont en-dessus d'un gris foncé, rayé de bandes transversales, noires; & en-dessous elles sont rayées transversalement de gris foncé & de gris clair. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres, & l'Oiseau les redresse en forme de huppe. L'iris des yeux est d'un orangé tirant sur le rouge. Le bec & la

membrane, qui couvre les nari-
nes, sont d'un brun obscur. Les
doigts sont d'un orangé vif; &
les ongles sont noirs. On le
trouve sur les côtes d'Afrique.

obscurè fuscum. Cutis nuda
sive membrana, nares coo-
periens, concolor. Digiti
splendidè aurantii; unguis
verò nigri. Habitat in oris
Africaë maritimis.

** 15. L'AIGLE DE PONDICHERY.

Voyez Pl. XXXV.

Aquila castanea, scapis pennarum nigricantibus; capite, collo
& pectore albis, lineolis longitudinalibus fuscis variis; re-
migibus sex primoribus ultimâ medietate nigris; pedibus
nudis *AQUILA PONTICERIANA.*

Il est à peu près de la gros-
seur du *Gerfault*. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est d'un pied
sept pouces, & jusqu'à celui
des ongles de seize pouces. Son
bec depuis son crochet jus-
qu'aux coins de la bouche a un
pouce sept lignes de long; sa
queue sept pouces trois lignes;
son pied un pouce onze lignes;
& celui du milieu des trois
doigts antérieurs, joint avec
l'ongle, un pouce huit lignes:
les latéraux sont un peu plus
courts; & celui de derrière est
de la même longueur que l'ex-
térieur de ceux de devant: l'in-
térieur est le plus court de tous.
Il a trois pieds neuf pouces de
vol; & ses ailes, lorsqu'elles
sont pliées, s'étendent un peu
au-delà du bout de la queue.

Crassitie Gyr Falconem cir-
citer æquat. Ipsius longitudo
ab apice rostri ad caudam
extremam usque unum pe-
dem & septem pollices ex-
plet, & ad extremos un-
guis sexdecim pollices. Ros-
trum ab ipsius unco ad oris
angulos unum pollicem &
septem lineas longum est;
cauda septem pollices cum
tribus lineis; pes unum pol-
licem & undecim lineas;
& trium digitorum antico-
rum medius cum ungue
unum pollicem & octo li-
neas: laterales paulò sunt
breviores; posticus antico-
rum extimum longitudine
adæquat: intimus autem om-
nium brevissimus. Ab extre-
mo ad extremum alarum ex-
tensarum distantia est trium
pedum.

pedum & novem pollicum; alæ verò complicatæ ultra caudæ extremitatem nonnihil protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus & ventrem supremum vestiunt pennæ albæ, lineolâ strictissimâ, fuscâ, secundum scapi longitudinem extensâ, præditæ. In toto reliquo corpore, dorso scilicet, uropygio, imo ventre, lateribus, cruribusque, castanea est, uniuscujusque pennæ scapo nigricante. Caudam superne & infernè tegentes, alarum tectrices superiores & inferiores, & scapulares pennæ, sicut & ala notha, concolores. Remiges sex primores primâ medietate castaneæ, ultimâ versùs apicem nigræ: reliquæ omnes castaneæ, scapo nigro, ad latus interius tantum quibusdam exiguis taniis transversis, nigricantibus variegantur. Partes in superiore pennarum facie castaneæ, in inferiore sunt dilutè fulvæ. Pinnulæ exteriores & interiores tertiæ, quartæ & quintæ remigum, & pinnulæ exteriores tantum sextæ remigis fiunt subito cæteris multò breviores, eo in loco, in quo castaneus desinit color. Caudam componunt duodecim

La tête, la gorge, le col, la poitrine & le haut du ventre sont couverts de plumes blanches, qui ont chacune une ligne brune, fort étroite, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Tout le reste du corps, sçavoir le dos, le croupion, le bas-ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des aîles, les plumes scapulaires & l'aîle bâtarde, est marron, & la tige de chaque plume est noirâtre. Les six premières plumes de l'aîle sont marron à leur origine, & terminées de noir: toutes les autres sont marron, ont leur tige noire, & sont variées du côté intérieur seulement de quelques petites bandes transversales, noirâtres. Ce qui est marron dans le dessus de ces plumes, est d'un fauve clair dans le dessous. Les barbes extérieures & intérieures de la troisième, de la quatrième & de la cinquième des plumes de l'aîle, & les barbes extérieures seulement de la sixième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers l'endroit où se termine la couleur marron. La queue est composée de douze plumes marron: les six du milieu sont terminées d'un fauve

clair ; & les trois plus extérieures de chaque côté sont variées du côté intérieur seulement de quelques petites bandes transversales , noirâtres. La peau nue ou membrane , qui couvre la bête du bec est bleuâtre. Le bec est cendré à son origine , & d'un jaune pâle à son bout. Les pieds sont jaunes ; & les ongles noirâtres. On le trouve à *Pondichery* , d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry* , qui le conserve dans son cabinet. Les *Malabares* adorent cet Oiseau.

X.

Le genre du Vautour.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant , un derrière ; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec court & crochu ; dont la bête est couverte d'une peau nue ; & dont la courbure commence à quelque distance de son origine :

La tête ou nue , ou seulement couverte de duvet.

rectrices castaneæ : sex intermedia apicibus donantur dilutè fulvis ; & tres utrinque extimæ in latere interiore tantum quibusdam exiguis tæniis transversis , nigricantibus variegantur. Cutis nuda sive membrana , basin rostri cooperiens , cœrulescit. Rostrum in exortu cinereum , apice pallidè flavum. Pedes lutei ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ponticerio* , unde in *musæum D. Aubry* missa est. A *Malabaris* cultu divino honoratur hæc Avis.

X.

Genus Vulturinum.

Hujus character est
Digiti quatuor , membranis destituti ; tres scilicet antici , posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum breve , primum rectum , dein aduncum ; ad basin cute nudâ tectum :

Caput vel nudum , vel lanugine tantum præditum.



Designé et Gravé par Martinet.

Aigle de Mer.



Desiné et Gravé par Martinet.

Aigle de Pondichéri.

** I. LE VAUTOUR.

Vultur fusco-nigricans ; remigibus & rectricibus ad cinereum
vergentibus ; pedibus pennis fuscis vestitis . . . VULTUR.

Vultur. *Gesn. Avi. pag. 780.*

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 235.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 373.

Jonst. Avi. pag. 6.

Willugh. Ornith. pag. 34.

Charlet. Exer. pag. 71. N^o. II.

Charlet. Onomazt. pag. 63. N^o. II.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 297.

Moehr. Avi. Gen. 44.

Vultur ; Avis magna Plauti. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 428.*

Vultur cinereus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 271. hujus icon à Bellonio
mutuata pag. 272.*

Willugh. Ornith. pag. 35. N^o. 1.

Raj. Syn. Avi. pag. 9. N^o. 1.

Charlet. Exer. pag. 71. N^o. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 64. N^o. 2.

Vultur cinereus Jonstoni. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 430.*

Vultur cinereus Autorum. *Klein. Avi. pag. 44. N^o. 4.*

Vultur Σποδοειδής, seu magis cinereus. *Jonst. Avi. pag. 7. hujus icon
à Bellonio mutuata Tab. VI.*

Grand Vautour cendré. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 83 ; avec une mau-
vaise figure pag. 84.*

Grand Vautour. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 9 a, dans laquelle est la même
figure.*

Les Hébreux l'appellent ΑΙΑΗ. *Gesn. Aldrov.*

Les Arabes, RACHAME ou ROCHAM. *Gesn. Aldrov.*

Les Grecs, Γύψ. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Γύψ μετ'ων. Bel. Οἶωνος ;
Αἰγυπίος. Jonst.*

Les Grecs modernes, Τίτας. *Gesn. Aldrov. Γύπας. Schwenck. Jonst.*

Les Espagnols, BUYETRE. *Aldrov.*

Les Italiens, AVOLTOIO. *Bel. Gesn. Aldrov. AVOLTOIO GRANDE. Bel.*

Les Savoyards, VAUTEUR. *Gesn. VAULTEUR. Aldrov.*

Les Allemands, GYR. *Gesn. Aldrov. Schwenck. GEIR. Aldrov. GEIER.
Gesn. GEYER. Schwenck. Rzac.*

Les Flamands, VOGEL GHYER. *Aldrov.*

Les Illyriens, SUP. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, SEP. *Gesn. Aldrov. Rzac. SEMP. Gesn. Aldrov.*

Il est plus gros que l'*Aigle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds six pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces trois lignes de long; sa queue douze pouces six lignes; son pied quatre pouces; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a sept pieds neuf pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le haut du col sont couverts d'un duvet brun. Sous la gorge sont en outre plusieurs plumes longues, qui imitent des poils, & qui sont à l'Oiseau une espece de barbe. Tout le reste du corps, sçavoir le bas du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue,

Aquilam crassitie superat.
Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & sex pollices aequat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque quatuor pollices & tres lineas longum est; cauda duodecim pollices cum sex lineis; pes quatuor pollices; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pedum & novem pollicum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, guttur & colli pars suprema fuscâ teguntur lanugine. Pennulæ longæ, pilorum æmulæ, sub gutture prominent, & barbam quodammodo efficiunt. Totum reliquum corpus, infimum scilicet collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera & crura, pennis vestitur fuscâ.

co-nigricantibus. Scapulares pennæ, alarum tectrices superiores & inferiores, quæque caudam superne & infernè cooperiunt, concolores. Remiges & rectrices eodem imbuuntur colore, sed ad cinereum nonnihil vergente. Pennæ fuscæ pedes vestiunt ad principium usque digitorum. Digni sunt flavi; ungues verò nigri. Habitat in *Europa*. In altis montibus degit; & cadaveribus præcipuè victitat.

la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes, est couvert de plumes d'un brun-noirâtre. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur, mais tirant un peu sur le cendré. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes brunes. Les doigts sont jaunes; & les ongles noirs. On le trouve en *Europe*. Il fréquente les hautes montagnes; & se nourrit principalement de corps morts.

**** 2. LE VAUTOUR BRUN.**

Vultur fuscus; remigibus fusco-nigricantibus, primariis apice albis fusco maculatis; rectricibus griseo-fuscis; pedibus nudis VULTUR FUSCUS.

Aquila Heteropus. Gesn. Avi. pag. 207, in qua icon minimè accurata.

Aquila Heteropus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 232, in qua icon à Gesnero mutuata.

Aquilæ genus, Heteropus cognominatum. Gesn. icon. Avi. pag. 4, in qua icon minimè accurata.

Heteropus Gesneri. Jonst. Avi. pag. 6. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. V.

Charlet. Exer. pag. 71. N°. 10.

Charlet. Onomazt. pag. 63. N°. 10.

Pernopterus cucullatus, fuscus, punctis nigris. Barr. Ornith. Class. III. Gen. I. sp. 2.

Falco capite nudo, fuscus. Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 2.

Les Allemands l'appellent ADLER Gschlecht. Gesn.

Quoad crassitiem *Phasianum* inter & *Pavonem* medium locum obtinet. Ipsius longitudo ab apice rostri ad

Il tient le milieu pour la grosseur entre le *Faisan* & le *Paon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est

de deux pieds six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue neuf pouces; son pied deux pouces neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces dix lignes: l'intérieur est un peu plus court; l'extérieur l'est encore davantage; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte d'un duvet brun; & le col est couvert de plumes étroites, d'un brun très-foncé ou noirâtre. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont brunes. Les couvertures de l'aîle sont d'un brun plus foncé, & variées de quelques taches blanches. Les plumes de l'aîle sont d'un brun-noirâtre, excepté le bout des deux ou trois premières, qui est blanc, & varié de taches brunes. Celles de la queue sont d'un gris-brun. Le bec est noir. Les pieds sont jaunâtres; & les

caudam extremam duos pedes & sex lineas aequat, & ad extremos ungues unum pedem & decem pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos duos pollices & sex lineas longum est; cauda novem pollices; pes duos pollices & novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & decem lineas: intimus paulò brevior est; extimus adhuc brevior; & posticus anticorum extremum longitudine adæquat. Alæ complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis pars superior fusca lanugine vestitur; collum verò cooperiunt pennæ strictiores, saturatissimè fusca aut fusconigrificantes. Dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ superiores & inferiores fusca sunt. Tectrices alarum fusco saturatiore tinguntur, & quibusdam maculis albis variegantur. Remiges sunt fusco-nigrificantes, exceptis tamen duarum aut trium primorum apicibus albis, maculis fuscis variegatis. Rectrices sunt griseo-fusca. Rostrum nigrum. Pedes flavescentes; ungues

verò nigricantes. Habitat in ongles noirâtres. On le trouve
Europa. A Melita Insula in en Europe. Il a été envoyé de
museum Realmurianum mis l'Isle de Malthe à M. de Reau-
fus est à D. Godeheu. mur par M. Godeheu.

3. LE VAUTOUR D'EGYPTE.

Vultur rufus ad cinereum vergens, maculis fuscis varius ;
pedibus nudis VULTUR ÆGYPTIUS.

Sacer Ægyptius Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 378. hujus icon
à Bellonio mutuata pag. 379.

Jonst. Avi. pag. 12. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. IX, sub titulo
Accipiter Ægyptius.

Accipiter Ægyptius, Bellonii.

Sacre Egyptien. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 110 ; avec une figure peu
exacte pag. 111.

Sacre d'Égypte. Bel. Portr. d'Ois. pag. 17 a, dans laquelle est la même
figure.

Crassitie ad Milvum regalem accedit. In toto corpore Il est à peu près de la gros-
vestitur pennis rufis ad cine- seur du Milan royal. Il est cou-
reum vergentibus, maculis vert par tout le corps de plu-
fuscis variegatis. In Ægypto mes d'un roux tirant sur le cen-
frequens est ; habitat etiam dré, & varié de taches brunes.
quandoque in Syria & Cara- Il est très-fréquent en Égypte ;
mania. on le trouve aussi quelquefois
en Syrie & en Caramanie.

4. LE VAUTOUR NOIR.

Vultur niger ; remigibus, reſtrictiſque fuscis ; pedibus pen-
nis nigris veſtitis VULTUR NIGER.

Vultur niger. Jonst. Avi. pag. 7.

Willugh. Ornith. pag. 35. N°. 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 9. N°. 2.

Vultur nigricans. Charlet. Exer. pag. 71. N°. 4.

Charlet. Onomazt. pag. 64. N°. 4.

An Percnopterus Americanus totus niger ? Barr. Ornith. Claſſ. III.

Gen. I. ſp. 3.

Vautour noir. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 85.*

Les Anglois l'appellent SWARTHY VULTURE. *Charlet.*

Il est plus grand & plus gros que le *Vautour doré*. Il est noir par tout le corps, excepté les plumes des aîles & celles de la queue, qui sont brunes. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes noires. On le trouve fréquemment en *Egypte*.

Magnitudine & crassitie *Vulturem aureum* antecellit. In universo corpore niger est, exceptis remigibus & rectricibus fuscis. Pennæ nigrae pedes vestiunt ad principium usque digitorum. In *Egypto* frequens.

5. LE VAUTOUR DORÉ.

Vultur superne niger, scapis pennarum albis, infernè rufus; capite & collo supremo ex albido rufis; remigibus, rectricibusque fuscis; pedibus pennis dilutè rufis vestitis . . .
VULTUR AUREUS.

Vultur quem in Helvetia Aureum cognominant. *Gesn. Avi. pag. 781, in qua icon satis accurata.*

Vultur Alpinus, vel Aureus. *Gesn. icon. Avi. pag. 12, in qua eadem icon.*

Vultur Aureus Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 277. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 276.*

Vultur Aureus Gesneri. *Jonst. Avi. pag. 8. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. VI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 10. N°. 5.

Vultur Aureus Alberti magni, Gesneri, Raji, Willughbeyi. *Klein. Avi. pag. 43. N°. 1.*

Vultur Aureus. *Willugh. Ornith. pag. 35. N°. 5. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. IV.*

Charlet. Exer. pag. 71. N°. 6.

Charlet. Onomazt. pag. 64. N°. 6.

Vultur Boeticus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 273. hujus icon minimè accurata pag. 274.*

Jonst. Avi. pag. 7. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. VI.

Willugh. Ornith. pag. 35. N°. 3.

Raj. Syn. Avi. pag. 10. N°. 3.

Vultur Boeticus, sive castaneus. *Charlet. Exer. pag. 71. N°. 3.*

Charlet. Onomazt. pag. 64. N°. 3.

Vultur Boeticus Autorum. *Klein. Avi. pag. 44. N°. 3.*

Moyen

Moyen Vautour brun ou blanchâtre. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 85 ; avec une mauvaise figure pag. 86.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 9 b, dans laquelle est la même figure.

Les Grecs l'appellent Ἰὺψ μύρδος, & Ἐλωκοτρερς. Bel.

Les Italiens, AVOLTOIO BIANCO. Bel.

Les Allemands, GOLD-GEYR. Gesn.

Les Anglois, GOLDEN-VULTURE. Willugh. Charlet. CHESNUT VULTURE. Charlet.

Magnitudine & crassitie *Aquilam* antecellit. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad
caudam extremam quatuor
pedes & octo circiter pol-
lices æquat, & ad extremos
ungues tres pedes & septem
pollices. Rostrum ab ipsius
unco ad oris angulos usque
septem ferè pollices longum
est ; cauda duos pedes &
tres circiter pollices. Alas
habet valdè longas ; remix
enim longissima trium ferè
pedum longitudinem ob-
tinet. Caput, guttur & colli
pars suprema lanugine ves-
tiuntur ex albido rufâ. Pennæ
collum infimum & superio-
rem dorsi partem vestientes,
nigræ sunt, scapis albis. Pars
dorsi inferior, uropygium &
tectrices caudæ superiores
nigricant. Totum corpus in-
ferius, pars scilicet colli in-
ferior, pectus, venter, la-
tera, crura, caudæ tectrices
inferiores & pennæ alas sub-
tus regentes, rufo tingitur
colore, dilutior quidem

Il surpasse l'*Aigle* en gran-
deur & en grosseur. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est d'environ
quatre pieds huit pouces, &
jusqu'à celui des ongles de trois
pieds sept pouces. Son bec de-
puis son crochet jusqu'aux coins
de la bouche a presque sept
pouces de long ; sa queue en-
viron deux pieds trois pouces.
Son aîle est fort longue ; car la
plus grande de ses plumes a
presque trois pieds de long. La
tête, la gorge & le haut du col
sont couverts d'un duvet d'un
blanc-roux. Le bas du col & la
partie supérieure du dos sont
couvertes de plumes noires, de
chacune desquelles la tige est
blanche. La partie inférieure du
dos, le croupion & les cou-
vertures du dessus de la queue
sont noirâtres. Tout le dessous
du corps, sçavoir la partie in-
férieure du col, la poitrine, le
ventre, les côtés, les jambes,
les couvertures du dessous de
la queue & celles du dessous
de l'aîle, est d'un roux foncé

vers la tête, & plus clair vers la queue. Les petites couvertures du dessus de l'aîle sont noires : les grandes sont de la même couleur ; mais parmi ces dernières les unes sont variées vers le bout de taches roussâtres, & les autres le sont de taches blanchâtres : ces plumes sont d'autant plus noires qu'elles sont plus voisines du corps, auprès duquel elles sont d'un noir brillant. Toutes les plumes de l'aîle sont brunes : celles de la queue sont de la même couleur. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un roux clair. Les doigts sont bruns ou le trouve sur les *Alpes*.

caudam versùs, saturatiore autem versùs caput. Alarum tectrices superiores minores sunt nigræ : majores concolores ; inter istas verò aliæ subrufis, aliæ subalbidis maculis versùs apicem notantur : eò autem nigriores sunt quò proximiores dorso, ubi splendent præ nigredine. Remiges omnes fuscæ sunt. Rectrices concolores. Pedes pennis vestiuntur ad exortum usque digitorum dilutè rufis. Digni verò fusco sunt vel corneo colore. Habitat in *Alpibus*.

d'une couleur de corne. On

6. LE VAUTOUR HUPÉ.

Vultur cristatus ; ex rutilo nigricans ; pectore magis ad rufum inclinante ; pedibus nudis. . . . *VULTUR CRISTATUS.*

Vultur. Gesn. icon. Avi. pag. 13, in qua icon pessima.

Vultur quem Germani vocant Afz-Gyr, vel Hasen-Gyr. Gesn. Avi. pag. 782, in qua eadem icon.

Vultur Leporarius. Schwenck. Avi. Sil. pag. 375.

Jonst. Avi. pag. 8. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. VI.

Charlet. Exer. pag. 71. N°. 5.

Charlet. Onomast. pag. 64. N°. 5.

Klein. Avi. pag. 44. N°. 2.

Vultur Leporarius Germanorum. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 274. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 275.

Vultur Leporarius Germanis. Willugh. Ornith. pag. 35. N°. 4.

Vultur Leporarius Gesneri. Raj. Syn. Avi. pag. 10. N°. 4.

Vultur Leporarius ; Vultur Anserinus ; Vultur cinereus. Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 419.

LES OISEAUX, Classe III. Ordre III. 461

Les Grecs l'appellent Γύψ λαγυροδρας. Schwenck. Λαγυροδρος. Schwenck. Charlet.

Les Allemands, HASEN-GYR. Gesn. Aldrov. Willugh. HASEN-GEIR; ASZ-GYR; ASS-GEIR; ROSSZ-GYR; STEIN-GYR; KEIB-GYR. Gesn. Aldrov. AAS-GEYER; ROSZ-GEYER. Rzac. ASZ-GEYER; ROS-GEYER; GANSE-AHR. Schwenck. KIB-GEYER. Schwenck. Rzac.

Les Suisses, HOTZ-GYR. Gesn. Aldrov.

Les Polonois, SEP POPIELATY. Rzac.

Les Anglois, HARECATCHING VULTURE. Charlet.

Vulturi aureo magnitudine cedit. Alarum extensarum extremitates sex pedum & amplius intervallo distant. Caudam habet longam & directam. Color totius corporis est ex rutilo nigricans; pectus tamen magis ad rufum inclinat. Stans aut sedens cristam quasi cornua in capite erigit, quæ in volante non apparet. Rostrum nigrum est. Pedes sunt flavi; ungues verò nigri. Celeriter incedit; unoquoque enim incessu duorum palmorum spatium gradum facit. Ex Avibus persequitur omne genus. Ex Feris venatur *Lepores*, *Cuniculos*, *Vulpes*, *Hinnulos*; necnon *Piscibus* insidiatur. Ne quidem à cadaveribus abstinet. Non solum volatu ex præcipiti, verum etiam cursu prædam insequitur. In densis & desertis sylvis, & in altissimis arboribus nidificat.

Il est plus petit que le *Vautour doré*. Il a plus de six pieds de vol. Sa queue est longue & droite. Il est par tout le corps d'un roux-noirâtre; cependant la poitrine tire plus sur le roux. Lorsqu'il est posé, soit par terre ou ailleurs, il dresse une hupe, qui ressemble assez bien à des cornes; au lieu qu'en volant cette hupe ne paroît point du tout. Son bec & ses ongles sont noirs; & ses pieds sont jaunes. Il marche fort vite; car à chaque pas il avance de l'espace de deux palmes. Il poursuit toutes sortes d'Oiseaux. Parmi les Quadrupèdes il donne la chasse aux *Lièvres*, aux *Lapins*, aux *Renards*, aux *Faons*; il se nourrit aussi de *Poissons*; & mange encore des corps morts. Il poursuit sa proie, non-seulement en se précipitant dessus, lorsqu'il vole, mais encore à la course. Il fait son nid sur les arbres les plus élevés des forêts épaisses & désertes.

7. LE VAUTOUR FAUVE.

Vultur superne griseo-rufescens , infernè albus , griseo-rufescente admixto ; capite , collo & torque albis ; remigibus , rectricibusque nigris ; pedibus in parte suprema lanugine albâ vestitis VULTUR FULVUS.

Vultur fulvus , Bœtico Bellonii congener. *Raj. Syn. Avi. pag. 10. N^o. 7.*

Vultur fulvus noster, Bœtico Bellonii congener. *Willugh. Ornith. pag. 36. hujus icon non satis accurata Tab. IV, sub titulo, Vultur.*

Vultur ruber , seu lateritii coloris. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 430.*

Vautour. *Alb. Tom. III. pag. 1 ; avec une figure peu exacte Pl. 1.*

Grifon. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag. 209 ; avec une figure passable Pl. 30.*

An Percnopterus Americanus , flavescens , capite grandi ? *Barr. Ornith. Class. III. Gen. I. sp. 4.*

Il est plus grand qu'un *Aigle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds six pouces , & jusqu'à celui des ongles de trois pieds sept pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces trois lignes de long ; sa queue sept pouces ; son pied trois pouces six lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , quatre pouces : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a huit pieds de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La

Aquilam magnitudine superat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & sex pollices aequat , & ad extremos ungues tres pedes septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos quatuor pollices & tres lineas longum est ; cauda septem pollices , pes tres pollices cum sex lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem anticorum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum expansarum distantia est octo pedum ; alæ verò complicatæ

caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur & collum albâ vestiuntur lanugine, in collo brevissimâ & rarâ; ita ut cutem nudam quasi relinquat, unde collum griseo-fuscum videtur & cœrulescens, quibus coloribus cutis vulgò tingitur. In collo infimo pennæ extant tres pollices longæ, strictissimæ & candidissimæ, torquem efficientes. Dorsum, uropygium, rectrices caudæ superiores & pennæ alas superne & infernè tegentes ex griseo rufescunt, quibusdam tamen pennis albis admixtis in rectricibus alarum superioribus & inferioribus. Pectus, venter, latera & rectrices caudæ inferiores albæ, griseo-rufescente admixto, unaquâque scilicet pennâ in exortu albâ, & versùs apicem griseo-rufescente maculatâ. Pennæ dorso concolores crura exterius cooperiunt; crurum verò latus interius, sicut & pedum suprema pars, albâ lanugine vestitur. Remiges, rectricesque nigræ. In medio pectore cavitas est satis lata & profunda, pennis obsita longis, pilorum amulsis, densis, cuti incumbentibus & versùs cavitatis medium

tête, la gorge & le col sont couverts d'un duvet blanc, qui est extrêmement court & rare sur le col; de sorte que tout le col paroît être d'un gris-brun & bleuâtre, qui est la couleur ordinaire de la peau, laquelle est presque nue en cet endroit. Au bas du col est une espece de collier, composé de plumes longues de trois pouces, fort étroites, & d'un très-beau blanc. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles du dessus & du dessous des ailes sont d'un gris-roussâtre: il y a cependant quelques plumes blanches parmi les couvertures du dessus & du dessous de l'aile. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé de gris-roussâtre, chaque plume étant tachée de cette couleur par le bout, & blanche vers son origine. Les jambes sont en-dehors de la même couleur que le dos, & leur côté intérieur, ainsi que la partie supérieure des pieds, est couvert d'un duvet blanc. Les plumes des ailes & celles de la queue sont noires. Au milieu de la poitrine est une cavité assez grande, garnie de plumes longues & semblables à des poils, épaisses, couchées sur la peau

& tournées vers le milieu de la cavité. Ces plumes sont de la même couleur que le dos, mais un peu plus brunes. L'iris des yeux est d'un bel orangé. Le bec est noir à son origine & à son bout, & la partie du milieu est d'un gris-bleuâtre. Les pieds sont cendrés, & les ongles noirs.

reflexis. Pennæ autem istæ sunt dorso concolores, atamen paululum magis ad fuscum inclinantes. Oculorum irides aurantiæ. Rostrum in exortu & apice nigrum, in medio griseo-ceruleus. Pedes cinerei; ungues verò nigri.

8. LE VAUTOUR DES ALPES.

Vultur superne dilutè ferrugineus, infernè sordidè griseus, maculis ferrugineis variis; capite, collo & torque albis; remigibus, rectricibusque nigris; pedibus nudis. . . . VULTUR ALPINUS.

Vulturina Aquila Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 44. N°. 6.*

Aquila quam Percnopterus, & Oripelargum & Gypæetum vocant. *Gesn. Avi. pag. 199, in qua icon pessima.*

Hypæetus Aristotelis, vel Gypæetus. *Gesn. icon. Avi. pag. 5, in qua eadem icon.*

Percnopterus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 216. hujus duæ icones pessimæ pag. 217 & 219; & insuper altera icon à Gesnero mutuata pag. 221.*

Percnopterus cucullatus albicans. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. I. sp. 1.*

Percnopteros, qui & Gypætos, vel Hypætos, Ægyptias & Oripelargus dicitur. *Jonst. Avi. pag. 4. hujus duæ icones ab Aldrovando mutuata Tab. IV, sub titulis, Percnopteros, & Percnopteros alius; & insuper alia icon à Gesnero mutuata Tab. V.*

Percnopteros; Hypætos; Ægyptas & Oripelargus. *Charlet. Exer. pag. 70. N°. 7.*

Charlet. Onomast. pag. 63. N°. 7.

Percnopteros, seu Gypætos Aldrovandi, Oripelargus etiam dicta. *Willugh. Ornith. pag. 33. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. IV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 8. N°. 10.

Falco capite nudo albicans. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 36. sp. 1.*

Aigle-Vautour. *Alb. Tom. II. pag. 2; avec une figure mal coloriée Pl. 3.*

An Corvus moschatus, rostro adunco? *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 129.*

An Fregata sylvatica, moschata ribiis oblongis, tota nigra? *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. VIII. sp. 2.*

Les Hébreux l'appellent RACHAM, *Gesn. ROCHAM. Aldrov.*

Les Arabes, ALRACHME, *Gesn. ALRACHAME; RACHAME. Aldrov.*

Les Grecs, Περυρόπλιος; Ευπαειτός; Οριπελαργός. *Aldrov.*

Les Catalans, TRENCALOS. *Barr.*

Les Allemands, GEYR-ADLER. *Gesn.*

Les François de la Guiane, CORMORANT SENTANT LE MUSC. *Barr.*

Magnitudine *Aquilam* æquat, superatve. Caput & collum plumis destituuntur, albâque tantum lanugine vestiuntur. Infra lanuginem quædam est series pennarum albarum, cæteris longiorum, quæ collum cingunt & torquem quodammodo efficiunt. In utroque capitis latere, à rostro ad oculos usque, cutis est nuda, cinereo-cœrulescens. Dorsum, uropygium, testrices caudæ superiores, scapulares pennæ & alas superne tegentes sunt dilutè ferrugineæ. Pectus, venter, latera, crura & testrices caudæ inferiores sordidè griseæ, & maculis ferrugineis variegatæ: crura tamen ex parte interiore albescent. Remiges & testrices nigrae. Oculorum pupilla nigra; ipsorumque irides ex rubro avellaneæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, nigra. Rostrum quoque nigrum, excepto unco albicante. Pedes plumbei; ungues verò nigri. Habitat in

Il est de la grandeur de l'*Aigle*, ou même un peu plus grand. La tête & le col sont dégarnis de plumes, & ne sont couverts que d'un duvet blanc. Au-dessous de ce duvet est un amas de plumes blanches, plus longues que les autres, qui entourent le col, & forment une espèce de collier. De chaque côté de la tête, l'espace contenu entre le bec & l'œil, est couvert d'une peau nue, d'un cendré-bleuâtre. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, celles du dessus des ailes, & les plumes scapulaires sont d'un ferrugineux clair. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris sale, varié de taches ferrugineuses: il faut cependant en excepter la partie intérieure des jambes, qui est blanche. Les plumes des ailes & celles de la queue sont noires. La prunelle des yeux est de la même couleur; & leur iris est d'une couleur de noisette, tirant sur le rouge. La peau nue ou membrane, qui couvre

la bête du bec, est noire. Le bec est de la même couleur, excepté son crochet, qui est blanchâtre. Les pieds sont couleur de plomb; & les ongles noirs. On le trouve sur les *Alpes*, & sur les autres montagnes élevées.

9. LE VAUTOUR A TESTE BLANCHE.

Vultur superne fuliginous, maculis castaneis varius; capite & collo albis, lineolis fuscis respersis; remigibus primâ medietate candidis, alterâ medietate nigricantibus; rectricibus in exortu albis, extremitate fuscis, apicibus albidis; pedibus pennis obscurè flaventibus vestitis, . . . VULTUR LEUCOCEPHALOS,

Vultur albicans. Jonst. Avi. pag. 7.

Klein. Avi. pag. 44. N°. 5.

Vultur albicans & parvus. Charlet. Exer. pag. 71. N°. 1.

Charlet. Onomazt. pag. 64. N°. 1.

Vultur albus. Willugh. Ornith. pag. 35. N°. 6.

Raj. Syn. Avi. pag. 10. N°. 6.

Vultur λευκοκέφαλος. Schwenck. Avi. Sil. pag. 375.

Vultur albo capite Schwenckfeldii. Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 429.

Les Allemands l'appellent WEIS-KOEPFFICHTER-GEYER. Schwenck. Rzac.

WEIS-KOPFF. Schwenck.

Les Silésiens, GRIMMER. Schwenck.

Les Polonois, SEP Z GLOWA BIALA. Rzac.

Les Anglois, WHITISH VULTURE. Charlet.

Il n'est pas plus gros que l'*Aigle tacheté*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long; sa queue neuf pouces; & son pied environ quatre pouces. Il a cinq pieds neuf pou-

Aquilam næviam crassitie non superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & tres pollices æquat. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda novem pollices; pes quatuor circiter pollices. Alis expansis, extremitates

extremities majorum remigum quinque pedum & novem pollicum intervallo distant. Pinnulæ pilorum æmulæ, nigræ utrinque juxta rostrum & oculos rigent, & sub gutture, instar barbulæ, propendent. Caput & collum insigni candore nitent, maculisque seu lineolis longiusculis, fuscis resperguntur. Dorsum, uropygium, tectrices alarum superiores & pennæ caudam superne tegentes fuliginei sunt coloris, intermicantibus maculis castaneis, præsertim in alarum tectricibus superioribus. Pectus maximâ insignitur maculâ clypeiformi, ad alas usque excurrente, coloris obscurè castanei, in quo tamen elucet paucula rubedo. Venter, latera & tectrices caudæ inferiores ex obscura rubedine albescent, maculisque castaneis resperguntur. Crura & pedes villosâ lanugine & plumulis vestiuntur ad exortum usque digitorum coloris ex obscuro flaventis, & maculis notantur longiusculis. Alarum tectrices inferiores nivei sunt candoris. Remiges ab exortu ad medietatem usque candidæ sunt, à medietate verò ad extremitatem nigricantes.

ces de vol. De chaque côté de la tête, auprès du bec & des yeux, s'élevaient de petites plumes semblables à des poils : il y en a de pareilles sous la gorge, qui font à l'Oiseau une espèce de barbe. La tête & le col sont d'un blanc éclatant, varié de taches ou de petites lignes longitudinales, brunes. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles du dessus des ailes sont d'un noir de suie, varié de taches de marron, surtout sur les couvertures du dessus des ailes. Il y a sur la poitrine une très-grande tache en forme de bouclier, d'un marron obscur, tirant cependant un peu sur le rouge, & qui s'étend jusqu'aux ailes. Le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant sur le rouge obscur, & parsemé de taches de marron. Les jambes & les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de duvet & de très-petites plumes d'un jaune obscur, varié de taches longitudinales. Les couvertures du dessous de l'aile sont d'un blanc de neige. Les plumes de l'aile sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de là à leur extrémité elles sont noirâtres. Celles de la queue sont blan-

ches à leur origine , ensuite brunes , & terminées de blanc. L'iris des yeux est d'un rouge obscur. La peau nue ou membrane , qui couvre la bête du bec , est d'un jaune de safran. Le bec est bleuâtre , excepté son bout , qui est noirâtre. Les doigts sont d'un jaune de safran ; & les ongles très-noirs & très-aigus. On le trouve en *Europe* , sur les montagnes , où il vit de rapines. Il se nourrit de *petits Oiseaux* & de *Rats*.

Rectrices in exortu candidæ , in extremitate fuscæ , apicibus tamen albidis. Oculorum irides obscurè rubentes. Cutis nuda sive membrana , basin rostri cooperiens , crocea. Rostrum subcœruleum , extremè tamen nigricans. Digiti crocei ; ungues verò aterrimi & acutissimi. Habitat in *Europa*. In montibus vivit ex raptu. *Aviculas* & *Mures* capit pro cibo.

10. LE VAUTOUR DU BRÉSIL.

Vultur niger , purpureo & viridi colore varians ; capite , collo , pedibusque nudis VULTUR BRASILIENSIS.

Vultur pullus , capite implumi , cute crassâ rugosâ ultra aperturas nasales laxatâ , tecto. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 471.*

Vultur Gallinæ Africanæ facie. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 294. N°. 1. hujus icon non satis accurata Tab. 254.*

Vultur Brasiliensis aut Mexicanus. *Raj. Syn. Avi. pag. 10. N°. 8.*

Vultur Brasiliensis , Urubu dictus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 36. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. III. Klein. Avi. pag. 44. N°. 7.*

Vulturi affinis Brasiliensis , Urubu Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 180. N°. 1.*

Urubu Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 207. hujus icon pessima pag. 208.*

Jonst. Avi. pag. 142. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 61.

Aura. *Euf. Nieremb. pag. 224.*

Aura , aliis Gallinassa , aut Gallinasso. *Jonst. Avi. pag. 121.*

Charlet. Exer. pag. 117. N°. XII.

Charlet. Onomast. pag. 113. N°. XII.

Gallinaça , aut Gallinaço aliis. *Euf. Nieremb.*

Tzopilotl , sive Aura. *Hernand. Hist. Mex. pag. 331 , in qua icon pessima. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 37. cap. CXII.*

Tzopilotl. *Joan. de Laër. Nov. Orb. pag. 232.*

Corvus sylvaticus, capite phœniceo. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 129.*

Corvus, calvus, torquatus duplici ingluvie foras propendente. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 129.*

Meleagris duplici ingluvie. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 67. sp. 2.*

Meleagris Guianensis, torquatus, duplici ingluvie foras propendente. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XI. sp. 2.*

Huexolotl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 27. cap. LIX.*

Aigle. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 137.*

Buse à figure de Paon. *Catesb. Tom. I. pag. 6; avec une figure assez bonne, mais dont le col est mal colorié Pl. 6.*

Oiseau appelé Galinache ou Marchand. *Des March. Tom. III. pag. 329.*

Les François de St. Domingue l'appellent MARCHAND. Des March.

Les François de la Guiane, CORMORANT DES AMAZONES; PIAILLEUR. Barr.

Les Portugais, GALINACHE. Des March.

Les Flamands, MENSCHENETER. Marcg. Willugh. Klein. MENSCHEN-ESSER. Jonst.

Les Hollandois du Cap de bonne Espérance, STRONT-VOGEL ou STRONT-JAGER. Kolbe.

Les Anglois, TURKEY-BUZZARD. Catesb.

Les Anglois de la Jamaïque, CARRION-CROW. Sloane. Raj. Browne.

Les Indiens de la Guiane, KIANKIA; OUROUA. Barr.

Les Brasiiliens, URUBU. Marcg. Jonst. Willugh. Raj.

Les Péruviens, SUYUNTU. Nieremb. Jonst. Charlet.

Les Mexiquains, TROPILLOTL. Nieremb. TZOPILOTL. De Laët. Fern. Jonst. Willugh. Charlet. Ils appellent aussi le mâle HUEXOLOTL; & la femelle, CIHUATOTOLIN. Fern.

On l'appelle en Amérique, sur les bords de la mer, ZAMURO. Nieremb. Jonst.

Magnitudine & crassitie *Milvum regalem* circiter æquat. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est. Alæ complicatæ paulò ultra caudæ extremitatem protenduntur. Caput & collum cute teguntur paululùm rugosâ, ex croceo, cœruleo, albicante & rufo-fuscescente variâ, raris

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du *Milan royal*. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête & le col sont couverts d'une peau un peu raboteuse, variée de couleur de safran, de bleu, de blanchâtre & de roux

tirant sur le brun, & sur laquelle sont quelques poils noirs, clair-semés. Tout le reste du corps est couvert de plumes d'un noir changeant en pourpre & en verd. Les plumes des ailes & celles de la queue sont de la même couleur. La prunelle des yeux est ronde & noire; leur iris est rougeâtre; & les paupières sont d'un jaune de safran. La peau nue ou membrane, qui couvre la bête du bec, est d'une couleur de safran tirant sur le bleu. Cette peau s'étend jusqu'à la moitié de la longueur du bec, & là est l'ouverture des narines, qui est fort large & percée de part en part. Le bec est blanc. Les pieds sont d'une couleur de chair; & les ongles noirs. Il se nourrit de corps morts. Il mange aussi des *Serpents*. Il passe la nuit sur les arbres & les rochers: le matin il s'approche des villes, pour y dévorer toutes les immondices & tous les corps morts qu'il rencontre. On le trouve à la *Jamaïque*, au *Mexique*, à *S. Domingue*, au *Brésil*, dans toute la *Guiane* & au *Pérou*.

** II. LE ROI DES VAUTOURS.

Voyez Pl. XXXVI.

Vultur albus, rufescente superne admixto; capite & collo supremo nudis; torque saturatè cinereo; remigibus ex nigro obscurè viridibus; rectricibus nigris; pedibus nudis....
 REX VULTURUM.

insuper pilis nigris obsitâ. Totum reliquum corpus pennis vestitur nigris, purpureo & viridi colore variantibus. Remiges & rectrices concolores. Oculorum pupilla rotunda, nigra; ipsorum irides rubescentes; palpebræ verò croceæ. Cutis nuda sive membrana, basin rostri cooperiens, ex croceo cœrulescit. In ista cute, circa mediam rostri longitudinem, narium foramen unum est amplum, transversim positum. Rostrum album est. Pedes carnei; ungues verò nigri. Cadaveribus vescitur. *Serpentes* quoque insectatur. Pernoctat in arboribus & rupibus, manè advolans ad urbes, & quidquid immundum aut exanime devorans. Habitat in *Jamaica*, *Mexico*, *Dominicensi Insula*, *Brasilia*, *Guiana* tota & *Peruvia*.

Vultur Monachus. *Klein. Avi. pag. 46. N^o. 9.*

Regina Aurarum. *Euf. Nieremb. pag. 224.*

Willugh Ornith. pag. 302.

Cozcaquauhtli. *Fern. Hist Nov. Hisp. pag. 20. cap. XXVII.*

Cozcaquauhtli, Regina Aurarum. *Hernand. Hist. Mex. pag. 319.*

Cozcacoauhtli, five Regina Aurarum Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag. 161.*

Cozcaquauhtli, five, ut Mexicani vocant, Aura. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 232.*

Cozcaquauhtli. *Jonst. Avi. pag. 121.*

Roi des Vautours. *Edwards. Tom. I pag II; avec une figure exacte Pl. 2.*

Vautour des Indes. *Alb. Tom. II. pag. 2; avec une figure mal coloriée Pl. 4.*

Les Anglois l'appellent WARWOUWEN. *Alb. KING OF THE VULTURES. Edwards.*

Les Mexiquains, COZCAQUAUHTLI. *Nieremb. Fern. COZQUAUHTLI; AURA. De Laët.*

Crassitie Gallo - pavonem
fœminam circiter æquat. Ipsius
longitudo ab apice rostri
ad caudam extremam
duos pedes & tres pollices
explet, & ad extremos un-
gues duos pedes totidem
pollices & sex lineas. Rostrum
ab ipsius unco ad oris
angulos usque unum pollicem
& novem lineas longum est;
cauda septem pollices cum
novem lineis; pes tres pollices
& sex lineas; & trium digitorum
anticorum medius cum ungue tres
pollices cum quatuor lineis:
laterales multò sunt breviores;
posticus verò anticorum
intimum longitudine adæquat.
Alæ complicatæ caudam
extremam attingunt. Cu-

Il est à peu près de la grosseur d'un *Dindon* femelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue sept pouces neuf lignes; son pied trois pouces six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces quatre lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue.

La tête & le haut du col sont couverts d'une peau nue, variée de différentes couleurs. La bête du bec est couverte d'une peau de couleur orangée, dans laquelle sont placées les narines, entre lesquelles cette peau s'élève en manière de crête dentelée & mobile. La partie supérieure de la tête est d'une couleur de chair ternie vers le synciput, & tirant sur le rouge vers l'occiput. Au-dessous de l'occiput est une petite touffe de duvet noir, de laquelle sort & s'étend de chaque côté jusque sous la gorge une peau ridée de couleur brunâtre, avec un peu de bleu & de rouge dans sa partie postérieure. Cette peau est rayée de petites lignes de duvet noir. Les côtés de la tête ou les joues, sont couvertes de duvet noir; & entre le bec & l'œil est une tache d'un pourpre-brun. Les yeux sont entourés d'une peau d'un rouge d'écarlatte; & leur iris est blanchâtre. A la partie supérieure du haut du col est de chaque côté une petite ligne longitudinale de duvet noir: l'espace contenu entre ces deux lignes est d'un jaune terni. Les côtés du haut du col sont rouges; & cette couleur se change par degrés en jaune en descendant vers la partie inférieure. Au-dessous

tis nuda, diversis coloribus varia, caput & colli partem supremam vestit. Basis rostri aurantiâ tegitur cute, in qua nares collocantur; inter nares autem cutis ista, cristæ dentatæ & mobilis instar, erigitur. Capitis pars superior colore tingitur carneo versus synciput obscuro, & versus occipitium ad rubrum vergente. Infra occipitium quædam est series nigræ lanuginis, ex qua oritur & utrinque ad gutturusque protenditur cutis rugosa, coloris fuscescentis, pauco coeruleo & rubro in parte posteriore admixtis: quæ cutis lineolis nigrâ lanugine constantibus striata est. Capitis latera sive genæ nigrâ vestiuntur lanugine; rostrum inter & oculos utrinque macula extat purpureo-fusca. Cute coccineâ ambiuntur oculi; ipsorum irides albidæ. Supra colli supremi partem superiorem utrinque extenditur lineola longitudinalis, nigrâ lanugine conflata: spatium autem duas inter lineolas istas contentum obscure flavet. Collum supremum ad latera rubore tingitur; quæ rubedo sensim atque sensim, versus partem inferiorem procedendo, flavescit. Infra

partem colli nudam pennæ extant longiusculæ, saturatè cinereæ, torquem quodammodo efficientes. Torquis iste collum ambit, & deinde versùs pectus reflectitur. Collum in reliqua longitudine, dorsum, alarumque tectrices superiores alben, cum aliqua rufescentis mixtura. Uropygium & pennæ caudam superne tegentes nigræ; (in illo ab *Edwardo* descripto uropygium & tectrices caudæ superiores alben). Pectus, venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes albæ. Remiges majores ex nigro obscurè viridescunt: minores concolores, oris exterioribus griseis. Rectrices nigræ. Rostrum, pedes, unguisque rubri: (qui ab *Edwardo* descriptus est, pedes habebat sordidè albos, ungues verò nigros.) Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Regium* missus est.

de la partie nue est une espece de collier, formé par des plumes assez longues, d'un cendré foncé. Ce collier entoure le col, & descend un peu vers la poitrine. Le reste du col, le dos & les couvertures du dessus des aîles sont blanches, avec une légère teinte de rouffâtre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont noires; (celui qu'*Edwards* a décrit, avoit le croupion & les couvertures du dessus de la queue blanches). La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un noir changeant en un verd très-obscur: les moyennes sont de la même couleur, & bordées extérieurement de gris. Celles de la queue sont noires. Le bec, les pieds & les ongles sont rouges: (Les pieds de celui qu'a décrit *Edwards*, étoient d'un blanc sale, & ses ongles noirs). On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé au cabinet du Roi.

12. LE CONDOR.

Vultur fuscus, superne saturatiùs infernè dilutiùs; sive ex albo & nigro varius; gutture & collo inferiore nudis, rubris; remigibus nigris; pedibus nudis GRYPHUS.

Vultur Gryps ; Gryphus. *Klein. Avi. pag. 45. N^o. 8.*

Cuntur. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 407.*

Jonst. Avi. pag. 124.

Charlet. Exer. pag. 118. N^o. XIX.

Charlet. Onomast. pag. 115. N^o. XIX.

Avis ingens. *Euf. Nieremb. pag. 238.*

Avis ingens Chilensis, Cuntur dicta. *Raj. Syn. Avt. pag. 11. N^o. 9.*

Ovyra Ovaßou. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 615.*

Jonst. Avi. pag. 125.

Condor. *Frezier. Voy. de la mer du Sud. pag. 111.*

Comdam. Voy. des Amaz. pag. 175.

Oiseau de Proye nommé Condor. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 640. (ed. 1714).*

Oiseau d'une grandeur prodigieuse, appelé Contur ou Condur. *Des March. Tom. III. pag. 320.*

Les Espagnols l'appellent CONDOR. De Laët. Raj.

Les Péruviens, CUNTUR. Nieremb. CONTUR. Comdam.

Cet Oiseau est d'une énorme grandeur. Celui que le *Pere Feuillée* a décrit, avoit onze pieds quatre pouces de vol ; & les grandes plumes de ses ailes deux pieds deux pouces. La longueur de son bec étoit de trois pouces sept lignes ; celle de son pied de cinq pouces deux lignes ; celle de celui du milieu des trois doigts antérieurs de cinq pouces huit lignes, & l'ongle qui le terminoit, avoit un pouce neuf lignes de longueur ; celle du doigt intérieur de trois pouces deux lignes, avec un ongle d'un pouce neuf lignes ; celle du doigt extérieur de trois pouces, avec un ongle d'un pouce ; & enfin celle du doigt postérieur d'un pouce six lignes ,

Ingenti magnitudine donatur hæc Avis. Illius à *Patre Feuillée* descripti extremitates majorum remigum, alis extensis, undecim pedum & quatuor pollicum intervallo distabant ; majores autem remiges duorum pedum & totidem pollicum longitudinem explebant. Longitudo rostri tres pollices & septem lineas æquabat ; pedis quinque pollices cum duabus lineis ; trium digitorum anticorum medii quinque pollices & octo lineas, ungue adjuncto unum pollicem & novem lineas longo ; digiti intimi tres pollices & lineas binas, cum ungue unum pollicem & novem lineas longo ; digiti extimi tres pollices,



Martinet Del. et Sculp.

Roi des Vautours.

pollices, cum ungue unum pollicem longo; & digiti tandem postici octodecim lineas, cum ungue novem lineas longo. Quædam sunt hujus speciei Aves, quarum extremitates majorum remigum, alis expansis, quindecim aut sexdecim pedum intervallo distant, in reliquis proportionem servatâ. Fusca, brevissime lanugo caput vestit. (Secundum *Frezier* guttur & pars colli inferior rubent, pennisque destituuntur, *Gallo-pavonis* instar). Pars colli superior, dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores & pennæ alas superne tegentes sunt saturatè fusca. Pectus, venter, latera, crura, alarum tectrices inferiores & pennæ caudam subtus cooperientes dilutè fuscescunt. Remiges nigrae. Rectrices superne saturatè fusca, subtus verò dilutè fusca. Hujus speciei Aves quædam in universo corpore albo & nigro variegantur. Oculi sunt nigri; ipsorum verò irides fusco-rubescences. Rostrum nigrum, excepto apice albo. Pedes, unguisque nigri. Habitat in *Peruvia*.

avec un ongle de neuf lignes. Il y en a qui ont jusqu'à quinze ou seize pieds de vol, & le reste à proportion. La tête est couverte d'un duvet brun & court. (Selon *Frezier* la gorge & la partie inférieure du col sont rouges & dégarnies de plumes, comme dans le *Dindon*). La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles du dessus des ailes sont d'un brun foncé. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de l'aile & celles du dessous de la queue sont d'un brun clair. Les plumes des ailes sont noires. Celles de la queue sont en-dessus d'un brun foncé, & en-dessous d'un brun clair. Quelques-uns sont variés par tout le corps de noir & de blanc. Les yeux sont noirs; & leur iris est d'un brun-rouge. Le bec est noir, excepté son bout, qui est blanc. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Pérou*.

SECTION II.

Ceux dont la b  se du bec est couverte de plumes tourn  es en-devant.

IL n'y a dans cette section que deux genres d'Oiseaux. Les uns ont la t  te orn  e de paquets de plumes en forme d'oreilles, comme le *Hibou* : & les autres ont la t  te d  nu  e de ces paquets de plumes, comme le *Chathuant*.

Tous les Oiseaux de cette section sont *Nocturnes*. Ils ont l'ouverture des oreilles tr  s-grande (voyez *Pl. XXXVII. Fig. 3*), & garnie d'un opercule cutan  e. Leur t  te est grosse, ronde & assez semblable    celle d'un *Chat*. Leurs yeux sont entour  s de plumes d  compos  es ou dont les barbes sont s  par  es les unes des autres. Ces plumes partent des yeux, comme d'un centre commun, s'  tendent en rond, & forment de chaque c  t   de la t  te un cercle, dont la circonf  rence est termin  e par des plumes roides & fris  es.

Dans les Oiseaux de cette section le doigt ext  rieur de ceux de devant peut se retourner en-arri  re & faire l'office

SECTIO II.

*E   quarum basis rostri plumis antrorsum incumben-
tibus cooperta est.*

H  c sectio duobus tantum constat generibus Avium. Ali   capite donantur fasciculis pennarum, auricularum   mulis, pr  dito, ut *Asio* : ali   capite fasciculis illis pennarum destituto, ut *Strix*.

Omnes hujus sectionis Aves sunt *Nocturn  *. Auricularum foramina habent amplissima) *Vide. Tab. XXXVII. Fig. 3*), valv   cutane   obte  ta. Caput ipsis crassum, rotundum & form   caput *Felinum* referens. Oculorum ambitus pennis constat decompositis sive quarum pinul      se invicem sunt disjunct  . Penn   autem ist  , tanquam    centro communi, ab oculis oriuntur, in orbem extenduntur, & in utroque capitis latere circulum efformant, cujus circumferentia pennis terminatur rigidis & crispis.

Hujus sectionis Avium anticorum extimus digitus est retrorsum versatilis & postici digiti munere fungitur :

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 477

unde binos digitos posticos du doigt postérieur ; c'est ce
habere dicuntur. qui a fait croire qu'ils avoient
deux doigts derriere.

XI.

XI.

Genus Asionis.

Le genre du Hibou.

Hujus character est	Son caractere est d'avoir
Digitum quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :	Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere ; tous séparés environ jusqu'à leur origine :
Crura ad calcaneum usque plumosa :	Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :
Rostrum breve, aduncum ; ad basin plumis antrorsum incumbentibus tectum :	Le bec court & crochu ; dont la bête est couverte de plumes tournées en-devant :
Caput fasciculis pennarum, auricularum amulis, præditum.	La tête ornée de paquets de plumes en forme d'oreilles.

** I. LE GRAND DUC.

Asio superne fulvo, rufescente & nigricante varius, inferne rufus, nigricante longitudinaliter & transversim striatus ; rectricibus interius versum exortum fulvis, nigricante transversim striatis BUBO.

Bubo. *Gesn. Avi. pag. 233. hujus icon non satis accurata pag. 234.*
Gesn. icon. Avi. pag. 14, in qua eadem icon.
Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 502. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 509.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 230.
Jonst. Avi. pag. 29. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XVIII.
Raj. Syn. Avi. pag. 24. N°. 1.
Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 272.
Bubo Gesneri. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 368.
Bubo primus. Willugh. Ornith. pag. 63. hujus icon non satis accurata.
Tab. XII.

- Linn. *Systh. nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 1.*
 Bubo maximus. Charlet. *Exer. pag. 77. N^o. 1.*
 Charlet. *Onomazt. pag. 70. N^o. 1.*
 Bubo maximus, nigri & fusci coloris. Sibbald. *Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.*
 Bubo; Noctua maxima. Frisch. *hujus icon accurata Tab. 93.*
 Bubo à Marcgravio descriptus, sub titulo, Jacurutu Brasiliensium. Willugh. *Ornith. pag. 64.*
 Strix capite aurito; corpore rufo. Faun. Suec. Linn. *N^o. 45.*
 Feliceps subrufus, albis nigrisque maculis variegatus. Barr. *Ornith. Class. III. Gen. VI. sp. 1.*
 Ulula. Klein. *Avi. pag. 55. N^o. 1.*
 Noctua. Mus. Worm. *pag. 296, in qua icon minimè accurata.*
 Chalcis Goropii. Klein.
 Jacurutu Brasiliensibus; Bufo Lusitanis. Marcgr. *Hist. Br. pag. 199, in qua hujus icon minimè accurata.*
 Jonst. *Avi. pag. 136. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.*
 Αἰκάδος Aristoteli. Charlet.
 Grand Duc. Bel. *Hist. nat. des Ois. pag. 135; avec une mauvaise figure pag. 136.*
 Duc; Chatuant; Hibou. Bel. *Portr. d'Ois. pag. 25 a, dans laquelle est la même figure.*
 Grand Chatuant. Alb. Tom. II. *pag. 5; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 9.*
 Les Hébreux l'appellent Kos. Gesn. Aldrov.
 Les Chaldéens, KADIA. Gesn. Aldrov.
 Les Arabes, KUS. Gesn. Aldrov.
 Les Perses, HAKUS. Gesn. GAKUS. Aldrov.
 Les Grecs, Βῆας. Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet. Βῆρας; Βού-
 λαις. Schwenck. Βῆρας; Βῆταλος; Σκλέψ. Jonst.
 Les Turcs, UGU. Gesn. Aldrov.
 Les Portugais, MOCHO. Gesn. Aldrov. BUFO. Gesn. Aldrov. Marcgr. Jonst.
 Les Espagnols, BUHO. Gesn. Aldrov.
 Les Catalans, DUC MUSSOL. Barr.
 Les Italiens, DUCCO; DUGO; BUFO. Bel. Gesn. Aldrov.
 Les Boulonois, GUUO; GUFO. Aldrov.
 Les Savoyards, DUC; CHASSETONT; LUCHERANT. Gesn. Aldrov.
 Les Allemands, UHU. Gesn. Aldrov. Rzac. Frisch. GROSS HUH; SCHUF-
 FAUSZ ou SCHUFFANSZ; SCHEUFFEL ou SCHUFFEUL; FRANCK. Gesn.
 Aldrov. SCHUFFUT. Frisch. BHU; BERG-HU; HUHUY. Schwenck. Rzac.
 EYLE. Rzac.
 Les Bas Allemands, HUB. Aldrov.
 Les Saxons, UHO. Gesn. Aldrov.
 Les Silésiens, PUHUY. Schwenck.

Les Carinthiens, STEINAUFF. *Gesn. Aldrov.*

Les Suisses, HUW; BERG-HUW; HURU ou HURUW : & quelques-uns ,
HERTZOG. *Gesn. Aldrov.*

Les Flamands, SCHUYFFUUT. *Aldrov.*

Les Illyriens, WYR. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, PUHACZ; SOWA LEZNA. *Rzac.*

Les Suédois, UF. *Linn. Klein.*

Les Anglois, LYKEFOULE ou SHRICHE OULE. *Gesn. Aldrov.* LYSE-OULE.
Aldrov. GREAT HORN-OWL. *Willugh.* ALB. EAGLE-OWL. *Willugh.*

Les Brasiliens, JACURUTU. *Marcgr. Jonst.*

Adeo plumosa est hæc
Avis, ut crassitie *Anserem*
æquare videatur, quamquam
revera sit multò minor. Ip-
sius longitudo à capitis ver-
tice ad caudam extremam
unum pedem & decem pol-
lices æquat, & ad extremos
ungues unum pedem & sep-
tem pollices. Rostrum ab
ipsius unco ad oris angulos
usque duos pollices longum
est; cauda decem pollices;
pes duos pollices cum sep-
tem lineis; & trium digito-
rum anticorum medius cum
ungue tres pollices cum li-
nea una: laterales paulò sunt
breviores; posticus omnium
brevissimus. Ab extremo ad
extremum alarum extensa-
rum distantia est quatuor pe-
dum & undecim pollicum;
alæ verò complicatæ ad tres
quartas longitudinis caudæ
partes extenduntur. Partes
capitis & colli superiores,
dorsum & uropygium ves-

Il paroît aussi gros qu'une
Oye, par la quantité & l'é-
paisseur de ses plumes, quoique
effectivement il soit plus petit.
Sa longueur depuis le sommet
de la tête jusqu'au bout de la
queue est d'un pied dix pou-
ces, & jusqu'à celui des on-
gles d'un pied sept pouces. Son
bec depuis son crochet jus-
qu'aux coins de la bouche a
deux pouces de long; sa queue
dix pouces; son pied deux pou-
ces sept lignes; & celui du mi-
lieu des trois doigts antérieurs,
joint avec l'ongle, trois pou-
ces une ligne: les latéraux sont
un peu plus courts; & celui de
derrière est le plus court de
tous. Il a quatre pieds onze
pouces de vol; & ses aîles,
lorsqu'elles sont pliées, s'éten-
dent jusqu'aux trois quarts de
la longueur de la queue. Les
parties supérieures de la tête &
du col, le dos, le croupion,
les plumes scapulaires, les cou-
vertures du dessus des aîles &

celles du dessus de la queue sont variées de fauve, de rouffâtre & de noirâtre. Les plumes qui forment les oreilles, sont longues de deux pouces deux lignes, & variées des mêmes couleurs que le dessus de la tête. Celles qui retombent sur le bec, sont roides, blanchâtres & terminées de noir. Les yeux sont entourés de plumes décomposées ou dont les barbes sont séparées les unes des autres, qui partent toutes des yeux, comme d'un centre commun, s'étendent en rond, & forment de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides, frisées & variées de roux & de noir. Ces plumes décomposées sont noirâtres vers leur origine, & leur bout est varié de gris & de noirâtre. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes noirâtres dans leur milieu & rouffes sur les côtés. Celles qui couvrent le ventre & les côtés sont rouffes, & ont chacune une bande longitudinale, noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & de plus sont rayées transversalement de bandes étroites, de la même couleur. Les couvertures du dessous de la queue & les plumes des jambes sont

tiunt pennæ fulvo, rufescente & nigricante variæ. Alarum tectrices superiores, scapulares pennæ, quæque caudam superne tegunt, concolores. Plumulæ auriculas efficientes, duos pollices & totidem lineas longæ sunt, ac iisdem ac caput superius coloribus variæ. Pennæ rigidæ, candicantes, nigro terminatæ, antrosum incumbentes, basin rostri cooperiunt. Oculorum ambitus pennis constat decompositis sive quarum pinulæ à se invicem sunt disjunctæ, in exortu nigricantibus, apice verò griseo & nigricante variegatis, omnibus ab oculis, tanquam è centro communi, ortis, in orbem extensis, & in utroque capitis latere circulum efficientibus, cujus circumferentia pennis terminatur rigidis, crispis, rufoque & nigro variis. Guttur candicat. Partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ in medio nigricantes, in utroque latere rusæ. Quæ ventrem & latera cooperiunt, sunt rusæ: unaquæque autem taniâ longitudinali, nigricante, secundum scapi longitudinem ductâ, donatur, & taniis insuper stric-

tioribus & concoloribus est transversim striata. Teñtrices caudæ inferiores & pennæ crura vestientes rufæ, lineolisque strictissimis, fuscis transversim & undatim variæ. Alarum teñtrices inferiores dilutè rufæ, maculis fuscis variegatæ. Remiges in latere exteriori & apice fusco & rufescente variegantur; in latere interiore sunt fulvæ; & utrumque latus latis tæniis transversis, nigricantibus est striatum. Primæ remigis pinnularum exteriorum apices à se invicem sunt disjuncti, paululum sursum reflexi, & remigem infertæ dentatam exhibent. Remix prima uno pollice secundâ brevior est; tertia omnium longissima. Primæ & secundæ remigis pinnulæ interiores, & pinnulæ exteriores secundæ & tertiæ fiunt subito cæteris multò breviores, versùs uniuscujusque remigis apicem. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ nigricantes, tæniis transversis, nigricante & rufescente variis, striatæ: laterales concolores, excepto tamen latere interiore, versùs pennæ exortum tantum, fulvo, & nigricante transversim striatæ.

aussi rouffes, & rayées transversalement & en zigzags de petites bandes brunes, fort étroites. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un roux clair, varié de taches brunes. Les plumes des aîles sont variées de brun & de rouffâtre du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur est fauve; & les deux côtés sont rayés de larges bandes transversales, noirâtres. Les bouts des barbes extérieures de la première des plumes de l'aîle sont séparés les uns des autres, un peu recourbés vers le haut, & forment une dentelure pareille à celle d'une scie. Cette première plume est plus courte d'un pouce que la seconde: la troisième est la plus longue de toutes. Les barbes intérieures de la première & de la seconde, & les barbes extérieures de la seconde & de la troisième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers le bout de chaque plume. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont noirâtres, & rayées de bandes transversales, variées de noirâtre & de rouffâtre: les latérales sont de la même couleur, excepté leur côté intérieur, vers l'origine de la plume seulement,

to : fulvus autem color eò majus spatium occupat quò rectrix exterior fit. Oculorum irides croceæ. Rostrum nigrum. Pedes & digitos ad exortum unguium usque vestiunt plumulæ pennis crurum concolores ; ungues verò nigricant. Habitat in montibus , in quorum rupibus nidificat. *Ex museo Realmuriano , in quem ab Helvetia missus est à D. Altman.*

qui est fauve , & rayé transversalement de noirâtre : cette couleur fauve s'étend d'autant plus loin que la plume est plus extérieure. L'iris des yeux est couleur de safran. Le bec est noir. Les pieds & les doigts sont couverts jusqu'à l'origine des ongles , de plumes de la même couleur que celles des jambes ; & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les montagnes , dans les rochers desquelles il fait son nid. *Du cabinet de M. de Reaumur , à qui il a été envoyé de Suisse par M. Altman.*

A. LE GRAND DUC D'ITALIE.

Bubo Italicus.

Bubo noster. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 508. hujus icon minùs accurata pag. 510.*

Bubo. *Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII.*

Bubo secundus. *Willugh. Ornith. pag. 63.*

Grand Duc aux ailes noires. *Alb. Tom. III. pag. 3 ; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 6.*

Il est de la même grandeur & de la même grosseur que le précédent ; mais il en diffère par sa couleur. Il est par tout le corps d'un cendré-fauve ou ferrugineux , sur-tout à la poitrine , qui est aussi variée de taches longitudinales , noirâtres , semées çà & là & sans aucun ordre. Le dos & les couvertures des ailes sont d'un ferrugineux plus rembruni , & moins varié

Hic in eo quod ad magnitudinem & crassitiem attinet præcedenti per omnia respondet ; sed colore ab illo discrepat. Per totum enim corpus fulvus seu ferrugineus est ex cinereo , in pectore potissimum , ubi etiam subnigris maculis , in longum ductis , promiscue huc illuc nullo ordine respergitur. Dorsum & alarum tectrices è ferrugineo

ferrugineo magis fuscescunt, nec ita variegatæ sunt quàm in præcedente. Remiges & rectrices lineis subnigris, transversis, latiusculis distinguuntur. Sunt autem lineæ ita efformatæ, præsertim in rectricibus, ut singulæ latiores superne & infernè aliis subtilioribus claudantur, certis à se mutuo intervallis determinatæ. A præcedente etiam differt pedibus brevioribus & gracilioribus. Ungues maximi sunt, acutissimi, cornei. Habitat in *Italia*.

Edwards, Glanur. pag. 37, Cap. XVII, unius descriptionem dedit sub isto titulo, Grand Hibou cornu d'Athenes, cujus iconem accuratam delineavit Tab. 227, cum isto in omnibus convenientis, aut saltem ab illo parùm discrepantis. Angli eum nuncupant Great Horned Owl from Athens.

que dans le précédent. Les plumes des ailes & celles de la queue sont rayées transversalement de larges bandes noires, un peu éloignées les unes des autres, & renfermées en-dessus & en-dessous par d'autres bandes plus étroites; & cela sur-tout dans les plumes de la queue. Il diffère encore du précédent par ses pieds, qui sont plus courts & plus effilés. Ses ongles sont très-grands, très-aigus & d'une couleur de corne. On le trouve en *Italie*.

Edwards, dans ses Glanures, pag. 37, Chap. XVII, en a décrit un sous le nom de Grand Hibou cornu d'Athenes, dont il a donné une figure fort exacte Pl. 227, qui ressemble à celui-ci, ou du moins qui en diffère fort peu. Les Anglois l'appellent Great Horned Owl from Athens.

B. LE GRAND DUC DÉCHAUSSÉ.

Bubo pedibus nudis.

Bubo noster. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 508. hujus icon minus accurate pag. 511.

Bubo. Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII.

Bubo tertius. Willugh. Ornith. pag. 64.

Præcedenti per omnia similis apparet, hoc excepto
Tome I.

Il ressemble parfaitement au précédent; si ce n'est que ses
R r r

pieds sont nuds & tout-à-fait
dégarnis de plumes.

to, quod pedes habeat nudos
& pennis omnino destitutos.

2. LE GRAND DUC DE VIRGINIE.

Asio superne obscurè fuscus, lineolis cinereis & rufescentibus
variegatus, infernè dilutè cinereus, fusco transversim stria-
tus; remigibus, rectricibusque fusco transversim striatis....
BUBO VIRGINIANUS.

Duc. Edwards. Tom. II. pag. LX; avec une figure exacte Pl. 60.

Hibou couronné. Voy. de la B. de Hud. Tom. I. pag. 55; avec une assez
bonne figure Pl. 2.

Il est à peu près de la gran-
deur de *notre grand Duc*. Les
parties supérieures de la tête &
du col, le dos, le croupion,
les couvertures du dessus de la
queue & celles du dessus des
ailes sont d'un brun obscur, va-
rié de petites lignes confuses
& transversales, de cendré &
de roussâtre. Les plumes sca-
pulaires sont orangées & poin-
tillées de blanc. Celles qui for-
ment les oreilles, prennent leur
origine au-dessus du bec, & là
elles sont marquées d'une ligne
blanche : dans le reste de leur
longueur elles sont d'un roux
obscur, mêlé confusément de
brun, & pointillé de noir. Cel-
les qui retombent sur le bec,
sont roides & grises. Les yeux
sont entourés de plumes dé-
composées, ou dont les bar-
bes sont séparées les unes des
autres, qui partent toutes des
yeux, comme d'un centre com-
mun, s'étendent en rond &

Bubonem nostratem magni-
tudine circiter æquat. Partes
capitis & colli superiores,
dorsum, uropygium, ala-
rum rectrices superiores &
pennæ caudam superne te-
gentes sunt obscurè fusæ,
lineolis transversis, cinereis
& rufescentibus, confusè
mixtis, variæ. Scapulares
pennæ aurantiæ, albo punc-
tulatæ. Quæ auriculas effor-
mant, à basi rostri superius
oriuntur, & in exortu lineâ
albâ notantur : in reliqua
longitudine sunt obscurè ru-
fæ, fusco confusè mixtæ &
nigro punctatæ. Quæ basi ro-
stri incumbunt, rigidæ sunt
& griseæ. Oculorum ambitus
pennis constat decompositis,
sive quarum pinnulæ à se in-
vicem sunt disjunctæ, om-
nibus ab oculis, tanquam è
centro communi ortis, in
orbem extensis; & in utro-
que capitis latere circulum

efficientibus : pennæ autem istæ in parte oculis viciniore nigricant , in remotiore verò sunt aurantiæ , & fusco diluto confusè mixtæ. Supra oculos lineola extat candida. Guttur albicat. Pars colli inferior , pectus (medio tamen excepto) & latera ex fusco ad aurantium vergunt ; qui color ad latera sensim atque sensim dilutior fit , & maculis variegatur majusculis , fuscis , inter quas maculæ aliæ concolores , sed minutæ , disseminantur. Medium pectus , venter , crura , rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes sunt dilutè cineræ , fusco transversim striatæ. Remiges & rectrices superne sunt dorso concolores , latissime taniis transversis , fuscis variegantur ; subtus verò dilutè cineræ , fusco transversim striatæ. Oculorum irides aureæ. Rostrum nigrum. Pedes & digitorum maximam partem vestiunt pennæ dilutè cineræ : digitorum extrema & ungues corneo obscuro colore tinguntur. Habitat in *Virginia & Fretò Hudsonis*.

forment un cercle de chaque côté de la tête : ces plumes sont noirâtres dans la partie la plus voisine des yeux , mais en s'en éloignant elles deviennent d'une couleur orangée , mêlée confusément de brun clair. Audessus des yeux il y a une petite ligne blanche. La gorge est blanche. La partie inférieure du col , la poitrine (excepté son milieu) & les côtés sont d'un brun tirant sur l'orangé , qui s'affoiblit par degrés sur les côtés , & varié d'assez grandes taches brunes , entre lesquelles sont semées d'autres petites taches de la même couleur. Le milieu de la poitrine , le ventre , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont d'un cendré clair , rayé transversalement de brun. Les plumes des aîles & celles de la queue sont en-dessus de la même couleur que le dos , & variées de larges bandes transversales , brunes ; & en-dessous elles sont d'un cendré clair , rayé transversalement de brun. L'iris des yeux est de couleur d'or. Le bec est noir. Les pieds & la plus grande partie des doigts sont couverts de plumes d'un cendré clair : l'extrémité

des doigts & les ongles sont d'une couleur de corne obscure. On le trouve en *Virginie* , & à la *Baye de Hudson*.

3. LE GRAND DUC DE LAPONIE.

Asio albus, nigris maculis aspersus BUBO LAPONICUS.

Bubo Scandianus. Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 2.

Strix capite aurito, corpore albido. Faun. Suec. Linn. N°. 46.

Il est de la grosseur d'un *Dindon*. Il est par tout le corps d'un blanc varié de taches noires. Il ressemble parfaitement au *Chathuant blanc de la Baye de Hudson*, si ce n'est qu'il a des paquets de plumes en forme d'oreilles. On le trouve sur les *Alpes Laponnes*.

Magnitudine *Gallo-pavonem* æquat. Per universum corpus albus est, nigrisque maculis aspersus. Nisi auritus esset, cum *Strige alba Freti Hudsonis* in omnibus perfectè conveniret. Habitat in *Alpibus Laponicis*.

** 4. LE MOYEN DUC, OU LE HIBOU.

Asio superne fusco, rufescente & albido varius, infernè pennis in exortu rufescentibus, apice albidis, fusco longitudinaliter & transversim striatis vestitus; rectricibus quatuor extimis rufescentibus, fusco transversim striatis ASIO.

Asio. Gesn. Avi. pag. 223.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 271.

Asio secundus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 525. hujus icon minùs accurata pag. 524.

Asio seu Otus alter. Jonst. Avi. pag. 30. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII, sub titulo, Asio Bubonis species.

Asio seu Otus. Charlet. Exer. pag. 77. N°. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 70. N°. 2.

Otus. Gesn. Avi. pag. 635.

Otus, sive Noctua aurita. Willugh. Ornith. pag. 64. hujus icon non satis accurata Tab. XII, sub titulo, Otus, sive Asio.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Otus, sive Noctua aurita; Asio Latinis, Plinio. Raj. Syn. Avi. pag. 25. N°. A. 2.

Noctua aurita. Schwenck. Avi. Sil. pag. 308.

Noctua aurita Schwenckfeldii; Otus Willughbeyi. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 398.

Noctua minor aurita; Scops. Frisch. hujus icon accurata Tab. 99.

Ulula-Asio. Klein. Avi. pag. 55. N°. 2.

Bubo capite aurito, pennis sex. Linn. Syst. nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 3.

Strix capite aurito pennis sex. Faun. Suec. Linn. N°. 47.

Feliceps auribus patulis, cinereus, maculis nigris. Barr. Ornith. Class. III.

Gen. VI. sp. 2.

Moyen Duc ou Hibou cornu. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 137; avec une figure peu exacte pag. 138.*

Moyen Duc; Hibou cornu. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 25 b, dans laquelle est la même figure.*

Grand Duc. *Alb. Tom. II. pag. 6; avec une figure mauvaise & mal coloriée. Pl. 10.*

Les Hébreux l'appellent ASEN ou OSSEN. Aldrov.

Les Grecs, Ὀύς. Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck.

Les Espagnols, MOCHUELO. Gesn. Aldrov.

Les Italiens, DUOCO CORNUTO. Bel.

Les Allemands, ORHEUWEL. Gesn. Aldrov. OHR-KUTZ; UHR EULE;

RANTZ EULE. Schwenck. Rzac.

Les Flamands, KERCH-WL. Aldrov.

Les Polonois, KRUK NOCNY; SOWA USSATA. Rzac.

Les Suédois, HORN-UGGLA ou HORN-UGLA. Linn.

Les Anglois, HORN-OWL. Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Alb.

Crassitie Cornicem æquare videtur; quamvis revera *Picam* non superet. Ipsi longitudo à capitis vertice ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues undecim pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda quinque pollices & novem lineas; pes unum pollicem cum septem lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octodecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus verò omnium brevissimus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum

Il paroît gros comme une *Corneille*; quoiqu'il ne soit cependant pas plus gros qu'une *Pie*. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue cinq pouces neuf lignes; son pied un pouce sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a deux pieds onze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'el-

les sont pliées , s'étendent un peu au delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , ainsi que le dos , sont joliment variées de brun , de roussâtre & de blanchâtre. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont variées des mêmes couleurs , & quelques-unes des unes & des autres ont de plus une grande tache blanche du côté extérieur vers leur bout. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont roussâtres , & mêlées d'un peu de brun. Les plumes qui forment les oreilles , sont au nombre de six : elles sont brunes dans leur milieu selon leur longueur ; leur bord extérieur est roussâtre , l'intérieur est blanchâtre & varié de petites taches brunes. Les plumes qui retombent sur le bec , sont décomposées , roides , blanches & terminées de noir. Les yeux sont entourés de plumes roussâtres , décomposées , ou dont les barbes sont séparées les unes des autres , qui partent toutes des yeux , comme d'un centre commun , s'étendent en rond , & forment de chaque côté de la tête un cercle , dont la circonférence est terminée par des plumes roides , frisées , blanchâtres & terminées de brun. Celles qui

pedum undecim pollicum & trium linearum ; alæ verò complicatæ ultra caudæ extremitatem nonnihil protenduntur. Partes capitis & colli superiores , sicut & dorsum , fusco , rufescente & albedo perpulchrè sunt variegatæ. Scapulares pennæ & tectrices alarum superiores iisdem ornantur coloribus , & insuper quædam ex utrisque in latere exteriore versùs apicem majusculâ maculâ albâ notantur. Uropygium & tectrices caudæ superiores rufescunt , cum pauco fusco admixto. Sex plumulæ in medio secundum ipsarum longitudinem fuscæ , in latere exteriore rufescentes , in interiore verò albidæ maculis fuscis variæ , auriculas efformant. Pennæ basi rostri incumbentes decompositæ sunt , rigidæ , albæ & nigro terminatæ. Oculorum ambitus pennis constat rufescentibus , decompositis , sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ , omnibus ab oculis , tanquam è centro communi , ortis , in orbem extensis , & in utroque capitis latere efficientibus circulum , cujus circumferentia pennis terminatur rigidis , crispis , albidis

& apice fuscis. Quæ auriculas exterius cingunt, in exortu nigricant, apice verò minutissimis maculis fuscis, rufescentibus & albidis variegantur. Partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ in medio secundum ipsarum longitudinem fuscae, in utroque latere rufescentes. Quæ ventrem & latera cooperiunt, in exortu rufescunt, apice candicant, & tæniâ donantur longitudinali, fusca, secundum scapi longitudinem ductâ, & insuper duabus aut tribus aliis tæniis transversis & undatis, concoloribus ornantur. Tectrices caudæ inferiores pallidè rufescunt; unaquæque autem tæniâ donatur longitudinali, fusca, secundum scapi longitudinem extensâ. Alarum tectrices inferiores concolores, & similiter tæniis longitudinalibus, fuscis, sed strictioribus, variegatæ. Remiges majores ab exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque rufæ, latis tæniis transversis, fuscis variæ; in reliqua longitudine fuscae, rufescente admixto, fusco transversim striatæ: minores in latere exteriori & apice iisdem ac in dorso coloribus variæ, fusco trans-

forment le contour extérieur des oreilles, sont noirâtres à leur origine, & leur bout est varié par très-petites taches de brun, de roussâtre & de blanchâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes brunes dans leur milieu selon leur longueur, & roussâtres sur leurs côtés. Celles qui couvrent le ventre & les côtés, sont roussâtres à leur origine, blanchâtres à leur bout, & ont chacune une bande longitudinale, brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & deux ou trois autres bandes transversales & en zigzags, de la même couleur. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roussâtre pâle, & chacune a une bande longitudinale, brune, qui s'étend selon la longueur de sa tige. Celles du dessous de l'aile sont de la même couleur, & variées de même de bandes longitudinales, brunes, mais fort étroites. Les grandes plumes des ailes sont rousses depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, & variées de larges bandes transversales, brunes; leur bout est d'un brun mêlé de roussâtre, & rayé transversalement de brun: les moyennes sont variées des mêmes couleurs que le dos du côté exté-

rieur & à leur bout, & rayées transversalement de brun; leur côté intérieur est rouffâtre, & varié de bandes transversales, brunes. Les bouts des barbes extérieures de la première des plumes de l'aile sont séparés les uns des autres, un peu recourbés vers le haut, & forment une dentelure pareille à celle d'une scie: ses barbes intérieures deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers le bout de la plume. Cette plume est plus courte que la seconde & la troisième, qui sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont brunes, & variées de grandes taches rouffâtres vers l'origine de la plume, & blanchâtres vers le bout; ces taches sont mêlées d'un peu de brun, & le fond de la plume est lui-même mêlé d'un peu de rouffâtre: la plume qui suit de chaque côté, est variée des mêmes couleurs du côté extérieur; son côté intérieur est rouffâtre & rayé transversalement de brun: les quatre plus extérieures de chaque côté sont rouffâtres & variées de bandes transversales, brunes; mais la troisième & la quatrième ont un peu de brun mêlé sur le roux du côté exté-

versim striatæ; in latere inferiore rufescentes, taniis pariter transversis, fuscis præditæ. Primæ remigis pinnularum exteriorum apices à se invicem sunt disjuncti, paululum sursum reflexi, & remigem ferræ instar dentatam exhibent. Remigis istius pinnulæ interiores, versùs ipsius apicem, fiunt subito cæteris multò breviores. Remix autem ista brevior est secundâ & tertiâ, quæ sunt omnium longissimæ. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae fuscae, paucò rufescente admixto, maculis majusculis, versùs pennæ exortum rufescentibus, versùs apicem candidantibus, variegatæ; maculis autem istis paululum fusci admiscetur: rectrix utrinque sequens in latere exteriorè iisdem variegatur coloribus; in latere verò interiorè rufescit, & fusco est transversim striata: quatuor utrinque extimæ rufescentes, taniis transversis, fuscis variæ, cum aliqua in rufo ad latus exteriorius tertiæ & quartæ fusci mixtura. Oculorum irides splendide luteæ. Pedes ad unguum principium usque rufescentibus vestiuntur pen- nis. Rostrum unguisque nigricant.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 491

gricant. Montes, locaque rieur seulement. L'iris des yeux
edita frequentat. *Ex museo* est d'un beau jaune. Les pieds
Realmuriano. sont couverts jusqu'à l'origine
des ongles de plumes roussâ-
tres. Le bec & les ongles sont noirâtres. On le trouve le plus
souvent sur les montagnes & les endroits élevés. *Du cabinet*
de M. de Reaumur.

A. LE HIBOU D'ITALIE.

Asio Italicus.

Asio seu *Otus.* *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 519. hujus icon minùs accurata*
pag. 523.

Jonst. Avi. pag. 30. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII.

Hic primus ab *Aldrovando*
descriptus à nostrate differt
magnitudine & crassitie, qui-
bus eum antecellit : ab illo
colore quoque discrepat. Ca-
put cinereo, castaneo diluto
& nigro varium est. Oculos
ambiunt minutissimæ plu-
mulæ ex cinereo candican-
tes, decompositæ, sive qua-
rum pinnulæ nullo modo in-
ter se connectuntur, omnes
ab oculis, tanquam è cen-
tro communi, ortæ, in or-
bem positæ, & in utroque
capitis latere efficientes cir-
culum, cujus circumferen-
tia pennis constat rigidis &
crispis. Totum corpus ex ci-
nereo ad ferrugineum dilu-
tum vergit, maculis ubi-
que fuscis conspersum, tam
majusculis passim quàm in-
tar punctorum minutissimis.
Alarum tectrices superiores
quædam, & quidem à cor-

Celui-ci, qui est le premier
dont *Aldrovande* donne la des-
cription, est plus grand & plus
gros que le nôtre : il en diffère
aussi par sa couleur. La tête est
variée de cendré, de marron
clair & de noir. Les yeux sont
entourés de très-petites plu-
mes, d'un cendré-blanchâtre,
décomposées, ou dont les bar-
bes sont séparées les unes des
autres, qui partent toutes des
yeux, comme d'un centre com-
mun, s'étendent en rond, &
forment de chaque côté de la
tête un cercle, dont la circon-
férence est terminée par des plu-
mes roides & frisées. Tout le
corps est d'un cendré tirant sur
le ferrugineux clair, tout parfè-
mé de taches brunes, assez
grandes, entre lesquelles le
fond est pointillé de la même
couleur. Quelques-unes des
couvertures du dessus des aîles,
les plus éloignées du corps, sont

blanches & terminées de noirâtre. Le ventre est varié de taches brunes, longitudinales, & qui se terminent en pointe. Les couvertures du dessous de l'aile, ainsi que leur bord vers les aisselles, sont d'un blanc argenté. Les plus grandes plumes de l'aile sont variées de taches transversales, brunes, assez larges, & placées de distance en distance : celles qui suivent sont d'un cendré-blanchâtre, tout pointillé de brun : & les plus petites, qui sont les plus proches du dos, sont variées, comme les grandes, de taches transversales, mais en plus grand nombre, & plus proches les unes des autres. Les plumes de la queue, qui s'étendent jusqu'à six pouces au-delà du bout des ailes, sont vers leurs bords d'un cendré tirant sur la couleur de plomb, & le milieu est varié par intervalles égaux d'un grand nombre de lignes noires, transversales & en zigzags. Les yeux sont grands ; leur prunelle est noire ; & leur iris d'un jaune de safran. Le bec est d'un marron-noirâtre. Les pieds sont couverts presque jusqu'à l'origine des ongles de plumes d'un brun tirant sur le ferrugineux : ils sont grands, gros, forts & armés d'ongles noirs, très-crochus. On le trouve en *Italie*.

pore remotiores, albæ sunt, apice nigricante. Per ventrem maculæ fuscae longitudinaliter ducuntur, & in acumen desinunt. Alarum rectrices inferiores, sicut & axillæ, argenteo colore candescunt. Remiges alarum pennæ majores per æqua & magna intervalla fuscis maculis latioribus transversim distinguuntur ; mediæ ex cinereo albicant, & minutissimis punctis fuscis maculatæ sunt : minores tandem, quæ dorso proximæ, lineis transversis, uti majores, sed frequentioribus insigniuntur. Quæ caudam constituunt pennæ rectrices, ultra extremas alas ad sex circiter pollices protensæ, circa oras ex cinereo ad plumbeum inclinant, medioque per æqua spatia lineis frequentibus, nigris, iisque transversim contortis, & incurvo flexu undulatis, ornantur. Oculi ampli sunt ; pupilla nigra ; irides verò croceæ. Rostrum ex castaneo nigricat. Pedes ad ungues propemodum usque fusco-subferrugineis pennis vestiuntur : grandes sunt, crassi & validi, unguibusque nigris, aduncis admodum armati. Habitat in *Italia*.

**** 5. LE PETIT DUC.**

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 1.

Asio griseo, rufo, fusco & nigricante varius, remigibus exterius albo-rufescente transversim maculatis.... SCOPS.

Scops. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 530. hujus icon minimè accurata pag. 532.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 348.

Jonst. Avi. pag. 31. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII, sub titulo, Asio alius, seu Scops.

Charlet. Exer. pag. 77. N° 3.

Charlet. Onomazt. pag. 70. N° 3.

Scops Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 65. hujus icon satis accurata Tab. XII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 25. N° 3.

Ulula, Scops Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 57. N° 7.*

Noctua minor; Scops Aldrovandi. *Rzac. Auth. Hist. nat. Pol. pag. 398.*

Noctua minor; Noctua aucuparia; Scops Plinii. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 288.*

Huette ou Hulote. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 141; avec une figure peu exacte pag. 142.*

Huette; Hulote; Chouette, nommée par aucuns, Petit Duc. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 27 b, dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent Σκῆψ. *Schwenck. Aldrov. Jonst. Avi. pag. 31. Schwenck.*

Les Italiens, ZIVETTA; ZUETTA; ZIGUETTA. *Bel.*

Les Italiens, dans le Duché d'Urbain, ALOCHARELLO. *Aldrov.*

Les Boulonnois, CHIVINÔ. *Aldrov.*

Les Allemands, STOCK EULE; KLEIN-KEUTZLIN; KLEINE WALD EULE.

Schwenck. KLEINE NACHT-EULE. Rzac. KLEINE FROEMBD KUTZLE, ou KLEINE VUELSCH KUTZLE. Aldrov.

Les Polonois, SOWKA. *Rzac.*

Les Anglois, LITTLE HORN-OWL. *Willugh.*

Noctua minori crassitie cedit. Ipsius longitudo à capitis vertice ad caudam extremam septem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues septem pol-

Il n'est pas si gros que la petite Chouette. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept
Sffij

pouces une ligne. Son bec depuis le crochet jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long ; sa queue deux pouces ; son pied un pouce ; & le milieu des trois doigts de devant , joint avec l'ongle , dix lignes : l'intérieur est de la même longueur ; l'extérieur est un peu plus court ; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Tout son corps est très-joliment varié de gris , de roux , de brun & de noirâtre. Il y a plus de gris à la partie inférieure du corps que par-tout ailleurs , & le brun domine à la partie supérieure. La figure fera mieux voir cette variété , que la meilleure description ne pourroit l'exprimer. Les plumes des aîles sont variées comme le reste du corps , & ont leur côté extérieur marqué de taches transversales , d'un blanc-roussâtre. L'iris des yeux est jaune. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un gris-roussâtre , mêlé de taches brunes. Le bec est noir. Les doigts & les ongles sont bruns. Il fait son nid dans les arbres creux. *Du cabinet de M. de Réaumur.*

lices & lineam unam. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque octo lineas longum est ; cauda duos pollices ; pes pollicem unum ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue decem lineas : intimus eandem longitudinem explet : extremus paulò brevior est ; & posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ultra caudam extremam non nihil protenduntur. Universum corpus griseo , rufo , fusco & nigricante perpulchrè variègatur. Griseus color majus spatium occupat in corpore inferiore , & fuscus in superiore. Iconem consule : varietatem istam magis præbebit quàm accuratissima descriptio eam exprimere posset. Alarum remiges iisdem ac reliquum corpus coloribus variègantur , & insuper maculis transversis , albo-rufescentibus in latere exteriorè notantur. Oculorum irides flavæ. Pennæ griseo-rufescentes , maculis fuscis variæ , pedes vestiunt ad exortum usque digitorum. Rostrum nigrum. Digiti , unguesque fusci. In cavis arboribus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

6. LE PETIT DUC DE LA CAROLINE.

Alio superne fusco-rufescens, infernè sordidè albus, fusco-rufescente admixto; remigibus maculis albis variegatis; rectricibus saturatè fuscis SCOPS CAROLINIENSIS.

Petit Hibou. *Catesb. Tom. I. pag. 7; avec une figure exacte Pl. 7.*
Les Anglois l'appellent LITTLE OWL. Catesb.

Quoad crassitiem tertiâ circiter parte *Scopem nostratè* antecellit. Alæ complicatæ caudam extremam non attingunt. Caput, collum, dorsum, uropygium, alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes ex fusco ad rufum inclinant. Scapulæ pennæ concolores, & quinque maculis majusculis, albis variæ. Quæ auriculas efformant pennæ eodem, quo caput tingitur, colore imbuuntur, & in acumen desinunt. Oculorum ambitus pennis confert candidis, cum aliqua fusco-rufescentis mixtura. Pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores sordidè alben, fusco-rufescente admixto. Margines alarum, versùs articulum carpo humano respondentem, candicant. Remiges dorso concolores; majores autem maculis quibusdam albis variegantur. Rec-

Il est d'environ un tiers plus gros que notre petit Duc. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'au bout de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur le roux. Les plumes scapulaires sont de la même couleur, & variées de cinq taches blanches, assez grandes. Celles qui forment les oreilles, sont de la même couleur que la tête, & se terminent en pointe. Les plumes qui entourent les yeux sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de brun-roussâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale, mêlé d'une teinte de brun-roussâtre. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les plumes des aîles sont de la même couleur que le dos; & les grandes sont

variées de quelques taches blanches. Celles de la queue sont d'un brun foncé. L'iris des yeux est d'un jaune foncé, ou couleur de safran. Le bec est de la même couleur. Les pieds sont garnis jusqu'à l'origine des doigts de plumes d'un brun clair. Les doigts sont de ce même brun; & les ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle par sa couleur, qui est un brun plus foncé, sans aucun mélange de roussâtre.

On les trouve à la Caroline.

trices saturatè fusciscunt. Oculorum irides saturatè flavæ aut croceæ. Rostrum eodem colore imbuitur. Pedes ad principium usque digitorum pennis vestiuntur dilutè fuscis. Digni quoque dilutè fuscis; unguis verò nigri.

Fœmina à mâle discrepat colore saturatiore fusco, absque ulla rufescentis mixtura.

Habitant in Carolina.

7. LE HIBOU D'AMÉRIQUE.

Asio superne saturatè cinereus, infernè ferrugineus; uropygio & imo ventre albis, nigro maculatis; remigibus, rectricibusque ferrugineis, saturatè cinereo, sordidè albo admixto, transversim striatis. ASIO AMERICANUS.

Bubo minor flavescens, nigris maculis conspersus. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 127.

Feliceps flavescens, maculis nigris. Linn. Syst. nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 4.

Feliceps Americanus, flavescens, maculis nigris. Barr. Ornith. Class. III.

Gen. VI. sp. 3.

Hibou ou Bubo ocre-cinereus, pectore maculoso. Feuillee. Journ. des Obs. phis. pag. 59, dans laquelle il y a une figure assez exacte. (ed. 1725.)

Les François de la Guiane l'appellent CHATHUANT. Barr.

Il est à peu près de la grandeur de notre Hibou. La tête, la partie supérieure du col, le dos & les couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré un peu foncé. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, les jambes &

Magnitudine Asionem nostratè circiter æquat. Caput, pars colli superior, dorsum, alarumque rectrices superiores sunt saturatè cinereæ. Colli inferior pars, pectus, venter supremus, latera & crura sunt ferrugi-

nea. Uropygium , venter imus & rectrices caudæ superiores & inferiores lactei sunt coloris, maculisque nigris variegantur. Remiges & rectrices ferrugineæ , latis tæniis transversis , cinereo quàm in dorso saturatiore tinctis , cum pauco sordide albo admixto , striatæ. Pennæ aurículas efformantes supra oculos oriuntur ; maxime graciles sunt , acutæ & flavicantes. Oculos ambiunt pennæ cinerascences , decompositæ , sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ , omnes ab oculis , tanquam è centro communi , ortæ , & in orbem extensæ. Oculi magni ; ipso irides splendide flavæ & ad aureum colorem vergentes. Rostrum , pedesque lutei ; ungues verò nigri. Habitat in *America meridionali*.

les côtés sont ferrugineux. Le croupion , le bas-ventre & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc de lait , varié de taches noires. Les plumes des aîles & celles de la queue sont ferrugineuses , & rayées de larges bandes transversales , d'un cendré plus foncé que celui du dos , & mêlé d'un peu de blanc sale. Les plumes qui forment les oreilles, sortent immédiatement au-dessus des yeux : elles sont pointues , très-déliées & jaunâtres. Les yeux sont entourés de plumes grisâtres , décomposées , ou dont les barbes sont séparées les unes des autres , qui partent toutes des yeux , comme d'un centre commun , & s'étendent en rond. Les yeux sont grands ; & leur iris est d'un jaune brillant & tirant sur la couleur d'or. Le bec & les pieds sont jaunes ; & les ongles noirs. On le trouve dans l'*Amerique méridionale*.

8. LE HIBOU DU BRÉSIL.

Asio superne dilutè fusco-ferrugineus , albis maculis variegatus , infernè albicans , maculis dilutè fusco-ferrugineis varius ; rectricibus dilutè fusco-ferrugineis , albo undatis
ASIO BRASILIENSIS.

Noctua Brasiliensis, Cabure dicta Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 69. Raj. Syn. Avi. pag. 26. N° 7.*
Ulala Brasiliensis. *Klein. Avi. pag. 57. N° 8.*

** 1. LE CHATHUANT.

Strix superne rufo - ferruginea , medio pennarum nigricante ;
infernè alba , rufo-ferrugineo admixto , tæniis nigricantibus
longitudinaliter & transversim variegata ; remigibus , rec-
tricibusque fusco & rufo transversim striatis *STRIX*.

Strix capite lævi ; corpore ferrugineo ; remige tertiâ longiore. *Faun.*
Suec. Linn. N°. 55.

Strix. Gefn. Avi. pag. 738.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 561. *hujus icon non satis accurata pag.* 563.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 353.

Jonst. Avi. pag. 34. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIX.*

Charlet. Exer. pag. 78. *N°.* 7.

Charlet. Onomazi. pag. 70. *N°.* 7.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Moehr. Avi. Gen. 39.

Strix Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 65. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 25. *N°.* A. 2.

Strix minor. Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 35. *sp.* 6.

Ulula, Strix Aldrovandi, Gefneri, aliorum. Klein. Avi. pag. 56. *N°.* 3.

Ulula è cinereo boëtica. Barr. Ornith. Class. III. Gen. V. sp. 3.

Noctua major. Frisch. hujus icones accuratæ, maris Tab. 96, *& feminae Tab.* 95.

Chouette. Alb. Tom. I. pag. 10 ; *avec une figure très-mal coloriée Pl.* 9.

Les Grecs l'appellent Στρίξ. Aldrov. Στρίων. Schwenck.

Les Catalans, CABECA. Barr.

Les Allemands, MILCHSANGER ; KINDER MELCKER. Schwenck. BRAND-EULE ; GELBLICHE-EULE ; BRAUNE-EULE ; STOCK-EULE. Frisch.

Les Anglois, BROWN-OWL. Alb. COMMON BROWN-OWL ; COMMON JUVY-OWL. Willugh. Raj. LICH-OWL, ou LEECH-OWL. Charlet ; & à cause de son cri, SCREECH-OWL. Willugh. Raj. Charlet. SCRITCH-OWL. Sibbald.

Il est à peu près de la grosseur d'un Pigeon. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec

Crassitie Columbam circiter æquat. Ipsius longitudo à capitis vertice ad caudæ extremitatem quatuordecim pollices explet, & ad extremos unguis tredecim pol-

lices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda sex pollices ; pes unum pollicem cum octo lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octodecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alis extensis , extremitates majorum remigum duorum pedum & octo pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt , exceptâ tamen unius pollicis distantia. Universum corpus superius , partes scilicet capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes , est rufo-ferrugineum , nigricante varium , unaquâque scilicet pennâ in medio nigricante , marginibus rufo-ferrugineis : quæ tamen pennæ , si attentius conspiciantur , lineis fuscis , transversis & undatis variegatæ apparent. Capitis verticem cooperientes pennæ , sicut & scapulares , maculis quibusdam albis præditæ sunt. Majorum alarum tectricum maxima pars maculâ quoque donatur albâ versùs ipsarum apices & ad

depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; sa queue six pouces ; son pied un pouce huit lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , dix-huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière l'est encore davantage. Il a deux pieds huit pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à un pouce de distance du bout de la queue. Tout le dessus du corps , sçavoir les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue , est d'un roux-ferrugineux , varié de noirâtre , cette dernière couleur occupant le milieu de chaque plume , & le roux-ferrugineux en occupant les bords : & si l'on examine chaque plume avec attention , on la trouvera de plus variée de lignes brunes , transversales & en zigzags. Les plumes du sommet de la tête & les scapulaires ont quelques taches blanches. La plupart des grandes couvertures des aîles en ont aussi une vers leur bout & du côté extérieur. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont variées de

blanc, de noirâtre & de roux-ferrugineux; c'est-à-dire, que chaque plume est blanche, ayant dans son milieu une bande longitudinale, noirâtre, & trois ou quatre lignes de la même couleur, transversales & en zig-zags; le tout mêlé de roux-ferrugineux. Les jambes & les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des ongles de plumes d'un blanc sale, semé de petits points bruns ou roussâtres. Les couvertures du dessous de l'aile sont variées de blanc & de brun clair. Les plumes des ailes & celles de la queue sont variées de bandes transversales, alternativement brunes & rousses. La première des grandes plumes de l'aile est la plus courte, & la quatrième est la plus longue. Les bouts des barbes extérieures de ces plumes sont séparés les uns des autres, un peu recourbés vers le haut, & forment une dentelure pareille à celle d'une scie. La queue est composée de douze plumes, dont celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés de plumes décomposées, ou dont les barbes sont séparées les unes des autres, d'un gris sale, mêlé de roussâtre. Ces plumes partent des yeux, comme d'un centre commun, & s'étendent

latus exterius sitâ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera & rectrices caudæ inferiores albo, nigricante & rufo-ferrugineo variegantur; unaquæque scilicet penna alba est, taniâ longitudinali, nigricante in medio donata, & tribus quatuorve lineis concoloribus, transversis & undatis prædita, rufo-ferrugineo cum supradictis coloribus confusè mixto. Pennæ sordidè albæ, minutis punctulis fuscis aut rufescentibus aspersæ, crura & pedes vestiunt ad exortum usque unguium. Alarum rectrices inferiores ex albo & dilutè fusco variegantur. Remiges & rectrices pennæ taniis transversis, alternatim fuscis & rufis, variæ. Remix prima brevissima; quarta verò omnium longissima. Istarum remigum pinnularum exteriorum apices sunt à se invicem disjuncti, nonnihil sursum reflexi, & remiges instar ferræ dentatas exhibent. Cauda constat duodecim rectricibus, quarum intermedia lateralibus paulò sunt longiores. Oculorum ambitus pennis conflatur decompositis, sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ, sordidè griseis, ru-

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 503

fescente admixto, omnibus ab oculis, tanquam è centro communi, ortis, in orbem extensis, & in utroque capitis latere circulum efficientibus, cujus circumferentia plumis terminatur rigidis, crispis & albo, fusco & rufo in *mare*, rufo verò & nigricante in *fœmina* variis. Oculorum irides cœrulescunt. Rostrum ex flavo viridescit; unguis autem corneo colore tinguntur. Habitat in sylvis. *Ex museo Reat-muriano.*

en rond, formant de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides, frisées & variées de blanc, de brun & de roux dans le *mâle*, & de roux & de noirâtre dans la *femelle*. L'iris des yeux est bleuâtre. Le bec est d'un jaune-verdâtre : & les ongles sont d'une couleur de corne. On le trouve dans les bois. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LE PETIT CHATHUANT.

Strix superne rufescens, lineolis undatis griseis & fuscis variâ, punctulis albidis aspersa, infernè alba aut albo-rufescens, punctulis nigricantibus variegata aut immaculata; rectricibus lateralibus interiùs albo-rufescentibus, fusco transversim striatis; extimâ albâ, fusco transversim striatâ... *ALUCO.*

Strix capite lævi; corpore luteo. *Faun. Suec. Linn. N°. 49.*

Strix flammea. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 7.*

Aluco. *Charlet. Exer. pag. 78. N°. 4.*

Charlet. Onomazt. pag. 70. N°. 4.

Aluco alter, seu minor. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 536, in qua icon minimè accurata; & insuper altera icon à Gesnero mutuata pag. 538.*

Aluco minor. *Jonst. Avi. pag. 32. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIX; & insuper duæ aliæ icones à Gesnero mutuatae eadem Tab. sub titulis, Ulula Kirch Eule & Ulula alia.*

Aluco minor *Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 67. hujus icon non satis accurata Tab. XIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 25. N°. A. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 355.

Ululæ genus alterum, quod quidam flammeatum cognominant. *Gesn. Avi. pag. 774. hujus icon non satis accurata pag. 775.*

Gesn. icon. Avi. pag. 16, in qua eadem icon.

- Ulula Aluco Aldrovandi. Klein. Avi. pag. 56. N°. 4.*
Ulula flameata. Schwenck. Avi. Sil. pag. 368.
Ulula flameata Gefneri & Schwenckfeldii ; Aluco Aldrovandi ; Otus Turneri. Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 427.
Ulula cinerea , maculis ferrugineis dilutis. Barr. Ornith. Class. III. Gen. V. sp. 2.
Noctua guttata. Frisch. hujus icon accurata Tab. 97.
Tuidara Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 205. Jonst. Avi. pag. 140.
Petit Chathuant plombé. Bel. Portr. d'Ois. pag. 26 b , dans laquelle il y a une figure peu exacte.
Effraye ou Fresaye. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 142 ; avec la même figure pag. 143.
Lucheran ou Chouette blanche. Alb. Tom. II. pag. 7 ; avec une figure mal coloriée Pl. II.
Les Grecs l'appellent Έλεος. Charlet. Jonst. Έλεος ; Ωλοε. Schwenck.
Les Allemands , KIRCH EULE ; RANTZ EULE. Schwenck. Rzac. SCHLEVER EULE ; PERL EULE. Frisch.
Les Allemands aux environs de Strasbourg , SCHLEYEREUL. Gefn. Marcgr. Jonst.
Les Silésiens , SCHLEIER-EULE. Schwenck.
Les Flamands , KIRCHUL. Gefn. KERCKUNLE. Marcgr. Jonst.
Les Hollandois , RANSULLE ou RANSSULLE. Gefn.
Les Illyriens , LELECK. Aldrov.
Les Anglois , WHITE-OWL. Charlet. Sibbald. Alb. COMMON WHITE-OWL. Willugh. Raj. BARN-OWL. Willugh. Raj. Charlet ; & quelques-uns , CHURCH-OWL. Willugh. Raj. Sibbald.
Les Brasiiliens , TUIDARA. Marcgr. Jonst.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a un pouce quatre lignes & demie de long ; sa queue quatre pouces dix lignes ; son pied deux pouces deux lignes ; & celui du milieu des trois

Præcedenti paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo à capitis vertice ad caudam extremam tredecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & quatuor cum semi lineas longum est ; cauda quatuor pollices & decem lineas ; pes duos pollices cum totidem

lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Ab extremo ad extremum alarum expansarum distantia est duorum pedum undecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad sexdecim lineas ultra caudæ extremitatem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, rectrices caudæ superiores & scapulares pennæ rufescunt, lineolis undatis, griseis & fuscis perpulchrè variantur, & punctulis albidis asperguntur. Oculos ambiunt pennæ decompositæ, sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ, candidæ, (in quibusdam tamen quæ oculos immediatè cingunt, ex rufo ad castaneum inclinant) omnes ab oculis, tanquam è centro communi, ortæ, in orbem extensæ, & in utroque capitis latere efficientes circulum, cujus circumferentia pennis terminatur rigidis, crispis & rufescentibus. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes

doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a deux pieds onze pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à seize lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont roussâtres, fort joliment variées de petites lignes en zigzags, de gris & de brun, & semées de petits points blanchâtres. Les yeux sont entourés de plumes blanches décomposées ou dont les barbes sont séparées les unes des autres. (Dans quelques-unes de ces plumes qui sont les plus proches des yeux, sont d'un roux tirant sur le marron). Ces plumes partent des yeux, comme d'un centre commun, s'étendent en rond, & forment de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides, frisées & roussâtres. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc-roussâtre, varié de petits points bruns.

Quelques-uns ont tout le dessous du corps blanc, & varié de quelques petits points bruns ou noirâtres: d'autres l'ont blanc & sans taches. Les petites ouvertures du dessus des aîles sont variées des mêmes couleurs & de la même façon que le dos: les grandes sont variées de même à leur bout seulement; leur côté extérieur est roux & taché de brun & de gris, & leur côté intérieur est d'un blanc-roussâtre, marqué d'une bande transversale, brune. Les plumes des aîles sont du côté extérieur roussâtres, & rayées de bandes transversales, variées de gris & de brun; leur côté intérieur est d'un blanc-roussâtre, rayé de bandes transversales, brunes: & leur bout est varié de gris & de brun. Les bouts des barbes extérieures de la première des plumes de l'aîle sont séparés les uns des autres, recourbés vers le haut, & forment une dentelure pareille à celle d'une scie. Cette première plume est un peu plus courte que la seconde, qui est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un roussâtre rayé de bandes transversales, variées de gris & de brun: les quatre suivantes de chaque côté sont de la même couleur du côté extérieur, &

ex albo rufescunt, punctulisque variegantur fuscis. In quibusdam universum corpus inferius album est, & punctulis aliquibus fuscis aut nigricantibus varium: in aliis album est & immaculatum. Alarum tectrices superiores minores iisdem ac in dorso coloribus & simili modo variantur: majores apice tantum concolores; in latere exteriori sunt rufæ, fusco & griseo maculatæ, in interiori verò ex albo rufescunt, & taniâ transversâ, fuscâ notantur. Remiges in latere exteriori rufescentes, taniis transversis, griseo & fusco variis, striatæ; in latere interiori albo-rufescentes, taniis transversis, fuscis notatæ: apice verò griseo & fusco variegantur. Primæ remigis pinnularum exteriorum apices à se invicem sunt distincti, nonnihil sursum reflexi, & remigem serræ instar dentatam exhibent. Remix prima paulò brevior est secundâ, quæ omnium longissima. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae rufescentes, taniis transversis, griseo & fusco variis, striatæ: quatuor utrinque sequentes in latere exteriori concolores, in interiori

riore verò albo-rufescentes, tæniis transversis, fuscis varix : utrinque extrema albet, cum aliqua rufescentis mixtura secundum rectricis scapi longitudinem extensa, & tæniis variegatur transversis, fuscis : duodecim insuper rectricum apices griseo & fusco variantur. Oculorum irides croceæ. Rostrum album; excepto unci apice fusco. Pedes ad principium usque digitorum alba lanugo, pilorum æmula, vestit. Digiti albi, raris quibusdam pilis candidis obsiti. Ungues nigricantes : trium autem digitorum anticorum medii unguis interiùs serræ instar denticulatus. Habitat in antiquis ædificiis. *Ex museo Realmuriano.*

une scie. On le trouve dans les vieux bâtimens. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

leur côté intérieur est d'un blanc-rouffâtre, rayé de bandes transversales, brunes : la plus extérieure de chaque côté est d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de rouffâtre le long de la tige de la plume seulement, & rayé de bandes transversales, brunes : de plus le bout de ces douze plumes est varié de gris & de brun. L'iris des yeux est d'un jaune de safran. Le bec est blanc, excepté le bout de son crochet, qui est brun. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts d'un duvet blanc, qui ressemble assez bien à des poils. Les doigts sont blancs, & couverts de quelques poils clair-semés, de la même couleur. Les ongles sont noirâtres : celui du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé intérieurement comme

**** 3. LA HULOTE.**

Strix superne cinerea, maculis albicantibus & nigris variegata, infernè alba, tæniis nigris longitudinaliter & transversim varia; remigibus, rectricibusque nigro & cinereo-rufo transversim striatis ULULA.

Strix capite lævi; corpore ferrugineo; oculorum iridibus atris; remigibus primoribus ferratis. Faun. Suec. Linn. N°. 48.

Strix cinerea; an fortè Ulula Aldrovandi? Willugh Ornith. pag. 66.

Strix cinerea; fortè Ulula Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 26. N°. A. 3.

Ulula. Gesn. Avi. pag. 772. hujus icon minùs accurata pag. 773.

- Gesn. icon. Avi. pag. 15, in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 538. hujus icon pessima pag. 540.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 367.
Jonst. Avi. pag. 32. hujus duæ icones Tab. XIX, una à Gesnero mutuata, & altera ab Aldrovando.
Charlet. Exer. pag. 78. N°. 5.
Charlet. Onomazi. pag. 70. N°. 5.
Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 297.
Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 5.
Ulula Latinis. Raj. Syn. Avi. pag. 26. N°. 4.
Ulula Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 68. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIII.
Ulula Gesneri. Raj. Syn. Avi. pag. 26. N°. 5.
Ulula Gesneri & Aldrovandi; Strix cinerea Willughbeyi. Rzac. Auth. Hist. nat. Pol. pag. 426.
Ulula coloris plumbei maculis albidis. Barr. Ornith. Class. III. Gen. V. sp. 1.
Noctua major. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 94.
Aluco. Gesn. Avi. pag. 95.
Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 534.
Aluco major. Jonst. Avi. pag. 32.
Rzac. Auth. Hist. nat. Pol. pag. 355.
Aluco prior Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 68.
Aluco Gesnero, Gazzæ, Gelenio. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 269.
An Ulula Vulturina? Klein. Avi. pag. 57. N°. 10.
Hibou sans cornes, ou Chathuant. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 139, dans laquelle il y a une figure peu exacte.
Hibou; Chathuant, appelé aussi Dame. Bel. Portr. d'Ois. pag. 26 a, dans laquelle est la même figure.
Chouette noire. Alb. Tom. III. pag. 4; avec une très-mauvaise figure Pl. 8.
Les Grecs l'appellent Α'γ'ωλιος. Schwenck. Jonst. Charlet. Ο'γελυνη; Ο'λολυ'ας.
Jonst. Ε'λεος. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst.
Les Portugais, CORUSA. Gesn. Aldrov.
Les Catalans, XOT; XURA; RUTA; SORIGUER; OLIBA DE NIT. Barr.
Les Italiens, ULULA. Gesn. ALUCO; BARBAIANI. Bel. ALOCHO; & quelques-uns, LUCHARO. Aldrov.
Les Boulonnois, BARBAIANO. Gesn. Aldrov.
Les Allemands, UL; EUL. Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. UWEL; NACHT-EUL. Gesn. Aldrov. STOCK-EUL. Gesn. HUUH. Gesn. Rzac. EULE. Schwenck. Rzac. NACHT-VOGEL; NACHT-EULE; KAEUTZLEIN. Rzac. GRAVE-EULE. Frisch. GRAW-EULE; PUSCH-EULE; BLE. Schwenck.
Les Bas Allemands ou les Flamands, HUBEN ou HUBEKEN. Aldrov.
Les Illyriens, SOWA. Gesn. Aldrov.
Les Polonois, LELEK; SOWKA; PUSSCZYK; PUSZCZYK. Rzac. PUSZZYK. Gesn. Aldrov.

Les Anglois, OWL ou HOWLET. Gefn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet.
 GREY-OWL. *Willugh. Raj.* WHOOPING OWL; GILHOOTER. *Charlet.*
 BLACK-OWL. *Alb.*

On l'appelle à Avignon MACHETTE. Gefn. Aldrov. GRIMAUD. Aldrov.

Magnitudine & crassitie
Strigem nonnihil superat. Ipsius longitudo à capitis vertice ad caudæ extremitatem quatuordecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues eandem mensuram explet. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque commensuratum sexdecim lineas longum est; cauda sex pollices & tres lineas; pes unum pollicem & decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novemdecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudam extremam paululum protenduntur. Capite est valde magno, enormiter crasso, tereti, admodum plumoso. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes cineræ, maculis albicantibus & nigris variega-

Elle est un peu plus grande & plus grosse que le *Chathuant*. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue, ainsi que jusqu'à celui des ongles, est de quatorze pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue six pouces trois lignes; son pied un pouce dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix-neuf lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a deux pieds onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Elle a la tête extrêmement grosse & épaisse, ronde, & couverte d'une grande quantité de plumes. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré varié de taches noires & blanches. Les plus grandes des plumes scapulaires ont leur côté extérieur presque tout blanc. La partie inférieure

du col, la poitrine, le haut du ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches, & variées de taches longitudinales, noires, qui sont croisées par d'autres taches transversales, de la même couleur. Le bas-ventre est blanc & sans taches. Les plumes des ailes & celles de la queue sont rayées de bandes transversales, alternativement noires & d'un cendré-roux. Les yeux sont entourés de plumes grisâtres, décomposées, ou dont les barbes sont séparées les unes des autres, qui partent toutes des yeux comme d'un centre commun, s'étendent en rond, & forment de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides, frisées & variées de blanc & de brun ou de noirâtre. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette obscure. Le bec est d'un blanc-verdâtre. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des ongles de plumes blanches, semées de petits points noirâtres. Les ongles sont de cette dernière couleur. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

*Scapularium longiorum pinnulae exteriores ferè totae albæ sunt. Pars colli inferior, pectus, venter supremus, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albe, maculisque nigris, in longum ductis, & insuper aliis transversis variegantur. Infimus venter albus, immaculatus. Remiges, sicut & rectrices, areolis transversis, nigris & ex cinereo rufis sunt striatæ. Pennæ cinerascens, decompositæ, sive quarum pinnulae inter se nullo modo connectuntur, oculos ambiunt. Pennæ autem istæ omnes ex oculis, tanquam è centro communi, oriuntur, suntque in orbem positæ, & in utroque capitis latere efficiunt circulum, cujus circumferentia pennis constat rigidis, crispis, ex albo & fusco aut nigricante variis. Oculorum irides obscurè avellaneæ. Rostrum ex albo virescens. Pedes ad ungues usque pennis vestiuntur albicantibus, punctis nigricantibus aspersis. Ungues nigricant. *Ex museo Realmu-**

** 4. LA GRANDE CHOUETTE.

Strix albo-rufescens, maculis longitudinalibus fuscis varia; remigibus exterius rufis, tæniis transversis fuscis variis, interioribus albo-rufescentibus; rectricibus rufescentibus, fusco transversim striatis NOCTUA MAJOR.

Strix capite lævi; corpore supra fusco, albo maculato, rectricibus omnibus fasciis albidis. *Faun. Suec. Linn. N°. 52.*

Strix capite lævi; corpore fusco, iridibus oculorum fulvis. *Faun. Suec. Linn. N°. 50. (hujus speciei varietas).*

Strix capite lævi; corpore fusco, iridibus oculorum flavis. *Faun. Suec. Linn. N°. 51. (hujus speciei varietas).*

Noctua. Schwenck. Avi. Sil. pag. 308.

Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIII.

Charlet. Exer. pag. 78. N°. 6.

Charlet. Onomast. pag. 70. N°. 6.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Noctua, quam saxatilem Helvetii cognominant. *Gesn. icon. Avi. pag. 17, in qua icon pessima.*

Noctua saxatilis. Gesn. Avi. pag. 622, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 545, in qua icon minimè accurata.

Noctua major. Jonst. Avi. pag. 33. hujus duæ icones Tab. XIX, una à Gesnero mutuata sub titulo, Noctua saxatilis; & altera ab Aldrovando mutuata sub titulo, Noctua.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 8.

Ulula flammeata. Frisch. hujus icon accurata Tab. 98.

Noctua major; *Cecuma Isidoro*; *Cicumma Festo*; aliis *Cecua. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 288.*

Noctua, seu *Noctua sylvarum*; *Noctua saxatilis Aldrovandi. Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 398.*

Grande Chouette brune. Alb. Tom. III. pag. 4; avec une figure très-mal coloriée Pl. 7.

Grande Cheveche. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 140; avec une mauvaise figure pag. 141.

Cheveche; *Grimault*; *Machette. Bel. Portr. d'Ois. pag. 27 a, dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent *Ναυζύξ. Bel. Schwenck. Jonst. Charlet. Κοκκοβάρι; Κρίγν; Τοτά. Jonst.*

Les Italiens, ULULA. Bel.

Les Allemands, STEIN-KUTZ. Gesn. Aldrov. STEIN-EULE. Schwenck. Rzac. Frisch. NACHT-EULE. Schwenck. Rzac. MITTEL-EULE; KAUTZ. Schwenck.

Les Polonois, SOWA. Rzac.

Les Anglois, COMMON GREY OWL. Charlet. Sibbald. GREAT-BROWN-OWL. Alb.

Elle est à peu près de la grosseur du *Chathuant*. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long ; sa queue cinq pouces trois lignes ; son pied un pouce sept lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce au-delà du bout de la queue. La tête, le col, la partie supérieure du dos & la poitrine sont d'un blanc-roussâtre, varié de larges bandes longitudinales, brunes, qui occupent le milieu de chaque plume. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roussâtre mêlé confusément d'un peu de brun. Le haut du ventre & les côtés sont couverts de plumes d'un blanc-roussâtre, variées de lignes

Strigem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo à capitis vertice ad caudam extremam tredecim pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem longum est ; cauda quinque pollices & tres lineas ; pes novemdecim cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudæ extremitatem protenduntur. Caput, collum, pars dorsi superior & pectus ex albo rufescunt, latissime variegantur tæniis longitudinalibus, fuscis, uniuscujusque pennæ medium occupantibus. Dorsi pars infima, uropygium & tectrices caudæ superiores sunt rufescentes, cum paucò fusco confusè admixto. Ventrem supremum & latera vestiunt pennæ albo-rufescentes, lineis

fuscis, secundum scapi longitudinem extensis, variæ. Imus venter, crura & rectrices caudæ inferiores in aliis candidæ, in alteris albo-rufescentes & immaculatæ. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ albent. Alarum rectrices superiores & scapulares pennæ fusco, rufo & albo-rufescente variegantur. Remiges in latere exteriori rufæ, latis tæniis transversis, fuscis variæ, in latere autem interiore albo-rufescentes ab exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque, in reliqua longitudine fusæ, maculis quibusdam albo-rufescentibus variæ: majores verò apicibus donantur fuscis & immaculatis. Cauda conflata est duodecim rectricibus albo-rufescentibus, tæniis transversis, fuscis striatis: binæ insuper intermediæ maculis quibusdam fuscis supra rufescentem colorem asperguntur; & utrinque extrema in latere exteriori versus apicem tantum fusco maculatur. Pennæ decompositæ, sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ, oculos ambiunt: quæ oculos immediatè cingunt, circum efficiunt nigricantem,

brunes, qui s'étendent selon la longueur de leur tige. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches dans les unes, & d'un blanc-rouffâtre & sans taches dans d'autres. Les couvertures du dessous de l'aile sont blanches: celles du dessus, ainsi que les plumes scapulaires, sont variées de brun, de roux & de blanc-rouffâtre. Les plumes des ailes sont rouffes du côté extérieur, & variées de larges bandes transversales, brunes, & du côté intérieur elles sont d'un blanc-rouffâtre depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, & le reste est brun, varié de quelques taches de blanc-rouffâtre: les plus grandes sont terminées de brun & sans taches. La queue est composée de douze plumes d'un blanc-rouffâtre, rayées de bandes transversales, brunes: les deux du milieu ont de plus quelques taches brunes, répandues sur le rouffâtre; & la plus extérieure de chaque côté n'a du brun sur le côté extérieur que vers son bout. Les yeux sont entourés de plumes décomposées, ou dont les barbes sont séparées les unes des autres: celles qui sont les plus proches des yeux, forment un cercle noirâtre; ensuite elles

font d'un blanc sale, mêlé de roussâtre & de noirâtre. Toutes ces plumes partent des yeux, comme d'un centre commun, & s'étendent en rond, formant de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides, frisées & variées de roux, de brun & de blanchâtre. L'iris des yeux est jaune. Le bec & les ongles sont noirâtres. Les pieds & les doigts sont couverts jusqu'à l'origine des ongles de plumes d'un blanc-roussâtre. On la trouve dans les vieux bâtimens. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

extra quem pennæ sunt fordidè albæ, rufescente & nigricante mixtæ. Omnes autem plumæ istæ ab oculis, tanquam è centro communi, oriuntur, in orbem extenduntur, & in utroque capitis latere efformant circulum, cujus circumferentia pennis terminatur rigidis, crispis, rufo, fusco & albido variis. Oculorum irides luteæ. Rostrum, unguetque nigricant. Pennæ alborufescentes pedes & digitos vestiunt ad exortum usque unguium. In antiquis ædificiis habitat. *Ex museo Reaumuriano.*

**** 5. LA PETITE CHOUETTE OU LA CHEVECHE.**

Strix superne fusca, maculis albis variegata, infernè alba, maculis longitudinalibus fuscis varia; reëtricibus in utroque latere rufescente transversim variegatis, apice albidis...
NOCTUA MINOR.

Strix capite lævi; corpore fusco; remigibus albis maculis quinque ordinum. Faun. Suec. Linn. N°. 53.

Noctua. Gesn. Avi. pag. 620, in qua icon minimè accurata.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 543. hujus icon. à Gesnero mutuata pag. 544.

Noctua, vel potius Noctuæ genus parvum. Gesn. icon. Avi. pag. 15, in qua icon minimè accurata.

Noctua minor. Jonst. Avi. pag. 33. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XIX.

Willugh. Ornith. pag. 69. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XIII, sub titulo, Noctua minima.

Raj. Syn. Avi. pag. 26. N°. 6.

Linn. Systh. nat. ed. 6 Gen. 35. sp. 10.

Noctua minima, sive funerea. Frisch. hujus icon accurata Tab. 100.

Noctua parva, aucuparia. Klein. Avi. pag. 56. N°. 6.

Petite

Petite Chouette. *Alb. Tom. II. pag. 8 ; avec une figure mal coloriée Pl. 12.*

Petite Cheveche. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 140.*

Petit Hibou. *Edwards. Glanur. pag. 39. Chap. XVIII ; avec une figure exacte Pl. 228.*

Les Grecs l'appellent Γλαύξ. *Gesn. Aldrov. Jonst. Κοκοβάρι ; Κρίγν ; Τότω. Jonst.*

Les Turcs , BAIGUS. *Gesn. Aldrov.*

Les Portugais , MOCHO. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols , LECHUZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens , ZIVETTA ; ZUETA ; ZUETTA. *Gesn. Aldrov. ZIGUETTA. Gesn. CIVETTA. Aldrov.*

On l'appelle à Avignon ZOETTA. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands l'appellent KUTZ. *Gesn. Aldrov.*

Les Autrichiens , SCHAFFIELT. *Willugh. Klein.*

Les Illyriens , KALUS ou KALAUS. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois , SZOWA. *Gesn. Aldrov.*

Les Anglois , LITTLE OWL. *Willugh. Raj. Alb. Edwards.*

Crassitie *Merulam* circiter adæquat. Ipsi^{us} longitudo à capitis vertice ad caudam extremam usque octo pollices & duas lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos decem lineas longum ; cauda duos pollices cum decem lineis ; pes quindecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus omnium brevissimus. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis & novem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partem

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de huit pouces deux lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue deux pouces dix lignes ; son pied un pouce trois lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , douze lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a un pied neuf pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes brunes , qui

ont chacune une bande longitudinale, blanche, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les yeux sont entourés de plumes décomposées, ou dont les barbes sont séparées les unes des autres, variées de blanc & de brun, qui partent toutes des yeux, comme d'un centre commun, s'étend en rond, & forment de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides & frisées. La gorge est blanche. Le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, celles du dessus des ailes & les plumes scapulaires sont brunes, & variées de taches blanches, qui sont en plus grand nombre au col que par-tout ailleurs. Le ventre, les côtés & les jambes sont couvertes de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & dont les deux côtés sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches, ayant seulement une petite ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles du dessous de l'aile sont blanches & variées de taches brunes. Les plumes de l'aile sont brunes & variées des deux côtés de taches transversales, blanches, qui sont mêlées vers leurs bords

capitis superiorem vestiunt pennæ fuscae, taniâ longitudinali, albâ, secundùm scapi longitudinem ductâ, præditæ. Oculorum ambitus pennis constat decompositis, sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ, albo & fusco variis, omnibus ab oculis, tanquam è centro communi, ortis, in orbem extensis, & in utroque capitis latere efficientibus circulum, cujus circumferentia pennis terminatur rigidis & crispis. Guttur albicat. Collum, pectus, dorsum, uropygium, teatrices caudæ superiores, scapulares pennæ, quæque alas superne cooperiunt, sunt fuscae, maculis albis variæ; quæ maculæ majori numero collum variegant. Pennæ in medio secundùm scapi longitudinem fuscae, in utroque latere albæ ventrem, latera & crura obtegunt. Teatrices caudæ inferiores albescent, & lineolâ tantùm fuscâ, secundùm scapi longitudinem ductâ, variegantur. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ candidæ, maculis fuscis variæ. Remiges fuscae, maculis transversis, albis in utroque latere variegatæ, cum aliqua in macularum margi-

nibus rufescentis mixtura. Primæ remigis pinnularum exteriorum apices à se invicem sunt disjuncti, nonnihil sursum reflexi, & remigem ferræ instar denticulatam præbent. Remix prima cæteris multò brevior est: tertia & quarta omnium longissimæ. Trium priorum remigum pinnulæ interiores & pinnulæ exteriores secundæ, tertiæ & quartæ fiunt subito cæteris multò breviores versùs uniuscujusque pennæ extremitatem. Cauda constat duodecim rectricibus fuscis, maculis transversis, rufescentibus in utroque latere variegatis, apice albidis. Oculorum irides pallide flavæ. Rostrum in exortu nigricans, apice luteum. Lannugo sordide alba & nonnihil rufescens pedes vestit ad principium digitorum usque; digiti verò sunt fusci, & raris quibusdam plumulis, pilorum æmulis, obsiti. Ungues fuscescunt. Habitat in antiquis ædificiis. *Ex museo Reaumuriano.*

d'une légère teinte de rouffâtre. Les bouts des barbes extérieures de la première des plumes de l'aîle sont séparés les uns des autres, recourbés vers le haut, & forment une dentelure pareille à celle d'une scie. Cette première plume est beaucoup plus courte que les autres: la troisième & la quatrième sont les plus longues. Les barbes intérieures des trois premières plumes de l'aîle & les barbes extérieures de la seconde, de la troisième & de la quatrième deviennent tout-à-coup beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers le bout de chacune de ces plumes. La queue est composée de douze plumes brunes, variées des deux côtés de taches transversales, rouffâtres, & terminées de blanchâtre. L'iris des yeux est d'un jaune pâle. Le bec est noirâtre à sa base & jaune vers son bout. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de duvet d'un blanc sale & un peu rouffâtre: les doigts sont bruns & garnis de quelques petites plumes clairsemées, qui imitent des poils. Les ongles sont bruns. On la trouve dans les vieux bâtimens. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 6. LE CHATHUANT DE CANADA.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 2.

Strix superne fusca, maculis albis variegata, infernè alba, fusco in pectore, castaneo in ventre transversim striata; remigibus maculis albis variegatis; rectricibus albo transversim striatis STRIX CANADENSIS.

Il est à peu près de la grosseur de *notre Chathuant*. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche est long de dix lignes; sa queue de six pouces six lignes; son pied de dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, d'un pouce six lignes: l'intérieur est presque aussi long; l'extérieur est un peu plus court; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ aux trois quarts de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont noirâtres & variées de taches blanches. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont brunes, variées aussi de taches blanches. Les couvertures du dessus des ailes sont toutes brunes, excepté quelques-unes des plus grandes, qui ont quel-

Strigem nostratem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo à capitis vertice ad caudam extremam usque tredecim pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos decem lineas longum est; cauda sex pollices & totidem lineas; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octodecim lineas: intimus eandem ferè longitudinem obtinet; extremus paulò brevior est; & posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Partes capitis & colli superiores sunt nigricantes, maculis albis variæ. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ fuscescunt, & similiter maculis albis variegantur. Alarum rectrices superiores totaliter fuscæ, exceptis tamen quibusdam ex majoribus, maculis aliquot al-

bis in latere exteriore donatis. Oculorum ambitus pennis constat decompositis, fordidè albis, fusco confusè mixtis, omnibus ab oculis, tanquam è centro communi, ortis, in orbem extensis, & in utroque capitis latere efficientibus circulum, cujus circumferentia pennis terminatur rigidis, crispis & nigricantibus. Pars colli inferior, pectus, alarumque tectrices inferiores albæ, fusco transversim striatæ. Venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores pariter candidæ, castaneo, dilutiore quidem in cruribus & tectricibus caudæ inferioribus, in ventre verò & lateribus saturatiore, transversim striatæ. Remiges fuscæ, in utroque latere, interiore scilicet & exteriore, maculis albis variegatæ. Rectrices quoque fuscæ, albo transversim striatæ. Pedes, digitosque ad exortum usque unguium vestiunt pennæ fordidè albæ, exiguis maculis dilutè fuscis notatæ. Rostrum albidum; ungues verò grisei. Habitat in *Canada*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Gautier*.

ques taches blanches à leur côté extérieur. Les yeux sont entourés de plumes décomposées, d'un blanc sale, mêlé confusément de brun. Ces plumes partent des yeux, comme d'un centre commun, s'étendent en rond, & forment de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides, frisées & noirâtres. La partie inférieure du col, la poitrine & les couvertures du dessous de l'aîle sont blanches & rayées transversalement de brun. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont aussi blanches & rayées transversalement de marron, plus clair aux jambes & aux couvertures du dessous de la queue qu'au ventre & aux côtés. Les plumes de l'aîle sont brunes, & leurs côtés intérieur & extérieur sont marqués de taches blanches. Celles de la queue sont brunes & rayées transversalement de blanc. Les pieds & les doigts sont couverts jusqu'à l'origine des ongles de plumes d'un blanc sale, marquées de petites taches d'un brun clair. Le bec est blanchâtre; & les ongles sont gris. On le trouve en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Gautier*.

7. LE CHATHUANT DE LA BAYE DE HUDSON.

Strix superne fusca, oris pennarum albis, infernè alba, fusco transversim striata; uropygio obscurè fusco, fusco dilutiorè transversim striato; remigibus exterius maculis albis notatis; rectricibus albo transversim striatis . . . STRIX FRET HUDSONIS.

Petit Faucon-Chouette. *Edwards. Tom. II. pag. LXII; avec une figure exacte Pl. 62.*

Les Habitans de la Baye de Hudson l'appellent COPARACOC. Edwards.

Il est un peu plus gros qu'un *Epervier*. Il a les aîles & la queue proportionnellement plus longues que ne les ont les autres especes de ce genre. Le sommet de la tête est d'un brun fort obscur, parsemé de petites taches rondes, blanches. Les yeux sont entourés de plumes décomposées, ou dont les barbes sont séparées les unes des autres, d'un blanc mêlé d'une légère teinte de brun & varié de petites taches oblongues, brunes. Toutes ces plumes partent des yeux, comme d'un centre commun, s'étendent en rond, & forment de chaque côté de la tête un cercle, dont la circonférence est terminée par des plumes roides, frisées & noires. De chaque côté de la tête, vers les oreilles, est une petite bande longitudinale, blanche. Le derrière de la tête, la partie supérieure & les côtés du col & la par-

Crassitie Accipitrem non-nihil antecellit. In illa alæ & cauda, servatâ proportionè, longiores sunt quàm in aliis hujus generis speciebus. Capitis vertex est obscurè fuscus, minutis maculis orbiculatis, albis aspersus. Oculos ambiunt pennæ decompositæ, sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ, albicantes cum aliqua fusci mixtura, exiguis maculis oblongis, fuscis variæ, omnes ab oculis, tanquam è centro communi, ortæ, in orbem extensæ, & in utroque capitis latere efficientes circulum, cujus circumferentia pennis terminatur rigidis, crispis & nigris. In capite ad utrumque latus, versùs aures, parvula extat tænia longitudinalis, alba. Capitis pars posterior, collum in parte supe-

riore & ad latera, & dorſi pars ſuprema pennis integuntur ſaturatè fufcis, marginibus albicantibus. Scapulares pennæ fuſco & albo ſunt tranſverſim ſtriatæ. Dorſi pars infima, uropygium & tectrices caudæ ſuperiores obſcurè fuſcæ, tæniis tranſverſis, dilutiùs fuſcis variæ. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, caudam ſubtus tegentes pennæ, alarumque tectrices inferiores minores albæ, fuſco tranſverſim ſtriatæ; majores verò obſcurè cinereæ, in utroque latere maculis albis variæ. Alarum tectrices ſuperiores fuſcæ, quas maculæ candidæ in latere exteriori variegant. Remiges concolores, exceptis tamen tribus corpori vicinioribus, maculis albis in latere exteriori deſtitutis, ſed marginibus tantùm candidis præditis; exceptâ quoque primâ remige ſive extimâ, in toto fuſcâ & immaculatâ. Cauda conſtat duodecim rectricibus infernè cinereis, ſupernè ſaturate fuſcis, ſtrictioribus tæniis tranſverſis, albis ſtriatis: binæ intermediae extimam duorum pollicum longitudine ſuperant. Oculorum irides flavo-aurantiæ. Roſtrum eodem co-

tie ſupérieure du dos ſont couvertes de plumes d'un brun foncé & bordées de blanc. Les plumes ſcapulaires ſont rayées tranſverſalement de brun & de blanc. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un brun obſcur, rayé tranſverſalement d'un brun plus clair. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les petites du deſſous des aîles ſont d'un blanc rayé tranſverſalement de brun: les grandes ſont d'un cendré obſcur, & variées des deux côtés de taches blanches. Les couvertures du deſſus des aîles ſont brunes, & variées de taches blanches ſur leur côté extérieur. Les plumes des aîles ſont de la même couleur: les trois plus proches du corps n'ont cependant pas de taches blanches ſur le côté extérieur; mais elles ſont ſeulement bordées de cette couleur: & la première ou la plus extérieure n'a rien de blanc. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées en-deſſous, d'un brun foncé en deſſus, & rayées tranſverſalement de bandes étroites, blanches. Les deux du milieu ſont plus longues de deux pouces que la plus extérieure. L'iris

des yeux est d'un jaune orangé. Le bec est de la même couleur. Les pieds & les doigts sont couverts jusqu'à l'origine des ongles de plumes variées des mêmes couleurs que celles du ventre. Les ongles sont noirâtres. On le trouve à la *Baye de Hudson*, où il donne la chasse aux *Gelinotes blanches* & autres Oiseaux.

lore tingitur. Pedes & digitos ad exortum usque unguium vestiunt plumæ pennis ventrem vestientibus concolores. Ungues nigricant. Habitat in *Freto Hudsonis*. *Lagopodes*, aliasque Aves insectatur.

8. LE CHATHUANT BLANC DE LA BAYE DE HUDSON.

Strix alba, superne maculis fuscis variegata; remigibus exterius maculis fuscis notatis; rectricibus lateralibus immaculatis *STRIX ALBA FRETI HUDSONIS*.

Strix capite lævi; corpore albido. *Faun. Suec. Linn. N°. 54.*

Ulula alba, maculis terre coloris. *Klein. Avi. pag. 56. N°. 5.*

Noctua Scandiana. Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 35. sp. 9.

Noctua Scandiana maxima ex albo & cinereo variegata, *Rudbeck. Linn. Klein.*

Grand Hibou blanc. *Edwards. Tom. II. pag. LXI; avec une figure très-exacte Pl. 61.*

Voy. de la B. de Hud. Tom. I. pag. 55.

Hibou blanc d'Islande. *Anderf. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 85; avec une fort mauvaise figure Pl. 1.*

Les Suédois l'appellent *HARFAONG. Linn.*

Il est plus grand & plus gros que le *Grand Duc*. Sa tête est plus petite proportionnellement qu'elle ne l'est dans les autres espèces de ce genre. Tout son corps est couvert de plumes blanches. Les yeux sont entourés de plumes de la même couleur, décomposées ou dont les barbes sont séparées les unes des autres, qui partent toutes des yeux, comme d'un centre com-

Crassitie & magnitudine Bubonem antecellit. Capite donatur parvo & minùs crasso quàm aliæ hujus generis species, servatâ tamen corporis proportionem. In universo corpore pennis vestitur albis. Oculos ambiunt pennæ concolores, decompositæ sive quarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ, omnes ab oculis, tanquam è centro communi,

communi, ortæ, in orbem extensæ, & in utroque capitæ latere circulum efformantes. Partes capitæ & colli superiores, dorsi suprema pars, scapulares pennæ & latera maculis variegantur fuscis, in capite quidem minutissimis. Maculæ quædam concolores tectrices alarum superiores variegant. Reliquum corpus album, immaculatum. Remiges albæ, maculis quibusdam fuscis in latere exteriori tantum notatæ. Duodecim rectricibus candidis cauda constat: binæ intermediæ maculis fuscis in utroque latere variæ; laterales verò immaculatæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum nigrum. Pedes & digiti ad exortum usque unguum pennis vestiuntur albis, immaculatis. Ungues sunt nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*, & partibus *Americæ* magis septentrionalibus. *Lagopodibus* præcipuè victitat.

mun, s'étendent en rond, & forment un cercle de chaque côté de la tête. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, les plumes scapulaires & les côtés sont variés de taches brunes, plus petites sur la tête que par-tout ailleurs. Il y a aussi quelques taches de la même couleur sur les couvertures du dessus des aîles. Tout le reste du corps est d'un blanc pur & sans taches. Les plumes des aîles sont blanches & variées de quelques taches brunes sur leur côté extérieur seulement. La queue est composée de douze plumes blanches: les deux du milieu sont variées des deux côtés de taches brunes; & les latérales sont sans taches. L'iris des yeux est jaune. Le bec est noir. Les pieds & les doigts sont couverts jusqu'à l'origine des ongles de plumes blanches & sans taches. Les ongles sont noirs. On le trouve à la *Baye de Hudson*, & dans les parties les plus septentrionales de l'*Amérique*. Il se nourrit principalement de *Gelinotes blanches*.

9. LE CHATHUANT DU MEXIQUE.

Strix fulvo, albo, fusco & nigro in toto corpore varia . . .

STRIX MEXICANA.

Noctua Mexicana Chichiçtli dicta. *Raj. Syn. Avi. pag. 160.*

Chichiçtli. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 18. cap. XVIII.*

Les Mexiquains l'appellent CHICHICTLI. *Fern. Raj.*

Il a une si grande quantité de plumes, qu'il paroît aussi gros qu'une *Poule*, quoiqu'il soit réellement plus petit. Tout son corps est couvert de plumes variées de fauve, de blanc, de brun & de noir. Ses yeux sont de cette dernière couleur; & ses paupières sont bleues. Ses pieds sont tout couverts de plumes. On le trouve aux environs du *Lac du Mexique*.

Crassitie Gallinam æquare videtur, ob magnam pennarum copiam; quamquam revera minor sit. In toto corpore vestitur pennis fulvo, albo, fusco, nigroque respersis colore. Oculi sunt atrii; & palpebræ cœruleæ. Pedes pennis cooperiuntur. Habitat circa Mexicanam paludem.

10. LA CHOUETTE DU MEXIQUE.

Strix superne ex nigro, pallido, candido & fulvo varia; ventre albo; tectricibus alarum inferioribus nigris, fulvo mixtis NOCTUA MEXICANA.

Tolchiquatli, seu Noctua Junceti. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 36; cap. CVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 160.

Les Mexiquains l'appellent TOLCHICUATLI. Fern.

Elle est assez petite de corps; cependant au moyen de la grande quantité de plumes dont elle est couverte, elle paroît aussi grosse que nos *Poules*. Tout le dessus de son corps & de ses ailes est varié de noir, de jaune pâle, de blanc & de fauve. Les plumes qui retombent sur le bec, sont blanches. Le ventre est de la même couleur. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un noir mêlé de fauve. Ses ailes & sa queue sont longues. Ses yeux sont grands &

Parvo constat corpore; si tamen pennis vestitam consideres, metiarisque, *Gallinas nostras* crassitie æquare judicabis. Totum corpus superius, sicut & alæ superne, nigro, pallido, candido ac fulvo variegatur. Plumæ circa rostrum albæ. Venter albus est. Alarum tectrices inferiores nigræ, fulvo mixtæ. Alæ longæ sunt, velut & cauda. Oculi magni, atrique; ipsorum irides pallidæ. Rostrum breve, nigrum. Pe-

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre III.* 525

des villosi, & ex albo paulisper fulvescentes; ungues verò atri. Nocte volat, quo tempore venatur, ac devorat *Mures*. Habitat in *Mexico*. Versatur juxta Lacus & Oppida.

noirs; & leur iris est d'un jaune pâle. Le bec est court & noir. Les pieds sont couverts de plumes d'un blanc tirant un peu sur le fauve; & les ongles sont noirs. Elle vole pendant la nuit. C'est alors qu'elle donne la chasse aux *Souris*, dont elle se

nourrit. On la trouve au *Mexique*, aux environs des Lacs & des Villes.

II. LA CHOUETTE DE COQUIMBO.

Strix griseo-fulva, maculis albis variegata; ventre & caudâ fordidè albis. . . . NOCTUA COQUIMBANA.

Ulula cunicularia. *Klein. Avi. pag. 57. N^o. 9.*

Especie de Cheveche Lapin, ou *Ulula cunicularia*. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 562. (ed. 1714).*

Crassitie Noctuam majorem nostratè adæquat. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, pectus, dorsum & uropygium vestiunt pennæ griseo-fulvæ, maculis albis, perpulchrè dispositis, variegatæ. Alarum tectrices superiores, scapulares pennæ, quæque caudam superne cooperiunt, concolores. Venter & tectrices caudæ inferiores fordidè albescent. Remiges griseo-fulvæ, maculis albis variæ. Rectrices fordidè albæ, immaculatæ. Rostrum pallidè griseum. Pedes vestiunt plumulæ pilorum æmulæ. Un-

Elle est de la grosseur de notre grande Chouette. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, celles du dessus des aîles & les plumes scapulaires sont d'un gris-fauve varié de taches blanches, fort joliment distribuées. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale. Les plumes des aîles sont d'un gris-fauve varié de taches blanches. Celles de la queue sont d'un blanc sale & sans taches. Le bec est d'un gris pâle. Les pieds sont couverts de

petites plumes, qui ressemblent à des poils. Les ongles sont noirs. On la trouve au *Chili*, aux environs de *Coquimbo*.

Le *Pere Feuillée* prétend qu'elle creuse des terriers semblables à ceux des *Lapins*. La preuve qu'il en donne, est qu'il la trouva à l'entrée d'un trou si profond qu'il ne put en atteindre le bout. Je ne sçais si l'on regardera cette preuve comme suffisante pour un fait aussi singulier. Dans le cas même où l'on trouveroit l'Oiseau dans le trou, je ne crois pas que cela prouvât qu'il fût son ouvrage.

gues sunt nigri. Habitat in *Cilensi regione*, circa *Coquimbam*.

Secundum *Patrem Feuillée* cuniculos fodit hæc Avis, nostratis *Cuniculi* instar; idque comprobatur ex eo quod Avem istam reperierit ad ostium cuniculorum tam altorum, ut variis adhibitis instrumentis eos approfondare non potuerit. Quæ allegata, meâ sententiâ, non sufficiunt ad æquè insolita facta comprobanda. Quamquam Avem in cuniculis ipsis invenerit, hoc non probaret ab Ave fossos fuisse cuniculos.

Fin du Tome premier.




Martinet del. et Sculp.

1. Petit Duc.

2. Chathuant de Canada.

3. Tête de Chathuant.



INDEX

TABLE

*Avium in primo volumine
contentarum, secundum
ordinem in quo dispo-
nuntur.*

*Des Oiseaux contenus dans
le premier volume, selon
l'ordre dans lequel ils
sont rangés.*

ORDO I.

I. Genus Columbinum.

1. **C**olumba domestica.
2. Columba Romana.
 - A. Columba dasypes.
 - B. Columba cristata.
 - C. Columba Norvegica.
 - D. Columba Barbarica.
 - E. Columba cucullata.
 - F. Columba turbita.
 - G. Columba crispa.
 - H. Columba Turcica.
 - I. Columba tabellaria.
 - K. Columba gutturosa.
 - L. Columba Eques.
 - M. Columba percussor.
 - N. Columba gyratrix.
 - O. Columba galeata.
 - P. Columba laticauda.
 - Q. Columba tremula.
3. Columba livia.
4. Columba saxatilis.
 - A. Columba alba saxatilis.
5. Oenas sive Vinago.
6. Palumbus.
7. Turtur.
8. Turtur torquatus.
 - A. Turtur hybridus.
9. Turtur Lusitanus.

ORDRE I.

I. Genre du Pigeon.

1. **L**E Pigeon domestique.
 2. Le Pigeon Romain.
 - A. Le Pigeon patu.
 - B. Le Pigeon hupé.
 - C. Le Pigeon de Norvege.
 - D. Le Pigeon de Barbarie.
 - E. Le Pigeon Nonain.
 - F. Le Pigeon à gorge frisée.
 - G. Le Pigeon frisé.
 - H. Le Pigeon Turc.
 - I. Le Pigeon messager.
 - K. Le Pigeon grand gosier.
 - L. Le Pigeon Cavalier.
 - M. Le Pigeon batteur.
 - N. Le Pigeon culbutant.
 - O. Le Pigeon cuirassé.
 - P. Le Pigeon-paon.
 - Q. Le Pigeon trembleur.
 3. Le Biset.
 4. Le Pigeon de roche ou le
Rocheraye.
 - A. Le Rocheraye blanc.
 5. Le Pigeon sauvage.
 6. Le Pigeon ramier.
 7. La Tourterelle.
 8. La Tourterelle à collier.
 - A. La Tourterelle mulet.
 9. La Tourterelle de Portugal.

- | | |
|---|---|
| 10. Le Pigeon du Mexique. | 10. <i>Columba Mexicana.</i> |
| 11. Le Pigeon sauvage du Mexique. | 11. <i>Oenas Mexicana.</i> |
| 12. Le Pigeon sauvage d'Amérique. | 12. <i>Oenas Americana.</i> |
| 13. La Tourterelle d'Amérique. | 13. <i>Turtur Americanus.</i> |
| 14. Le Pigeon de la Martinique. | 14. <i>Columba Martinicana.</i> |
| 15. Le Pigeon des Indes. | 15. <i>Columba Indica.</i> |
| 16. La Tourterelle rayée de la Chine. | 16. <i>Turtur Sinensis striatus.</i> |
| 17. La Tourterelle rayée des Indes. | 17. <i>Turtur Indicus striatus.</i> |
| 18. La Tourterelle de la Caroline. | 18. <i>Turtur Caroliniensis.</i> |
| 19. La petite Tourterelle d'Amérique. | 19. <i>Turtur parvus Americanus.</i> |
| 20. La petite Tourterelle brune d'Amérique. | 20. <i>Turtur parvus fuscus Americanus.</i> |
| 21. La Tourterelle de Canada. | 21. <i>Turtur Canadensis.</i> |
| 22. La Tourterelle du Cap de bonne Espérance. | 22. <i>Turtur Capitis Bonæ Spei.</i> |
| 23. La Tourterelle du Sénégal. | 23. <i>Turtur Senegalensis.</i> |
| 24. La Tourterelle à collier du Sénégal. | 24. <i>Turtur torquatus Senegalensis.</i> |
| 25. La Tourterelle à gorge tachetée du Sénégal. | 25. <i>Turtur gutture maculato Senegalensis.</i> |
| 26. La Tourterelle d'Amboine. | 26. <i>Turtur Amboinensis.</i> |
| 27. Le Pigeon violet de la Martinique. | 27. <i>Columba violacea Martinicana.</i> |
| 28. Le Pigeon de montagne du Mexique. | 28. <i>Columba montana Mexicana.</i> |
| 29. Le Pigeon roux de Cayenne. | 29. <i>Columba rufa Cayennensis.</i> |
| 30. Le Pigeon de Guinée. | 30. <i>Columba Guineensis.</i> |
| 31. Le Pigeon de la Jamaïque. | 31. <i>Columba Jamaicensis.</i> |
| 32. La Tourterelle de la Jamaïque. | 32. <i>Turtur Jamaicensis.</i> |
| 33. Le Pigeon de roche de la Jamaïque. | 33. <i>Columba saxatilis Jamaicensis.</i> |
| 34. Le Pigeon à queue annelée de la Jamaïque. | 34. <i>Columba caudâ annulo cinctâ Jamaicensis.</i> |
| 35. Le Pigeon bleu du Mexique. | 35. <i>Columba coerulea Mexicana.</i> |
| 36. Le Pigeon ramier bleu de Madagascar. | 36. <i>Palumbus coeruleus Madagascariensis.</i> |

- | | |
|---|--|
| 37. <i>Palumbus viridis</i> Madagascariensis. | 37. Le Pigeon ramier verd de Madagascar. |
| 38. <i>Columba viridis</i> Philippensis. | 38. Le Pigeon verd des Philippines. |
| 39. <i>Columba viridis</i> Amboinensis. | 39. Le Pigeon verd d'Amboine. |
| 40. <i>Columba viridis</i> Insulæ sancti Thomæ. | 40. Le Pigeon verd de l'Isle S. Thomas. |
| 41. <i>Palumbus</i> Moluccensis. | 41. Le Pigeon ramier des Moluques. |
| 42. <i>Palumbus</i> Amboinensis. | 42. Le Pigeon ramier d'Amboine. |
| 43. <i>Turtur viridis</i> Amboinensis. | 43. La Tourterelle verte d'Amboine. |
| 44. <i>Columba</i> Nicombariensis. | 44. Le Pigeon de Nincombar. |

ORDO II.

SECTIO I.

II. Genus *Gallo-pavonis*.

1. *Gallo-pavo*.
 - A. *Gallo-pavo cristatus*.
 - B. *Gallo-pavo sylvestris*.
2. *Gallo-pavo* Brasiliensis.

III. Genus *Gallinaceum*.

1. *Gallus domesticus*. *Gallina domestica*.
 - A. *Gallus cristatus*. *Gallina cristata*.
 - B. *Gallus* & *Gallina pentadactylos*.
 - C. *Gallus Patavinus*. *Gallina Patavina*.
 - D. *Gallus Turcicus*. *Gallina Turcica*.
 - E. *Gallus Anglicanus*. *Gallina Anglicana*.
2. *Gallus* & *Gallina pumilio*.
 - A. *Gallus* & *Gallina plumipes*.

ORDRE II.

SECTION I.

II. Genre du Dindon.

1. Le Dindon.
 - A. Le Dindon hupé.
 - B. Le Dindon sauvage.
2. Le Dindon du Brésil.

III. Genre du Coq.

1. Le Coq & la Poule.
 - A. Le Coq hupé & la Poule hupée.
 - B. Le Coq & la poule à cinq doigts.
 - C. Le Coq & la Poule de Padoue.
 - D. Le Coq & la Poule de Turquie.
 - E. Le Coq & la Poule d'Angleterre.
2. Le Coq nain & la Poule naine.
 - A. Le Coq patu & la Poule patue.

B. *Le Coq & la Poule de Bantam.*

3. *Le Coq frisé & la Poule frisée.*

4. *Le Coq & la Poule negre, ou de Mozambic.*

5. *Le Coq & la Poule sans croupion, ou de Perse.*

6. *Le Coq & la Poule du Japon.*

IV. *Genre de la Peintade.*

1. *La Peintade.*

A. *La Peintade à poitrine blanche.*

SECTION II.

V. *Genre de la Gelinote.*

1. *Le Coq-de-Bruyeres.*

2. *Le Coq-de-Bruyeres à queue fourchue.*

A. *Le Coq-de-Bruyeres piqueté.*

3. *La Gelinote.*

4. *La Gelinote des Pyrénées.*

5. *La Gelinote d'Ecosse.*

6. *La Gelinote de la Baye de Hudson.*

7. *La Gelinote de Canada.*

8. *La grosse Gelinote de Canada.*

9. *La Gelinote hupée.*

10. *La Gelinote hupée d'Amérique*

11. *La Gelinote hupée de Pensilvanie.*

12. *La Gelinote blanche.*

VI. *Genre de la Perdrix.*

1. *La Perdrix grise.*

A. *La Perdrix grise-blanche.*

B. *La Perdrix de Damas.*

2. *La Perdrix de montagne.*

3. *La Perdrix de montagne du Mexique.*

B. *Gallus Banticus. Gallina Bantica.*

3. *Gallus crispus. Gallina crispa.*

4. *Gallus Mozambicanus. Gallina Mozambicana.*

5. *Gallus Persicus. Gallina Persica.*

6. *Gallus Japonicus. Gallina Japonica.*

IV. *Genus Meleagridis.*

1. *Meleagris.*

A. *Meleagris pectore albo.*

SECTIO II.

V. *Genus Lagopodis.*

1. *Urogallus major.*

2. *Urogallus minor.*

A. *Urogallus minor punctatus.*

3. *Bonasa.*

4. *Bonasa Pyrenaica.*

5. *Bonasa Scotica.*

6. *Bonasa Freti Hudsonis.*

7. *Bonasa Canadensis.*

8. *Bonasa major Canadensis.*

9. *Attagen.*

10. *Attagen Americana.*

11. *Attagen Pensilvaniæ.*

12. *Lagopus.*

VI. *Genus Perdix.*

1. *Perdix cinerea.*

A. *Perdix cinereo-alba.*

B. *Perdix Damascena.*

2. *Perdix montana.*

3. *Perdix montana Mexicana.*

DES OISEAUX.

v

4. *Perdix Brasiliensis.*
5. *Perdix major Brasiliensis.*
6. *Perdix Novæ Angliæ.*

7. *Perdix Americana.*
8. *Perdix Senegalensis.*
9. *Perdix Sinensis.*
10. *Perdix rubra.*
 A. Perdix rufo-alba.
11. *Perdix rubra Barbarica.*

12. *Perdix Græca.*
13. *Francolinus.*
14. *Coturnix.*
 A. Coturnix major.
15. *Coturnix Javensis.*
16. *Coturnix Madagascariensis.*
17. *Coturnix Philippensis.*
18. *Coturnix Mexicana.*
19. *Coturnix major Mexicana.*

20. *Coturnix Ludoviciana.*
21. *Coturnix Mexicana cristata.*

4. La Perdrix du Brésil.
5. La grosse Perdrix du Brésil.
6. La Perdrix de la Nouvelle Angleterre.
7. La Perdrix d'Amérique.
8. La Perdrix du Sénégal.
9. La Perdrix de la Chine.
10. La Perdrix rouge.
 A. La Perdrix rouge-blanche.
11. La Perdrix rouge de Barbarie.
12. La Bartavelle.
13. Le Francolin.
14. La Caille.
 A. La grande Caille.
15. La Caille de Java.
16. La Caille de Madagascar.
17. La Caille des Philippines.
18. La Caille du Mexique.
19. La grande Caille du Mexique.
20. La Caille de la Louiziane.
21. La Caille hupée du Mexique.

VII. Genus *Phasianus*.

VII. Genre du Faisan.

1. *Phasianus.*
 A. Phasianus varius.
 B. Phasianus albus.
 C. Phasianus hybridus.
2. *Phasianus Antillarum.*
3. *Phasianus Guianensis.*
4. *Phasianus aureus Sinensis.*
5. *Phasianus albus Sinensis.*
6. *Phasianus cristatus Indicus.*

7. *Pavo.*
 A. Pavo varius.
 B. Pavo albus.
8. *Pavo Japonensis.*
9. *Pavo Sinensis.*
10. *Pavo Tibetanus.*
11. *Crax Brasiliensis.*
12. *Crax Guianensis.*

1. Le Faisan.
 A. Le Faisan panaché.
 B. Le Faisan blanc.
 C. Le Faisan bâtard.
2. Le Faisan des Antilles.
3. Le Faisan de la Guiane.
4. Le Faisan doré de la Chine.
5. Le Faisan blanc de la Chine.
6. Le Faisan couronné des Indes.
7. Le Paon.
 A. Le Paon panaché.
 B. Le Paon Blanc.
8. Le Paon du Japon.
9. Le Paon de la Chine.
10. Le Paon du Tibet.
11. Le Hocco du Brésil.
12. Le Hocco de la Guiane.

13. Le Hocco de Curaffow.
 14. Le Hocco du Mexique.
 15. Le Hocco brun du Mexique.
 16. Le Hocco du Pérou.

13. Crax Curaffous.
 14. Crax Mexicanus.
 15. Crax fuscus Mexicanus.
 16. Crax Peruvianus.

O R D R E I I I .

S E C T I O N I .

VIII. *Genre de l'Epervier.*

1. L'Epervier.
 A. *L'Epervier tacheté.*
2. Le petit Epervier.
3. L'Autour.
4. Le Faucon.
 A. *Le Faucon fors.*
 B. *Le Faucon hagard ou bossu.*
 C. *Le Faucon à tête blanche.*
 D. *Le Faucon blanc.*
 E. *Le Faucon noir.*
 F. *Le Faucon tacheté.*
 G. *Le Faucon brun.*
 H. *Le Faucon rouge.*
 I. *Le Faucon rouge des Indes.*
 K. *Le Faucon d'Italie.*
 L. *Le Faucon d'Islande.*
 M. *Le Sacre.*
5. Le Faucon gentil.
6. Le Faucon pèlerin.
 A. *Le Faucon de Barbarie.*
 B. *Le Faucon de Tartarie.*
7. Le Faucon à collier.
8. Le Faucon de roche ou Rochier.
9. Le Faucon de montagne ou Montagner.
 A. *Le Faucon de montagne cendré.*
10. Le Faucon de la Baye de Hudson.
11. Le Faucon étoilé.
12. Le Faucon hupé des Indes.
13. Le Faucon des Antilles.

O R D O I I I .

S E C T I O I .

VIII. *Genus Accipitrinum.*

1. Accipiter.
 A. *Accipiter maculatus.*
2. Accipiter minor.
3. Astur.
4. Falco.
 A. *Falco hornotinus.*
 B. *Falco gibbosus.*
 C. *Falco leucocephalos.*
 D. *Falco albus.*
 E. *Falco niger.*
 F. *Falco maculatus.*
 G. *Falco fuscus.*
 H. *Falco rubeus.*
 I. *Falco ruber Indicus.*
 K. *Falco Italicus.*
 L. *Falco Islandicus.*
 M. *Falco Sacer.*
5. Falco gentilis.
6. Falco peregrinus.
 A. *Falco Tunetanus.*
 B. *Falco Tartaricus.*
7. Falco torquatus.
8. Litho-Falco.
9. Falco montanus.
 A. *Falco montanus cinereus.*
10. Falco Freti Hudsonis.
11. Falco stellaris.
12. Falco Indicus cristatus.
13. Falco Antillarum.

14. Falco piscator Antillarum.

14. Le Faucon pêcheur des Antilles.

15. Falco piscator Carolinienfis.

15. Le Faucon pêcheur de la Caroline.

16. Lanarius.

16. Le Lanier.

17. Lanarius cinereus.

17. Le Lanier cendré.

18. Lanarius albicans.

18. Le Lanier blanc.

19. Gyrfalco.

19. Le Gerfault.

A. *Gyrfalco Islandicus*.A. *Le Gerfault d'Islande*.

20. Dendro-Falco.

20. Le Hobreau.

21. Accipiter Carolinienfis.

21. L'Epervier de la Caroline.

22. Accipiter Alaudarius.

22. L'Epervier des Alouettes.

23. Æsalon.

23. L'Emerillon.

24. Æsalon Antillarum.

24. L'Emerillon des Antilles.

25. Æsalon Carolinienfis.

25. L'Emerillon de la Caroline.

26. Æsalon Dominicanfis.

26. L'Emerillon de S. Dominique.

27. Tinnunculus.

27. La Crefferelle.

28. Circus major.

28. Le gros Bufard.

A. *Circus varius*.A. *Le Bufard varié*.

29. Circus palustris.

29. Le Bufard de marais.

30. Circus rufus.

30. Le Bufard roux.

31. Circus Brasiliensis.

31. Le Bufard du Brésil.

32. Buteo.

32. La Buse.

33. Buteo apivorus.

33. La Bondrée.

34. Milvus niger.

34. Le Milan noir.

35. Milvus regalis.

35. Le Milan royal.

36. Milvus Carolinienfis.

36. Le Milan de la Caroline.

IX. Genus Aquilinum.

IX. Genre de l'Aigle.

1. Aquila.

1. L'Aigle.

2. Aquila leucocephalos.

2. L'Aigle à tête blanche.

3. Aquila alba.

3. L'Aigle blanc.

4. Aquila nævia.

4. L'Aigle tacheté.

5. Aquila albicilla.

5. L'Aigle à queue blanche.

6. Aquila albicilla minor.

6. Le petit Aigle à queue blanche.

7. Chrysaetos, seu Aquila aurea.

7. L'Aigle doré.

8. Melanaetos, seu Aquila nigra.

8. L'Aigle noir.

9. Aquila ossifraga.

9. Le grand Aigle de mer.

10. Haliaetus, seu Aquila marina.

10. L'Aigle de mer.

11. Le Jean-le-blanc.
12. L'Aigle du Brésil.
13. L'Aigle hupé du Brésil.
14. L'Aigle hupé d'Afrique.
15. L'Aigle de Pondichery.

X. *Genre du Vautour.*

1. Le Vautour.
2. Le Vautour brun.
3. Le Vautour d'Egypte.
4. Le Vautour noir.
5. Le Vautour doré.
6. Le Vautour hupé.
7. Le Vautour fauve.
8. Le Vautour des Alpes.
9. Le Vautour à tête blanche.
10. Le Vautour du Brésil.
11. Le Roi des Vautours.
12. Le Condor.

SECTION II.

XI. *Genre du Hibou.*

1. Le grand Duc.
 - A. *Le grand Duc d'Italie.*
 - B. *Le grand Duc déchauffé.*
2. Le grand Duc de Virginie.
3. Le grand Duc de Laponie.
4. Le moyen Duc ou le Hibou.
 - A. *Le Hibou d'Italie.*
5. Le petit Duc.
6. Le petit Duc de la Caroline.
7. Le Hibou d'Amérique.
8. Le Hibou du Brésil.
9. Le Hibou du Mexique.

XII. *Genre du Chathuant.*

1. Le Chathuant.
2. Le petit Chathuant.
3. La Hulote.
4. La grande Chouette.
5. La petite Chouette ou la Cheveche.
6. Le Chathuant de Canada.

11. Pygargus.
12. *Aquila Brasiliensis.*
13. *Aquila Brasiliensis cristata.*
14. *Aquila Africana cristata.*
15. *Aquila Ponticeriana.*

X. *Genus Vulturinum.*

1. Vultur.
2. Vultur fuscus.
3. Vultur Ægyptius.
4. Vultur niger.
5. Vultur aureus.
6. Vultur cristatus.
7. Vultur fulvus.
8. Vultur Alpinus.
9. Vultur leucocephalus.
10. Vultur Brasiliensis.
11. Rex Vulturum.
12. Gryphus.

SECTIO II.

XI. *Genus Asionis.*

1. Bubo.
 - A. *Bubo Italicus.*
 - B. *Bubo pedibus nudis.*
2. Bubo Virginianus.
3. Bubo Laponicus.
4. Asio.
 - A. *Asio Italicus.*
5. Scops.
6. Scops Caroliniensis.
7. Asio Americanus.
8. Asio Brasiliensis.
9. Asio Mexicanus.

XII. *Genus Strigis.*

1. Strix.
2. Aluco.
3. Ulula.
4. Noctua major.
5. Noctua minor.
6. Strix Canadensis.

7. Strix

DES OISEAUX.

ix

7. Strix Freti Hudsonis.

7. Le Chathuant de la Baye de Hudson.

8. Strix alba Freti Hudsonis.

8. Le Chathuant blanc de la Baye de Hudson.

9. Strix Mexicana.

9. Le Chathuant du Mexique.

10. Noctua Mexicana.

10. La Chouette du Mexique.

11. Noctua Coquimbana.

11. La Chouette de Coquimbo.






TABLE INDEX

Des Genres.

Generum.

I	Genre	page.	67	I	Genus	pagina	67
II	Genre	.	158	II	Genus	.	158
III	Genre	.	164	III	Genus	.	164
IV	Genre	.	176	IV	Genus	.	176
V	Genre	.	181	V	Genus	.	181
VI	Genre	.	219	VI	Genus	.	219
VII	Genre	.	262	VII	Genus	.	262
VIII	Genre	.	310	VIII	Genus	.	310
IX	Genre	.	419	IX	Genus	.	419
X	Genre	.	452	X	Genus	.	452
XI	Genre	.	477	XI	Genus	.	477
XII	Genre	.	499	XII	Genus	.	499



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS FRANÇOIS.

La lettre G indique le genre : la lettre V, la variété ;
& la lettre E, l'espece.

A.			B.		
	G.	E.		G.	V. E.
A IGLE,	9		B Artavelle,	6	12
—	9	1	Bifet,	1	3
—	9	7	Bondrée,	8	33
—	10	10	Bufard,	8	32
— à la queue blanche,	9	1	— de marais,	8	29
— à queue blanche,	8	7	— du Brésil,	8	31
—	9	1	— (Gros)	8	28
—	9	5	— roux,	8	30
— à queue blanche, (Pe-			— varié,	8	A. 28
tit)	9	6	Buse,	8	32
— à tête blanche,	9	2	— à figure de Paon,	10	10
— barbue,	9	9	Buzard,	8	32
— blanc,	9	3	— de marais,	8	29
— canardiere,	9	10	Buze cendrée,	8	10
— de mer,	9	10			
— de mer, (Grand)	9	9	C.		
— de Pondichery,	9	15		G.	V. E.
— doré,	9	7	C Aille,	6	14
— du Brésil,	9	12	— de Java,	6	15
— hupé d'Afrique,	9	14	— de la Chine,	6	17
— hupé du Brésil,	9	13	— de la Louiziane,	6	20
— huppé,	9	14	— de Madagascar,	6	16
— marine,	9	10	— des Philippines,	6	17
— noir,	9	8	— du Mexique,	6	18
— noire,	9	8	— du Mexique, (Grande)	6	19
— noire, (Petite)	9	8	— (Grande)	6	A. 14
— royal, (Grand)	9	7	— hupée du Mexique,	6	21
— tacheté,	9	4	Caffard,	8	32
— toute blanche,	9	3	Cercelle,	8	27
— Vautour,	10	8	Chapon,	3	1
Angel,	1	5	Chathuant,	11	1
Autour,	8	3	—	11	7
Autre Oiseau S. Martin,	8	17	—	12	

	G.	E.		G. V. E.
Chathuant,	12	1	Contur,	10 12
—	12	3	— (Oiseau d'une gran-	
— blanc de la Baye de			deur prodigieuse ,	
Hudson,	12	8	appelé)	10 12
— de Canada,	12	6	Coq,	3
— de la Baye de Hud-			—	3 1
son ,	12	7	— à cinq doigts ,	3 B. 1
— du Mexique ,	12	9	— d'Angleterre ,	3 E. 1
— (Grand)	11	1	— de Bantam ,	3 B. 2
— (Petit)	12	2	— de Bantam , (Femelle	
— plombé , (Petit)	12	2	du)	3 B. 2
Cheveche ,	12	4	— de Bois ,	5 1
—	12	5	— de Bruyere ,	5 2
— (Grande)	12	4	— de Bruyere à fraise ,	5 11
— Lapin , (Espece de)	12	11	— de Bruyere aux deux	
— (Petite)	12	5	aiguilles à la queue ,	
Chouette ,	11	5	(Petit)	5 4
—	12	1	— de Bruyere femelle ,	5 2
— blanche ,	12	2	— -de-Bruyeres ,	5 1
— brune , (Grande)	12	4	— -de-Bruyeres à queue	
— de Coquimbo ,	12	11	fourchue ,	5 2
— du Mexique ,	12	10	— de Bruyeres brun &	
— (Grande)	12	4	tacheré ,	5 6
— noire ,	12	3	— -de-Bruyeres piqueté ,	5 A. 2
— (Petit Faucon-)	12	7	— de Limoges ,	5 1
— (Petite)	12	5	— de marais ,	5 9
Coc ,	3	1	— de Mozambic ,	3 4
— de Windhover ,	8	27	— de Padoue ,	3 C. 1
— -d'Inde ,	2	1	— de Perse ,	3 5
Cocq de bois d'Améri-			— de Turquie ,	3 D. 1
que ,	5	10	— d'Hambourg ,	3 1
— -Indien ,	7	12	— -d'Inde ,	2 1
Cog ,	3	1	— du Japon ,	3 6
Colombe ,	1	1	— frisé ,	3 3
— de la Chine ,	1	16	— hupé ,	3 A. 1
— de Portugal ,	1	9	— nain ,	3 2
Condor ,	10	12	— negre ,	3 4
— (Oiseau de proye			— noir des montagnes	
nommé)	10	12	de Moscovie ,	5 1
Condur ,	10	12	— patu ,	3 A. 2
— (Oiseau d'une gran-			— sans croupion ,	3 5
deur prodigieuse ,			Cormorant des Amazo-	
appelé)	10	12	nes ,	10 10

DES NOMS FRANÇOIS. xiiij

	G.	E.		G. V. E.
Cormorant sentant le			Epervier des Alouettes,	8 22
musc,	10	8	— (Petit)	8 2
Coulon,	1	1	—	8 25
— ramier,	1	6	— tacheté,	8 A. 1
Crécerelle,	8	27	Escoufle,	8 35
Crefferelle,	8	27	Esmerillon,	8 23
Croiseau,	1	3	— Gri-gry,	8 24
Crot pescherot,	9	10	Espervier,	8 1
D.			Espece de Cheveche La-	
	G. V. E.		pin,	12 11
D Ame,	12	3	— de Vautour,	9 9
Dindon,	2		— de Vautour, (Quelque)	9 9
—	2	1	Espervier,	8 1
— à crête blanche,	2 A.	1	F.	
— du Bréfil,	2	2		G. V. E.
— hupé,	2 A.	1	F Aisan,	5 11
— sauvage,	2 B.	1	—	7 —
Duc,	11	1	—	7 1
—	11	2	—	7 2
— aux ailes noires,			— bâtard,	7 C. 1
(Grand)	11 A.	1	— blanc,	7 B. 1
— de la Caroline, (Petit)	11	6	— blanc de la Chine,	7 5
— de Laponie, (Grand)	11	3	— bruyant,	5 1
— de Virginie, (Grand)	11	2	— couronné des Indes,	7 6
— déchauffé, (Grand)	11 B.	1	— de la Guiane,	7 3
— d'Italie, (Grand)	11 A.	1	— des Antilles,	7 2
— (Grand)	11	1	— doré de la Chine,	7 4
—	11	4	— panaché,	7 A. 1
— (Moyen)	11	4	Faucon,	8 4
— (Petit)	11	5	— à collier,	8 7
E.			— à tête blanche,	8 C. 4
	G. E.		— apprivoisé,	8 5
E Ffraye,	12	2	— blanc,	8 D. 4
Emerillon,	8	23	— bleu,	8 17
— de la Caroline,	8	25	— bossu,	8 B. 4
— de S. Domingue,	8	26	— brun,	8 G. 4
— des Antilles,	8	24	— Chouette, (Petit)	12 7
Emouchet,	8	1	— de Barbarie,	8 A. 6
Epervier,	8		—	8 B. 6
—	8	1	— de la Baye de Hudfon,	8 10
— à Pigeons,	8	21	— de montagne,	8 9
— à queue d'Hirondelle,	8	36	— de montagne cendré,	8 A. 9
— de la Caroline,	8	21	— de roche,	8 8

	G.	V.	E.		G.	V.	E.
Faucon de Tartarie ,	8	B.	6	Gelinote de bois ,	5		3
— des Antilles ,	8		13	— de Canada ,	5		7
— d'Islande ,	8	L.	4	— de Canada , (Grosse)	5		8
—	8		19	— de la Baye de Hudfon ,	5		6
— d'Italie ,	8	K.	4	— d'Ecoffe ,	5		5
— étoilé ,	8		11	— des Pyrénées ,	5		4
— Gentil ,	8		5	— hupée ,	5		9
— hagard ,	8	B.	4	— hupée d'Amérique ,	5		10
— hupé des Indes ,	8		12	— hupée de Pensilvanie ,	5		11
— Montagner ,	8		9	Gerfault ,	8		19
— noir ,	8	E.	4	— d'Islande ,	8	A.	19
— pêcheur ,	8		15	Gog ,	3		1
— pêcheur de la Caro-				Goiran ,	8		33
line ,	8		15	Grand Aigle de mer ,	9		9
— pêcheur des Antilles ,	8		14	— Aigle royal ,	9		7
— pèlerin ,	8		6	— Chathuant ,	11		1
— Punicien ,	8	A.	6	— Duc ,	11		1
— Rochier ,	8		8	—	11		4
— rouge ,	8	H.	4	— Duc aux aîles noires ,	11	A.	1
— rouge des Indes ,	8	I.	4	— Duc de Laponie ,	11		3
— fors ,	8	A.	4	— Duc de Virginie ,	11		2
— tacheté ,	8	F.	4	— Duc déchauffé ,	11	B.	1
— Tunicien ,	8	A.	6	— Duc d'Italie ,	11	A.	1
Faux-perdrieux ,	8		29	— Hibou blanc ,	12		8
Femelle du Coq de Ban-				— Hibou cornu d'Athe-			
ram ,	3	B.	2	nes ,	11	A.	1
Francolin ,	5		2	— Vautour ,	10		1
—	5		9	— Vautour cendré ,	10		1
—	6		13	Grande Caille ,	6	A.	14
Francolini brun-tacheté ,	5		6	— Caille du Mexique ,	6		19
Frefaye ,	12		2	— Cheveche ,	12		4
	G.			— Chouette ,	12		4
	G.	E.		— Chouette brune ,	12		4
G Al ,	3		1	Grifon ,	10		7
G Galinache ,	10		10	Gri-gry , (Esmerillon)	8		24
— (Oiseau appelé)	10		10	Grimauld ,	12		3
Gau ,	3		1	Grimault ,	12		4
Geau ,	3		1	Gros Bufard ,	8		28
Geline ,	3		1	Grosse Gelinote de Ca-			
Gelinote de boys ,	5		3	nada ,	5		8
Gelinote ,	5			— Perdrix ,	6		4
—	5		3	— Perdrix du Brésil ,	6		5
— blanche ,	5		12	Guan ,	2		2

DES NOMS FRANÇOIS.

xv

H.

G. V. E.

G.

E.

Hibour,

II

Lanier cendré,

8

17

—

II

I

— (Petit)

8

16

—

II

4

Lapin, (Espece de Cheve-

12

11

—

II

7

Lucheran,

12

2

— blanc d'Islande,

12

3

M.

G.

E.

— blanc, (Grand)

12

8

MAchette,

12

3

— cornu,

II

4

—

12

4

— cornu d'Athenes,

II

4

Manfart,

I

6

(Grand)

II

A. I

Marchand,

10

10

— couronné,

II

2

— (Oiseau appelé)

10

10

— d'Amérique,

II

7

Milan,

8

35

— d'Italie,

II

A. 4

— de la Caroline,

8

36

— du Brésil,

II

8

— noir,

8

34

— du Mexique,

II

9

— royal,

8

35

— (Petit)

II

6

Montagner,

8

9

—

12

5

Mouchet,

8

I

— sans cornes,

12

3

Moyen Duc,

II

4

Hobereau,

8

20

— Vautour blanchâtre,

10

5

Hobreau,

8

20

— Vautour brun,

10

5

Hocco brun du Mexique,

7

15

O.

G.

E.

— de Cayenne,

7

12

O

iseau appelé Gali-

10

10

— de Curassow,

7

13

nache,

10

10

— de la Guiane,

7

12

— appelé Marchand,

10

10

— de Para,

7

11

— de proie nommé Con-

10

12

— des Amazones,

7

13

dor,

10

12

— du Brésil,

7

11

— d'une grandeur pro-

10

12

— du Mexique,

7

14

digieuse, appelé

10

12

— du Pérou,

7

16

Condur,

10

12

Huau,

8

35

— d'une grandeur pro-

10

12

Huette,

II

5

digieuse, appelé

10

12

Hulote,

II

5

Contur,

10

12

—

12

3

— S. Martin,

9

11

Jean-le-blanc,

9

11

— S. Martin, (Autre)

8

17

—

—

—

— Trompette,

6

5

—

—

—

Orfraie,

9

9

Laneret,

8

16

Orfraye,

9

10

Lanier,

8

16

Ortolan blanc,

1

19

— blanc,

8

18

— de la Martinique,

1

19

Ossifrague,

9

9

	G. V. E.			G. V. E.	
P.					
P Aon,	7	7	Perdrix de montagne,	6	2
— blanc,	7	B. 7	— de montagne du Me-	6	3
— de la Chine,	7	9	— xique,	6	13
— du Japon,	7	8	— de prairies,	6	4
— du Tibet,	7	10	— du Brésil,	6	5
— panaché,	7	A. 7	— du Brésil, (Grosse)	6	8
— Phaïfan de la Chi-			— du Sénégal,	6	10
— ne,	7	9	— franche,	6	1
— (Pigeon-)	1	P. 2	— gouache,	6	1
Pêcheur,	8	14	— grise,	6	A. 1
Peintade,	4		— grise blanche,	6	4
—	4	1	— (Grosse)	6	10
— à poitrine blanche,	4	A. 1	— rouge,	6	12
Perdrieux (Faux-)	8	29	—	6	A. 10
Perdris,	6	1	— rouge blanche,	6	11
— aux pieds rouges,	6	10	— rouge de Barbarie,	1	27
— blanche,	5	12	— rouille,	6	10
— de Damas,	5	4	Pernisse,	8	7
— de Syrie,	5	4	Perturbateur des Poules,		
— des champs,	6	1	Petit Aigle à queue blan-		
— des Terres Neufves,	4	1	— che,	9	6
— gaille,	6	10	— Chathuant,	12	2
— gaule,	6	10	— Chathuant plombé,	12	2
— gaye,	6	10	— Coq de Bruyere aux		
— goache,	6	1	— deux aiguilles à la		
— griesche,	6	1	— queue,	5	4
— gringette,	6	1	— Duc,	11	5
— grise,	6	1	— Duc de la Caroline,	11	6
— rouge,	6	10	— Epervier,	8	2
Perdrix,	1	14	—	8	25
—	5	12	— Faucon-Chouette,	12	7
—	6		— Hibou,	11	6
—	6	1	—	12	5
— Américaine,	6	7	— Lanier,	8	16
— blanche,	5	12	Petite Aigle noire,	9	8
— d'Amérique,	6	7	— Cheveche,	12	5
— de Damas,	6	B. 1	— Chouette,	12	5
— de Grece,	6	12	— Tourterelle brune		
— de la Chine,	6	9	— d'Amérique,	1	20
— de la Martinique,	1	29	— Tourterelle d'Améri-		
— de la Nouvelle An-			— que	1	19
— gleterre,	6	6	— Tourterelle tachetée,	1	19
			Phaïfan,	7	1
			Phaïfan		

DES NOMS FRANÇOIS.


G. V. E.

xvij

G. V. E.

Phaïfan Belles-couleurs			Pigeon grand gosier,	I K. 2
de la Chine,	7	4	— hupé,	I B. 2
— blanc de la Chine,	7	5	— Jacobin,	I E. 2
— de Carafow,	7	13	— Messager,	I I. 2
— de la Chine noir &			— Nonain,	I E. 2
blanc,	7	5	— Paon,	I P. 2
— de la Chine, (Paon-)	7	9	— paté,	I E. 2
— rouge de la Chine,	7	4	— patu,	I A. 2
Piaïlleur,	10	10	— privé,	I I. 1
Pigeon,	I		— ramier,	I 5
—	I	I	—	I 6
— à chaperon,	I	E. 2	— ramier bleu de Mada-	
— à gorge frisée,	I	F. 2	gascar,	I 36
— à la couronne blanche,	I	33	— ramier d'Amboine,	I 42
— à l'aile verte,	I	42	— ramier des Moluques,	I 41
— à longue queue,	I	13	— ramier verd de Mada-	
— à queue annelée de la			gascar,	I 37
Jamaïque,	I	34	— Romain,	I 2
— aux taches triangulaires,	I	30	— roux de Cayenne,	I 29
— barré,	I	17	— sauvage,	I 5
— battéur,	I	M. 2	— sauvage d'Amérique,	I 12
— bleu du Mexique,	I	35	— sauvage du Mexique,	I 11
— brun des Indes,	I	15	— sauvage ordinaire,	I I
— cavalier,	I	L. 2	— trembleur,	I Q. 2
— cuirassé,	I	O. 2	— Turc,	I H. 2
— culbutant,	I	N. 2	— verd d'Amboine,	I 39
— de Barbarie,	I	D. 2	— verd de l'Isle S. Tho-	
— de Guinée,	I	30	mas,	I 40
— de la Jamaïque,	I	31	— verd des Philippines,	I 38
— de la Martinique,	I	14	— violet de la Martini-	
— de montagne du Me-			que,	I 27
xique,	I	28	Pintade, (Poule)	4 I
— de Nincombar,	I	44	Poule,	3 I
— de Norvége,	I	C. 2	— à cinq doigts,	3 B. I
— de passage,	I	12	— commune,	3 I
— de roche,	I	4	— d'Angleterre,	3 E. I
— de roche de la Jamaï-			— de Bantam,	3 B. 2
que,	I	33	— de Guinée,	4 A. I
— des Indes,	I	15	— de la Guinée,	4 I
— domestique,	I	I	— de Mozambic,	3 4
— du Mexique,	I	10	— de Padoue,	3 C. I
— frisé,	I	G. 2	— de Perse,	3 5
— fuyard,	I	5	— de Turquie,	3 D. I

	G. V. E.			G. V. E.	
Poule d'Inde,	2	1	Tourterelle d'Amboine,	1	26
— du Japon,	3	6	— d'Amérique,	1	13
— frisée,	3	3	— d'Amérique, (Petite)	1	19
— hupée,	3	A. 1	— de Canada,	1	21
— naine,	3	2	— de la Caroline,	1	18
— negre,	3	4	— de la Jamaïque,	1	32
— noire des montagnes			— de Portugal,	1	9
de Moscovie,	5	1	— des Indes,	1	8
— parue,	3	A. 2	— du Cap de Bonne Es-		
— Pintade,	4	1	pérance,	1	22
— rouge du Pérou,	7	16	— du Sénégal,	1	23
— sans croupion,	3	5	— mullet,	1	A. 8
— sauvage,	7	3	— rayée de la Chine,	1	16
Poulet,	3	1	— rayée des Indes,	1	17
Poulsin,	3	1	— tacherée, (Petite)	1	19
	Q.	G. E.	— verte d'Amboine,	1	43
Q ^U an,	2	2	Trompette, (Oiseau-)	6	5
Quelque espece de			Turterelle,	1	7
Vautour,	9	9	Turtrelle,	1	7
Quercerelle,	8	27		V.	
	R.	G. V. E.		G. E.	
R ^A mier,	1	3	V ^A utour,	10	
—	1	6	—	10	1
Rocheraie,	1	4	—	10	7
— blanc,	1	A. 4	— à tête blanche,	10	9
Rochier,	8	8	— (Aigle-)	10	8
Roi des Vautours,	10	11	— blanchâtre, (Moyen)	10	5
	S.	G. V. E.	— brun,	10	2
S ^A cre,	8	M. 4	— brun, (Moyen)	10	5
— d'Egvpte,	10	3	— cendré, (Grand)	10	1
— Egyptien,	10	3	— d'Egypte,	10	3
Sacret,	8	M. 4	— des Alpes,	10	8
	T.	G. E.	— des Indes,	10	11
T ^I ercelet,	8	3	— doré,	10	5
Tortorelle,	1	7	— du Brésil,	10	10
Tourte,	1	7	— (Espece de)	9	9
Tourterelle,	1	7	— fauve,	10	7
— à collier,	1	8	— (Grand)	10	1
— à collier du Sénégal,	1	24	— hupé,	10	6
— à gorge tacherée du			— noir,	10	4
Sénégal,	1	25	— (Quelque espece		
— brune d'Amérique,			de)	9	9
(Petite)	1	20	Vautours (Roi des)	10	11
			Windhover (Coc de)	8	27



INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum,
Græcorum, &c.

*Littera G Genus designat; Littera V, varietatem; &
Littera S, Speciem.*

A.

G. V. S.

G. V. S.

A ^{A K E B} ,	9	I	Accipiter minor,	8	2
Aar,	9	I	— minor Gesneri,	8	I
—	9	7	— minor pullivorax,	8	25
— (Gause-)	9	4	— Nifus, Alaudarius,	8	22
Aaf-Geyer,	10	6	— nocturnus Eberi,	8	9
Abgerichter Habicht,	8	3	— nocturnus Peuceri,	8	9
Accipiter,	8	—	— nocturnus Plinii,	8	9
—	8	I	— Palumbarius,	8	3
—	8	3	— Palumbarius Aldro-		
— Ægyptius,	10	3	vandi,	8	3
— Æfalo,	8	23	— Palumbarius aliorum,	8	3
— Æfalon,	8	23	— (Pygargus)	8	7
— Alaudarius,	8	22	— Pygargus Willugh-		
— Buteo,	8	32	beyi,	8	7
— Caroliniensis,	8	21	— (Rubetarius)	8	33
— Circus,	8	29	— rubetarius Turneri,	8	35
— (Circus)	8	29	— stellaris,	8	3
— Cyanopus,	8	11	— stellaris Eberi,	8	11
— Fringillarius,	8	I	— stellaris Ornithologis,	8	3
— Fringillarius Alber-			— stellaris Peuceri,	8	11
ti,	8	I	— stellaris,	8	A. 28
— Fringillarius Gazæ,	8	I	— (Tinnunculus)	8	27
— fuscus,	8	4	Achal,	9	7
— guttatus,	8	A. 28	Adeler,	9	7
— ignavus,	8	35	— (Schwartzter)	9	8
— ignavus Alberti,	8	35	Adelicher Habicht,	8	3
— lævis Schwenckfeldii,	8	35	Aderal,	9	7
— (Leius)	8	23	Adfinis, (Columbæ)	7	3
— Leporarius,	8	11	Adler,	9	I
— maculatus,	8	A. 1	—	9	7
— major,	8	3	— (Braun-fähle)	9	6
— Merularius,	8	3	— (Fisch-)	9	10
— minor,	8	I	— (Geyer-)	10	8

	G. V. S.			G. S.	
Adler gschlecht,	10	2	Aguila,	9	7
— (Kleiner)	9	8	— conocida,	9	1
— (Meer-)	9	10	— nera,	9	8
— (Schwartz-braune)	9	8	Aguilaastro,	8	19
— (Schwartzter)	9	8	Aguilo,	9	7
— (Stein-)	9	4	Aguista,	9	7
— (Weisser)	9	3	— nera,	9	8
Ægyptas,	10	8	Ahr, (Buf-)	8	32
Ægyptias,	10	8	— (Fisch-)	8	32
Αετοειδής,	11	5	—	9	10
Aefala,	8	E. 4	— (Ganse-)	10	6
Æfalo,	8	23	— (Graver Meuse)	8	18
— (Accipiter)	8	23	— (Großter Hasen-)	9	9
— Aldrovandi,	8	23	— (Hasen-)	9	8
— Gesneri,	8	23	— (Haw-)	8	35
— Junii,	8	23	— (Heuner-)	8	35
— Plinio,	8	23	— (Meuse-)	8	34
— Turneri,	8	23	— (Meufz-)	8	32
Æfalon,	8	23	— (Roetlichter Meuse)	9	4
— (Accipiter)	8	23	— (Rohr-)	8	32
— Alberti,	8	23	— (Schwartzter)	9	8
— Aldrovandi,	8	23	— (Stock)	8	3
— Antillarum,	8	24	— (Weisser Heuner)	8	18
— Aristotelis,	8	23	Ahrn, (Bufz-)	8	32
— Bellonii,	8	23	Aiah,	10	1
— Caroliniensis,	8	25	Αἰετος,	9	1
— Dominicensis,	8	26	—	9	7
— (Falco)	8	23	Aieta,	8	32
— Junii,	8	23	Αἰετος,	9	1
— Plinio,	8	23	Aigle,	9	1
— Turneri,	8	23	—	9	1
Αἰετος,	9	1	—	9	7
Αἰετος,	9	7	—	10	10
Αετος γνήσιος Aristoteli,	9	7	— à la queue blanche,	9	1
Αετος λαγοφάνος,	9	8	— à queue blanche,	8	7
Affinis Brasiliensis, (Vul-			—	9	1
turi)	10	10	—	9	5
Afra Avis Horatio,	4	1	— à queue blanche, (Pe-		
Agami,	6	5	tit)	9	6
Αγος,	9	1	— à tête blanche,	9	2
—	9	7	— barbue,	9	9
Aguglia,	9	7	— blanc,	9	3
— nigra,	9	8	— canardiere,	9	10

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G. V. S.
Aigle de mer ,	9	10	Αλέτωρ ,	3
— de mer , (Grand)	9	9	Αλεκτριωναν ,	3
— de Pondichery ,	9	15	Αλεκτρων , (Aliud)	3
— doré ,	9	7	Αλεκτρων εκταμίας ,	3
— du Brésil ,	9	12	Ales Lucis Martiali ,	3
— hupé d'Afrique ,	9	14	— (Phafidis)	7
— hupé du Brésil ,	9	13	— prænuntia lucis Ovidio ,	3
— huppé ,	9	14	— Statio , (Phafidis)	7
— marine ,	9	10	Alfuachat ,	5
— noir ,	9	8	— Arabum ,	5
— noire ,	9	8	Alia species , (Mitu)	7
— noire , (Petite)	9	8	— species , (Mutu)	7
— royal , (Grand)	9	7	Αλιετος ,	9
— tacheté ,	9	4	Αλιμετος ,	9
— toute blanche ,	9	3	Αλιαιτος ,	9
— Vautour ,	10	8	Aliga coronada ,	9
Α'ιγάλιος ,	12	3	Aliud Galli sylvestris	7
Α'ιγύπιος ,	10	1	Genus ,	5
Α'ισαλων ,	8	23	Alnëfer ,	9
Α'ιτος ,	9	7	Alocharello ,	11
Albafi ,	8	6	Alocho ,	12
Alberto Bonafa ,	5	3	Alrachame ,	10
— Orix ,	5	3	Alrachme ,	10
Albicilla ,	9	5	Aluco ,	12
— (Aquila)	9	5	—	12
— Gazæ ,	9	5	— Aldrovandi ,	12
—	9	6	— Aldrovandi , (Ulula)	12
— minor , (Aquila)	9	6	— alter ,	12
Albini Gallina ,	7	16	— Gazæ ,	12
Alchal ,	9	1	— Gelenio ,	12
Alchata ,	5	4	— Gefnero ,	12
— Aldrovandi ,	5	4	— major ,	12
— Arabum ,	5	4	— minor ,	12
— (Perdix)	5	4	— minor Aldrovandi ,	12
Alector ,	3	1	— prior Aldrovandi ,	12
— Brasiliensis ,	2	2	American Partridge ,	6
— Curassaus ,	7	12	Americanische Hahn ,	7
— Guineensis ,	4	1	— Hasel-Huhn ,	6
— Mitu ,	7	11	— Taube ,	11
— Mutu ,	7	11	An bas , (Mar)	8
Α'λεκτόριος ,	3	1	— baz , (Mar)	8
Α'λεκτορίς ,	3	1	— si muger ,	9
Α'λεκτορεπτυλα ,	3	1	— tih , (Mar)	8

	G.	S.		G.	S.
Anataria,	9	10	Aquila Heteropus,	10	2
— (Aquila)	9	10	— Heteropus,	10	2
— Ornithologi, (Aquila)	9	10	— Leporaria aliorum,	9	8
Angel,	1	5	— leucocephalos,	9	2
Anguista barbata,	9	9	— marina,	9	9
— piombina,	9	10	—	9	10
Ano,	7	12	— Melanætus,	9	8
Aoker-Hoena,	6	12	— minor,	9	8
Aquila,	9		— Morphnus,	9	10
—	9	1	— Morphnus Aldrovan-		
—	9	7	di,	9	10
—	9	8	— nævia,	9	4
— Africana cristata,	9	14	— nigra,	9	8
— alba,	9	3	— nigra Schwenckfel-		
— alba Aldrovandi,	9	3	dii,	9	8
— alba Cygnea,	9	3	— Ossifraga,	9	9
— albicilla,	9	5	— Ossifraga Aldrovan-		
— albicilla minor,	9	6	di,	9	9
— Aldrovandi, (Vultu-			— Piscium,	9	10
rina)	10	8	— Planga,	9	10
— Alpina faxatilis,	9	1	— Ponticeriana,	9	15
— Anataria,	9	10	— Pygargus,	9	5
— Anataria Ornitholo-			—	9	6
gi,	9	10	— Pygargus Plinii,	9	6
— aurea,	9	7	— Pyrenaica, &c.	9	7
— barbata Plinii,	9	9	—	9	10
— Brasiliensis,	9	12	— quam Gypæetum vo-		
— Brasiliensis cristata,	9	13	cant,	10	8
— Brasiliensis cristata			— quam Oripelargum		
Marcgravii,	9	13	vocant,	10	8
— Chrysaëtos,	9	7	— quam Percnopterum		
— Clanga,	9	4	vocant,	10	8
—	9	10	— regalis,	9	7
— Clanga Aldrovandi,	9	10	— simpliciter,	9	1
— cristata,	9	13	— stellaris,	9	7
— Cycnea,	9	3	— (Terzolo d')	9	7
— Cygnea,	9	3	— valeria,	9	8
— Cygnea Aldrovandi,	9	3	— (Valeria)	9	8
— fulva,	9	7	— valeria Gazæ,	9	8
— fulva, caudâ annulo			— valeria Raji,	9	8
albo cinctâ,	9	1	— valeria Willughbeyi,	9	8
— Germana,	9	7	Aquila genus, Heteropus		
— Gesneri,	9	7	cognominatum,	10	2

ALPHABETICUS.

xxij

	G.	V.	S.		G.	V.	S.
Aquilaastro,	9	9		Astore,	8	3	
—	9	10		Astur,	8	3	
Ar,	9	7		—	8	28	
Ἀρακος,	8	3		— aliis,	8	3	
Arbenne,	5	12		— Firmico,	8	3	
Arent,	9	11		— Recentioribus,	8	3	
—	9	7		Asturnellato,	11	2	
Ἀργίπος,	9	1		Asturo,	8	3	
Ἀργιποψ,	9	1		Afz-Geyer,	10	6	
Arn,	9	11		— Gyr,	10	6	
—	9	7		— Gyr, (Vultur quem			
— (Fisch-)	9	10		Germani vocant),	10	6	
Arnt,	9	7		Atlekeha,	11	1	
Aroazes,	3	1		Ἀτταγας,	5	9	
Ἀρπη,	8	35		Attagen,	5	3	
Ἀρπετος,	8	35		—	5	9	
Art,	9	7		—	6	13	
Ascherfarbener Berg-				— Aldrovandi,	5	9	
Falcke,	8	A. 9		— Americana,	5	10	
Asen,	11	4		— Americanus,	6	20	
Ash-coloured Vulture,	10	1		— candida,	5	12	
Ἀσκαλαφος. Aristoteli,	11	1		— major,	5	2	
Asio,	11			— minor,	5	9	
—	11	4		— Pensilvaniae,	5	11	
—	11	A. 4		Ἀτταγηννα,	5	9	
— alius,	11	5		Ἀτταγλυ,	5	9	
— alter,	11	4		Aver-Hahn,	5	1	
— Americanus,	11	7		— Han,	5	1	
— Brasiliensis,	11	8		— Henne,	5	1	
— Bubonis species,	11	4		— Ochffe,	5	1	
— Italicus,	11	A. 4		Avis Aldrovandi, (La-			
— Latinis,	11	4		gopus)	5	12	
— Mexicanus,	11	9		— aliorum, (Hiperio-			
— Plinio,	11	4		nis)	9	8	
— secundus,	11	4		— externa Plinio,	6	1	
— (Ulula)	11	4		— Horatio, (Afra)	4	1	
Asnija,	9	10		— ingens,	10	12	
Afs-Geir,	10	6		— ingens Chilenfis Cun-			
Asterias,	8	3		tur dicta,	10	12	
— Alberto magno,	8	3		— Lybica aliis,	2	1	
Ἀστρίας,	8	3		— magna Plauti,	10	1	
— Arist. Peuceri,	8	11		— medica Varroni,	7	7	
— (Ἰεραξ)	8	3		— montana,	7	12	

	G.	S.		G. V. S.
Avis Motmot Brasiliensis,	7	3	Basant,	7 1
— Numidica,	2	1	Basi,	8 3
— Numidica aliis,	2	1	Baum-Faelckle,	8 20
— Numidica quibusdam,	2	1	— Falck,	8 20
— Ovidio, (Junonia)	7	7	Baydach,	8 1
— (Pauxi vocata)	7	14	Baz, (Mar an)	8 6
— Phoebea,	8	11	Bazant,	7 1
— similem nomini edens			Baziant,	7 1
vocem,	7	15	Bein-brecher,	9 9
Aukeb,	9	7	Belez,	9 9
Avoltoio,	10	1	Berg-Falck,	8 9
— bianco,	10	5	— Falcke, (Ascherfar-	8 A. 9
— grande,	10	1	bener)	5 1
Aura,	10	10	— Fasan,	5 1
—	10	11	— Fasan, (Groffer)	5 1
Aurarum Nierembergii,			— Fasan, (Kleiner)	5 2
(Regina)	10	11	— Houn,	5 12
— (Regina)	10	11	— Hu,	11 1
Autour,	8	3	— Huhn,	5 12
Autre Oiseau S. Martin,	8	17	— Huw,	11 1
Awér-Han,	5	1	Bezar, (Kaphtār)	1 1
Aygle de mer,	9	10	Bhu,	11 1
			Bialozor,	8 19
B.			Bialy, (Orzel)	9 3
	G. V. S.		Birck-Falck,	8 9
B Aigús,	12 5		— Hahn,	5 2
Balbuzardus,	9 10		— Han,	5 2
— Anglorum,	9 10		— Henne,	5 2
Bald-Buzzard,	9 10		— Hun,	5 2
— Eagle,	9 2		Bird, (Curacoa-)	7 12
Bantam-Cock,	3 B. 2		— (Técuecholi Moun-	
— Hen,	3 B. 2		tain-)	7 13
Bar Jonah,	1 1		Birg-Falck,	8 9
Barbaiani,	12 3		— Fasan,	5 2
Barbaiano,	12 3		Biset,	1 3
Barbary-Falcon,	8 A. 6		Bla-Fusz,	8 11
— Pigeon,	1 D. 2		Black-Cock,	5 12
Bapbas,	8 3		—	5 A. 2
Barello,	8 20		— Eagle,	9 18
Barn-Owl,	12 2		— Game,	5 2
Bartavelle,	6 12		— Gled,	8 34
Bas, (Mar an)	8 3		— Grous,	5 2
			— Owl,	12 3
			Blad-Pate	

ALPHABETICUS.

xxv

G. V. S.

G. V. S.

Blad-Pate,	I	33	Braune Fisch - Geyer,		
Blaofot,	9	10	(Schwartz-)	8	29
Blau-Fufz, (Liecht-bla-			— Geyer, (Gelb-)	8	C. 4
ver)	8	A. 9	— Habigt, (Schwartz)	8	E. 4
— Habicht,	8	11	— -Reb-Huhn, (Sch-		
— Taube,	I	5	wartz-)	6	2
Blaver Blau - Fufz ,			Breaker, (Bone-)	9	9
(Liecht-)	8	A. 9	Brecher, (Bein-)	9	9
Blaw-Fufz,	8	11	Breucchel, (Stein-)	9	9
— Fufz, (Sprintz-)	8	A. 9	<i>Brytes,</i>	3	I
Blawe-Tauben,	I	5	Broad-Tail'd Shaker,	I	P. 2
Ble,	12	3	Broburen,	8	32
Blew-Backt Falcon,	8	6	Brom-Hahn,	5	2
— Legged Falcon,	8	11	— Han,	5	2
Blue Hawk,	8	17	Brown-Owl,	12	I
Bog-Gled,	8	29	— Owl, (Common)	12	I
Bonafia,	5	3	— Owl, (Great-)	12	4
— Alberti,	5	3	Bubo,	11	I
— Alberto,	5	3	—	11	A. I
— (Alberto)	5	3	—	11	B. I
— Canadensis,	5	7	— à Marcgravio descrip-		
— Freti Hudsonis,	5	6	tus,	11	I
— major Canadensis,	5	8	— capite aurito, &c.	11	4
— Pyrenaica,	5	4	— Gefneri,	11	I
— (Recentioribus)	5	3	— Italicus,	11	A. I
— Scotica,	5	5	— Laponicus,	11	3
Bonafia,	5	3	— maximus,	11	I
Bondrée,	8	33	— maximus, &c.	11	I
Bone-breaker,	9	9	— minor flavescens, &c.	11	7
Bose,	8	32	— nofter,	11	A. I
Boufat,	8	32	—	11	B. I
<i>Βουφος,</i>	11	I	— ocro-cinereus, &c.	11	7
<i>Βουταλις,</i>	11	I	— oculaurus,	11	9
<i>Βέφος,</i>	11	I	— pedibus nudis,	11	B. I
<i>Βέταλος,</i>	11	I	— primus,	11	I
Brand-Eule,	12	I	— Scandianus,	11	3
— Geyer,	8	30	— secundus,	11	A. I
<i>Βραος,</i>	9	7	— tertius,	11	B. I
Braun-Fahle Adler,	9	6	— Virginianus,	11	2
— Fahle Geyer,	8	G. 4	Bubonis auriti species,	11	9
Braune Adler, (Schwartz-)	9	8	— species, (Afio)	11	4
— Eule,	12	I	Bucciario,	8	32
— Falck, (Schwartz)	8	4	Bufo,	11	I

d

	G.	V.	S.		G.	S.
Bufo Lusitanis,	II	I		Buzzard, (Common)	8	32
Búho,	II	I		— (Honey-)	8	33
Bunte Fasan,	7	A. I		— (Lesser)	8	20
— Pfau,	7	A. I		— (Moor-)	8	29
Buf-Ahr,	8	32		— (Turkey-)	10	10
— hard,	8	32		Byalozor,	8	19
Bufant,	8	32		Búas,	II	I
Bufard,	8	32			C.	
— de marais,	8	29			G. V. S.	
— du Brésil,	8	31		C Abagi,	6	12
— (Gros)	8	28		— Cabeca,	12	I
— roux,	8	30		Cabegi,	6	12
— varié,	8	A. 28		Cabure,	II	8
Buse,	8	32		— Brasiliensibus,	II	8
— à figure de Paon,	10	10		— Marcgravii,	II	8
Busz-ahrn,	8	32		Caille,	6	14
— hart,	8	32		— de Java,	6	15
— hen,	8	32		— de la Chine,	6	17
Buteo,	8	32		— de la Louiziane,	6	20
—	9	4		— de Madagascar,	6	16
— (Accipiter)	8	32		— des Philippines,	6	17
— albus,	8	7		— du Mexique,	6	18
— albus quibufdam,	8	7		— du Mexique, (Grande)	6	19
— apivorus,	8	33		— (Grande)	6	A. 14
— apivorus Willughbeyi,	8	33		— hupée du Mexique,	6	21
— triorchis,	8	32		Calecutifch-Hun,	2	I
— vespivorus,	8	33		Canibello,	8	27
— vespivorus Willugh-				Caparut, (Gall)	3	C. I
— beyi,	8	33		Capo,	3	I
— vulgaris,	8	32		Capon,	3	I
— vulgaris, Autorum,	8	32		Capper,	I	E. 2
— vulgaris, Autorum,				Cappon,	3	I
— (Falco)	8	32		Cappone,	3	I
— vulgaris Willughbeyi,	8	32		Capricalca,	5	I
Buteus Alberto,	8	32		Capus,	3	I
Butherius Alberto,	8	32		Caracara,	8	31
Buyetre,	10	I		— Brasiliensibus,	8	31
Buzard,	8	32		Caraffow-Cock,	7	13
— de marais,	8	29		— Hen,	7	13
Buze cendrée,	8	10		Caririri, (Urutavi cuqui-		
Buzza,	8	32		— chu)	9	13
Buzzard,	8	32		Carrier,	I	I. 2
— (Bald-)	9	10		— Pigeon)	I	I. 2

ALPHABETICUS.

xxvij

	G.	S.		G.	V.	S.
Carriion-Crow,	10	10	Chichiçtli dicta, (Noc-	12		9
Cassard,	8	32	tua Mexicana)			
Cecua aliis,	12	4	Chijk,	3		1
Cecuma Ifidoro,	12	4	Chin-Tchien-Khi,	7		10
Cedron,	5	1	China-Pheasant,	7		4
Cehoilotl, (amoT)	1	10	— Pheasant, (White)	7		5
Cenchramus,	2	1	Chinefe Quail,	6		17
Cenchridis mas, (Fal-			Chivino,	11		5
co)	8	27	Chotroniffe,	6		12
Cenchris,	8	23	Chrosciel,	6	A.	14
—	8	27	Chouette,	11		5
— Aldrovandi,	8	27	—	12		1
— Dalecampio,	8	27	— blanche,	12		2
— (Falco)	8	27	— brune, (Grande)	12		4
Cercelle,	8	27	— de Coquimbo,	12		11
Cernicalo,	8	27	— du Mexique,	12		10
Chalcis Goropii,	11	1	— (Grande)	12		4
Chamamah,	1	1	— noire,	12		3
Chapon,	3	1	— (Petit Faucon-)	12		7
Chafferont,	11	1	— (Petite)	12		5
Chathuant,	11	1	Chrysaëtos,	9		7
—	11	7	— Aldrovandi,	9		7
—	12		— (Aquila)	9		7
—	12	1	— caudâ annulo albo			
—	12	3	cinctâ,	9		1
— blanc de la Baye de			Xpouacros,	9		7
Hudson,	12	8	— γνήσιος.	9		7
— de Canada,	12	6	Church-Owl,	12		2
— de la Baye de Hud-			Cicama Festo,	12		4
son,	12	7	Cieciorka,	5		2
— du Mexique,	12	9	Cietrzew,	5		2
— (Grand)	11	1	Cihuatotolin,	10		10
— (Petit)	12	2	Circus,	8		29
— plombé, (Petit)	12	2	— Accipiter,	8		29
Chebalos,	9	9	— (Accipiter)	8		29
Cheruna,	5	12	— Brasiliensis,	8		31
Chefnut Vulture,	10	5	— major,	8		28
Cheveche,	12	4	— palustris,	8		29
—	12	5	— rufus,	8		30
— (Grande)	12	4	— varius,	8	A.	28
— Lapin, (Espece de)	12	11	Civetta,	12		5
— (Petite)	12	5	Clanga,	9		10
Chichiçtli,	12	9	— Aldrovandi,	9		10

	G. V. S.			G. V. S.	
Clanga Aldrovandi ,			Colli fonalis,	6	18
(Aquila)	9	10	Colmestre ,	5	12
— (Aquila)	9	10	Colom ,	1	1
Clapper-Pigeon ,	1	N. 2	— patut ,	1	A. 2
Coc ,	3	1	— silvestre ,	1	6
— de Windhover ,	8	27	Coloma , (Tortra)	1	7
— -d'Inde ,	2	1	Colombe ,	1	1
Cock , (Bantam-)	3	B. 2	— de la Chine ,	1	16
— (Black-)	5	2	— de Portugal ,	1	9
—	5	A. 2	Colombo Butaracco ,	1	6
— (Caraffow-)	7	13	— favacco ,	1	6
— (Dunghill-)	3	1	— favaro ,	1	6
— (Gor-)	5	9	— puniono ,	1	1
— (Heath-)	5	2	Coloured Vulture, (Ash-)	10	1
— (House-)	3	1	Columba ,	1	
— (Japan Pea-)	7	8	—	1	1
— (Moor-)	5	9	—	1	11
— (Mountain-)	5	1	— agrestis ,	1	A. 4
— of the mountain ,	5	1	— agrestis Varroni ,	1	5
— of the Wood ,	5	1	— alba faxatilis ,	1	A. 4
— (Pea-)	7	7	— Americana ,	1	12
— (Roost-)	3	1	— Anglica ,	1	E. 2
— (Ruffed Heath-)	5	11	— arborea Schwenckfel-		
— (Turkey-)	2	1	— dii ,	1	5
— (White Pea-)	7	B. 7	— arvorum ,	1	1
Cocotli ,	1	19	— Barbarica ,	1	D. 2
Cocotzin ,	1	19	— capite albo , Sloane ,	1	33
—	1	20	— capite nigro ,	1	32
— aliud genus ,	1	20	— caudâ annulo cinctâ		
— Hernandezii ,	1	19	— Jamaicensis ,	1	34
— Nierembergii ,	1	19	— caudâ fasciâ notatâ ,		
Cocq de bois d'Améri-			— &c.	1	34
— que ,	5	10	— caudâ torquatâ , &c.	1	34
— -Indien ,	7	12	— caudata ,	1	P. 2
Codornix ,	6	1	— cavernalis ,	1	5
Cog ,	3	1	— cœrulea Mexicana ,	1	35
Cok ,	3	1	— cœrulescens , &c.	1	1
— (Mwyr-)	5	5	—	1	D. 2
Colcuicuiltic ,	6	20	—	1	E. 2
Coli fonalis ,	6	18	—	1	F. 2
Colin genus ,	6	21	—	1	K. 2
— genus omnium maxi-			—	1	M. 2
— mum ,	6	19	—	1	5

ALPHABETICUS.

xxix

G. V. S.

G. V. S.

Columba collo hirsuto, I F. 2
 — collo utrinque albo, I 6
 &c. I 7
 — Cretenfis, I D. 2
 — crispa, I G. 2
 — crispis pennis, I G. 2
 — cristata, I B. 2
 — cucullata, I E. 2
 — Cypria, I B. 2
 — I D. 2
 — Cypria alia, I B. 2
 — Cypria cucullata, I E. 2
 — dasypes, I A. 2
 — domestica, I 1
 I 2
 — domestica cucullata, I E. 2
 — domestica major, I 2
 — domestica versicolor, I 1
 &c. I A. 2
 I L. 2
 — Eques, I L. 2
 — ex Insula S. Thomæ, I 40
 &c. I 40
 — fera arborea, I 5
 — fera faxatilis, I 3
 — galeata, I O. 2
 — galerita, I E. 2
 — Gazæ, I 3
 — gestuosa, I N. 2
 — Guineensis, I 30
 — gutturosa, I K. 2
 — gyratrix, I N. 2
 — hirsutis pedibus, I A. 2
 — Jacobea, I E. 2
 — Jacobina, I E. 2
 — Jamaicensis, I 31
 — Indica, I F. 2
 I 15
 — Indica fusca, I 15
 — laticauda, I P. 2
 — lignorum, I 5
 — Livia, I 3

Columba Livia Gesnero, I 3
 — Maderaspatana, &c. I 38
 — major, &c. I 34
 — Martinicana, I 14
 — media, ventre candido, I 31
 — menstrua, I B. 2
 — Mexicana, I 10
 — Mexicana Hoilotl dicta Hernandezii, I 11
 — Mexicana, montana, I 28
 — maxima, I 33
 — minor, capite albo, I 29
 — minor fulva, I 31
 — minor Jamaycensis, I 31
 &c. D. Sloane, I 33
 — minor Leucocoryphos, I 31
 — minor ventre candido, I 5
 — montana, I 28
 — montana Mexicana, I 5
 — montana Schwenckfeldii, I 44
 — Nicombariensis, I 44
 — Nincombar, Indica, I C. 2
 — Norvegica, I B. 2
 — nostra cristata, I D. 2
 — Numidica, I K. 2
 — œsophago inflato, I P. 2
 — Pavonia, I A. 2
 — pedibus hirsutis, I A. 2
 — pedibus pennatis, I B. 2
 — pedibus plumosis, I M. 2
 — percussor, I H. 2
 — Persica, I 9
 — Portugallensis, I 29
 — purpureo - rufescens, I 2
 &c. I 29
 — Romana, I 4
 — rufa Cayennensis, I E. 2
 — rupicola, I 1
 — Russica, I 4
 — rusticorum, I 4
 — faxatilis, I 4

	G. V. S.		G. V. S.
<i>Columba faxatilis</i> Aldro-		<i>Columba viridis</i> Philip-	
<i>vandi</i> , I	4	<i>penfis</i> , I	38
— <i>faxatilis</i> <i>Jamaicensis</i> , I	33	— <i>viridissimi coloris</i> , I	37
— <i>faxatilis</i> <i>M. Varronis</i> , I	4	— <i>vulgaris</i> , I	1
— <i>faxatilis</i> <i>Varroni</i> , I	5	<i>Columbæ adfinis</i> , 7	3
— <i>finensis</i> , <i>elegans</i> , I	16	— <i>sylvestris</i> <i>species</i> , I	35
— <i>strumosa</i> , I	K. 2	— <i>sylvestris</i> <i>species</i> , &c. I	40
— <i>subfusca</i> <i>media</i> , &c. I	15	<i>Columbicida</i> , 8	3
— <i>subfusca</i> <i>minima</i> , &c. I	19	<i>Columbo</i> , I	1
— <i>sylvana</i> , I	6	<i>Columbus</i> , I	E. 2
— <i>sylvestris</i> , I	G. 2	— <i>Carolinienfis</i> , I	12
— I	10	— <i>minimus</i> , I	19
— <i>sylvestris</i> , &c. I	7	<i>Common brown-Owl</i> , 12	1
— I	40	— <i>Buzzard</i> , 8	32
— <i>sylvestris</i> <i>cinerea</i> , &c. I	3	— <i>Dove</i> , I	1
— I	6	— <i>Grey Owl</i> , 12	4
— <i>sylvestris</i> <i>minima</i> , I	19	— <i>Ivy-Owl</i> , 12	1
<i>Brasilienfis</i> , I	I. 2	— <i>Partridge</i> , 6	1
— <i>tabellaria</i> , I	6	— <i>Pigeon</i> , I	1
— <i>torquata</i> , I	P. 2	— <i>White-Owl</i> , 12	2
— <i>tremula</i> , I	Q. 2	— <i>Wild-Dove</i> , I	1
— I	Q. 2	— <i>Wild-Pidgeon</i> , I	1
— <i>tremula</i> <i>acuticauda</i> , I	Q. 2	— <i>Wild-Pigeon</i> , I	1
— <i>tremula</i> <i>angusticauda</i> , I	P. 2	<i>Condor</i> , 10	12
— <i>tremula</i> <i>laticauda</i> , I	F. 2	— (<i>Oiseau de proie</i>	
— <i>Turbita</i> , I	H. 2	<i>nommé</i>) 10	12
— <i>Turcica</i> , I	7	<i>Condur</i> , 10	12
— <i>Turtur</i> , I	18	— (<i>Oiseau d'une gran-</i>	
— <i>Turtur</i> <i>Carolinienfis</i> , I	17	<i>deur prodigieuse</i> ,	
— <i>Turtur</i> <i>Indiæ Orienta-</i>		<i>appellé</i>) 10	12
<i>lis</i> , I	8	<i>Congener</i> <i>Aldrovandi</i> ,	
— <i>Turtur</i> <i>Indica</i> <i>Aldro-</i>		(<i>Morphno</i>) 9	4
<i>vandi</i> , I	42	— (<i>Morphno</i>) 9	4
— <i>Turture</i> <i>nostrate</i> <i>mi-</i>		<i>Contur</i> , 10	12
<i>nor</i> , &c. I	A. 2	— (<i>Oiseau d'une gran-</i>	
— <i>Tympanizans</i> , I	N. 2	<i>deur prodigieuse</i> ,	
— <i>vertaga</i> , I	33	<i>appellé</i>) 10	12
— <i>vertice</i> <i>depresso</i> <i>albi-</i>		<i>Coparacoch</i> , 12	7
<i>do</i> , I	27	<i>Coq</i> , 3	
— <i>violacea</i> <i>Martinicana</i> , I	39	— 3	1
— <i>viridis</i> <i>Amboinensis</i> , I	40	— à cinq doigts, 3	B. 1
— <i>viridis</i> <i>Insulæ</i> <i>S. Tho-</i>		— d'Angleterre, 3	E. 1
<i>mæ</i> , I		— de Bantam, 3	B. 2

ALPHABETICUS.

[xxxj]

G. V. S.

G. V. S.

Coq de Bantam, (Femelle
du) 3 B. 2
— de bois, 5 I
— de Bruyere, 5 2
— de Bruyere à fraise, 5 II
— de Bruyere aux deux
aiguilles à la queue,
(Petit), 5 4
— de Bruyere femelle, 5 2
— de Bruyeres, 5 I
— de Bruyeres à queue
fourchue, 5 2
— de Bruyeres brun &
tacheté, 5 6
— de Bruyeres piqueté, 5 A. 2
— de Limoges, 5 I
— de marais, 5 9
— de Mozambic, 3 4
— de Padoue, 3 C. 1
— de Perse, 3 5
— de Turquie, 3 D. 1
— d'Hambourg, 3 I
— d'Inde, 3 1
— du Japon, 3 6
— frisé, 3 3
— hupé, 3 A. 1
— nain, 3 2
— negre, 3 4
— noir des montagnes
de Moscovie, 5 I
— patu, 3 A. 2
— sans croupion, 3 5
Cormorant des Amazo-
nes, 10 10
— sentant le musc, 10 8
Cortbeck, 1 F. 2
Corusa, 12 3
Corvus calvus, &c. 10 10
— moschatus, &c. 10 8
— piscator, 9 10
— sylvaticus, &c. 10 10
Coturnix, 6 14
Coturnice, 6 12

Coturnicis simulacrum, 6 20
Coturnise, 6 12
Coturnix, 6 14
— alia, 6 19
— Americana, elegan-
ter, &c. 6 21
— eleganter, &c. 6 21
— Javenfis, 6 15
— Indica, 6 15
— 6 18
— 6 20
— 6 21
— Indica alia, 6 19
— Indica Bontii, 6 15
— Latinorum, 6 14
— Ludoviciana, 6 20
— Madagascariensis, 6 16
— major, 6 A. 14
— major Mexicana, 6 19
— Mexicana, 6 18
— Mexicana cristata, 6 21
— nigro torque, &c. 6 14
— omnium maxima ful-
va, 6 19
— Philippenfis, 6 17
— Quauhtzonecolin nun-
cupata, 6 21
— unicolor, &c. 6 14
— vulgaris nostras, 6 14
Coturno, 6 12
Cou, (Tche-) 6 9
Coulon, 1 1
— ramier, 1 6
Coxolitli, 7 16
— Hernandezii, 7 16
Coyolcozque, 6 18
Cozacacauhtli, 10 11
Cozcaquauhtli, 10 11
Cozquauhtli, 10 11
Cozquauhtli, 10 11
Crax, 7 12
— Brasiliensis, 7 11
— Curaffous, 7 13

	G. V. S.		G. V. S.
Crax fuscus Mexicanus ,	7 15	Dendro-Falcus ,	8 20
— Guianensis ,	7 11	— Falcus Gefnero ,	8 20
— Mexicanus ,	7 14	Dic ,	3 1
— niger , &c.	7 11	Dieb , (Heuner-)	8 35
—	7 12	Dieff , (Kuken-)	8 34
—	7 13	Dindon ,	2 2
— Peruvianus ,	7 16	—	2 1
Crécerelle ,	8 27	— à crête blanche ,	2 A. 1
Creeper ,	3 2	— du Brésil ,	2 2
Cresserelle ,	8 27	— hupé ,	2 A. 1
Crested-Turkey ,	2 A. 1	— sauvage ,	2 B. 1
Croiseau ,	1 3	Diwoky ,	1 6
Croisi ,	1 3	Doffer ,	1 1
Cropper ,	1 K. 2	Dove , (Common-)	1 1
— -Dove ,	1 K. 2	— (Common-Wild-)	1 1
Crot pescherot ,	9 10	— (Cropper-)	1 K. 2
Crow , (Carrion-)	10 10	— (Ear-)	1 7
Crowned Eagle ,	9 14	— from China ,	1 16
Cryer ,	8 29	— from Jamaica , (Turt-	
Cuaderviz ,	6 14	le-)	1 32
Cubegi ,	6 12	— from the east Indies ,	
Cubeth ,	6 1	(Turtle-)	1 8
Cubugi ,	6 12	— (Ground-)	1 19
Culver ,	1 1	— (Least Barbados Turt-	
Cuntur ,	10 12	le-)	1 19
— dicta , (Avis ingens		— (Mountain-)	1 29
Chilensis)	10 12	— (Parrot-)	1 38
Cuquichu caririri , (Uru-		— (Portugal-)	1 9
tavi)	9 13	— (Ring-)	1 6
Curaçoa-Bird ,	7 12	— (Rough-Footed-)	1 A. 2
Curaffo ,	7 12	— (Stock-)	1 3
Cushat ,	1 6	—	1 5
Cyanopus ,	8 11	— (Turtle-)	1 7
Cybindus ,	8 9	— (White-Belly'd)	1 31
Czarny , (Orzel)	9 8	— (White-Winged-)	1 15
D.		Drzemlik ,	8 23
D.		Drzewny , (Sokol)	8 20
D.		Duc ,	1 1
D.		—	1 2
D.		— aux ailes noires ,	
D.		(Grand)	1 A. 1
D.		— de la Caroline , (Petit)	1 6
D.		— de Laponie , (Grand)	1 3
D.		Duc	

ALPHABETICUS.

xxxiii

2. V. S.	G. V. S.	2. V. S.	G. V. S.
Duc de Virginie, (Grand)	II 2	Eagle, (Sea-)	9 9
— déchauffé, (Grand)	II B. 1	— (White)	9 10
— d'Italie, (Grand)	II A. 1	— (White)	9 3
— (Grand)	II 1	Ear-Dove,	1 7
— (Moyen)	II 4	Effraye,	12 2
— Muffol,	II 1	Egret,	8 3
— (Petit)	II 5	E'λεος, (Petit)	10 5
Duco,	II 1	E'λεος,	12 2
— cornuto,	II 4	E'λεος,	12 3
Duffer,	II 1	E'λεος,	12 2
Dufwa,	II 1	Emerillon,	8 23
— (Hem-)	II 1	— de la Caroline,	8 25
— (Kropp-)	II K. 2	— de S. Domingue,	8 26
— (Ring-)	II 6	— des Antilles,	8 24
— (Skogs-)	II 5	Emouchet,	8 1
— (Turtur-)	II 7	Englische Hahn,	3 E. 1
Dugo,	II 1	— Henne,	3 E. 1
Dukiphat,	II 1	Entenstoessel,	8 10
Dunghill-Cock,	II 3	Epervier,	8 1
— Hen,	II 3	— à Pigeons,	8 21
Dwarf-Hen,	II 2	— à queue d'Hirondelle,	8 36
Duve,	II 1	— de la Caroline,	8 21
— (Krieff-)	II 6	— des Alouettes,	8 22
— (Ring-)	II 6	— (Petit)	8 2
— (Turtel-)	II 7	— tacheté,	8 A. 1
Duyf,	II 1	Erne,	9 6
Dziki finy, (Golab)	II 5	Erythrontaon Plinio,	5 2
Eagle,	II 1	Erythrotao Plinii,	5 1
— (Bald)	II 7	E'ρυθρονταος,	5 1
— (Black)	II 2	Efalus,	8 8
— (Crowned)	II 14	Escoufle,	8 35
— (Fawn-Killing-)	II 5	Esmereillon,	8 23
— (Fowl-Killing)	II 10	Esmereillon,	8 23
— (Golden)	II 7	— Gri-gry,	8 24
— (Kough-Footed)	II 4	Espervier,	8 1
— Oronooke-	II 13	Espec de Cheveche La-	
— Owl,	II 1	pin,	12 11
		— de Vautour,	9 9
		— de Vautour, (Quelque)	9 9
		Espervier,	8 1
		Esfer, (Menschen-)	10 10

	G.	S.		G. V. S.
Eül,	12	3	Faisan couronné des In-	
Eul, (Nacht-)	12	3	des,	7 6
— (Stock-)	12	3	— de la Guiane,	7 3
Eule,	12	3	— des Antilles,	7 2
— (Brand-)	12	1	— doré de la Chine,	7 4
— (Braune-)	12	1	— panaché,	7 A. 1
— Gelbliche-)	12	1	Falck,	8 4
— (Grave-)	12	3	—	8 5
— (Graw-)	12	3	— (Baum-)	8 20
— (Kirch)	12	2	— (Berg-)	8 9
— (Kleine Nacht-)	11	5	— (Birck-)	8 9
— (Kleine Wald)	11	5	— (Birg-)	8 9
— (Mittel-)	12	4	— Eberi, (Tauben-)	8 3
— (Nacht-)	12	3	— (Frembdling-)	8 6
—	12	4	— (Gemeiner-)	8 6
— (Perl)	12	2	— (Ger-)	8 19
— (Pusch-)	12	3	— (Gier-)	8 19
— Rantz)	11	4	— (Grau Weisse)	8 17
—	12	2	— (Grosse Gepfeilte)	8 3
— (Schleier-)	12	2	— (Grosse Gesperberte)	8 3
— (Schlever)	12	2	— (Grosser-)	8 19
— (Stein-)	12	4	— (Gyr-)	8 19
— (Stock)	11	5	— (Hager-)	8 B. 4
— (Stock-)	12	1	— (Hoger-)	8 B. 4
— (Uhr)	11	4	— (Kleiner-)	8 22
— (Ulula Kirch)	12	2	— (Kleinste Rothe-)	8 23
Eyle,	11	1	— (Kol-)	8 E. 4
F.			— (Kyrkio-)	8 27
	G. V. S.		— (Maufe-)	8 22
Faelckle (Baum-)	8	20	— (Moschowitterische)	8 D. 4
Faelcklin, (Lerch-)	8	22	— Peuceri, (Tauben-)	8 3
— (Stos-)	8	22	— (Reger-)	8 19
Fagiano,	7	1	— (Rohr-)	8 29
Fahic Geyer, (Braun)	8	G. 4	— (Roter-)	8 H. 4
Fahle Adler, (Braun)	9	6	— (Rothe-)	8 27
Faisan,	5	11	— (Schwartz braune)	8 4
—	7	1	— (Socker-)	8 M. 4
—	7	1	— (Stein-)	8 8
—	7	2	—	8 9
— bâtard,	7	C. 1	— (Tauben-)	8 3
— blanc,	7	B. 1	— (Torn-)	8 27
— blanc de la Chine,	7	5	— (Wander-)	8 6
— bruyant,	5	1	— (Wasser-)	8 29

ALPHABETICUS.

xxxv

G. V. S.

G. V. S.

Falck, (Weisse) 8 D. 4
 — (Zwitter-) 8 A. 9
 Falcke, 8 4
 — (Ascherfarbener Berg-) 8 A. 9
 — (Kleiner-) 8 22
 — (Kohl-) 8 E. 4
 — (Mauß-) 8 33
 — (Mittel-) 8 19
 — (Rohr-) 9 10
 — (Stocker-) 8 M. 4
 — (Stos-) 8 M. 4
 — (Tauben-) 8 3
 — (Weißer-) 8 D. 4
 — (Zwitter-) 8 A. 9
 Falcker, 8 4
 Falco, 8 3
 — 8 4
 — 8 20
 — ad rufum inclinans, 8 20
 — Ælyus Avicennæ, 8 M. 4
 — Aeriphilus Avicennæ, 8 M. 4
 — æruginosus Aldrovandii, 8 29
 — Æsalon, 8 23
 — Alaudarum, 8 22
 — albicans, 8 35
 — albus, 8 D. 4
 — albus, lactei coloris Griffonii, 8 D. 4
 — albus Willughbeyi, 8 D. 4
 — aliter, 8 I. 4
 — Antillarum, 8 13
 — apud Firmicum, 8 4
 — apud Recentiores, 8 4
 — apud Suidam, 8 4
 — arborarius, 8 20
 — arborarius Alberto, 8 20
 — Ardearius, 8 6
 — aureus, &c. 8 27
 — Britannicus Avicennæ, 8 M. 4
 — , Buteo vulgaris Auditorum, 8 32
 — candidus, 8 D. 4

Falco capite nudo, &c. 10 2
 — 10 8
 — Carolinienfis Palumbarius, 8 21
 — caudâ forcipatâ, 8 35
 — Cenchridis mas, 8 27
 — Cenchris, 8 27
 — cerâ flavâ, &c. 8 35
 — 9 5
 — cerâ luteâ, &c. 9 7
 — cerâ luteo-viridi, &c. 8 29
 — cerâ, pedibusque luteis, &c. 8 32
 — cerâ viridi, &c. 8 1
 — cinereo-albus, 8 17
 — Columbarius, 8 3
 — Columbarius Nebbidictus, 8 E. 4
 — crudelis, 8 16
 — cyanopos, 8 11
 — cyanopus, 8 11
 — cyanopus Jonstoni, 8 11
 — cyanopus Schwenckfeldii, 8 11
 — cyanopus Willughbeyi, 8 11
 — (Dendro-) 8 20
 — Freti Hudsonis, 8 10
 — Fringillarius, 8 1
 — fuscus, 8 E. 4
 — 8 G. 4
 — Gentilis, 8 5
 — gibbosus, 8 B. 4
 — gibbosus albus, 8 B. 4
 — hornotinus, 8 A. 4
 — hyacinthinus Alberti magni, 8 11
 — Indicus cirratus, 8 12
 — Indicus cristatus, 8 12
 — Islandicus, 8 L. 4
 — Italicus, 8 K. 4
 — Lanarius, 8 16
 — Lapidarius, 8 8
 — leucocephalus, 8 C. 4

	G. V. S.		G. V. S.
Falco, (Litho-)	8 8	Falco pedibus, (cerâque)	8 27
— littoralis,	8 29	— flavis, &c.	8 27
— maculatus,	8 F. 4	— pedibus flavis, &c.	8 5
— manibus aureis, &c.	8 A. 1	— pedibus, rostroque	—
— maximus, &c.	9 13	— cœruleis, &c.	8 16
— medius,	8 19	— pedibus seminudis fla-	—
— minor rufescens, &c.	8 25	— vis, &c.	8 33
— mixtus,	8 A. 9	— peregrinus,	8 6
— mixtus Schwenckfel-	—	— peregrinus Gefneri,	8 6
— dii,	8 A. 9	— Peruvianus caudâ fur-	—
— montanarius Aldro-	—	— catâ,	8 36
— vandi,	8 9	— pictus,	8 22
— montanarius Schwenck-	—	— piscator Antillarum,	8 14
— feldii,	8 9	— piscator Caroliniensis,	8 15
— montanarius Willugh-	—	— piscator cyanopus,	8 15
— beyi,	8 9	— plumbeus, &c.	8 7
— montanus,	8 9	— Pyrenæus nigricans,	8 9
—	8 A. 9	— rapax,	8 19
— montanus Aldrovand-	—	— rostro nigro, &c.	8 3
— di,	8 9	— rubens,	8 H. 4
— montanus cinereus,	8 A. 9	— ruber Indicus,	8 I. 4
— montanus cœruleus,	8 A. 9	— rubeus,	8 H. 4
— montanus Gefneri,	8 9	—	8 I. 4
— montanus Schwenck-	—	— rubeus Jonstoni,	8 H. 4
— feldii,	8 9	— ruderum,	8 22
— montanus secundus	—	— rufus,	8 22
— Aldrovandi,	8 A. 9	— facer,	8 M. 4
— montanus Willugh-	—	— facer Schwenckfeldii,	8 M. 4
— beyi,	8 9	— facer Willughbeyi,	8 M. 4
— Moscoviticus,	8 D. 4	— sagittatus,	8 3
— murorum,	8 22	— stellaris,	8 11
— niger,	8 E. 4	— Tartaricus,	8 B. 6
— Nobilis,	8 5	— torquatus,	8 7
— Ocnentanus,	8 6	— Tunetanus,	8 A. 6
— Palumbarius,	8 3	— turrium,	8 22
— palustris,	8 29	— varius,	8 22
— parvus Schwenckfel-	—	— vertice, vel rubro vel	—
— dii,	8 22	— luteo,	8 25
— passager,	8 6	Falcon,	8 4
— pedibus, cerâ, palpe-	—	— (Barbary-)	8 A. 6
— brisque flavis, &c.	8 20	— (Blew-Backt)	8 6
— pedibus, cerâque cœ-	—	— (Blew-Legged)	8 11
— ruleis, &c.	9 10	— from Barbarie,	8 A. 6

ALPHABETICUS.

xxxvij.

G. V. S.	G. V. S.	G. V. S.	G. V. S.
Falcon Gentle, 8	Falcon à collier, 8	Falcon à collier, 8	Falcon à collier, 8
— (Ger-) 8	— à tête blanche, 8	— à tête blanche, 8	— à tête blanche, 8
— (Gyr-) 8	— apprivoisé, 8	— apprivoisé, 8	— apprivoisé, 8
— (Haggard) 8	— blanc, 8	— blanc, 8	— blanc, 8
— (Jer-) 8	— bleu, 8	— bleu, 8	— bleu, 8
— (Mountain-) 8	— bossu, 8	— bossu, 8	— bossu, 8
— (Red-) 8	— brun, 8	— brun, 8	— brun, 8
— (Stone-) 8	— Chouette, (Petit) 8	— Chouette, (Petit) 8	— Chouette, (Petit) 8
— (Tish-) 8	— de Barbarie, 8	— de Barbarie, 8	— de Barbarie, 8
— (Tree-) 8	— de la Baye de Hudson, 8	— de la Baye de Hudson, 8	— de la Baye de Hudson, 8
— (Tunis-) 8	— de montagne, 8	— de montagne, 8	— de montagne, 8
— (White-) 8	— de montagne cendré, 8	— de montagne cendré, 8	— de montagne cendré, 8
— With red spots, 8	— de roche, 8	— de roche, 8	— de roche, 8
Falconè, 8	— de Tartarie, 8	— de Tartarie, 8	— de Tartarie, 8
— rosso, 8	— des Antilles, 8	— des Antilles, 8	— des Antilles, 8
Falconellus, 8	— d'Islande, 8	— d'Islande, 8	— d'Islande, 8
— feriens, 8	— d'Italie, 8	— d'Italie, 8	— d'Italie, 8
Falcones rubri Indici, 8	— étoilé, 8	— étoilé, 8	— étoilé, 8
— rubri Indici Aldrovandi, 8	— Gentil, 8	— Gentil, 8	— Gentil, 8
Falconis montani secundum genus, 8	— hagard, 8	— hagard, 8	— hagard, 8
Falconum species, 8	— hupé des Indes, 8	— hupé des Indes, 8	— hupé des Indes, 8
Falcus, (Dendro-) 8	— Montagner, 8	— Montagner, 8	— Montagner, 8
— Gesnero, (Dendro-) 8	— noir, 8	— noir, 8	— noir, 8
— (Litho-) 8	— pêcheur, 8	— pêcheur, 8	— pêcheur, 8
Fasaen, 8	— pêcheur de la Caro- line, 8	— pêcheur de la Caro- line, 8	— pêcheur de la Caro- line, 8
Fasan, 8	— pêcheur des Antilles, 8	— pêcheur des Antilles, 8	— pêcheur des Antilles, 8
— (Berg-) 8	— pélerin, 8	— pélerin, 8	— pélerin, 8
— (Birg-) 8	— Punicien, 8	— Punicien, 8	— Punicien, 8
— (Bunte) 8	— Rochier, 8	— Rochier, 8	— Rochier, 8
— (Grosser Berg-) 8	— rouge, 8	— rouge, 8	— rouge, 8
— Hunern 8	— rouge des Indes, 8	— rouge des Indes, 8	— rouge des Indes, 8
— (Kleiner Berg-) 8	— fors, 8	— fors, 8	— fors, 8
— negro, 8	— tacheré, 8	— tacheré, 8	— tacheré, 8
Fasano, 8	— Tunicien, 8	— Tunicien, 8	— Tunicien, 8
Fasant, 8	Fawn-Killing-Eagle, 8	Fawn-Killing-Eagle, 8	Fawn-Killing-Eagle, 8
Fasian, 8	Faux-perdrieux, 8	Faux-perdrieux, 8	Faux-perdrieux, 8
Fasiano Alpestre, 8	Fazanella, 8	Fazanella, 8	Fazanella, 8
— 8	Fazyan, 8	Fazyan, 8	Fazyan, 8
Faucon, 8	Feld-Huhn, 8	Feld-Huhn, 8	Feld-Huhn, 8

G. V. S.		G. V. S.	
Feld Hun,	6	Fowl-Killing Eagle,	10
— Taube,	1 A. 4	— (Moor-)	9
Feliceps Americanus, fla-	—	Francello,	1
vescens, &c.	7	Franck,	1
— auribus patulis, &c.	4	Francolin,	2
— flavescens, &c.	7	—	9
— subrufus, &c.	1	— H. 8	13
Femelle du Coq de Ban-	—	Francolini brun-tacheté,	6
tam,	3 B. 2	Francolino,	3
Fen-Kite,	8 29	—	9
Fesän,	7	— A. 8	13
Fesant,	7	— Italorum,	13
Filacotona,	4	Francolinus,	13
— Aldrovandi,	4	— Olinæ,	13
— Arabum,	4	Fregata sylvatica, &c.	8
Fisch-Adler,	10	Fremdling-Falck,	6
— Ahr,	32	Fremeüder Wilder Han-	—
—	9 10	Ufs Africa,	1
— Arn,	10	— Wilder Han Ufs Bar-	1
— Geyer,	30	barijen,	4
— Geyer, (Schwartz-	—	Fresaye,	2
braune)	29	Fringillarius Accipiter,	1
— knecht,	32	Froembd Kutzle, (Klei-	—
Fischer,	10	ne)	5
Fishing-Hawk,	15	Frog-Kite,	29
Fisk-Oern,	10	Fur Pullosum Schwenck-	—
Fisktius,	10	feldii,	35
Flayfant,	1	Fufs-Geyer, (Rauh-)	4
Flug-Taube,	1	Fufz, (Bla-)	11
Fogel, (Quid-)	32	— (Blaw-)	11
— (Qwid-)	32	— (Liecht-blaver Blau-)	9
Footed-Dove, (Rough-)	2	— (Sprintz-Blaw)	9
— Eagle, (Kough-)	4	G.	
— Pigeon, (Rough-)	2	G. V. S.	
Forked-tail Gled,	35	G Agila,	1
— tail Kite,	35	—	7
— tayl'd Glead,	34	Gakus,	1
— tayl'd Kite,	34	Gal,	1
Foul, (Gor-)	9	Galinache,	10
Foule, (Lyke)	1	— (Oiseau appelé)	10
Founingo Maïtsou,	37	Gall,	1
— -mena-rabou,	36	— Caparut,	1
Foutivento,	27		

ALPHABETICUS.

xxxix

G. V. S.		G. V. S.	
Gall de las Indies,	2 A. 1	Gallina minor,	3 A. 2
— de Monaco,	3 C. 1	— Mozambicana,	3 4
— dels peus guarnits de	—	— (Mozambicana)	3 4
plumes,	3 A. 2	— nana,	3 2
— d'Indi,	2 1	— non caudata,	3 5
— salvatge,	5 1	— Numidica,	4 1
— (Stein-)	8 27	—	7 14
— (Steyn-)	8 27	— Patavina,	3 C. 1
— (Stone-)	8 27	— pedibus hirsutis,	3 A. 2
Galli sylvestris genus,	—	— pedibus pennatis,	3 A. 2
(Aliud)	5 A. 2	— pennis reflexis,	3 3
Gallina,	3 1	— penthactylos,	3 B. 1
— Africana,	4 1	— peregrina,	4 1
— Africana Jonstoni,	4 1	— Persica,	3 5
— alba cristata,	3 A. 1	— plumipes,	3 A. 2
— (Albini)	7 16	— pumila,	3 2
— alia Indica,	7 14	— pumilio,	3 2
— Anglicana,	3 E. 1	— quibusdam, (Numi-	—
— Bantica,	3 B. 2	dica)	4 1
— Betularum,	5 2	— rustica Bellonio,	5 3
— carne nigra,	3 4	— sylvatica, crepitans,	—
— Corylorum,	5 3	&c.	6 5
— Corylorum Aldrovan-	—	— sylvestris caudâ lon-	—
di,	5 3	giori,	7 3
— crispa,	3 3	— sylvestris Marcgravii,	6 5
— cristata,	3 A. 1	— sylvestris Marcgravio,	6 5
— di Numidia,	4 1	— Turcica,	3 D. 1
— d'India,	2 1	— villaris,	3 1
— domestica,	3 1	— villatica,	3 1
—	3 B. 1	— villatica alba cristata,	3 A. 1
— ex Persia,	3 5	Gallinaça aliis,	10 10
— Frislandica,	3 3	Gallinaceus,	3 1
— Guinea,	4 1	— (Gallus)	3 1
— Guineæ Aldrovando,	4 1	Gallinaço aliis,	10 10
— Guineensis,	4 1	Gallinarum pullus,	3 1
— Japonica,	3 6	Gallinassa aliis,	10 10
— Indica,	7 13	Gallinasso aliis,	10 10
— Indica altera,	7 14	Gallo,	3 1
— Indica prima,	7 13	— Alpestre,	5 1
— Indica tertia,	7 14	—	5 2
— lanata,	3 3	— cedrone,	5 1
— lanigera,	3 3	— di montagna,	5 1
— lanigera Indica,	3 3	— d'India,	2 1

Gallo-pavo, 2 M. 1
 — payo Brasiliensis, 2 M. 1
 — payo cristatus, 2 A. 1
 — payo sylvestris, 2 B. 1
 — payo sylvestris Novæ Angliæ, 2 B. 1
 — pavus, 2 A. 1
 — pavus Gesnero, 2 B. 1
 — salyatico, 2 B. 1
 Gallus, 2 A. 1
 — Aldrovando, (Pavus) 2 B. 1
 — alius Indicus, 2 B. 1
 — Alpinus, 2 A. 1
 — Alpinus aliis, 2 A. 1
 — Americanus, 2 B. 1
 — Anglicanus, 2 E. 1
 — Banticus, 2 B. 1
 — Betulæ, 2 B. 1
 — Betularum, 2 B. 1
 — carne nigrâ, 2 B. 1
 — clamorifer, &c. 2 B. 1
 — caudâ compressâ, &c. 2 B. 1
 — caudâ erectâ, &c. 2 B. 1
 — crispus, 2 A. 1
 — cristatus, 2 A. 1
 — domesticus, 2 B. 1
 — duplici cristâ, &c. 2 B. 1
 — ex Persia, 2 B. 1
 — Gallinaceus, 2 A. 1
 — Gallinaceus, &c. 2 A. 1
 — Gallinaceus caudâ carens, 2 B. 1
 — Gallinaceus crispus, 2 B. 1
 — Gallinaceus pumilio, 2 B. 1

Gallus Gallinaceus, 2 B. 1
 — pygæ carens, 2 B. 1
 — Guineensis, 2 B. 1
 — Japonicus, 2 B. 1
 — Indicus, 2 B. 1
 — Indicus alius Aldrovandi, 2 B. 1
 — Indicus vulgaris, 2 B. 1
 — Indicus vulgus, 2 B. 1
 — major exoticus, 2 B. 1
 — Mauritanus sylvestris, 2 B. 1
 — minor, 2 B. 1
 — minor Banticus, 2 B. 1
 — monstruosus, 2 B. 1
 — montanus, 2 B. 1
 — Mozambicanus, 2 B. 1
 — niger, &c. 2 B. 1
 — non caudatus, 2 B. 1
 — Numidicus sylvestris, 2 B. 1
 — palustris, 2 B. 1
 — parvulus, 2 B. 1
 — Patavinus, 2 B. 1
 — pedibus hirsutis, 2 B. 1
 — pedibus pennatis, 2 B. 1
 — pentadactylos, 2 B. 1
 — Persicus, 2 B. 1
 — plumipes, 2 B. 1
 — plumipes, &c. 2 B. 1
 — plumis crispis, 2 B. 1
 — pumilio, 2 B. 1
 — rectricibus carens, 2 B. 1
 — Scoticus sylvestris, 2 B. 1
 — spado, 2 B. 1
 — sylvestris, 2 B. 1
 — sylvestris Aldrovandi, 2 B. 1
 — do, 2 B. 1
 — sylvestris Gesnero, 2 B. 1
 — Turcicus, 2 B. 1
 — versicolor vulgaris, 2 B. 1
 — vertice corneo, 2 B. 1
 — Gamamah, 2 B. 1

ALPHABETICUS.

	G. V. S.			G. V. S.	
Game, (Black-)	5	2	Gerfault d'Islande,	8	A. 19
— (Grey-)	5	2	Gerzabek,	5	3
—	5	9	Gesperberte Falck,		
— (Red-)	5	9	(Grosse)	8	3
Ganga,	5	4	Gesticularius,	1	N. 2
Ganle-Ahr,	10	6	Gestrzab,	8	3
Gau,	3	1	Geyer,	10	1
Gaviaon,	8	31	— (Aas-)	10	6
Gavinello,	8	27	— (Alz-)	10	6
Gause-Aar,	9	4	— (Brand-)	8	30
Gazæ Vinago,	5	4	— (Braun Fahlc)	8	G. 4
Geau,	3	1	— (Fisch-)	8	30
Gehoeslete-Tauben,	1	A. 2	— (Gelb-braune)	8	C. 4
Gehoeslete-Tub,	1	E. 2	— (Grau weisse)	8	17
Geier,	10	1	— (Hazen-)	9	8
Geir,	10	1	— (Heuner-)	8	35
— (Afs-)	10	6	— (Hüner-)	8	28
— (Hasen-)	10	6	—	8	A. 28
Gelb-braune Geyer,	8	C. 4	— (Kib-)	10	6
Gelbliche-Eule,	12	1	— (Rauh-Fuß-)	8	C. 4
Geline,	3	1	— (Ros-)	10	6
Gelinette,	3	1	— (Rosz-)	10	6
— de boys,	5	3	— (Rothel)	8	27
Gelinote,	5		— (Schwartz-braune		
—	5	3	Fisch-)	8	29
— blanche,	5	12	— (Weiß-koepffichter-)	10	9
— de bois,	5	3	— (Weisse)	8	D. 4
— de Canada,	5	7	Geyr-Adler,	10	8
— de Canada, (Grosse)	5	8	— (Gold-)	10	5
— de la Baye de Hudson,	5	6	Ghiandaria,	1	6
— d'Ecoffe,	5	5	Ghyer, (Vogel)	10	1
— des Pyrénées,	5	4	Gibber,	2	1
— hupée,	5	9	Gier-Falck,	8	19
— hupée d'Amérique,	5	10	Gilhooter,	12	3
— hupée de Pensilvanie,	5	11	Γίρας,	10	1
Gemeiner-Falck,	8	6	Girfalco,	8	19
Gentil, (Tarsel-)	8	5	— Aldrovandi,	8	19
Gentle, (Falcon)	8	5	Girifalco,	8	19
— (Tercell-)	8	5	Girofalco,	8	19
Gepfeilte Falck, (Grosse)	8	3	— Alberti,	8	19
Ger-Falck,	8	19	Glada,	8	35
— (Falcon)	8	19	Γλαυζ,	12	4
Gerfault,	8	19	Γλαυζ,	12	5

	G. V. S.			G. V. S.	
Glead,	8	35	Grande Chouette brune,	12	4
— (Forked-tayl'd)	8	34	Grau weisse Falck,	8	17
Gled, (Black)	8	34	— weisse Geyer,	8	17
— (Bog-)	8	29	Grave-Eule,	12	3
— (Forked-tail)	8	35	Graver Meuse Ahr,	8	18
Glida,	8	34	Graw-Eule,	12	3
Glowa biala, (Sep z)	10	9	Great-brown-Owl,	12	4
Glufzec,	5	1	— Horn-Owl,	11	1
Gog,	3	1	— Horned Owl from		
Goiran,	8	33	Athens,	11	A. 1
Golab,	1	1	Grey-Game,	5	2
— Dziki Siny,	1	5	—	5	9
Gold Geyr,	10	5	— Hen,	5	2
Golden Eagle,	9	7	—	5	A. 2
— -Vulture,	10	5	— Owl,	12	3
Golebiow, (Jastrzab-)	8	3	— Owl, (Common)	12	4
Golub,	1	1	Grifon,	10	7
Gor-Cock,	5	9	Gri-gry,	8	24
— Foul,	5	9	— gry, (Efmerillon)	8	24
Goritas de Oviedo,	1	33	Grimauld,	12	3
Gorny, (Sokol)	8	9	Grimault,	12	4
Gos-Hawk,	8	3	Grimmer,	8	35
Gozal,	1	1	—	10	9
Grand Aigle de mer,	9	9	Gros Busard,	8	28
— Aigle royal,	9	7	Gross-Holtz-Tub,	1	6
— Chathuant,	11	1	— Huhu,	11	1
— Duc,	11	1	Grosse Gelinote de Ca-		
—	11	4	nada,	5	8
— Duc aux ailes noires,	11	A. 1	— Gepfeilte Falck,	8	3
— Duc de Laponie,	11	3	— Gesperberte Falck,	8	3
— Duc de Virginie,	11	2	— Perdrix,	6	4
— Duc déchauffé,	11	B. 1	— Perdrix du Brésil,	6	5
— Duc d'Italie,	11	A. 1	Grosser Berg-Fasan,	5	1
— Hibou blanc,	12	8	— Falck,	8	19
— Hibou cornu d'Athe-			— Habicht,	8	3
nes,	11	A. 1	— Hasen-Ahr,	9	9
— Vautour,	10	1	— welscher-Han,	3	C. 1
— Vautour cendré,	10	1	Ground-Dove,	1	19
Grande, (Avoltoio)	10	1	Grous, (Black-)	5	2
Grande Caille,	6	A. 14	— (Little Pin-tailed)	5	4
— Caille du Mexique,	6	19	— (Ruffed)	5	11
— Cheveche,	12	4	Grugel-Han,	5	1
— Chouerte,	12	4	Grygallus,	5	1

ALPHABETICUS.

xliij

	G. V. S.			G. V. S.	
Grygallus,	5	A. 2	Gyr, (Vultur quem Ger-		
— Aldrovando,	5	2	mani vocant Ha-		
— Gefnero,	5	2	fen-)	10	6
— major,	5	1	Gyrfalco,	8	3
— minor,	5	2	—	8	19
Γρυκάκκυξ,	5	1	— Islandicus,	8	A. 19
Gryphus,	10	12	Gyrofalco Alberto,	8	19
Gryps, (Vultur)	10	12			
Grzywacz,	1	6	H.		
— Mniefly,	1	3			
Gschlecht, (Adler)	10	2			
Gualle,	6	14	H Abch,	8	3
Guan,	2	2	Habich,	8	3
Guatla,	6	14	Habicht,	8	3
Gufo,	11	1	— (Abgerichter)	8	3
Guggel,	3	1	— (Adelicher)	8	3
Guinea-Hen,	4	1	— (Blau-)	8	11
— Hen, (White-breasted)	4	A. 1	— (Groffer)	8	3
Guiny-Hen,	4	1	— (Klein)	8	3
—	4	A. 1	— (Maeufe-)	8	32
Gul,	3	1	— Tercellin,	8	3
Gump-Hoens,	3	5	— (Voll)	8	3
Guuo,	11	1	Habigt, (Hüner-)	8	28
Gypæetus,	10	8	—	8	A. 28
Gypætos,	10	8	— (Schwartz braune)	8	E. 4
— Aldrovandi,	10	8	Hæbchle,	8	3
Γυπαετός,	10	8	Haenlin, (Jung-)	3	1
Γύπας,	10	1	Hafkin,	8	3
Γύψ,	10	1	Hager-Falck,	8	B. 4
— λαγοθήρας,	10	6	Haggard Falcon,	8	B. 4
— μεζων,	10	1	Hahn,	3	1
— μικρός,	10	5	— (Americanifche-)	7	12
Gyr,	10	1	— (Aver-)	5	1
— (Afz-)	10	6	— (Birck-)	5	2
— -Falck,	8	19	— (Brom-)	5	2
— -Falcon,	8	19	— (Englifche)	3	E. 1
— (Hafen-)	10	6	— (Haus)	3	B. 1
— (Hotz-)	10	6	— (Indianifche)	2	1
— (Keib-)	10	6	— (Klut)	3	5
— (Roffz-)	10	6	— (Krup)	3	2
— (Stein-)	10	6	— mit rauchen fuffen,		
— (Vultur quem Ger-			(Kleine)	3	A. 2
mani vocant Afz-)	10	6	— (Ur-)	5	1
			Hakus,	11	1

	G. V. S.			G. V. S.	
Halcon ,	8	4	Hafel-Hun ,	5	3
Halixætus ,	9	9	Hafen-Ahr ,	9	8
—	9	10	— Ahr , (Groffer)	9	9
Haliaetus ,	9	9	— Geir ,	10	6
Halixætus ,	9	10	— Gyr ,	10	6
Haman , (Pherak)	1	1	— Gyr , (Vultur quem		
Hamoni ,	9	9	Germani vocant)	10	6
Han ,	3	1	Haukeb ,	9	7
— (Aver-)	5	1	Haus Hahn ,	3	B. 1
— (Awer-)	5	1	— Henne ,	3	B. 1
— (Birck-)	5	2	Haus-Han ,	3	1
— (Brom-)	5	2	Haw-Ahr ,	8	35
— (Groffer Welfcher-)	3	C. 1	Hawk , (Blue)	8	17
— (Grugel-)	5	1	— (Fishing-)	8	15
— (Haus-)	3	1	— (Gos-)	8	3
— (Indianifcher-)	2	1	— (Little-)	8	25
— (Kalekuttifcher-)	2	1	— (Pigeon-)	8	21
— (Kleiner Or-)	5	2	— (Small)	8	27
— (Laub-)	5	2	— (Sparrow-)	8	1
— (Mur-)	5	5	— (Star-)	8	3
— (Ohr-)	5	1	— (Swallow-tail)	8	35
— (Or-)	5	1	Hawke ,	8	3
— (Paduanifcher-)	3	C. 1	Hazel-Hen ,	5	3
— (Spil-)	5	2	Hazen-Geyer ,	9	8
— (Spill-)	5	2	Hazle-Hun ,	5	3
— (Ur-)	5	1	Heath-Cock ,	5	2
— Ufs Africa , (Fremeu-			— Cock , (Ruffed)	5	11
der wilder)	4	1	— Hen ,	5	2
— Ufs Barbarijen , (Fre-			Heimifche-Taube ,	1	1
meuder wilder)	4	1	Helmet-Pigeon ,	1	O. 2
Hard , (Buf-)	8	32	Hem-Dufwa ,	1	1
Harecatching Vulture ,	10	6	Heman ,	1	1
Harfaong ,	12	8	Hen ,	3	1
Harpa ,	9	9	— (Bantam-)	3	B. 2
Harpe ,	9	9	— (Bufz-)	8	32
— Oppiani ,	9	9	— (Caraffow-)	7	13
Harrier , (Hen-)	8	7	— (Dunghill-)	3	1
Harrow , (Hen-)	8	7	— (Dwarf-)	3	2
Hart , (Bufz-)	8	32	— (Grey-)	5	2
Hafel-Henne ,	5	3	—	5	A. 2
— Huhn ,	5	9	— (Guinea-)	4	1
— Huhn , (Americanif-			— (Guiny-)	4	1
che)	6	20	—	4	A. 1

ALPHABETICUS.

xliv

G. V. S.

G. V. S.

Hen Harrier ,	8	7	Hibou cornu d'Athenes ,	11	A. 1
— Harrow ,	8	7	(Grand)	11	2
— (Hazel-)	5	3	— couronné ,	11	7
— (Heath-)	5	2	— d'Amérique ,	11	A. 4
— (Moor-)	5	9	— d'Italie ,	11	8
— (Mountain-)	5	1	— du Bréfil ,	11	9
— Quail ,	6	14	— du Mexique ,	11	6
— (Red Peruvian)	7	16	— (Petit)	12	5
— (White-breasted Gui- nea-)	4	A. 1	—	12	3
Henn ,	3	1	— sans cornes ,	8	19
— (Keur-)	4	1	Hierofalcho ,	8	19
Henne ,	3	1	Hierofalco Jovii ,	8	19
— (Aver-)	5	1	— Micchovitæ ,	8	19
— (Birck-)	5	2	— Paulo Jovio ,	8	19
— (Englische)	3	E. 1	Hierpe ,	5	3
— (Hafel-)	5	3	Hinnularia , (Pygargus)	9	6
— (Haus)	3	B. 1	— quibusdam ,	9	5
— (Klut)	3	5	— Roberti Constantini ,	9	6
— (Straubige-)	3	3	Hinnularius , (Pygargus)	9	6
— (Teurckische-)	3	3	Hiperionis Avis aliorum ,	9	8
— (Wollechte-)	3	3	Hoatzin ,	7	15
Herbey ,	5	12	Hoatzin ,	7	15
Hertzog ,	11	1	Hobby ,	8	20
Heteropos , (Aquila)	10	2	—	8	22
— Gesneri ,	10	2	Hobereau ,	8	20
Heteropus ,	10	2	Hobie ,	8	3
— (Aquila)	10	2	Hobreau ,	8	20
Heuner-Ahr ,	8	35	Hocco brun du Mexique ,	7	15
— Ahr , (Weiffer)	8	18	— de Cayenne ,	7	12
— dieb ,	8	35	— de Curaffow ,	7	13
— Geyer ,	8	35	— de la Guiane ,	7	12
Heunlin ,	3	1	— de Para ,	7	11
— (Junge-)	3	1	— des Amazones ,	7	13
Hjaerpe ,	5	3	— du Bréfil ,	7	11
Hibou ,	11		— du Mexique ,	7	14
—	11	1	— du Pérou ,	7	16
—	11	4	Hoek , (Slag-)	8	33
—	11	7	Hoena , (Aoker-)	6	12
—	12	3	— (Rapp-)	6	1
— blanc d'Islande ,	12	8	Hoena ,	3	1
— blanc , (Grand)	12	8	— (Kroll-)	3	3
— cornu ,	11	4	Hoens-tjuf ,	8	29
			Hœns ,	3	1

	G. V. S.			G. V. S.	
Hoens, (Gump-)	3	5	Huhn, (Feld-)	6	I
— (Tofs-)	3	A. I	— (Hasel-)	5	9
Hoger-Falck,	8	B. 4	— (Krup)	3	2
Hoilotl,	I	II	— mit rauchen fussen ,		
—	I	28	(Kleine)	3	A. 2
Hok, (Slag-)	8	33	— (Pert)	4	I
Hol-Tauben,	I	5	— (Reb-)	6	I
Holtz-Taube ,	I	3	— (Rothe - Italianische		
—	I	5	Reb-)	6	12
—	I	6	— (Schnee-)	5	12
— Taube , (Kleine)	I	3	— (Schwartz - braune-		
— Tub , (Grofs-)	I	6	Reb-)	6	2
Honey-Buzzard ,	8	33	— (Stein-)	5	12
Horn-Owl,	II	4	— (Weisse-Reb-)	6	A. I
— Owl, (Great)	II	I	Huhu,	12	3
— Owl, (Little)	II	5	— (Grofs)	II	I
— uggla ,	II	4	Huhuy ,	II	I
— ugle ,	II	4	Hulote,	II	5
Horsemen-Pigeon, (Light)	I	L. 2	—	12	3
Horsman-Pidgeon,	I	L. 2	Hun ,	3	I
Hotz-Gyr ,	10	6	— (Birck-)	5	2
Houn, (Berg-)	5	12	— (Calecutisch-)	2	I
— (Raeb-)	6	I	— (Feld-)	6	I
— (Schnee-)	5	12	— (Hasel-)	5	3
— (Schrat-)	5	12	— (Hazle-)	5	3
— (Stein-)	5	12	— (Kalekuttisch-)	2	I
— (Vaeld-)	6	I	— (Indianisch-)	2	I
— (Wyfs-raeb-)	5	12	— (Or-)	5	I
— (Wyfz-wild-)	5	12	— (Pirck-)	5	I
Houfe-Cock ,	3	I	— (Raeb-)	6	I
— Pigeon ,	I	I	— (Reb-)	6	I
Howler ,	12	3	— (Rot-)	6	12
Hrdlicze ,	I	7	— (Rot-Raeb-)	6	12
Hu , (Berg-)	II	I	— (Rott-)	5	3
Huau ,	8	35	— (Welsch-)	2	I
Hub ,	II	I	— (Welsch-Raeb-)	6	12
Hubeken ,	12	3	— (Wild-)	6	I
Huben ,	12	3	Hunckel ,	3	I
Huette ,	II	5	Hüner-Geyer ,	8	28
Huexolotl ,	10	10	—	8	A. 28
Huhn , (Americanische			— Habigt ,	8	28
Hasel-)	6	20	—	8	A. 28
— (Berg-)	5	12	— Schwantz ,	I	P. 2

ALPHABETICUS.

xlviij

G. V. S.

G. S.

Hunern, (Fasan)	7	C. I	Ιεράξ Φασσακτόνος,	8	3
Huolne,	3	I	— Φασσακτόνος,	8	3
Hüru,	II	I	Ιεράξ Φρίλλοκλος Eberi,	8	35
Hüruw,	II	I	— Φρίλλοκλος Peuceri,	8	35
Hufz-Tube,	I	I	Ιεράξ, (Φρυνολοκος)	8	33
Huw,	II	I	Ιεράξ τριόρχης,	8	32
— (Berg-)	II	I	Jerkin,	8	19
Hypæetus Aristotelis,	IO	8	Ικτίνα,	8	35
Hypætos,	IO	8	Ικτινος,	8	34
Hypotriorchis,	8	20	—	8	35
I.	—	—	Ικτίνος,	8	35
			— αϊτωόλιος,	8	34
			Ικτίνος, (Ικτος)	8	35
J Abantau,	5	3	Ικτις,	8	34
Jack,	8	23	Ικτις,	8	35
Jacobine-Pidgeon,	I	E. 2	Ικτις,	8	35
— Pigeon,	I	E. 2	Ικτος ικτίνος,	8	35
Jacu-pema,	2	2	Immutulus aliorum,	9	9
— pema Brasiliensibus,	2	2	Indian-Turtle,	1	8
— pema Brasiliensium	—	—	Indianisch-Hun,	2	I
Marcgravio,	2	2	— Teublin,	1	8
Jacurutu,	II	I	Indianische Hahn,	2	I
— Brasiliensibus,	II	I	Indianischer Han,	2	I
— Brasiliensium,	II	I	Indiot,	2	I
Jager, (Stront-)	IO	IO	Indyk,	2	I
Jambu,	6	4	Indyyski, (Kur-)	2	I
— Brasiliensibus,	6	4	Jon,	I	I
— Pisoni,	6	4	Jonah,	I	I
Japan Pea-Cock,	7	8	— (Bar)	I	I
Jarzabek,	5	3	Jonetah,	I	I
Jastrzab,	8	3	Ιποτριόρχης,	8	20
— Golebiow,	8	3	Ιπποι, (Νέοσσοι Ἰνκρακας)	3	I
— Myffy,	8	32	Ιρηξ κίρκος,	8	29
— Wielki,	8	3	Ismerlus,	8	23
Ιβινος,	9	I	— Crescentii,	8	23
Jean-le-blanc,	9	II	Italianische Reb-Huhn,	—	—
Jer-Falcon,	8	19	(Rothe-)	6	12
Ιεράξ,	8	3	Itzquauhli,	9	13
— αϊπερίας,	8	3	Jugargen,	I	I
Ιεράξ, (Λίτιος)	8	23	Jung-Haenlin,	3	I
— (Φασσακτόνος)	8	4	Junge-Heunlin,	3	I
Ιεράξ Φασσακτόνος,	8	3	— Tauben,	I	I
— Φαβοτύπος,	8	3	— Tub,	I	I

	G.	S.		G. V. S.
Junonia Avis Ovidio,	7	7	Kiezot,	8 19
Ivy-Owl, (Common)	12	1	Kijcken,	3 1
			Κίκιρρος,	3 1
K.			Κίκααν,	3 1
	G.	S.	Killing-Eagle, (Fawn-)	9 5
K Adia,	11	1	—	9 6
Kaeutzlein,	12	3	— Eagle, (Fowl-)	9 10
Κακκίβα,	6	12	Kinder Melcker,	12 1
Kalaus,	12	5	King of the Vultures,	10 11
Kalekurtifsch-Hun,	2	1	Kirch Eule,	12 2
Kalekurtifcher-Han,	2	1	— Eule, (Ulula)	12 2
Kalkon,	2	1	Kirchul,	12 2
Kalus,	12	5	Κίρρος,	8 29
Kania,	8	35	— (I'ρηξ)	8 29
— biala,	8	18	Kistrel,	8 27
Kaphan,	3	1	Kite,	8 35
Kaphtar,	1	1	— (Fen-)	8 29
— Bezar,	1	1	— (Forked-tail)	8 35
Kaplun,	3	1	— (Forked-tayl'd)	8 34
Kappaun,	3	1	— (Frog-)	8 29
Kappun,	3	1	— (Long-Winged)	8 35
Kapun,	3	1	Κλάγγος,	9 10
Kastrel,	8	27	Klein Habicht,	8 3
Kata,	5	4	— Keutzlin,	11 5
Katrakas-Katrakas,	7	3	Kleine froemdbd Kutzle,	11 5
Kautz,	12	4	— Hahn mit rauchen fuß-	
Kebuhar,	1	1	fen,	3 A. 2
Κεγχρης,	8	27	— Holtz-Taube,	1 3
Keib-Gyr,	10	6	— Huhn mit rauchen fuß-	
Κεγχρης,	8	27	fen,	3 A. 2
Kerch-Wl,	11	4	— Nacht-Eule,	11 5
Kerckunle,	12	2	— Wald Eule,	11 5
Κερκνος,	8	3	— Vuelfch Kutzle,	11 5
Kestrel,	8	27	— Wilde-Tub,	1 3
Kestrell,	8	27	Kleiner Adler,	9 8
Keuchlin,	3	1	Kleiner Berg-Fafan,	5 2
Keur-Henn,	4	1	— -Falck,	8 22
Keutzlin, (Klein)	11	5	— -Falcke,	8 22
Khi, (Chin-Tchien-)	7	10	— Or-Han,	5 2
— (Thi-)	7	1	Kleinste Rothe-Falck,	8 23
Kjaeder,	5	1	Klut Hahn,	3 5
Kiankia,	10	10	— Henne,	3 5
Kib-Geyer,	10	6	Knecht, (Fisch-)	8 32

ALPHABETICUS.

xliv

G. V. S.

G. V. S.

Knorhaan,	4	1
Kobiec,	8	22
Kobus,	8	22
Koepffichter - Geyer,		
(Weis-)	10	9
Koeppel,	8	M. 4
Koepfichte-Tauben,	1	B. 2
Kogut,	3	1
Kohl-Falcke,	8	E. 4
Kok of Inde,	2	1
Κοκκοβαρν,	12	4
—	12	5
Κοκκοβαρν Ορνις,	3	1
Kokofz,	3	1
Kokot,	3	1
Kol-Falck,	8	E. 4
— Tauben,		5
Kopff, (Weis-)	10	9
Kore,	6	1
Korea,	6	1
Koriath,	6	1
Κορκορα Ορνις,	3	1
Κορυβαρν,	3	1
Kos,	11	1
Κοθαρν,	6	12
Κοτικας μεγαλινος,	3	1
Κοτλος,	3	1
Kough-Footed Eagle,	9	4
Kretzet,	8	19
Kriefs-Duve,	1	6
Κριγν,	12	4
—	12	5
Krogulec,	8	1
Κροκίος,	3	1
Kroll-Hœna,	3	3
Kroon-Voogel,	7	6
Krope-Taube,	1	K. 2
Kropp-Dufwa,	1	K. 2
Kropper,	1	K. 2
Kruk nocny,	11	4
Krup Hahn,	3	2
— Huhn,	3	2
Krzeczot, (Rarog)	8	11

Krzepelka,	6	14
Krziepelka,	6	14
Kuijcken,	3	1
Kuken-Dieff,	8	34
Kunter,	1	1
Kuppel,	8	M. 4
Kur,	3	1
— Indyyski,	2	1
Kura,	3	1
Kuropathwa,	6	1
Kuropatwa,	6	1
— Snieczniczka,	5	12
Kuroptwa,	6	1
Kus,	11	1
Kutz,	12	5
— (Ohr-)	11	4
— (Stein-)	12	4
Kutzle, (Kleine Froemdb)	11	5
— (Kleine Vuelsch)	11	5
Kyrkio-Falck,	8	27

L.

G. S.

L Ach-Taube,	1	8
— Weihe,	8	27
Lachendes-Teublin,	1	8
Lagopodis genus, (Ter-		
tium)	5	12
Lagopus,	5	
—	5	2
— altera,	5	12
— altera Gefneri,	5	4
— altera Plinii,	5	12
— altera Plinii, Aldro-		
vandi,	5	9
— Avis Aldrovandi,	5	4
— Corylorum,	5	12
— è fusco & albo, &c.	5	3
— Jonstoni,	5	6
— maximus,	5	12
— minor Americanus,	5	1
— simpliciter,	5	10

B

	G. V. S.			G. V. S.	
Lagopus five Urogallus,			Lechûza,	12	5
&c.	5	10	Leech-Owl,	12	1
— varia,	5	12	Leg'd Partridge, (Red-)	6	10
Λαγούρουρος, (Γύψ)	10	6	Legg'd Partridge, (Red-)	6	10
Λαγώνυς,	5	12	Λίτος,	8	23
Λαγαφονος,	10	6	— ίεραξ,	8	23
Λαγαφόνος,	9	8	Leius Accipiter,	8	23
— (Astos)	9	8	Leleck,	12	2
Λαγαθουρας,	9	8	Lelek,	12	3
Lanarius,	8	16	Lerch-Faelcklin,	8	22
—	8	18	Lesser Buzzard,	8	20
— albicans,	8	18	Lézná, (Sowa)	11	1
— albus,	8	D. 4	Lich-Owl,	12	1
— albus Aldrovandi,	8	18	Liecht-blaver Blaufusz,	8	A. 9
— apud Recentiores,	8	32	Light Horsemen-Pigeon,	1	L. 2
— cinereus,	8	17	Λικαδωρος,	8	35
— Gallorum,	8	16	Litho-Falco,	8	8
— rubeus Alberti,	8	35	— Falcus,	8	8
Laneret,	8	16	Little-Hawk,	8	25
Lanete,	8	16	— Horn-Owl,	11	5
—	8	18	— Owl,	11	6
Laniarius,	8	29	—	12	5
— cinereus,	8	17	— Pin-Tailed Grouse,	5	4
— medius,	8	30	Livia,	1	3
— rufus,	8	27	Loch-Taube,	1	5
Lanier,	8	16	— Tub,	1	3
— blanc,	8	18	Lomignat, (Orzel)	9	9
— cendré,	8	17	Long-winged Kite,	8	35
— (Petit)	8	18	Loyetta,	8	1
Laniero,	8	16	Λέπη,	8	35
—	8	18	Lucharo,	12	3
—	8	32	Lucheran,	12	2
— (Terzolo)	8	16	Lucherant,	11	1
Lanius Milvus,	8	29	Luniak,	8	35
Lannar,	8	16	Lyke Foule,	11	1
Lanneret,	8	16	Lyse-Oule,	11	1
Lanoy,	8	16			
—	8	32			
Lapin, (Espece de Cheve-					
che)	12	11			
Laub Han,	5	2			
Least Barbados - Turtle,	1	19			
— Barbados Turtle-Dove,	1	19			

M.

G. S.

M	Achette,	12	3
—		12	4
Macucagua,		6	5
— Brasiliensibus,		6	5

ALPHABETICUS.

Ij

G. V. S.

G. V. S.

Macucagua Brasiliensibus			Meleagris pectore albo ,	4	A.	1
Marcgravii ,	6	5	— quibusdam ,	2		1
— Brasiliensibus Marc-			—	4		1
gravio ,	6	5	— versicolor vulgaris ,	2		1
— (Tarda)	6	5	— (Veterum)	4		1
Maeuse-Habicht ,	8	32	— vulgaris ,	2		1
Maïssou , (Founingo)	1	37	Μελεαγρίς ,	4		1
Manfart ,	1	6	Mena-rabou , (Founin-			
Manfau ,	1	6	go)	1	36	
Mansfeny ,	8	13	Menschen-Esser ,	10	10	
Mar an bas ,	8	3	Menscheneter ,	10	10	
— an baz ,	8	6	Merillo ,	8	23	
— an tih ,	8	35	Merillus Alberto magno ,	8	23	
Marchand ,	10	10	— Isidori ,	8	23	
— (Oiseau appelé)	10	10	Meristio, Recentioribus ,	8	23	
Malswy ,	9	10	Merlin ,	8	23	
Mauf-Falcke ,	8	33	Merlina ,	8	23	
Mause-Falck ,	8	22	Μερμενης ,	8	3	
Μηδικόν ὄρνειον ,	7	7	Meuse-Ahr ,	8	34	
Μηδικός (Κοτίκας)	3	1	— Ahr , (Graver)	8	18	
Meer-Adler ,	9	10	— Ahr , (Roetlichter)	9	4	
Μελαιναιετός ,	9	8	Meusfz-Ahr ,	8	32	
Melanætos ,	9	8	Μηρός , (Γούψ)	10	5	
Melanæetus ,	9	8	Mila ,	8	35	
— Raji ,	9	8	Milan ,	8	35	
— Willughbeyi ,	9	8	— de la Caroline ,	8	36	
Melanætos ,	9	8	— noir ,	8	34	
Melanaetus ,	9	8	— royal ,	8	35	
Melanætus ,	9	8	Milano ,	8	35	
— Aldrovandi ,	9	8	Milchfanger ,	12	1	
— (Aquila)	9	8	Milvio ,	8	35	
— Willughbeyi ,	9	8	Milvius ,	8	35	
Μελαναιετός ,	9	8	Milvus ,	8	28	
Μελανοαιετός ,	9	8	—	8	34	
Melcker , (Kinder)	12	1	—	8	35	
Meleagris ,	2	1	— æruginosus ,	8	29	
—	4		— æruginosus Aldrovan-			
—	4	1	di ,	8	29	
— caudam erigens ,	2	1	— ætoliis ,	8	34	
— cristatus ,	2	A. 1	— albicans ,	8	18	
— duplici ingluvie ,	10	10	— albus ,	8	18	
— Græcis ,	2	1	— albus Schwenckfel-			
— Guianensis , &c.	10	10	dii ,	8	18	

g ij

	G. V. S.			G. V. S.	
Milvus Brasiliensis, Ca-			Montanaro,	8	9
racara dictus,	8	31	Moor-Buzzard,	8	29
— Brasiliensis, Caracara			— Cock,	5	9
dictus, Marcgravii,	8	31	— Fowl,	5	9
— Caroliniensis,	8	36	— Hen,	5	9
— fuscus Schwenckfeldii,	8	34	Moreg-Zeha,	6	14
— (Lanius)	8	29	Moregzag,	6	14
— major candicans,	8	18	Morphno Congener,	9	4
— minor rubeus,	8	27	— Congener Aldrovand-		
— niger,	8	34	di,	9	4
— niger Schwenckfeldii,	8	34	Morphnos,	9	10
— palustris,	8	29	— Aldrovandi,	9	10
— primum Genus,	8	34	— Bellonii,	8	19
— regalis,	8	35	— Gesneri,	9	10
— rubeus Schwenckfel-			Móρφνος,	9	10
dii,	8	35	Morphnus,	9	10
— secundus Ulyssis Al-			— Aldrovandi, (Aquila)	9	10
drovandi,	8	35	— (Aquila)	9	10
— vulgaris,	8	35	Morski, (Orzel)	9	10
— vulgaris caudâ forci-			Moschetus,	8	1
patâ,	8	35	Moschowitterische Falck,	8	D. 4
Mirle,	8	23	Motmot Brasiliensis,		
— Alberto,	8	23	(Avis)	7	3
Mittel-Eule,	12	4	Mouchet,	8	1
— Falcke,	8	19	Mountain - Bird, (Te-		
Mitu,	7	11	cuecholi)	7	13
— (Alektor)	7	11	— Cock,	5	1
— alia species,	7	12	— Dove,	1	29
— Brasiliensibus,	7	11	— Falcon,	8	9
— Brasiliensium Marc-			— Hen,	5	1
gravii,	7	11	— Partridge,	1	29
Mituporanga,	7	12	— Witch,	1	29
— Brasiliensibus,	7	12	Mouton,	7	12
— Brasiliensibus Marc-			Mowchen,	1	F. 2
gravii,	7	12	Moyen Duc,	11	4
— Marcgravii,	7	12	— Vautour blanchâtre,	10	5
Mnicyzy, (Orzel)	9	8	— Vautour brun,	10	5
Mnieysy, (Grzywacz)	1	3	Moyton,	7	12
Mocho,	11	1	Mozambicana Gallina,	3	4
—	12	5	Muger, (An fi)	9	7
Mochuelo,	11	4	Mur-Han,	5	5
Mon-Taube,	1	B. 2	Muscet,	8	1
Montagner,	8	9	Muschet,	8	1

ALPHABETICUS.

liij

	G.	S.		G. V. S.
Muffol, (Duc)	11	1	Nifus sagittatus,	8 1
Mutu,	7	11	— sagittatus alter,	8 1
—	7	13	— striatus,	8 1
— (Alektor)	7	11	— Veterum,	9 9
— alia species,	7	12	Nocny, (Kruk)	11 4
— Brasiliensibus,	7	11	Noctua,	11 1
— Brasiliensium Marc-			—	12 4
gravii,	7	11	—	12 5
— -poranga,	7	12	— aucuparia,	11 5
Mwyr-Cok,	5	5	— aurita,	11 4
Myrle,	8	23	— aurita Schwenckfel-	11 4
Myffy, (Jastrzab)	8	32	dii,	11 4
			— Brasiliensis Marcgra-	11 8
			vii,	12 11
			— Coquimbana,	12 5
			— funerea,	12 2
			— guttata,	12 10
			— Junceti,	12 1
			— major,	12 3
			—	12 4
			— maxima,	11 1
			— Mexicana,	12 10
			— Mexicana Chichiſtli	12 9
			dicta,	12 5
			— minima,	11 5
			— minor,	12 5
			—	12 4
			— minor aurita,	12 5
			— parva, aucuparia,	12 4
			— faxatilis,	12 4
			— faxatilis Aldrovan-	12 4
			di,	12 4
			— faxatilis Helvetio-	12 4
			rum,	12 8
			— Scandiana,	12 8
			— Scandiana maxima,	12 8
			&c.	12 4
			— sylvarum,	12 5
			Noctux genus parvum,	12 2
			Norvegische-Tauben,	1 1
			Numidica Avis,	2 1
			— Gallina quibusdam,	4 1

G. V. S.

P.

Otorno,	5	12
Otus,	11	4
—	11	A. 4
— alter,	11	4
— Turneri,	12	2
— Willughbeyi,	11	4
Ovassou, (Ovyra)	10	12
Oule, (Lyfe-)	11	1
— (Shriche)	11	1
Ouroua,	10	10
Owl,	12	3
— (Barn-)	12	2
— (Black-)	12	3
— (Brown-)	12	1
— (Church-)	12	2
— (Common brown-)	12	1
— (Common Grey)	12	4
— (Common Ivy-)	12	1
— (Common White-)	12	2
— Eagle-)	11	1
— from Athens, (Great Horned)	11	A. 1
— (Great-brown-)	12	4
— (Great Horn-)	11	1
— (Grey)	12	3
— (Horn-)	11	4
— (Leech-)	12	1
— (Lich-)	12	1
— (Little)	11	6
—	12	5
— (Little Horn-)	11	5
— (Screech-)	12	1
— (Scritch-)	12	1
— (White-)	12	2
— (Whooping)	12	3
Ovyra Ovassou,	10	12
Ὀυράξ,	5	1
Ozel,	9	1
Ὀϊδος Ὀφίς,	3	1
Ὀρος,	11	4
Ὀρος,	12	2

G. V. S.

Paafuel,	7	7
Paduanischer-Han,	3	C. 1
Pagelun,	7	7
Pago,	7	7
Pagone,	7	7
παγάρι,	7	7
Paloma,	1	1
— torcatz,	1	6
Palomas Tortoras Ovie-		
di,	1	7
Palumbella,	1	3
Palumbes major,	1	6
— minor,	1	3
— rupicola,	1	4
— torquatus,	1	6
Palumbo,	1	1
Palumbulus,	1	3
Palumbus,	1	6
— Amboinenfis,	1	42
— Carolinienfis,	1	12
— cicur,	1	E. 2
— cœruleus Madagasca-		
riensis,	1	36
— major,	1	6
— major Aldrovandi,	1	6
— minor,	1	3
— Moluccenfis,	1	41
— Plinio,	1	6
— rupicola,	1	4
— torquatus,	1	6
— torquatus Aldrovan-		
di,	1	6
— torquatus Gesnero &		
Aldrovando,	1	6
— viridis Madagasca-		
riensis,	1	37
Paofogel,	7	7
Paon,	7	7
— blanc,	7	B. 7
— de la Chine,	7	9
— du Japon,	7	8

	G. V. S.			G. V. S.	
Perdris,	6	1	Perdrix rouge,	6	10
— aux pieds rouges,	6	10	—	6	12
— blanche,	5	12	— rouge blanche,	6	A. 10
— de Damas,	5	4	— rouge de Barbarie,	6	11
— de Syrie,	5	4	— rouffe,	1	27
— des champs,	6	1	Περνιπέρι,	1	1
— des Terres Neufves,	4	1	Περνιπέρι Οικιδία,	1	1
— gaille,	6	10	Περνιπέρι,	1	1
— gaule,	6	10	Περνιπέριδης,	1	1
— gaye,	6	10	Περνιπέρος,	1	1
— goache,	6	1	Πέρνιξ,	6	1
— griesche,	6	1	Περκινόπτερος,	10	8
— gringette,	6	1	Περκνος,	9	10
— grise,	6	1	Perl Eule,	12	2
— rouge,	6	10	Pernice,	6	1
Perdrix,	1	14	Pernigona,	6	1
—	5	12	Pernijffe,	6	12
—	6		Pernis Alpedica,	5	3
—	6	1	Pernisa,	6	12
— Américaine,	6	7	Pernise blanche della		
— aux pieds rouges,	6	12	montaigne,	5	12
— blanche,	5	12	Pernifette,	6	1
— d'Amérique,	6	7	Pernifo,	6	12
— de Damas,	6	B. 1	Pernisse,	6	10
— de Grece,	6	12	—	6	12
— de la Chine,	6	9	Persian-Pigeon,	1	H. 2
— de la Martinique,	1	29	Πέρσικοι ὄρνις,	3	1
— de la Nouvelle An-			Πέρσικον ὄρνειον,	7	7
gleterre,	6	6	Pert Huhn,	4	1
— de montagne,	6	2	Perturbateur des Poules,	8	7
— de montagne du Me-			Peruvian Hen, (Red)	7	16
xique,	6	3	Petit Aigle à queue blan-		
— de prairies,	6	13	che,	9	6
— du Brésil,	6	4	— Chathuant,	12	2
— du Brésil, (Grosse)	6	5	— Chathuant plombé,	12	2
— du Sénégal,	6	8	— Coq de Bruyere aux		
— franche,	6	10	deux aiguilles à la		
— gaille,	6	12	queue,	5	4
— gaule,	6	12	— Duc,	11	5
— gaye,	6	12	— Duc de la Caroline,	11	6
— gouache,	6	1	— Epervier,	8	2
— grise,	6	1	—	8	25
— grise blanche,	6	A. 1	— Faucon-Chouette,	12	7
— (Grosse)	6	4	— Hibou,	11	6

ALPHABETICUS.

lix

	G. V. S.			G. V. S.	
Petit Hibou,	12	5	Phasianus albus,	7	B. 1
— Lanier,	8	16	— albus Sinensis,	7	5
Petite Aigle noire,	9	8	— Antillarum,	7	2
— Cheveche,	12	5	— aureus Sinensis,	7	4
— Chouette,	12	5	— Brasiliensis Jacu-pema		
— Tourterelle brune			dictus Marcgravii,	2	2
d'Amérique,	1	20	— Capitolino,	7	1
— Tourterelle d'Améri-			— cristâ flavâ, &c.	7	4
que	1	19	— cristatus Indicus,	7	6
— Tourterelle tachetée,	1	19	— fuscus,	7	9
Pfaewin,	7	7	— fuscus Brasiliensis,	2	2
Pfau,	7	7	— Guianensis,	7	3
— (Bunte)	7	A. 7	— hybridus,	7	C. 1
— Taube,	1	P. 2	— Insularum Antillarum,		
— (Weisse)	7	B. 7	D. Du Tertre,	7	2
Pfaw,	7	7	— montanus,	5	2
— (Weisser)	7	B. 7	— niger, &c.	7	11
Phabes,	1	3	—	7	12
Φαβοκτόνος,	8	3	—	7	13
Φαβοκτόνος, (Ιερὰξ)	8	3	— patrius,	7	16
Φαβοτύπος,	8	3	— Pavoneus,	7	9
Φαβοτύπος, (Ιερὰξ)	8	3	— sanguineus,	7	4
Φαβς,	1	3	— simpliciter,	7	1
Phaïsan,	7	1	— Sinensis, &c.	7	5
— Belles - couleurs de la			— varius,	7	A. 1
Chine,	7	4	— vulgaris,	7	1
— blanc de la Chine,	7	5	Phasidis Ales,	7	1
— de Carasow,	7	13	— Ales Statio,	7	1
— de la Chine noir &			Φασσα,	1	6
blanc,	7	5	Φασσοκτόνος,	8	3
— de la Chine, (Paon-)	7	9	— (Ιερὰξ)	8	3
— rouge de la Chine,	7	4	Φασσοφόνος, (Ιερὰξ)	8	3
Φαα,	1	6	Φασσοφόνος,	8	3
Φάικων,	8	4	— Ιερὰξ,	8	4
Φαλκωνος,	8	4	Φατλα,	1	6
Φαπς,	1	3	Pheasant,	7	1
Φαψ,	1	6	— (China-)	7	4
Φασα,	1	6	— (White China-)	7	5
Phasianophonus,	8	3	Φηνή,	9	9
Φασσιανός,	7	1	Φήνης,	9	9
Φασσιανός,	7	1	Pherak Haman,	1	1
Phasianus,	7		Φινς,	9	9
—	7	1	Φωή,	9	9

	G. V. S.		G. V. S.
Φρύνκολος Eberi, (Ιεραξ)	8 35	Pigeon de montagne du	
— Peuceri, (Ιεραξ)	8 35	Mexique,	I 28
Φρύνκολος,	8 33	— de Nincombar,	I 44
Φρύνκολος ιεραξ,	8 33	— de Norvège,	I C. 2
Piailleur,	10 10	— de passage,	I 12
Picacuroba,	I 18	— de roche,	I 4
— Brasiliensibus,	I 18	— de roche de la Jamaï-	
Piccione,	I I	que,	I 33
Picuipinima,	I 19	— des Indes,	I 15
— Brasiliensibus,	I 19	— domestique,	I I
Pidgeon, (Common-		— du Mexique,	I 10
Wild-)	I I	— frisé,	I G. 2
— (Horsman-)	I L. 2	— from the Ninkcombar,	I 44
— (Jacobine-)	I E. 2	— fuyard,	I 5
— (Rock-)	I 4	— grand gosier,	I K. 2
— (Wood-)	I 5	— Hawk,	8 21
Pigeon,	I I	— (Helmet-)	I O. I
—	I I	— (Houfe-)	I I
— à chaperon,	I E. 2	— hupé,	I B. 2
— à gorge frisée,	I F. 2	— Jacobin,	I E. 2
— à la couronne blanche,	I 33	— (Jacobine-)	I E. 2
— à l'aile verte,	I 42	— (Light Horsmen-)	I L. 2
— à longue queue,	I 13	— Messager,	I I. 2
— à queue annelée de la		— Nonain,	I E. 2
Jamaïque,	I 34	— of passage,	I 12
— aux taches triangulai-		— Paon,	I P. 2
res,	I 30	— paté,	I E. 2
— (Barbary-)	I D. 2	— patu,	I A. 2
— barré,	I 17	— (Persian-)	I H. 2
— batteur,	I M. 2	— privé,	I I
— bleu du Mexique,	I 35	— ramier,	I 5
— brun des Indes,	I 15	—	I 6
— (Carrier-)	I I. 2	— ramier bleu de Mada-	
— Cavalier,	I L. 2	gaspar,	I 36
— (Clapper-)	I N. 2	— ramier d'Amboine,	I 42
— (Common-)	I I	— ramier des Moluques,	I 41
— (Common-Wild-)	I I	— ramier verd de Mada-	
— cuirassé,	I O. 2	gaspar,	I 37
— culbutant,	I N. 2	— (Ring-Tail)	I 34
— de Barbarie,	I D. 2	— (Ring-Tail'd)	I 34
— de Guinée,	I 30	— Romain,	I 2
— de la Jamaïque,	I 31	— (Rough-Footed-)	I A. 1
— de la Martinique,	I 14	— roux de Cayenne,	I 29

ALPHABETICUS.

1xj

	G. V. S.			G. V. S.	
Pigeon, (Runt-)	I	2	Poule de Guinée,	4	A. I
— sauvage,	I	5	— de la Guinée,	4	I
— sauvage d'Amérique,	I	12	— de Mozambic,	3	4
— sauvage du Mexique,	I	11	— de Padoue,	3	C. I
— sauvage ordinaire,	I	I	— de Perse,	3	5
— (Smiter-)	I	M. 2	— de Turquie,	3	D. I
— trembleur,	I	Q. 2	— d'Inde,	2	I
— (Tumbler-)	I	N. 2	— du Japon,	3	6
— (Turbit-)	I	F. 2	— frisée,	3	3
— Turc,	I	H. 2	— hupée,	3	A. I
— (Turkey-)	I	H. 2	— naine,	3	2
— verd d'Amboine,	I	39	— negre,	3	4
— verd de l'Isle S. Tho-			— noire des montagnes		
mas,	I	40	— de Moscovie,	5	I
— verd des Philippines,	I	38	— patue,	3	A. 2
— violet de la Martini-			— Pintade,	4	I
que,	I	27	— rouge du Pérou,	7	16
— (White-Crown'd-)	I	33	— sans croupion,	3	5
— (Wood-)	I	5	— sauvage,	7	3
Pin-Tailed Grouse, (Lit-			Poulet,	3	I
tle)	5	4	Poulsin,	3	I
Pintade, (Poule)	4	I	Pouts,	5	9
Pintado,	4	I	Poyana,	8	32
Pirck-Hun,	5	I	—	8	35
Πλάγγος,	9	10	Przedni, (Orzel)	9	7
Planca aliorum,	9	10	Przepiorka,	6	14
Planga,	9	10	Pfophia crepitans, &c.	6	5
— aliorum,	9	10	Ptarmigan,	5	12
— (Aquila)	9	10	Puhacz,	11	I
Ploch-Taube,	I	6	Puhuy,	11	I
— Tub,	I	6	Pulcino,	3	I
Poes,	7	12	Pullicenus quinque digi-		
Polak, (Rarog)	8	11	tis in utroque pede,	3	B. I
Pollastro,	3	I	Pullus, (Gallinarum),	3	I
Pollo,	3	I	Pusch-Eule,	12	3
Popielaty, (Sep)	10	6	Puffczyk,	12	3
Poranga, (Mutu-)	7	12	Pustolka,	8	27
Portugal-Dove,	I	9	Pufzczyk,	12	3
Poule,	3	I	Pufzyk,	12	3
— à cinq doigts,	3	B. I	Pattock,	8	32
— commune,	3	I	—	8	35
— d'Angleterre,	3	E. I	Pygargi secundum genus,	9	11
— de Bantam,	3	B. 2	— tertium genus,	8	17

ALPHABETICUS.

lxiii

G. V. S.

G. V. S.

Red-Legg'd Partridge, 6 10
 — Peruvian Hen, 7 16
 Reger-Falck, 8 19
 Regina Aurarum, 10 11
 — Aurarum Nierember-
 gii, 10 11
 Reuffische-Tauben, 1 A. 2
 Rex Vulturum, 10 11
 Rhoncas, 5 12
 Ring-Dove, 1 6
 — Duffwa, 1 6
 — Duve, 1 6
 — tail, 8 7
 — tail Pigeon, 1 34
 — tail'd Pigeon, 1 34
 Ringel-Taube, 1 6
 — Tub, 1 6
 Ripa, 5 12
 — (Snoe-) 5 12
 Riper, (Snoe-) 5 12
 Rocham, 10 1
 — 10 8
 Rocheraye, 1 4
 — blanc, 1 A. 4
 Rochier, 8 8
 Rock-Pidgeon, 1 4
 Roetel-Weib, 8 27
 — Weih, 8 27
 Roetlichter Meuse Ahr, 9 4
 Rohr-Ahr, 8 32
 — Falck, 8 29
 — Falcke, 9 10
 Roi des Vautours, 10 11
 Roode Valck, 8 H. 4
 Roof-Cock, 3 1
 Ros-Geyer, 10 6
 Roslare, 5 A. 2
 Rossz-Gyr, 10 6
 Rossz-Geyer, 10 6
 Rot-Hun, 6 12
 — Raeb-Hun, 6 12
 Roter-Falck, 8 H. 4
 Rothe-Falck, 8 27

Rothe-Falck, (Kleinste) 8 23
 — Italianische Reb-
 Huhn, 6 12
 Rothel Geyer, 8 27
 Rott-Hun, 5 3
 Rottel-Wy, 8 35
 Roug-Footed-Dove, 1 A. 2
 — Footed-Pigeon, 1 A. 2
 Rubetarius Accipiter, 8 33
 Ruffed Grouse, 5 11
 — Heath-Cock, 5 11
 Rumkin, 3 5
 Runt Pigeon, 1 2
 Ruta, 12 3
 Ruttel-Wy, 8 35
 Rüttelweyh, 8 32
 Rüttelwy, 8 32
 Ryphen, 5 12
 Ryper, 5 12
 S.

G. V. S.

Sacer Ægyptius Bello-
 nii, 10 3
 Sacker, 8 M. 4
 Sacre, 8 M. 4
 — d'Egypte, 10 3
 — Egyptien, 10 3
 Sacret, 8 M. 4
 Sacro, 8 M. 4
 Saker, 8 M. 4
 Sakvia, 3 1
 Salui, 6 14
 Saphina, 1 7
 Saphnina, 1 7
 Saffarolo, 1 5
 Scahau, 9 10
 Schaffielt, 12 5
 Schahau, 9 10
 Schelau, 6 14
 Scheuffel, 11 1
 Schlag-Taube, 1 1
 — Tub, 1 6
 — Tub, (Zame-) 1 E. 2

	G. V. S.			G. V. S.	
Schleier-Eule,	12	2	Sep z glowa biala,	10	9
Schleier Eule,	12	2	Σίρκος,	3	3
Schleyer-Taube,	1	E. 2	Shaker, (Broad-Tail'd)	1	P. 2
Schleyereul,	12	2	— (Narrow-Tail'd)	1	Q. 2
Schmatz, (Stein-)	8	27	Shaliu,	6	14
Schmeyer,	8	16	Shriche Oule,	11	1
Schnee-Houn,	5	12	Si muger, (An)	9	7
— Huhn,	5	12	Sikvi,	3	1
— Vogel,	5	12	Simulacrum, (Coturni-		
Schrat-Houn,	5	12	cis)	6	20
Schuffanz,	11	1	Sinogàrlìcà,	1	7
Schuffaufz,	11	1	Siny, (Golab Dziki)	1	5
Schuffeul,	11	1	Siricach,	8	27
Schuffut,	11	1	Σισίλαρος,	6	1
Schwartz-braune Adler,	9	8	Siutut,	1	6
— braune Falck,	8	4	Skaft,	9	9
— braune Fisch-Geyer,	8	29	Σκλόφ,	11	1
— braune Habigt,	8	E. 4	Skogs-Dufwa,	1	5
— braune-Reb-Huhn,	6	2	Σκώφ,	11	5
Schwartzzer Adeler,	9	8	Slag-hoek,	8	33
— Adler,	9	8	— hok,	8	33
— Ahr,	9	8	Small Hawk,	8	27
Schwantz, (Huner-)	1	P. 2	Smeriglio,	8	23
Schweimmen,	8	18	Smerillus,	8	23
Schwemmer,	8	35	— Gesnero,	8	23
Schwimmer,	8	34	— Schwenckfeldij,	8	23
Schuyffut,	11	1	— Turnero,	8	23
Scops,	11	4	Smerla,	8	23
— Aldrovandi,	11	5	Smerlo,	8	23
— Aldrovandi, (Ulula)	11	5	Smerlus,	8	20
— Caroliniensis,	11	6	—	8	23
— Plinii,	11	5	Smirle,	8	23
Screech-Owl,	12	1	Smirlein,	8	23
Scritch-Owl,	12	1	Smirlin,	8	23
Sea-Eagle,	9	9	Smyrle,	8	23
—	9	10	Smyrlein,	8	23
Seda,	8	35	Smyrlin,	8	23
Selau,	6	14	Smiter-Pigeon,	1	M. 2
Σέλκος,	3	1	Snieczniczka, (Kuopatwa)	5	12
Semp,	10	1	Snoe-Ripa,	5	12
Sep,	10	1	— Riper,	5	12
— popielaty,	10	6	Socker-Falck,	8	M. 4
			Sofer,	9	10
			Soker		

ALPHABETICUS.

Ixv

	G. V. S.			G. V. S.	
Soker,	9	10	Stein-Adler,	9	4
Sokol,	8	1	— breucchel,	9	9
—	8	4	— Eule,	12	4
— drzewny,	8	20	— Falck,	8	8
— gorny,	8	9	—	8	9
— wodny,	8	29	— gall,	8	27
Sonalis, (Coli)	6	18	— Gyr,	10	6
— (Colli)	6	18	— Houn,	5	12
Sorella,	12	12	— Huhn,	5	12
Soriguer,	12	3	— Kutz,	12	4
Sowa,	12	3	— Schmatz,	8	27
—	12	4	— Taube,	1	3
— Lézná,	11	1	— Tauben,	1	3
— uffata,	11	4	Steinauff,	11	1
Sowka,	11	5	Steyn-gall,	8	27
—	12	3	Stock Ahr,	8	3
Spanish Partridge,	6	10	— Dove,	1	3
Sparavero,	8	1	—	1	5
Sparavier,	8	1	— Eul,	12	3
Sparaviero,	8	1	— Eule,	11	5
Sparshoek,	8	1	—	12	1
Sparshok,	8	1	Stocker-Falcke,	8	M. 4
Sparhawk,	8	1	Stolco,	5	1
Sparrow-Hawk,	8	1	Stolgo,	5	1
Sparverius,	8	1	Stolzo,	5	1
Sparviero,	8	1	Stone-Falcon,	8	8
Species, (Falconum)	8	E. 4	— gall,	8	27
Sperber,	8	1	Stos-Faelcklin,	8	22
Sperwer,	8	1	— Falcke,	8	M. 4
Spil-Han,	5	2	Stofz-Vogel,	8	35
Spill-Han,	5	2	Straubige-Henne,	3	3
Σπιγλας,	8	1	Strix,	12	
— Σπαζ,	8	1	—	12	1
Σπιγλινς,	8	1	— alba Freti Hudsonis,	12	8
Sprintz,	8	1	— Aldrovandi,	12	1
— Blaw-Fufz,	8	A. 9	— Aldrovandi, (Ulula)	12	1
Sprintzel,	8	1	— aliorum,	12	1
Sprintzle,	8	1	— aliorum, (Ulula)	12	1
Sprintzling,	8	1	— Canadensis,	12	6
Stanchel,	8	27	— capite aurito, &c.	11	1
Stannell,	8	27	—	11	3
Star-Hawk,	8	3	—	11	4
Starna,	6	1	— capite lævi, &c.	12	1

	G.	S.	G. V. S.
Strix capite laevi, &c.	12	2	Tailed Grouse, (Little
—	12	3	Pin-)
—	12	4	Taïs,
—	12	5	Taon,
—	12	8	Taais,
— cinerea,	12	3	Taraphitha,
— cinerea Willughbeyi,	12	3	Tarda Macucagua,
— flammea,	12	2	Tarnagola,
— Freri Hudsoni,	12	7	Tarnegul,
— Gesneri,	12	1	Tarnegula,
— Gesneri, (Ulula)	12	1	Tarsel-Gentil,
— Mexicana,	12	9	Tavas,
— minor,	12	1	Taube,
Σριξ,	12	1	— (Americanische-)
Stront-Jager,	10	10	— (Blau-)
— Vogel,	10	10	— (Feld-)
Subbuteo,	8	7	— (Flug-)
—	8	20	— (Heimische-)
— Aldrovandi,	8	20	— (Holtz-)
— Bellonii,	8	20	—
— Turneri,	8	7	—
Suglun,	7	1	— (Kleine Holtz-)
Sup,	10	1	— (Kroepe-)
Surglun,	7	1	— (Lach-)
Swallow-Tail Hawk,	8	36	— (Loch-)
Swarthy Vulture,	10	4	— (Mon-)
Swemere,	8	16	— (Paruquen-)
—	8	18	— (Pfau-)
Suyuntu,	10	10	— (Ploch-)
Σορπιον,	12	1	— (Ringel-)
Συροπεριδξ,	5	4	— (Schlag-)
Szowa,	12	5	— (Schleyer-)
T.	—	—	— (Stein-)
8	G. V. S.	—	— (Trummel-)
T Aera,	11	1	— (Tummel-)
T Tagarot,	8	20	— (Turkische-)
Ταγινερε,	5	9	— (Turtel-)
Tail Gled, (Forked-)	8	35	— (Wilde-)
— Hawk, (Swallow-)	8	35	—
— Kite, (Forked-)	8	35	— (Zahme-)
— (Ring-)	8	7	— (Zame-)
Tail'd Shaker, (Broad-)	1	P. 2	— (Zwitter Turtel-)
— Shaker, (Narrow-)	1	Q. 2	Tauben, (Blawe-)

ALPHABETICUS.

ixvij

	G.	V.	S.		G.	S.
Tauben-Falck,	8	3		Tetrao major Gefneri,	5	1
— Falck Eberi,	8	3		— minor,	5	2
— Falck Peuceri,	8	3		— minor aliis,	5	2
— Falcke,	8	3		— minor foemina,	5	2
— (Gehoeffete-)	1	A. 2		— pedibus nudis, &c.	6	14
— (Hol-)	1	5		— Plinii,	5	1
— (Junge-)	1	1		— rectricibus, &c.	5	1
— (Kœppichte-)	1	B. 2		— rectricibus albis, &c.	5	12
— (Kol-)	1	5		— rectricibus cinereis,		
— (Norvegische-)	1	C. 2		&c.	5	3
— (Rauchfeuffige-)	1	A. 2		—	6	12
— (Reuffische-)	1	A. 2		— remigibus secundariis,		
— (Stein-)	1	3		&c.	5	2
— (Turn-)	1	3		Tetraon minor,	5	2
— (Wilde-)	1	5		— Plinii,	5	1
— (Wollechte-)	1	G. 2		Tetrax,	5	2
Tayld Glead, (Forked-)	8	34		— Nemesiani Poetae,	5	1
— Kite, (Forked-)	8	34		— Nemesiano,	5	2
Tche-Gou,	6	9		Tetrez,	5	1
Tchien-Khi, (Chin-)	7	10		Tetrix Aristotelis,	5	1
Tecolotl,	11	9		Tetrix,	5	1
Tecuecholi Mountain-				Tetrzew,	5	1
Bird,	7	13		Teuber,		1
Tecuocholli,	7	12		Teubin,		1
Teperototl,	7	12		Teuble,		1
Tercell,	8	3		Teublin,		1
— -Gentle,	8	5		— (Indianisch-)	1	8
Tercellin, (Habicht)	8	3		— (Lachendes-)	1	8
Terfese,	3	1		— (Turckisch-)	1	8
Tertium Lagopodis Ge-				Teurckische-Henne,	3	3
nus,	5	12		Thi-Khi,	7	1
Terzolo,	8	3		Thor,		7
— d'Aquila,	9	7		Tjaeder,	5	1
— Laniero,	8	16		Tiercelet,	8	3
Tetaru,	1	7		Tih, (Mar an)	8	35
Tetrao,	5	1		Tinamou,	6	4
—	5	2		Tinnunculus,	8	27
—	7	1		— Accipiter,	8	27
— alius,	5	1		— Aldrovandi,	8	27
— caudâ bifurcâ, &c.	5	A. 2		— alter,	8	27
— lineâ, &c.	6	6		— Columellæ,	8	27
— maculâ nudâ, &c.	6	1		— Plinio,	8	27
— major Aldrovandi,	5	1		— verus,	8	27

	G. V. S.		G. V. S.
Tish-Falcon,	8 M. 4	Tourterelle rachetée,	
Tjuf, (Hoens-)	8 29	(Petite)	1 19
Tlacahoilotl,	1 35	— verte d'Amboine,	1 43
Tlaplalcocotli,	1 20	Tree-Falcon,	8 20
Tlotli,	8 E. 4	Trencalos,	10 8
Tofs-Heens,	3 A. 1	Triorches,	8 32
Tolchiquatli,	12 10	Τριόρχης,	8 32
Tor,	1 7	— (Ιεράξ)	8 32
Torn-Falck,	8 27	Triorchis,	8 32
Torquato,	1 6	— (Buteo)	8 32
Tortola,	1 7	Tristarello,	8 27
Tortole,	1 7	Tristinculo,	8 27
Tortolilla,	1 7	Tristunculus Gazæ,	8 27
Tortora,	1 7	Trompetero,	6 5
— nostrale,	1 7	Trompette, (Oiseau-)	6 5
Tortore,	1 7	Tronfo,	1 2
Tortorella,	1 7	Tropillotl,	10 10
Tortorelle,	1 7	Trukawka,	1 3
Tortra Coloma,	1 7	—	1 7
Torá,	12 4	Trummel-Taube,	1 A. 2
Torá,	12 5	Τρυγών,	1 7
Tourte,	1 7	Τρυγών,	1 7
Tourterelle,	1 7	Τρυγών,	1 7
— à collier,	1 8	Tschasarmadâr,	5 3
— à collier du Sénégal,	1 24	Tub,	1 1
— à gorge rachetée du	1 25	— (Gehoesflete-)	1 E. 2
Sénégal,	1 25	— (Gros-Holtz-)	1 6
— brune d'Amérique,	1 20	— (Junge-)	1 1
(Petite)	1 20	— (Kleine Wilde-)	1 3
— d'Amboine,	1 26	— (Loch-)	1 3
— d'Amérique,	1 13	— (Ploch-)	1 6
— d'Amérique, (Petite)	1 19	— (Ringel-)	1 6
— de Canada,	1 21	— (Schlag-)	1 6
— de la Caroline,	1 18	— (Turtel-)	1 7
— de la Jamaïque,	1 32	— (Welsche-)	1 E. 2
— de Portugal,	1 19	— (Zame-Schlag-)	1 E. 2
— des Indes,	1 8	Tube, (Hufz-)	1 1
— du Cap de Bonne Es-	1 22	Tudon,	1 6
pérance,	1 22	Tuidara,	12 2
— du Sénégal,	1 23	— Brasiliensibus,	12 2
— mulier,	1 A. 8	Tuk,	7 7
— rayée de la Chine,	1 16	Tumbler-Pigeon,	1 N. 2
— rayée des Indes,	1 17	Tummel-Taube,	1 N. 2

ALPHABETICUS.

lxix

G. V. S.

G. V. S.

Tummler,	1	N. 2	Turtur gutture maculato		
Tunis-Falcon,	8	A. 6	Senegalenfis,	1	25
Tupp,	3	1	— hybridus,	1	A. 8
Turbit-Pigeon,	1	F. 2	— Jamaicensis,	1	32
Turckisch-Teublin,	1	8	— Indiæ Orientalis, (Co-		
Turkey,	2	1	lumba)	1	17
— -Buzzard,	10	10	— Indica Aldrovandi,		
— (Crested-)	2	A. 1	(Columba)	1	8
— (New-England Wild-)	2	B. 1	— Indicus,	1	8
— -Pigeon,	1	H. 2	—	1	19
Turkische-Taube,	1	H. 2	— Indicus Aldrovandi,	1	8
Turkey-Cock,	2	1	— Indicus striatus,	1	17
Turn-Tauben,	1	3	— Lusitanus,	1	9
Turtel,	1	7	— minimus alis maculo-		
— -Duve,	1	7	sis,	1	19
— -Taube,	1	7	— minimus guttatus,	1	19
— -Taube, (Zwitter)	1	A. 8	— mixtus,	1	A. 8
— -Tub,	1	7	— nostras Schwenckfel-		
Turtell,	1	7	dii,	1	7
Turterelle,	1	7	— parvus Americanus,	1	19
Turtle,	1	7	— parvus, fuscus, Ame-		
— -Dove,	1	7	ricanus,	1	20
— -Dove from Jamaica,	1	32	— rubens, &c.	1	29
— -Dove from the east			— Senegalenfis,	1	23
Indies,	1	8	— Sinensis striatus,	1	16
— -Dove, (Least Barba-			— torquatus,	1	8
dos-)	1	19	— torquatus Senegalen-		
— (Indian-)	1	8	sis,	1	24
— (Least Barbados-)	1	19	— Turcicus,	1	8
— of Carolina,	1	18	— viridis Amboinensis,	1	43
Turtrelle,	1	7	Turtura,	1	7
Turtur,	1	7	Tzierziabek,	5	3
— Amboinensis,	1	26	Tzopilotl,	10	10
— Americanus,	1	13			
— auritus,	1	7	V.		
— Barbadenfis minimus,	1	19			
— Canadensis,	1	21	V Aeld-Houn,	6	1
— Capitis Bonæ Spei,	1	22	Vaher, (Wannen-)	8	27
— Carolinienfis,	1	18	Valck,	8	4
— Carolinienfis, (Co-			— (Roode)	8	H. 4
lumba)	1	18	Valeria Aldrovandi,	9	8
— (Columba)	1	7	— Aquila,	9	8
— -Dufwa,	1	7	— (Aquila)	9	8
			Valke,	8	4

G. V. S.

	G.	S.		G.	S.
Vanner, (Wind-)	8	27	Ulula,	12	3
Vaulteur,	10	1	—	12	4
Vauteur,	10	1	— alba, &c.	12	8
Vautour,	10	—	— Aldrovandi,	12	3
—	10	1	— alia,	12	2
—	10	7	— Aluco Aldrovandi,	12	2
— à tête blanche,	10	9	— Afio,	11	4
— (Aigle-)	10	8	— Brasiliensis,	11	8
— blanchâtre, (Moyen)	10	5	— cinerea, &c.	12	2
— brun,	10	2	— coloris plumbei, &c.	12	3
— brun, (Moyen)	10	5	— cunicularia,	12	11
— cendré, (Grand)	10	1	— è cinereo Boetica,	12	1
— d'Egypte,	10	3	— flameata,	12	2
— des Alpes,	10	8	— flameata Gefneri,	12	2
— des Indes,	10	11	— flameata Schwenckfel-		
— doré,	10	5	dii,	12	2
— du Brésil,	10	10	— flammeata,	12	2
— (Espece de)	9	9	—	12	4
— fauve,	10	7	— Gefneri,	12	3
— (Grand)	10	1	— Kirch Eule,	12	2
— hupé,	10	6	— Latinis,	12	3
— noir,	10	4	— Scops Aldrovandi,	11	5
— (Quelque espece			— Strix Aldrovandi,	12	1
de)	9	9	— Strix aliorum,	12	1
Vautours, (Roi des)	10	11	— Strix Gefneri,	12	1
Veterum Meleagris,	4	1	— Vulturina,	12	3
Uf,	11	1	Ululae Genus alterum,	12	2
Ugla, (Horn-)	11	4	Vogel Ghyer,	10	1
Ugla, (Horn-)	11	4	— (Nacht-)	12	3
Ugu,	11	1	— (Schnee-)	5	12
Uho,	11	1	— (Stofz-)	8	35
Uhr Eule,	11	4	— (Stront-)	10	10
Uhu,	11	1	Voll Habicht,	8	3
Villanus apud Recentio-			Voogel, (Kroon-)	7	6
res,	8	32	Ur-Hahn,	5	1
Vinago,	1	5	— Han,	5	1
— Aldrovandi,	1	5	Uragen,	5	1
— Gazæ,	1	5	Urblan,	5	12
— (Gazæ)	5	4	Urogallina major,	5	1
Vifarent,	9	10	— major Schwenckfel-		
Vishaern,	9	10	dii,	5	1
Ul,	12	3	— minor,	5	2
Ulula,	11	1	Urogallus,	5	1

ALPHABETICUS.

lxxj

G. V. S.

G. V. S.

Urogallus alius,	5	1	Weis Kopff,	10	9
— major,	5	1	Weisse Falck,	8	D. 4
— minor,	5	2	— Falck, (Grau)	8	17
— minor Aldrovandi,	5	2	— Geyer,	8	D. 4
— minor aliis,	5	2	— Geyer, (Grau)	8	17
— minor Americanus,	5	10	— Pfau,	7	B. 7
— minor punctatus,	5	A. 2	— -Reb-Huhn,	6	A. 1
— simpliciter,	5	1	Weisser Adler,	9	3
Urubitinga,	9	12	— Falcke,	8	D. 4
— Brasiliensibus,	9	12	— Heuner Ahr,	8	18
— Brasiliensibus Marc-			— Pfaw,	7	B. 7
gravii,	9	12	Welsch-Hun,	2	1
Urubu,	10	10	Vuelsch Kutzle, (Kleine)	11	5
— Brasiliensibus,	10	10	Welsche-Tub,	1	E. 2
— Marcgravii,	10	10	Welscher-Han, (Groffer)	3	C. 1
Urutavi cuquichu caririri,	9	13	Welsch-Raeb-Hun,	6	12
Urutaurana,	9	13	Weye,	8	35
— Brasiliensibus,	9	13	White-Belly'd Dove,	1	31
— Brasiliensium Marc-			— breasted Guinea-Hen	4	A. 1
gravio,	9	13	— China-Pheasant,	7	5
— Marcgravii,	9	13	— crown'd-Pigeon,	1	33
Ussata, (Sowa)	11	4	— Eagle,	9	3
Wachtel,	6	14	— Falcon,	8	D. 4
Waehel, (Wand-)	8	27	— Owl,	12	2
— (Wannen-)	8	27	— Owl, (Common)	12	2
Wald Eule, (Kleine)	11	5	— Pea-Cock,	7	B. 7
Wand-Waehel,	8	27	— Winged-Dove,	1	15
Wander-Falck,	8	6	Whitish Vulture,	10	9
Wannen-Waehel,	8	27	Whooping Owl,	12	3
— Vahel,	8	27	Wickel,	8	1
Wannt-Wehen,	8	27	Wieg-Wehen,	8	27
Warwouwen,	10	11	Wielki, (Jastrzab)	8	3
Wasser-Falck,	8	29	Wild-Dove, (Common-)	1	1
Wau,	8	35	— Houn, (Wyfz-)	5	12
Wehen, (Wannt-)	8	27	— Hun,	6	1
— (Wieg-)	8	27	— Pidgeon, (Common-)	1	1
Weib, (Roetel-)	8	27	— Pigeon, (Common-)	1	1
Weih, (Roetel-)	8	27	— Turkey, (New-En-		
Weihe,	8	35	gland)	2	B. 1
— (Lach-)	8	27	Wilde-Taube,	1	5
Weiher,	8	35	—	1	6
Weis-koepffichter-			— Tauben,	1	5
Geyer,	10	9	— Tub, (Kleine)	1	3

	G.	S.		G. V. S.
Wilder Han Ufs Africa,			Vultur fulvus nofter,	10 7
(Freundeuder)	4	1	— fufcus,	8 29
— Han Ufs Barbarijen,			—	10 2
(Freundeuder)	4	1	— Gallinæ Africanæ fa-	
Wind-Vanner,	8	27	cie,	10 10
Windhover,	8	27	— Gryps,	10 12
— (Coc de)	8	27	— lateritii coloris,	10 7
Winged Kite, (Long-)	8	35	— Leporarius,	10 6
Witch, (Mountain-)	1	29	— Leporarius Germanis,	10 6
Wl, (Kerch-)	11	4	— Leporarius Germano-	
Vultur,	10		rum,	10 6
—	10	1	— Leporarius Gefneri,	10 6
—	10	6	— Leucocephalos,	10 9
—	10	7	— λευκοκεφαλός,	10 9
— Ægyptius,	10	3	— magis cinereus,	10 1
— albicans,	10	9	— medius,	8 30
— albo capite Schwenck-			— Mexicanus,	10 10
feldii,	10	9	— Monachus,	10 11
— albus,	10	9	— niger,	10 4
— Alpinus,	10	5	— nigricans,	10 4
—	10	8	— parvus,	10 9
— Anferinus,	10	6	— pullus, &c.	10 10
— aureus,	10	5	— Pygargus,	8 G. 4
— aureus Alberti ma-			— quem Germani vocant	
gni,	10	5	Alz-Gyr,	10 6
— aureus Gefneri,	10	5	— quem Germani vocant	
— aureus Ornithologi,	10	5	Hafen-Gyr,	10 6
— aureus Raji,	10	5	— ruber,	10 7
— aureus Willughbeyi,	10	5	— Σποδοειδεστρος,	10 1
— Boëtico Bellonii con-			— subluteus, &c.	8 C. 4
gener,	10	7	Vulture,	10 1
— Boëticus,	10	5	— (Ash-Coloured),	10 1
— Boëticus Autorum,	10	5	— (Chefnut)	10 5
— Brasiliensis,	10	10	— (Golden-)	10 5
— Brasiliensis Marcgra-			— (Harecatching)	10 6
vii,	10	10	— (Swarthy)	10 4
— castaneus,	10	5	— (Whitish)	10 9
— cinereus,	10	1	Vultures, (King of the)	10 11
—	10	6	Vulturi affinis Brasilien-	
— cinereus Autorum,	10	1	fis,	10 10
— cinereus Jonftoni,	10	1	Vulturina Aquila Aldro-	
— cristatus,	10	6	vandi,	10 8
— fulvus,	10	7	Vulturum, (Rex)	10 11

lxxiiij

五

AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant elles puissent sortir du livre, & se voir à droite dans l'ordre qui suit.

Page	66.	Planches I, II, III, IV, V, VI & VII.
154.		VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV & XV.
164.		XVI.
176.		XVII.
180.		XVIII.
218.		XIX & XX.
260.		XXI, XXII, XXIII & XXIV.
306.		XXV, XXVI, XXVII, XXVIII & XXIX.
418.		XXX, XXXI, XXXII & XXXIII.
452.		XXXIV & XXXV.
474.		XXXVI.
526.		XXXVII.

ERRATA.

Pagina 3	linea 36.	mandi ulâ	lege	mandibulâ
16	35.	tredecim	lege	duodecim
70	8.	TENBEIN.	lisez	TEUBIN.
86	4 & 7.	Godheu de Rivier.	lisez	Codeheu de Riville.
116	20.	pex ses	lege	pes sex
167	35.	Ο'ρλάκιος;	lisez	Ο'ρλάκιος;
183	20.	Ερζοταος.	lisez	Ερζοταος.
312	5.	SPRINTZLE SPRINTZLING.	lisez	SPRINTZLE ; SPRINTZLING.
348	28.	es plumes	lisez	Les plumes
353	3.	drée, sur	lisez	drée. Sur
358	8.	marqué	lisez	& marquées
358	20.	engrainer	lisez	engrenent
391	35.	s'engraine	lisez	s'engrene
392	3.	s'engraine	lisez	s'engrene
459	4.	Εκλωκοτεργς.	lisez	Εκλωκοτεργς.
468	13.	rapines	lisez	rapine
516	10.	s'étend	lisez	s'étendent

EXTRAIT DES REGISTRES de l'Académie Royale des Sciences.

Du 9 Août 1758.

Messieurs Duhamel & de Jussieu, qui avoient été nommés pour examiner la suite de l'Ouvrage de M. BRISSON, sur les animaux, contenant l'*Ornithologie* ou la troisième Classe du Regne Animal, dans laquelle se trouvent environ quatorze cens Oiseaux rangés suivant une nouvelle méthode, par ordres, sections, genres, especes & leurs variétés, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que quel que soit le mérite des autres Ornithologies, qui ont été publiées, celle-ci les surpasse de beaucoup par le nombre d'Oiseaux inconnus qui y sont figurés & décrits, & qu'elle mérite d'être imprimée avec l'approbation de l'Académie, en foi de quoi j'ai signé le présent certificat. A Paris ce premier Avril 1759.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien amés LES MEMBRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne ville de Paris, Nous ont fait exposer qu'ils auroient besoin de nos Lettres de Privilège pour l'impression de leurs Ouvrages. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Exposans, Nous leur avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudroient choisir, toutes les recherches ou observations journalieres, ou relations annuelles de tout ce qui a été fait dans les assemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires, ou traités de chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits ouvrages, & jugé qu'ils sont dignes de l'impression, en tel volume, forme, marge, caractère, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon leur semblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de vingt années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes ; sans toutefois qu'à l'occasion des Ouvrages ci-dessus spécifiés ils puissent en imprimer d'autres qui ne soient pas de ladite Académie : faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucune

traduction ou extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit des Exposans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier, & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, qu'avant de l'exposer en vente, les Manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, le Sieur DAGUESSEAU, Commandeur de nos Ordres, Chancelier de France, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre dit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits Exposans & leurs ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original; Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le dix-neuvième du mois de Mars, l'an de grace mil sept cent cinquante, & de notre règne le trente-cinquième.

Par le Roi en son Conseil.

MOL.

Registré sur le Registre douze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N^o. 430. fol. 309. conformément au Règlement de 1723, qui fait défenses à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir à la susdite Chambre huit Exemplaires prescrits par l'Article 108 du même Règlement. A Paris le 5 Juin 1750.

LE GRAS, Syndic.

erg / u
han ru kissen





